




DB

Bull 3

cas

Bertrando
Barbieri
1870




F
104

567 **BERTRUCCIO.** Bertrucii Bononiensis, medici sua tempestate per Italiam famigeratissimi, compendium sive (ut vulgo inscribitur) collectior um artis medicae tam practicae quam speculativae... *Coloniae, ap. Melchiorrem Novesianum, 1537, in-4, vélin, tr. rouges. (Rel. mod.).* 400 fr.

Réparation très soignée à la marge inf. du titre et de quelques ff. Bel exemplaire. Les œuvres de ce célèbre médecin, qui eut parmi ses élèves Guy de Chauliac, sont peu communes.

DURANT 565

CC-12251



BERTRVCII BO

NONIENSIS, MEDICI SVA TEMPESTATE
per Italiam famigeratissimi, compendium suæ (vt vulgo inscribitur)
collectorium artis medicæ, tam practicæ quàm speculatiuæ, nunc
demum recognitum & suæ integritati restitutum
per D. Ioannem Cæsarium.


Petrus

a

Cum indice locupletissimo.

Tugurio

Medicæ



Allobrogi Sabaudia
COLONIAE, apud Melchiorē Nouesfanum,
Anno D. M. D. XXXVII. Mense Martio.

De archanaq. medicæ

IN COMPENDIVM

SIVE (VT VVLGO INSCRIBITVR) COLLE

ctorum totius medicinæ, auctore Bertruccio Bononiensi medico sua
ætate per Italiam famigeratissimo, ad magistrū Tilmānum Grauium

sue à fossa, virum præter singularem erga viros doctos beneco-

lentiam munificentiamq;, ab alijs multis præclaris animi

dotibus commendandum Ioannis Cæsarij

Præfatio.



OMPLVRES quidem ex recentio
ribus medicis, iisdemq; præsertim per
Italiam olim fama & doctrina claris,
idq; intra annos plus minus ducentos
post Græcos Arabesq; magnos illos de
arte medēdi scriptores, & inter hos Ga
lenum cum primis & Auicennam, vt
obiter silentio præteream medicorum
veluti deum Hippocratem, & alios nō
nullos eiusdē professionis tam ex Græ
cis quā ex Latinis & Arabibus non
parui nominis scriptores, aggressi sunt

de eadem arte præcepta colligere atq; de his scribere per compendia, nō
alio (opinor) proposito à se fine, quā vt dedita opera prodesse possent
medicinæ studiosis, cæterum eisdē maxima ex parte tironibus adhuc
in ea præsertim artis parte, quam vulgo practicam vocabulo græcanis
lo vocant, vt quæ in actione potissimum & in exercitatione consistat,
atque id quidem vt non inutiliter omnino, ita fortassis nec infelicitè
Verum inter hos ipsos compendarios (vt ita dicam) scriptores nullus
operam suam hac in re utilius feliciusq; mihi visus est collocasse, quā
Bertrucius Bononiensis medicus sua tempestate, qua per Italiam de
git imo claruit, celeberrimus & tanquam Aesculapius aliquis inter cæ
teros id ætatis medicos habitus. Qui præterquam q; nullam ipsius ar
tis partem in opere à se condito, intactam reliquit (vt quæ alioqui mul
tifariam multisq; modis diuidi soleat) non præcepta modo memoratæ
iam aliquoties artis collegit quā diligentissime, eademq; in compen

dium redegit, ordine profecto vt pulcherrimo ita artificiosissimo: sed & futurum insuper medicum ad exemplum (ni fallor) Fabij Quintiliani magni me hercule de institutione oratoria scriptoris, ita format adeoque instruit atq; instituit, idq; sane non tam ad practicam ita vulgo vocatam, quàm ad ipsam speculatiuam quoq; alteram huius artis atq; scientiæ partem, vt nisi idem ille quisquis tandem fuerit, plane stupidus sit & vel communi sensu destitutus, modo non sit ipsius artis omnino rudis atq; ignarus, is iam tuto aggredi possit ipsam medendi curandiq; methodum viamq; citra artis calumniam, & citra famæ suæ iacturam, & (quod summopere cauendū est) citra ægrotantium periculum, quantum quidem in ipso fuerit, & iuxta Hippocratis sententiam atq; doctrinam nihil eorum quæ ad officium medici spectare dignoscuntur, omiserit, simulq; & ægri opem medici requirentes eius monitis non inuite paruerint. Verba autem Hippocratis, quibus illa docet atq; præscribit in ipso statim suorum aphorismorum principio, imo in totius illius libri veluti procemio ad hunc modum se habent, *δὲι δὲ οὐ μόνον ἑωυτοῦ παρέχῃ τὰ δέοντα ποιοῦντα, ἀλλὰ καὶ τὸν νοσέοντα, καὶ τοὺς παρόντας, καὶ τὰ ἐξωθεν*: quæ latine versa sic sonant. Oportet autem non solum se ipsum præstare opportuna facientem, sed & ægrum, & assidentes & exteriora. Et hæc tenus quidem de authore operis, qualē videlicet sese in ipso præstiterit, hoc est, cuiusmodi in arte medendi fuerit, satis superq; dictū sit. Nunc de opere ipso quale sit, & quid ei incommodi acciderit, posteaq; ab authore suo digressum in publicum prodijt toties transcriptum manu, toties prælo subductum, deinceps dicendum. Opus nimirum tale est, si ad rerum cognitionem præcipue spectes, quæ vtriq; insignis in eo atq; notabilis obseruatur vbiq; vt vel eo saltem nomine, si non alio, author ipse inter magnos huius artis scriptores censerī haberiq; non immerito possit. Nam quod in ipso causantur quidā styli siue dictiōis ruditatem, seu (vt apertius dicam) barbariem, non est q̃ me in hoc opus habeat excusatore aut etiam defensore, vt quod vitium illi cum multis sui temporis scriptoribus in omni fere studiorum genere commune fuit atq; id proinde temporum potius iniuriæ quàm authoris inscitie tribuendum est. Vfus tamen est (vt dicam quod res est) stylo non vsq; adeo à Romanæ linguæ puritate abhorrente, vt hoc quoque nomine cæteris sui similibus in re medica scriptoribus præferendus veniat. Sed illud iniquius ferendum, q̃ opus ipsum præterquam q̃ innumeris prope in locis deprauatum fuit atque vitiatum, insuper compluribus quo-

que in locis mutilatum fuerit atq; truncatum, adeoque vt passim vel sum
in eo toti, imo & pagine aliquot integre desiderarentur. Quod equidem
cum ipse tandem inter legendum aliquoties animaduertissem, non po
tui sane diutius ferre ac pati opus tam vtile, tamque necessarium medi
cinæ studiosis, cuius gratia & mihi semper eius operis author præ cæter
is eiusdem farinae scriptoribus quàm plurimum arridebat, ita deprau
atum & corruptum, ita truncatum & mutilatum circumferri. Vnde
protinus adiecto animo, simulq; & ad mota manu tentare omnino vo
lui, atq; periculum facere quid possem, si hunc ego vel supra vires meas
laborem subirem. Cæterum vbi iam labor ille mihi insumptus vix cœ
ptus erat, tot vndique veluti monstra mihi occurrebant obstrepebant
que, vt deterritus illorum multitudine cœptum laborem destituere des
creuissem, & destituissem plane, nisi tu mihi animum rursus iniecisses,
ac veluti stimulum aliquem addidisses, Tilmanne vir humanissime ac
summe doctorum virorum fautor atque promotor. Id quod profecto
de te iam erga magnum illum Erasmum Roterodamum, & Arnol
dum Vesaliensem viros vndecunque doctissimos pro comperto ha
beo, ac certo scio, quibus proinde cum adhuc in humanis agerent, im
pensissime fauebas, affectusque eras non alio vllò quàm bonorum stu
diorum respectu. Itaque arrepto rursus animo simulque concepta spe
fore scilicet, vt non omnino labor iste frustra à me susceptus videretur,
adhibitis hinc inde atque collatis aliquot manu scriptis exemplaribus,
ad hoc ante omnia intentus eram, vt quæ loca deerant desiderabantq;
passim operi ipso infererentur, vnde opus ipsum vtcunque tandem suæ
integritati restitueretur. Interim tamen & ex monstris illis quædam
obiter confodi ac sustuli, quod omnia confodere atque sustollere mihi
propemodum impossibile videretur, nisi magno cum periculo autho
ris. Quippe quod hæc ipsa monstra partim ab ipso producta constaret,
ac veluti ex eo nata, quæ certe (vt supra dixi) temporum fuit iniuria,
partim transcriptorum & excusorum indiligentia suborta & inuecta.
Quæ utinam ne hic quidem taxanda veniret. Sed vt finem tandem
huic nostræ præfationi faciam & illud postremo adiiciam, quod si quid
gratiæ mihi debebitur à studiosis medicinæ cum primis pro insumpto
labore isto, eius sane bona pars ad te iure optimo referetur, vt qui me
ad hunc laborem peragendum inter alios instigaueris maxime & im
puleris quodāmodo. Dixi, Coloniae sexto nonas Martij, Anno à virgi
neo partu Millesimo quingentesimo, trigesimo septimo.

IN SEQVENTEM

BERTRVCII BONONIENSIS LIBRVM IN:

dex copiosus, & accurate collectus.



Bortum patiētia. fol. 185. col. 3
Aētus medicorū circa corpus
humanum sextuplices es-
se fol. 5. columna 2
Aētio laesa triplex 26. col. 4
Aētio calidi naturalis quid fa-

ciat 48. co. 3
Acuta rhyptica quæ sint. 81. co. 3
Et hic notandum quod ubiq; hoc modo
rhyptica scribendum est. Sunt autē rhy-
ptica medicamina purgatoria siue abster-
soria

Acura ventrē excitātia quæ sint. 145. co. 3

Aegritudinum materialium modi termina-
tionis quot sint 239. co. 3

Aegritudines duorū sunt generum. 239. co. 3

Aegritudines quibus modis terminent. 3. 2

Aloes commēdatio 93. col. 1

Alitatio quid sit 44. col. 2

Amentia signa 28. co. 2

Anatomia humani capitis cuiusmōi sit. 12. 2

Analepsia 32. col. 3

Animi passiones quō moderandæ 7. co. 4

Animi subuersio quid sit 105. co. 2

Ani vlcus & apostema 156. co. 3

Ani ragadia & fissuræ 153. co. 3

Anodina quæ sunt 81. c. 3

Appetitus prostratio quæ sit 95. co. 2

Appetitus prostratio quot de causis fiat. 95. c. 2

Appetitus prostrationis causæ tres. 96. co. 4

Appetitus caninus quis dicatur 97. c. 4

Appetitus corruptio quæ sit 99. co. 3

Apoplexia 35. co. 2

Apoplexiæ genus duplex 35. co. 2

Apoplexiæ secundum Galenum species tres

Aqua cicerum vel pisorum quomodo fiat

& quam vim habeat 218. colum. 2

Aqua ordei siue ptisana quomodo fiat &

quam vim habeat ibidem

Albaras & morphea quid sint 261. co. 1

Aqua corrosiua fortissima 155. col. 3

Aquæ operatio triplex 104. co. 7

Arthetica passio quæ sit & quot eius species

196. colum. 3

Aurium dolor

Asthma quid sit

Ascites quid

B Othor quid sit

Bolismus quid sit

Branchus quid sit

C Achexia quid

Calculus & arena rubea quomodo

generentur 159. col. 1

Calculus & arena quō differant 159. co. 1

Calidi quæ proprietates 135

Cancer quibus nominibus dicatur iuxta lo-

corum varietatem 190. co. 4

Calor naturalis vbi primit⁹ reperiat. 208. 1

Calor naturalis quō distinguatur à colore

febrili ibidem

Calor putredinis quis dicatur ibid.

Cancer in naso 55. co. 1

Canis rabidi morsus effectus, & cura. 250. 4

Capitis dolor 12. col. 4

Caputpurgii contra defectū odoratus. 56. 2

Capillorum decoratio quæ sit 252. 3

Capillorum generatio quæ 252. c. 4

Capillorum à canicie præseruatio ibidem

Capillorum crispatio quomodo fiat. ibid.

Capillorum casus quot accadat modis. 253. 2

Cardiaca passio quid sit 84. co. 3

Carminantia ventositates 182. co. 1

Casus vuulæ 57. c. 4

Casitatem custodientia 172. 4

Catarrhus quid 62. 3

Catarrhus frequens quæ mala adferat. 11. 2

Catarrhus quibus plerunque temporibus

fiat 64. co. 2

Catalepsia quid 32. co. 4

Cerebri influxus in totum corpus 176. 2

Cerebri distinctio 12. 2

Cerebri colatorum 12. 3

Cerebrum maxime lædentia 49. co. 4

Cerorum nobile pro stomacho frigido hu-

mido & debili 93. col. 2

Cerorum conferens ijs qui cibum vomere

solent 93. col. 1

Cholerica passio quid sit 108. 3

Cholerica passio quare dicatur 108. c. 4

fol. 52. colu. 1

67. c. 3

118. col. 4

56. colum. 3

98. co. 3

62. c. 3

118.

159. col. 1

159. co. 1

135

190. co. 4

208. 1

ibidem

ibid.

55. co. 1

250. 4

12. col. 4

56. 2

252. 3

252. c. 4

ibidem

ibid.

253. 2

84. co. 3

182. co. 1

57. c. 4

172. 4

62. 3

11. 2

64. co. 2

32. co. 4

176. 2

12. 2

12. 3

49. co. 4

93. col. 2

93. col. 1

108. 3

108. c. 4

I N D E X.

Cholera quare ad stomachum & ad intesti- na mandetur	109.co.4	Ciborum differentia quædam	ibid.
Cholera vitellina vnde fiat	126.3	Coitus diminutio vnde pueniat	171.3
Choleram generantia inter alia præcipue sunt dulcia, vntuosa	255.3	Coitus quantum noceat corpori	174.2
Chylus perfectus quis sit	89.co.3	Coitū diminuentia quæ	172.co.4
Cibi vnde procreentur	2.co.2	Coitus supflus q̄ mēbra lædat	201.3
Cibi regimē q̄t modis perficiatur	5.4	Colica passio quid sit	146.4
Cibus superflus q̄ mala inducat	9.1	Collyriū ad oēm maculā oculorū & ad lipo- ptudinē & ad fluxū oculorū, visum cua-	
Cibi medicinales qui sint	ibid.	Collyriū miræ virtutis pro (stodiēs. 47.3	
Cibi paucum sanguinem generantes qui sint	37.1. & 45.5	oculorū defectu remouendo	49.3
Cibi sanguinem multiplicantes	38.2	Complexio distemperata quomodo sit res- ducenda ad temperamentum	9.2
Cibi vaporosi qui sint	45.3	Consuetudo quando seruāda qñ non	6.4
Cibaria sanguinem turbantia q̄ sint	45.3	Consuetudo mala quomodo sit reducenda ad temperamentum	9.2
Cibus & potus vaporosi qui sint	51.1	Congelatio quid sit	20.1
Cibi grossi viscosi	76.4	Cordis debilitas cur appelletur	31.2
Cibi creatū facientes idemq̄ lenitiui.	76.4	Cordis tremor	39.3
Cibus mundificatiuus, nutritiuius, consoli- datiuius, confortatiuius	80.4	Cordis dolor, apostema, & vulnus	87.1
Cibus & potus styptici qui sint	82.3	Cordis, hepatis, & cerebri influxus in totū corpus	116.co.2
Cibi frigidi qui sint	85.2	Coriza quid sit	62.3
Cibi multū & subito corpus nutriendes qui sint	162.4	Corporum differentia secundum raritatem & densitatem;	9.c.3
Cibi inflatiui qui sunt	173.4	Corporis humani diuīso in stipitē, ramos, & deinceps	12.1
Cibus amplior vtrum in cœna an in pran- dio sumendus sit	94.c.4	Corpus humanum quot & quibus partibus integretur	208.3
Cibi calidi acuti qui sint	96.4	Corpis impinguādī mod⁹ i q̄ cōsistat.	113.2
Cibi melancholiam generantes	ibidem	Corpus q̄mo maceretur	263.3
Cibi viscosi qui sint	98.co.2	Corporū macrorū genus duplex	ibid.
Cibi ventosi qui sint	108.co.4	Corpis grossities siue crassities duplex	263.1
Cibi acuti sanguinē generantes	106.1	Corpis exiccādi regimē cuiusmodi esse des- beat	257.c.4
Cibi styptici qui sint	136.4	Corporum differētia multiplex & effectus	
Cibi impinguentes qui sint	141. c.3	Corporis ptes duplices.	ibid. (264.2
Cibi gñantes melācho. naturalē q̄ sint.	153.2	Crisis accidentia duorū generū sunt	276.1
Cibi generantes melancholiā non naturalē per adustionem qui sint	155.2	Crisis in morbo quid	238.2
Cibi generantes melancholiā non natura- lem per congelationē qui sint	ibid.	Crisis quot fiat modis	238.co.4
Cibi q̄ cito & multū nutriūt & facile diges- runtur qui sint	229.2	Crisis per quot regiones fieri habeat.	238.3
Cibi vehementer calidi qd faciāt	228.2	Crisis euacuatiōis q̄t cōtineat species.	238.4
Cibi vehemēter frigidi qd faciāt	ibid.	Crisis pmutatiōis q̄t cōtineat species.	ibi.3
Cibi vehementer sicci qd faciāt	233.4	Crisis vera q̄t habeat cōditiones	239.3
Cibi inflatiui & ventosi	117.2	Crisis p quā regionē fieri solet	243.2
Cibi corpus humectantes q̄ sint	263.co.1	Crisis laudabilis quæ	ibid.co.3
Cibi opilantes q̄ sint	137.1	Crisis illaudabilis quæ	ibid.
Cibi siue res exiccātes corpus	263.3	Dētes quō differāt ab aliorū ossiū ge-	
Ciborū exiccantiū corpus differentia quo- plexū	ibid.	Dentiū & gingiuarū corrosio.	ibi.
		Diabete quid sit	164.c.8

I N D E X

Diætæ ordo duplex	21. column. 4	Emplastrum repereussuum in dolore dors	204.1
Diætæ differentia triplex	216. CO. 2	si	204.1
Diarrhæa vrinæ quid sit	ibidem	Emplastrum anodinũ & mitigatiũ ois dolo	215. 204.3
Diarrhæa per quid cognoscatur	233. CO. 4	Emplastrum splenis confortatiũ & deop	
Dierum creticorum cognitio quomodo ha		piliatium	106. CO. 3
beatũ	241. C. 2	Emplastrum vomitum prohibens.	107. CO. 2
Dies creticus siue ad bonum siue ad malũ		Emplastrum maturatiũ	112.1
quis	242. CO. 3	Emplastrum expertum ad omne duriciem	
Dierum creticorum diuisio	ibidem	materias grossas mundificans in stomac	
Dies indicatiuus quis	ibidem	cho, hepate, & splene	113. 4
Dies indicatiui quotupliciter distinguantur	242. CO. 4	Emplastrum resolutiũ	52.3
Dies in q̄ crisis fieri solet p̄cognitio.	243. C. 2	Emplastrum calidum	ibidem
Digestiones quot sunt	94.2	Emplastrum exiccatiũ & consolidariũ	53. CO. 2
Digestio prima quot modis impediatur.	94.3	Emplastrum expertũ contra dolorem dentium qualemũq;	59. CO. 2
Dolores maximi qui sint	53. CO. 1	Emunctoria corporis quæ sint	238.3
Dorsi dolor vnde proueniat	203. C. 2	Epiglottis, qd sit	61.1
Dulcia grossa quæ	117. C. 2	Epilepsia quid sit, & quot eius species.	32.2
Didymi qui sint	196.1	Epithema cor confortans. 84. col. 1. Et hic notandum quod vbiq; sic scriptum legatur.	
Dysenteria per quid deprehendatur	133. 4	Epithema ad fluxum mēstruorum resurgendum	176.2
Dysnia quid sit	67. CO. 3	Epithema repereussuum in dolore dors.	204.2
E gestio quid significet	115.2	Eruetatio quid sit	103.3
Egestio temperata quæ sit	89. 4	Euaeuatio duplex	216. 4
Electuarium nobile confortans stomachum, digestionem promouens, cor lætificans, putrefactionem prohibens, mēbra calefaciens, renes & vesicam purgans.	92. column. 3	Exitura quid sit	69.3
Electuarium mirabile quod valet male digerentibus vomentibus lientericis & diarrheticis	93. CO. 3	Experimentum de felle bouis vel porci	146. CO. 4
Electuarium hepatis aperitiũ.	126. CO. 4	Extenuandi corpus ars quæ sit	262. 4
Electuarium refriactiũ	141. CO. 1	F ames quid sit	106. CO. 3
Electuarium ad raucedinem vocis cōferens	64. C. 3	Fastidium cibi quid sit	95.2
Electuarium pro oculis in causa humida & ad purgandum renes & ad prouocandam vrinam	49. CO. 4	Febris quid sit	208. C. 1
Electuarium pectorale & magistrale.	77. C. 2	Febris species siue differentie primæ quot sint	208.3
Electuariũ diastatirion quod cōficiatur.	172.3	Febris ephimera quæ dicatur	209.1
Electuarium ventositates carminans.	173. 4	Febris ephimera causa multiplex	209.2
Electuarium restauratiũ corporis hectici	212. CO. 3	Febris ephimera proprium quid	210.2
Embrionis siue fœtus in vtero situs	186.2	Febris hectica quæ dicatur	210.4
Empima quid sit	70.2	Febris hectica species tres	211.1
Empioica passio	60.3	Febris putrida quæ	214. 4
Emplastrum ad omnem squinantiam.	62.1	Febris sanguinea quæ sit	211. CO. 3
Emplastrum acuta rubrificatiua q̄ sunt.	62.1	Febris sanguinea quot species.	221.3. & 4
Emplastrum hepaticum	96. C. 2	Febris cholericæ interpollata quæ sit.	224.8
Emplastrum maturatiũ	76. CO. 4	Febris cholericæ interpollata duplex. ibid.	
		Febris cholericæ continua quæ sit	226.4
		Febris continuæ de cholera species duæ.	227.2
		Febris slegmatica interpollata q̄ sit.	227.4

Febris tropica qd sit. 230. 4. 1
Febris tropica qd sit. 230. 4. 1
Febris tropica qd sit. 230. 4. 1

Febris putrida quo tendat prolongata. 81.2	Hepatis exitura	ibidem
Febris plegmatica continua quæ sit 229.4	Hepatis vlcus	ibidem
Febris epiala cuiusmodi sit 230.3	Hepar à proprietate respicientia ex simplis cibis	133.2
Febris liparia cuiusmodi sit ibidem	Hepar aperientia, & deoppilantia	96.2
Febris melancholica interpollata q̄ sit. 231.1	Hepatis debilitas	114. c.3
Febris melancholica cōtinua q̄ dicat. 234.1	Hepatis vlus siue operatio	114.4.
Febris composita erratica 234.2	Hernia quid sit & quotuplex	195.1
Febris pestilentialis q̄ dicatur 235.3	Hominem quodammodo omnia esse atque ideo ab antiquis microcosmum dictū. 2.1	
Febris composita quæ 234.2	Horarum quatuor in febribus significatio, & quæ eas fieri debeat crisis	240.2
Febris commixta 234.2	Horripilatio in morbis quid sit	230.3
Febris erratica quæ ibidem	Horripilatio, rigor, tremor, typus, quomodo differant	230.2
Febris cognitio, an p̄ crifim terminata nec ne, rursus an longa vel brevis sit 239.3	Humores vnde generentur	2.60.2
Februm genus triplex ibidem	Humorum quatuor educendos; mod⁹ 4.1	
Fellis cistis vias habet tres 125. col.1	Humidum radicale quid agat	9.3
Ficus quid sit 154. co.1	Humida nutritiua quæ sint	81.3
Fistula Lachrymalis quæ dicatur 50. col.1	Humidum radicale cuiusmodi sit	84.2
Flegma quid sit 229. c.2	Humorum destructio secundum substantiā & colorem	142. c.1
Flegma vitreū in quibus mēbris fiat. 142.2	Humor⁹ quatuor proprietates	114.4.
Fluxus sanguinis narium 54. co.1	Humiditas quid sit	264.1
Fluxus omnis sanguinis, modis tollit. 54.3	Humiditas in corpore duplex	263.4.
Fortus siue embrionis ē matrice debitus & naturalis exitus quis sit 187. co.2	Hydromel quid sit & quō conficiat	218.2
Formica miliaris quæ sit 264.3	Hydrosifis quid	118.3
Frenesis quid sit 21. c.3	Hydropicor⁹ aqua duas habet partes. 124.1	
Frigida quæ sint 81. c.3	Hypofarcha quid	118.4.
Frigidum & siccum principijs vitę contrariari 84. col.2	Ictericita quid	125.1
Frigidi quæ proprietates 135.2	Ignis perficus quis dicatur	269.3
Furfures capitis qui sint 254.3	Ignis volatilis quis dicat	ibid.
G argarismata resolutiua q̄ sint 61.3	Iliaca passio quid sit	146.4.
Gargarismus sanās omnem squinantiā 62. c.4.	Impetigo quid sit	264.3
Generationis membra q̄ & quot sunt. 171.2	Impinguandi corpus ars	262.4.
Glandula quid sit 78.1	Imprægnationis difficultas vnde proveniat	187.3
Gonorrhœa quam vulgus medicorum gonorrhœam appellat, qd sit 174.4.	Imprægnationem prohibentes causę quę sint	183.3
H æmorrhoides in ano. 154.1.2.3.4.1	Imprægnationē impediencia q̄ sint. 185.2	
Hæmorrhoides à gbus morbis corpora præferunt ibidem	Imprægnationis & sexus ipsius fortus quæ signa sint	183.1
Hæmorrhoidum differentię ibidem	Incubus quid sit	37.4.
Hæctica senectutis q̄ dicatur 273.2	Indigestionis signa quæ sint	95. c.1
Hepati conferentia 116.1	Intestinatorum numerus	133.2
Hepati nocentia ibid.	Isophagus siue œsophagus ut qdā scribitur quid sit	54.1
Hepatis oppilatio & durities 116.2	Iulep quid sit & quō conficiatur	218.1
Hepatis influxus in totū corpus ibid.	Iuncturarum dolori omniquaq; nocentia quæ sint	201.2
Hepatis tensio ibid.		
Hepatis oppilatio quot modis fiat. 125. co.1		
Hepatis apostema 127.2		

Laborum fissura	56.	cautelae obseruare oportere	3.2
Labores spontanei qui dicantur	206.1	Melancholia descriptio quædā	231.2
Lac in mamillis exuberat quinq; de causis	87.co.4	Melancholia duplex	236.4
sis	ibid.	Melancholia non naturalis effectus multiplex	257.1
Lactis sterilitas vnde proueniat	88.3	Melancholiam generantia quæ	226.3
Lac quomodo generetur	80.c.4	Melancholicæ passionis species duæ	27.2
Lactis triplex siue trina substantia	83.3	Melancholiæ vsus quis sit	134.1
Lac quomodo fiat acetosum	141.c.4	Membra corporis humani vñ generet	2.2
Lactis diuersa genera	141.c.4	Membra spiritualia quæ sint	64.4
Lapis in renibus vel in vesica duorum est modorum	159.3	Membra naturalia quæ sint	68.4
Lentigo quæ dicatur	265.co.1	Membra nervosa quod mollescent	198.4
Lepra quid sit	256.4	Membra carniformia quomodo differant à membris spermaticis	89.1
Lepræ species quatuor	257.c.2	Menstrua quæ ætate mulier habere incipiat & quæ desinat	178.4
Lepra quib; signis cognoscat.	257.2. & 3. & 4.	Mensiuorum partes quatuor	ibid.
Lethargia seu potius lethargus qd sit	23.4	Mensiuorum exuberans fluxus quibus tēporibus præcipue fiat	179.1
Libror; compilatio quot de causis fiat	1.c.1	Mensiuor; retentio vnde proueniat, ibid.	161.2
Lipotomia	89.2	Menstrua prouocantia quæ sint	176.1
Lienteria per quid cognoscatur	133.4	Mensiuorum fluxus	178.3
Lingua grauedo & magnitudo	58.1	Mensiuorum causæ quot sint	121.2
Loca emunctoria totius corporis qt.	207.2	Mezereon quid	118.4
Lohoch ad rauedinem vocis	64.3	Mirach quid	118.4
Lutum sapientiæ quod dicatur	200.3	Mola siue matricis inflatio vnde proueniat at	189.1
M assa sanguinis in epare geniti segregatio ad vesicam vsq; tribus perficitur modis	156.4	Morbilli & variolæ quæ dicantur	236.4
Materiæ necessitas	48.3	Morbus omnis quot modis corpus humanum infestet	232.4
Materia quid dicatur in arte medica	115.1	Morbis omnium quatuor tēpora	21.4
Materiæ carentia quid	ibid.	Mortem duobus euenire modis	84.2
Materia peccans quot modis reddatur furi osa	216.3	Mors temporaria in verbo Syncopis	84.4
Matrix cuiusmodi membrum sit	189.3	N arium factor	54.c.4
Matricis rectificatio	181.3	Narcotica quæ sint	51.co.3
Matricis prouocatio quæ sit	189.3	Naturæ instrumenta per quæ suas perficit operationes in humano corpore quæ & quot sint	208.2
Matrix vbi sita sit	88.2	Neruorum differentia	12.2
Masticis aut olibani infusio quid possit.	93.1	Neruorum passionis famosæ quin q;	38.2
Medicinam esse artium præclarissimā	1.3	Nodi in corporibus qui dicantur	264.3
Medicinam propter tria cunctis alijs scientijs præferendam	ibidem	O bluionis signa	27.4
Medicinam duobus vti instrumentis. ibid.		Oculor; inflammatiōi qd cōferat.	46.3
Medicinæ impinguentes quō fiant	263.1	Oculor; fluxui quid conferat. ibid.	
Medicina deoppilatiua q̄lis eē debeat.	132.4	Oculorum humores tres	48.2
Medicinæ facile solutiua quæ sint	136.2	Odoratus defectus	56.1
Medicamen nobile contra fistulam lachrymalem	50.2	Odorifera frigida quæ	136.4
Medicorum infamia quot & quibus cautelis caueatur	3.2	Oleum benedictum cōferens ad arthriticam de causa frigida	200.8
Medicinæ q̄s fuerit primus inuētor.	2.3		
Medicos nouos ad proximum pcedentes decē			

Oleum sapientiæ siue oleum perfecti magisterij	200.C.3	Prognosticatio futurorū morborum in genere	12.4 (at. 255.1)
Oleum conferens epilepsiæ, vertigini, obliuioni, paralyti, doloribus dorsi, & neruorum	200.3	Pruritus & scabies corporis vnde prouenit	
Opera naturæ quæ sint	89.2	Puluis restringens omnem fluxū sang.	82.4
Ophthalmia quid sit	44.4	Puluis confortās oēs cerebri virtutes quæ modo fiat	85.3
Oppilatio auris duplex	51.2	Puluis ex cortice salicis combusta contrā omnem fluxum corrosiuum	14.12
Orechmon quid sit	47.3	Puluis conferēs hīs qui in lectū inuerti min-gunt	170.C.2
Oris tortuta quid sit	42.1	Puluis stypticus & consolidatiuus	57.3
Oris factor	57.1	Puluis expertus cōtra dentiū mobilitatē	59.4
Orthomia quid sit	67.3	Puluis incarnatiuus	63.CO.3
Oscheon quid sit	395.CO.1	Puluis ad oēm fluxum restringendum siue per inferius siue p̄ superius	107.2
Oscitatio quid sit	44.2	Puluis expertus cōtra tussim humidā	66.3
P Annus faciei quis dicatur	265.1	Putrefactio quid agat	24.C.1
Partum facilitantia & eductantia secundinam	186.2	Quercina folia quid operentur	398.1
Paralyti quid sit	38.2	R Amex quid sit	395.1
Peripneumonia quid sit	75.1	Raucedo vocis	64.2
Pestarium cuiusmodi sit instrumentū	177.4	Recidiua duplex	239.2
Pharmacum leniter euacuās humores adu-stos	265.1	Regimen cibi quot modis perficiat	5.4
Phthisis quid sit	77.3	Remedium cōmune ad omnē tussim	66.4
Phthisis duplex	81.2	Renum debilitas	156.3
Pilulæ humorum putrefactionem in stomacho & intestinis rectificatēs	55.3	Renum macies quid sit	162.3
Pilulæ vtilēs pro stomacho cædemq; laxatiuæ conferentes omni stomacho debili cum materia	43.CO.1	Renum durities & oppilatio	263.C.2
Pilulæ bichichiæ quomodo fiant	63.C.2	Renum apostema	ibidem
Pilulæ conferentes in omni tussu Cartarihasi	63.4	Renes maxime lædentiæ	94.4
Pilulæ remouentes tussim impediētē somnū similiter & contra aerem pestilentialem conferentes	66.4	Res non naturales quæ & quot sunt	5.4
Pilulæ expertæ ad omnem hydropisim ex quacūq; causa	122.4	Res stypticæ calidæ	115.2
Pilulæ stypticæ contra omnem fluxum ex quacūq; causa	141.1	Res maxime oppilantes q̄ sint, & hic nota qd̄ verbum oppilans per duplex pp̄ scribendum sit	9.4
Pilulæ contra pestilentia inuasionem quomodo conficiantur	236.2	Res diureticæ quæ sint	169.4
Pilulæ sublimes ad omnem catarrhū restringendum	66.CO.4	Res vrinatiuæ quæ	ibidem
Pleurēsis quid sit	68.1	Resolutiua & mollificatiua q̄ sint	56.C.4
Polypus in naso	55.CO.1	Reubarbari commendatio	92.1
Pomi cōfectio p̄ cerebri cōfortatione	89.1	Rheuma quid sit	62.3 62.3
Potus famosi in febre quatuor sunt	218.1	Rheuma si perseverauerit quæ malā inferat	64.colu.1
Portio ad catarrhum restringendum	93.1	Ruptura quid sit	69.3
Priapismus quid	173.1	S Anguinis natura quæ sit	221.C.3
Principium in arte medendi triplex	216.4	Sanguinis & sanici mictus	157.3
		Sanies vnde fiat	333.4
		Sanitas quot modis conseruetur	5.C.3
		Sapientia ordo in vlcis cura	52.4
		Sapor acetosus vnde fiat	104.1
		Sapor stypticus & pōticus vnde fiat	104.1
		Saporum genera tria	107.4
		Saporum frigidorū causæ quot sint	107.4

Saporum calidorum modi quot	108.1	Sputi & saliuæ multitudo vñ. pueniat.	57.3
Saporum téperatoꝝ modi duo sunt.	108.1	Sputum sanguinis vnde proveniat	81.4
Satyriasis quid sit	173.1	Stomachus cuiusmodi mēbrum sit	9.3
Scabies & prurit⁹ corporis vñ. pueniat.	255.1	Stomachi debilitas	89.3
Scotomia quid sit	19.1	Stomachus bonus quibus cognoscatur si-	
Scrophuli qui sint	226.2	gnis	ibid.
Semina communia calida quæ sint	160.3	Stomachi in digerendo actio læsa	ibid.
Semina cōmunia miora quæ sint	ibid.	Stomachum maxime lædentia	94.4
Semina cōmunia frigida minora	ibid.	Stomachi actio læsa triplex est	95.1
Sicca virtualiter quæ sint	42.3	Stomachi dolor & inflatio	110.1
Sicca substantialiter quæ sint	ibid.	Stomachi tunicæ duæ & earū vsus	ibid.
Sicca glutinosa quæ sint	61. CO. 3	Stomachi vlcus & apostema	111.2
Signum in morbis quid sit	209.3	Stranguria quid sit	167.1
Signum in arte medēdi à qbus sumat. ibi.		Stranguria, dysuria & suria quomodo dif-	
Simia Galeni quæ fuerit	81. CO. 2	ferant	167.1
Simplicia cordialia quæ sint	84.1	Stupor quid sit	20. CO. 1. & 43.1
Singultus quid sit	104.2	Styptica quæ sint	94.3
Singultus quot de causis fiat	ibid.	Styptica calida	114.3
Siphac quid	118.3	Styptica abstersiua	128.3
Sitis quæ sit	100.3	Styptica aromatica	129.3
Sitis duplex	102.3	Styptica incarnatiua quæ	47.3
Sitim quid reprimat	122.2	Subeth quid sit	20. CO. 1
Soda quid sit	16.2	Sudor quid significet	220.4
Somnium diurnum non vituperari quinq;		Suffocatio maxicis	36.3
obseruatis conditionibus	7.2	Surditas duplex	51.1
Somni proprietas siue conditio, q̄ sit	10.2	Synopsis quid sit	36. CO. 3. & 84. CO. 3
Somnus temperatus & debitus quot requi-		Synopsis duplex	89.2
rat conditiones	ibid.	Syringa quid sit	161. CO. 1
Somnus quid operetur	10.3	Syrupus nobilis cōferens ad ardorem vri-	
Spasmus quid sit	40.2	næ	166.3
Species non acutæ quæ sint	76.4	Syrupus euacuans aquā p vrinam	120.4
Species aromaticæ proprie quæ sint	83.4	Syrupus bonus ad raucedinem vocis	64.3
Sperma multiplicantiæ quæ	163.1	Syrupus maturatiuus	71. CO. 3
Spiritus in humano corpore qd sit	209.1	Syrupus bonus cōtra omne vitium pectō-	
Spiritus operatio triplex	201.2	ris	73. CO. 2
Spiritus vitalis quid sit	87.2	Syrup⁹ de meliloto, q̄ digerit oēm materiā	
Splenis debilitas	130.2	adustā, salsam, & acutam	55.1
Splenem confortantia à proprietate	131.1	Syrupus optimus in dysenteria & mīstu	
Splenis debilitas quæ mala inducat	ibi. 2	sanguinis	177.4
Splenis oppilatio, magnitudo, durities, &		Syrupus digerens materias grossas & frigi-	
tenso	ibid.	das, mēstrua, & vrinam prouocans, læ-	
Spleneticis confert vrina propria sumpta.		pidem frangens & oppilationes aperis-	
	132.3	ens	180.2
Splenis oppilatio q̄ mala adferat	133.1	Syrupus cholæræ digestiuius in quacūq; cor-	
Splenem respicientia à proprietate ex sim-		poris particula quæ fiat arte	224.4
plicibus	133.2	Syrupus digerens flegma ex quacūq; par-	
Splen receptaculū humoris melācholi.	29.2	ticula corporis	228.3
Splenis apostema exitura & vlcus	133.1	Syrupus ad digerendum & euacuandū hu-	
Squinantia quid sit	61. C. 1	morem melancholicum à quacūq; par-	
Squinantiæ species quot sint	ibidem	ticula corporis quomodo pareat	232.4

I N D E X


Tempora quatuor in febribus quò di
stinguantur 24.3
Tenasmus quid sit 131.2
Tenta quid sit 50.1
Tepidi quæ proprietas 135.2
Tetanus quid sit 36. co.3 & 40.2
Throscici contra oppilationem 132.1
Throscisci de reubarbaro ad omnem oppi-
lationem hepatis, & antiquas ægritudi-
nes in ipso 117.2
Tinnitus aurium quot de causis fiat 50.4
Tragæa pro stomacho frigido & debili &
ijs q cibum vomere soleant 93.2
Tragæa contra eructuationem 103.4
Tragæa ad stomachi dolorē eundemq ven-
tosum 110.4
Tragæa ad purgandum renes & prouocan-
dum vrinam 49.4
Tragæa ad idem ibid.
Tragæa contra omnem fluxū ex quacunq
causa 141.1
Tragæa conferens ijs qui laborant ardore
vrinæ 166.4
Tremor quid sit 43. c.1
Tussis quid sit 45.1
Tympanites quid 118.4
Vaporatio sublimis ad ardorem vri-
næ 166.4
Varices qui sint 201.4
Vena saluatella vbi sita sit 82.1
Vena saphena vbi sita sit ibid.
Venenosæ duplex genus 245.1
Venena ex sua qualitate nocentia duorum
sunt modorum 245.1
Venenum à proprietate agens quot modis
ab alijs generibus venenosæ differat. ibi.
Venenosæ cura & medicina 247.2
Venenosæ quæ per exterius applicant, effe-
ctus & cura 250.3
Venenosæ particularium effectus & cura q
sint 247. c.2. & deinceps ex ordine.
Venenum triplex 84.3
Ventris fluxus 133.3
Ventris stypicitas quid 143.3
Venter lubricus quis appelletur 109.4
Venter stypicus q̄t modis lubricifcet. 145.3
Vermes qui in nobis nascūtur geney sunt
trium 149.1
Verrucæ in ano 154.1
Verrucæ in corporib. q̄ dicantur 264.3


Vertigo quid sit 120. c.1
Vesicæ apostema 171.1
Vesicæ passionēs quot 164.4
Vesicæ compassio ibid.
Vigiliæ superflux, vnde fiant 25.3
Vigiliæ vnde proueniunt 25.3
Vigilia quid operetur 70.3
Vini differentia secundū vsum diuersorum
corporum 10.1
Vini proprietates in cordis cōfortatiōe. 84.2
Vinum non digestum quid agat 201.2
Vini proprietates quæ sit 43.2
Virgæ & testiculorum passionēs q̄ 171.2
Virtutes sensitiuæ interiores quæ & quot
sint 26.4
Visus debilitas vnde proueniat 48.2
Vlcus quid sit 81. c.2
Vlcus quō à vulnere differat 28.4
Vinctuosi proprietates quæ 144.1
Vnguentum ex vehementer attrahentibus
51.2
Vnguentum album quod sit 53.2
Vnguentum expertum in cura cuiuscunq
vcleris saniosi 53.3
Vnguentum apostolicum cur dicat ibid.
Vnguentū consolidās omne vlcus in quo
cunq corporis loco 56.4
Vnguentum cutem mundificans à pedicu-
lis & scabie 256.1
Vnguenta corpus exiccantia 263.4
Vniuersale quot modis dicatur 217.3
Vomitus quō prouocetur 138.1
Vomitus quid sit 105.2
Vomitus quatuor de causis sit 105.2
Vomitus quomodo prouocetur 85. c.1
Vomitium ad euacuandum omnes humi-
ditates in stomacho 55.3
Vrina digesta quæ sit 89.4
Vrina quid significet 115.2
Vrinæ insensibilis exitus vñ pueniat. 170.1
Vrinæ ardor qd & vnde pueniat 166.2
Vrina digesta in ægritudinibus quibus &
quot signis cognoscatur 221.1
Vrinæ contenta quot & quæ sint ibide m
Vrinæ differentia multiplex ibid. & 2
Vulnus quō ab vlcere differat 83.1
Zirbus quid sit 195.2
Zuccarum rosatum quō fiat. 84.1
Zuccarum violarum quomodo fi-
at ibidem

F I N I S.

ERRATORVM ELENCHVS, IN QVO PRIMVS NV-
merus folium, secundus columnam, tertius versum indicat.

Fo. 5. colum. 2. vers. 5. pro esse, lege pro posse, 8. 2. 36. succo ros. 16. 2. 17. anethi. 17. co. 3. natu-
ra recipit, le. repit. 24. 2. 32. mellis 3. iij. 24. 2. 34. fellibus acuta. 28. 1. 16. & æquitare, expunga-
tur. 28. 4. 39. Primo ergo. 30. 4. 5. melancholici generis redacta. 32. 4. 36. hiera nosos, 32. 4.
23. proprie tamen. 33. 10. confricando. 20. co. 4. apl. ctonica, leg. plethorica. 38. 3. imbiben-
te. 43. 3. 3. humorosa. 46. 4. 45. pyria. 45. co. 2. cui mox, leg. oxymelle. 52. 1. 3. pilus filii ibid.
pulex vel culex. 53. 2. 30. syringam. 54. col. 2. pulvis boli ai menici mixtus. 57. 4. 6. vuulæ.
Sic in toto illo cap. legatur. 59. 4. 7. 8. stercore capræ. 59. 2. 38. de fleg. subtili extinguitur.
59. 4. 30. & sano sputo. 75. 3. 42. añ. 3. iij. 79. 1. 8. cubeæ. 79. co. 4. spumofam, le. spasmofam.
85. co. 2. suppone, leg. superpone. 92. 10. 3. frigiditati q̃ siccitati, le. siccitati q̃ humiditati. 93.
co. 4. pl. hierapicra, le. hieræ picræ. 95. co. 2. ellatur, le. cōpellatur. 101. co. 4. signis quādoq;
le. signis fit quādoq;. 105. 3. 19. hora expungat. 106. co. 3. 3. duas leg. 3. 6. 113. 3. 19. & nō prius
ponat. 117. 4. 32. puocef ergo. 119. 4. 29. feminis, le. 3. 6. 150. 1. Si vero cū, le. Si vero p cura.
152. co. 3. q̃ omnium styptica, le. & oia styptica. 153. 4. ver. vlt. & post q̃, expungatur &, des-
inde vbi legitur styptics, quidam legunt cū rhypticis. 162. 4. 35. post cibū per 2. horas. 163.
3. 41. ex similibus dictum ibidem. 164. co. 1. vesicæ cōpositionē, le. vesicæ cōpassionē. 165. 4.
linita exterius. 165. 3. 25. in modū olei, deinde misceat cū ipso olei violæ; &c. 169. 4. ver.
penult. in 20. dieb. vel circa id, vt contingit in pleuresi, & peripneumonia. In ventre vero
frigido in 40. diebus hoc contingit, vel circa illud. 172. 3. linguæ auis. 173. co. 2. camph. 3. 5.
le. 3. 5. 173. co. 1. Signa vero, le. si vero. 174. co. 2. spasmus vrinālē, le. spas. vniuersalē. 176.
co. 1. in cholerica, le. in colica. 179. 3. 12. & ex generatione infint, habitudo corporis ficca,
&c. 18. 3. 36. corticis cassiof. 185. 1. 20. sed qualitas. 185. co. 2. cōplexio parens, le. cōplexio pu-
rens. 188. 3. ver. vlt. p^o men. pur. per dies quinq;. 189. 4. 23. figuram virgæ. 191. 4. 13. 8. olei
ros. 3. iij. ceræ 3. 1. &c. 204. co. 1. Sup dorsum caufatus, 225. 4. 24. in casu qñq; necesse fieri
egestio, verbi gratia, si molestiora accidētia. 24. 2. 6. sunt refractio, 224. 4. in 3. 4. aceti. 225.
2. 37. cum in tertiana vera tempus paroxysmi sit 12. horar; ad plus &c. 225. 3. 42. discrata.
227. 4. 3. Accidit hæc fe. ex fleg. 244. 3. 39. in 17. crisis. 260. 4. 13. & melancholia gñm diuerso
rū ex eisdē fiant causis, vt est dictū a princ. 261. 1. 28. Et alba quidē fit ex humore flegmati
co, grosso viscoso. Rubea vero ex hum. sangu. 262. 3. 9. excorticatæ; añ. 3. 1. fabar; excor-
ticatæ; cicer; pisor; excorticatog; farinæ ordeī, añ. 3. ij. se. raphani, &c. 265. 2. 9. albedio
dinemingerat





COLLE

CTORIVM MEDICINAE
vtilissimum ac pernecessarium Bertru-
tij Bononiensis, suæ ætatis me-
dicorum principis,



QVONIAM (VT ait Galenus medicorū princeps in septimo de ingenio sanitatis libro, capite 1.) librorū compiliatio tribus de causis fieri dignoscitur. Primo, ad exercitium proprii intellectus. Secundo, ad obuiandum obliuioni, quæ in senio fit. Tertio, ad satisfaciendum petitionibus amicorū. Idcirco ego Bertrutius genere Lombardus, in scientia medicinæ Bononiæ conuersatus, cum considerassem dispendia atq; varietates in parte practica medicinæ intellectum; q̃ plurimorum in ipsa operari volentium cōturbare, tum quia nuper introducti scriptis obscuris intrincantur, tum quia intelligentes & prouecti scribentium multitudine disturbantur, tum quia per regiones proficiscentes mole chartarum obruuntur, tum etiam quia nostri temporis philosophi breuitate scripturarum oblectantur: remedia omnium passionū corpori humano accedere possibilium, stilo (quo potero) breuiori, ordine quoq; convenientiori, autorū imitans vestigia, & præcipue Hippo. Gale. Rasis, & Aui. & postremo Ioh. Hebem. nihilq; proprii ponens: sed quod expertum est, & ab expertis traditum, pro posse lucidius exarabo. In collectione autem præsentis opusculi (quod collectorium nuncupari desidero) ordinem Iuicen. in suo lib. canoñ. obseruabo. Faciam namq; ex ipso duos libros generales, in quorū primo loquar de ægritudinibus particularibus, quæ sunt a ver-

rice capitis vsq; ad plātam pedis: ipsum in tractatus 22. diuidens, more tertij canon. eiusdē: ita vt primus tractatus istius primæ sectionis, & secundus secundæ, & sic deinceps pulchre cor respondeant, vt hic dicta prōptius & facilius dictis Auiacen. comprobentur. In secundo libro loquar de ægritudinibus vniuersalibus, stilo & ordine quarti canon. obseruatis. Antidotarium autem non subdam proprium: sed in singulis curis antidota propria cōficiam: vel ad antidotarium Nicolai Salernitani remittam: qui de antidotorum descriptione, iuuamēto & administratione breuiter & clare scribens apud communiter operātes omnium nationum medicos est acceptus. Anteq̃ tamē hūc laborem operosum aggrediar, tria non sine iuuamento præmittam capitula. Primum de medicina, secundum de medico, & tertium de corpore medicando: & erunt sicut præludium & prægustatio dicendorum. Verum quoniam in totius vniuersi compagine a summo philosophorum magistro compertum est vnum esse principium, quod solum si hīpsi sufficit ex se, quod est id, quod est, cui cūcta subsunt, & ad quod cūcta respiciunt, quodq; suam bonitatem omnibus tribuit affluenter: idcirco bene se habet in exordio præsentis operis, ad eius fontalem originem decurrere, atque ab ipso scribendi gratiam impetrare, quatenus digne assumpti laboris esse propitius initiator, largissimus adiutor & perfectissimus consummator: quod vt fiat, humiliter ei verbum deuoti Iohannis Hebemese scriptum in suo de medicinarum consolatione proœmiali ca. offero, dicentis: Hoc opus aggredior auxilio & bonitate dei confisus qui sit benedictus. Fac igitur pietissime deus sermonum meorum felicem congeriem de thesauro largitatis tuæ, qui es omnia felicitans.

¶ De commendatione artis
medicinæ.

Caput .I.

Medicina artium est præclarissima. Hæc verba primus medicinalis scientiæ repertor Hippocrates, qui nūquam aliquid eorum quæ dixit, falsè vel fabulose protulit (vt de ipso Galenus secūdo de crisi, tertio cap. asserit euidenter) ad commendationem suæ artis in libro de lege protulit, excel-
lenter intēdens in ipsis talem rationem: Illa ars siue scientia merito est omnium præclarissima cunctisq; præferenda, in qua ex omni genere suarum causarum redditur ratio: sed medicina est huiusmodi, ergo medicina est artium præclarissima. Maior patet ex terminis, quia subiectum & prædicatum vel sunt omnino idem, vel sese necessario consequuntur. Assumptum probatur per omnium causarum genera discurrendo. Incipiamus igitur a nobiliori causarum, quia ab eo quod bonum est, bonum est vt inchoemus, vt dicit Galenus in libello de malitia complexionis diuersæ. Redditur ergo medicinalis scientia ex parte suæ causæ formalis cunctis alijs quam sublimiter præferenda propter tria. Primum est suæ cognitionis certitudo siue efficacia demonstrandi. Secundum est suæ imitationis celsitudo siue gradus subalternādi. Tertium est suæ cōsiderationis altitudo siue profunditas speculandi. Primum reddit ipsam fixam & immobilem. Secundum celsam & non humilem. Tertium honorabilem & difficilem. De primo dicit Galenus in commento primi Apho. & Avic. secund. cano. cap. secūdo, de cognitione medicinarum per rationationem, quod inter omnes artes et scientias sola medicina duobus vtitur tanquam instrumentis, experimento scilicet & ratione, cum aliæ scientiæ sola

vtrantur ratione, neq; omnes omni: sed quædam formalitantum, vt mathematica: quædam formali efficiente & finali, vt naturalis philosophia prout in prologo libro physicorum edocet Auerrois in commento, De secundo scribit commentator Alexandrinus in libro sectarum dicens: Philosophatur quippe medicus circa humanū corpus. Sicut nāq; philosophia est medicina 2^a: ita medicina est philosophia corporis. Et Galenus tertio de crisi, ait: Mihi nanq; nō est possibile vt inueniam aliquam operationem huius artis, nisi per vsum principiorum certorum. Quapropter vocauit me necessitas, & ad addiscendum scientiam naturalem, & ad inuestigandum speculationem in ea. Et Auerrois primo colliget dicebat: Medicina est ars operatiua, exiens ex principijs veris, i. verificatis in philosophia naturali, de q̄ philosophia loquitur Seneca. 34. episto. ad Lucinium: Dei munus est per quod viuimus, philosophiæ vero quod bene viuimus. In qbus verbis ipsam primo omnium rerum principio comparat euidenter. Nam per philosophiam deū atque omnem veritatem speculamur, lux ra illud Aristote. 2. Meta. Vocantes philosophiam veritatis scientiam, recte se habent: sed per dei & totius veritatis speculationē felicitamur, iuxta illud Aristote. 4. Ethic. Dei itaq; operatio beatitudine differens, speculatiua quædā est: humanarum autem quæ huic cognatissima, felicissima est: sed per felicitatem deo assimilamur, iuxta illud ibidem: Dijs etenim vita omnino beata est, hominibus autem intantum, inquantū similitudo quædam operationis huic inexistit. Aliorum autem animalium vltimum felix nequaquam: sed per assimilationem deum amamus, & ab ipso amamur, iuxta illud ibidem circa finē: Sapientis amatissim⁹ deo est, q̄a ei simillima.

De tertio scribit Iohan. Damasc. in suis Apho. Certe in medicina imēsa est profunditas. Operari autem secundū libros sine solerti ingenio & perfecta ratione molestū est. Et subdit: Vita hominum brevis est ad cognoscendū vires oīm terrarum nascentium, tu autem quæ in propatulo sunt, & in quibus oēs consentiunt, & maxime quæ tu probasti, tene: q̄ vero contrarium, relinque. Eius autem difficultas ex alio percipitur, quia cunctas præsupponit scientias, eis vtens tanq̄ suis ministris: vtitur grammatica propter eruditionem, logica propter rationationem, philosophia propter cognitionem, mathematica propter dierum criticorum computationē. Redditur secundo medicinalis scientia cunctis quā sublimiter præferenda ex parte suæ causæ materialis etiā propter tria. Primum est sui subiecti intensā nobilitas siue celsitudo. Secundum sui subiecti extēsa capacitas siue latitudo. Tertium est huius artis immensa necessitas siue valitudo. Necessitas namq̄ ex materia dependet absoluta, sicut a fine conditionata, vt probatur. 2. Physicorū vltimo capi. De primo scribit Galenus in commento. 1. Apho. dicens: Subiectum quippe medicinæ non est lapis, corium aut lignū: sed corpus nobile atq̄ gloriosum: copus scilicet humanum, de quo loquens Auicē. primo canon. sen. prima cap. primo. ait: Donauit autē deus homini meliorem cōplexionem, quam in mundo esse est possibile, cum suarum virtutū conueniētia quibus agit atq̄ patitur. De secundo loquitur Aristo. 2. Physicorū. dicens: Est namq̄ homo quodāmodo oīs, & ideo microcosmus. i. minor mūdus ab ætīq̄ uis enūciatus est. Cōtinet em̄ homo in se primo entia diuina propter intellectiuiam partem suā, vt dicitur. 3. de anima: Intellectus autem de numero abstractorū est.

Continet entia cōlestia propter spiritus quos in se habet. Spiritus namq̄ est substantia corporea ex commixtione quatuor elementorū causata, vergens in similitudinē supercōlestiū corporum, vt scribit Auicē. in libello de viribus cordis, cap. 2. Continet tertio naturam elementorū quatuor. Nam vt ait Auicenna. 1. Canon. sen. prima capi. de membris: Membra sunt, quæ ex primo humorū commixtione generantur: quemadmodum humores ex prima ciborū, & cibi ex prima elemētōrū cōmixtione procreantur. Continet quarto naturam mineralium cum operationum suarum mirāda proprietate atq̄ stupenda raritate. Nā et si magnes ferrum attrahit, non tamen inter ferrū hoc vel illud distinguit: Et si magnes ferrum attrahit, non tamē aliud a ferro se repellit. Membra autē nostri corporis sic ad se attrahunt iuuuentiū, quod ab ipso discernūt nocitiū, & ita agunt in nutritiū quod expellūt a se superflū. Continet quinto naturā plantarum, quia habet in se virtutē naturalem, & ministrantem, & cui ministrat, q̄ vegetat, nutrit, generat & augmentat. Continet sexto naturam animalium, quia habet intra se principia, quibus animal a nō animali distinguitur, scilicet sensum & motum. De tertio loquitur Cassiodorus libro. 6. epistolarū variatum: Inter vtilissimas artes, quas ad sustentādum humanæ fragilitatis indigentiam, diuina tribuerunt, nulla præstare videtur aliquid simile, quod potest auxiliariæ medicina conferre. Ipsa em̄ morbo periclitantibus materna gratia semp̄ assistit, ipsa cōtra dolores pro nrā imbecillitate cōfligit, & ibi nos nititur defendere, vbi nullæ diuitiæ, nulla dignitas potest subuenire. Huic alludit dictū sapientis Ecclesiastici 38. cap. dicentis: Honora medicum propter necessitatem

De commendatione

etenim creauit eum altissimus. Additur
tertio medicinalis sciētia omnibus alijs
preferenda ratione suæ causæ efficien-
tis, etiam propter tria. Primum est auto-
rum suorum reuerenda vetustas. Secun-
dum est autorum suorum solers atq; stu-
diosa sagacitas. Tertium est autorum
suorum amica atq; placabilis tractabi-
litas. De primo loquitur Aristoteles se-
cūdo Meta. Non solum gratias debe-
mus ijs qui bene dixerunt, sed & qui ma-
le. Aliquid enim nobis boni cōtulerunt,
namq; habitum nostrum præexercitati
sunt; & ideo si Berosus nō fuisset, Timo-
theus non esset, & ita multa melodia ca-
reremus. Autores autem medicinalis sci-
entiæ primi omnium fuerunt, nam pri-
mus medicinæ repertor fuit Apollo, &
filius eius Aesculapius, anteq̃ principia
aliarum scientiarum forēt aliquatenus
reperita: ipsorum tamen scripta ad nos
non peruenerunt, propter interruptionē
studij ex diluuiū mundi. Hunc igit̃ Apol-
linem homines sui temporis intantum
admirati sunt, vt potius diuinum quam
hominem nuncuparēt. Propter quod &
Gentiles vsq; ad hodierna tempora de-
um sapientiæ prædicant, ac adorant. Pri-
mus medicinæ artis repertor, cuius scri-
pta ad nos peruenerūt, fuit Hippocrates
Cous, vt dicit Galenus in commento il-
lius Apho. tertiæ particulæ. Aegritūdi-
nes in pluualibus. & si nāq; ipsum præ-
cesserint medici de assidis, vt patet pri-
mo regiminis acutorum, illi tamen po-
tius empirici fuerant, quam rationales.
Iste igitur Hippocrates non solum medi-
cis, sed & philosophis, Platoni & Ari-
stoteli principia tradidit suæ artis, teste
Galeno septimo de ingenio sanitatis, ca-
pitulo primo dicente: Hippocrates qui-
dē bonus fuit agricola, qui primus hanc
artem seminauit, indiget autem & ali-
quo, qui semina eius augeat & irriget. Se-
cundum probat suorum autorum copio

sa varietas. Non enim reperitur alia sci-
entia tot scribentium calamis exarata.
Ipsam nāq; perfecte tradiderunt Hippo-
crates, Galenus, Dioscorides, Rasis,
& nunc tempore nouissimo Auicenna,
& Auerrois, & plures qui sequunt̃: pro-
pter quod dicit Auerrois quarto colligit
capitulo de signis totius complexionis:
Neq; ob hoc despicias, quæ in hoc libro
nostro reperiēs, si ipsa reperisti in alijs.
Plurij nāq; cribrat idem homo vnum
modium sabuli, vt vnicam margaritā
reperiat. Huic arridet dictum Cassiodo-
ri secundo epistolarum variarum: Omne
scientificum quanto profundius quæri-
tur, tanto gloriosius reperitur. Et Iohan-
nes Damascenus ait: Libros peritorum
veterum relegere, eosq; diligenter discu-
tere, omnem sapientem iuuat. De tertio
loquitur Galenus tertio de virtutibus na-
turalibus capitulo tertio: Deprecor oēs
audientes libros meos, illam inuestiga-
tionem dimittere, quam faciunt qui so-
phisticam intentionem requirunt. Hæc
enim intentio nō generat nisi bellū atq;
litem rabiosam, sed conuertit studium
suum ad indagationem virtuti pertinen-
tem, studium & veritatē sectantes. Red-
ditur quarto & vltimo medicinalis sciē-
tia super omēs alias gloriosius extollen-
da ex parte suæ causæ finalis, etiā pro-
pter tria. Primum est lucri copiosa acq-
sistio. Secundum honoris atq; amicorum
iucunda adeptio. Tertium, animæ vlti-
mata atq; perfecta felicitas. De primo
loquitur Auicē. primo canonē seū. prima
in procemio: Non est autem bonum, vt
non sit plurimum huius scientiæ apud
vnumquemq; & in eius memoria con-
sistat, qui nomine huius sciētię nomina-
ri seu per eam lucrari desiderat. De secu-
do loquitur Hippo. primo Prognostico
rum ca. primo: Omnis qui meditāx ar-
tis studio seu gloriam, seu delectabilem
amicorum desiderat copiā, &c. De ter-

rio loquitur Gale. 1. de sanitatis ingenio dicens: Qui vult curare animam, primo curet corpus: cum deficiente organo nullus dubitet architectonicū defecturū. Ad quam felicitatem vt perducamur, orationem Auerois quinto colliget finali positā deuotis mentibus offeramus, vt deus nobis consentiat peruenire ad vltimā felicitatem, quæ beatitudo sempiterna appellatur.

De informatione medici.

Caput II.

Quoniam propter malitiam vulgarium & incuriositatem medicorum licet peritorum, sciētia medicinæ simul cū medico sepe ludificant, & apud idiotas inter vanas glorias potius quā veritates reputantur. Quod respiciens Cassiodorus 4. libro variarum epistolarum dicebat: Hoc malum quasi naturaliter est in pectoribus humanis radicatum, vt qui nesciunt artes, non honorent artifices. Propositum est presentis capituli cautelas innuere, quibus peritorum medicorum infamia tollatur, & eorum vita inculpabiliter conseruetur. Ignaros namque præsentem erudire non cupio, cum de ipsis scribat medicorum princeps 2. de febribus ad Glauconē: Medice quomodo curas, si causam ægritudinis ignoras? Si enim nescis an morbus sit periculosus nec ne, quomodo nō nisi temere facis, quicquid facis? & si quis curatus a te euaserit, nō tui muneris, sed fortunæ est. Et primo de crisi. 13. capite dicebat: Et si tu nō cognoscis horam præsentem ægritudinis, & quanta sit propinquitās vel elongatio a statu, nō euacuabis, quin lædas ægrum nocumento magno in regime diætæ plus vel minus dādo quā oportet: cum ad hoc tempus vniuersalis limitē dixeris, & non erit differentia inter te & illum qui nihil nouit de medicina. Et Iohan. Hebemefue in suo de appro-

priatis 1. cap. Medice, qui corporum curā geris, auxiliari ne differas. Semel namque pereunt nullum amplius superest remedium. Dicamus igitur cautelas 10. numero, quarum prima est de aggressu noui medici ad practicam. Cum igitur tyro prædictus nuper studium exierit, et inexpertus sit varietatis consuetudinum, & regionum & complexionum & intricationum morborum cum eorum causis, nō sit præceps ad opus, nec ægrum quēcūque in suam custodiam recipiat, neque omnibus salutem promittat: sed primo pusillanimus salubres ægritudines ad se trahat, neque de salario in se importune, sicque degat potius expensas moderando quā lucrum aceruādo, donec in experientia radiceatur, & eius gloriā fama prædicet popularis. Quia cautius est gradatim ascendere, quā cito scandentē ad præcipitium festinare. Et hanc experientiæ necessitatem signans Iohan. Damascē. in lib. suo variorum sermonum, dicit: Nulli medico etiam studioso credendum est nisi ætate approbato. Secunda est de conditionibus circa ægrū obseruandis. Cum igitur medicus primo accesserit ad ægroi salutem ei nuntiet vultu hilari, deinde illum consilians sibi principium ægritudinis secundum diem & horam perquirat, & qualis antecesserit diætā secundū obseruationem sex rerum nō naturalium: & si quid fecerit propter quod potest talis morbus euenisse: & si non consueuerit tali morbo certis temporibus exorare, & qua horarum consueuerit exacerbari, & qua mitigari, et per quales modos assuetus sit ægritudines terminare, an per fluxum ventris, sudorem, vomitum, fluxum sanguinis nariū, menstrua, hæmorrhoides, scabiem, an per fleboromiā vel farmaciam, sollicitus perquirat. Deinde dispositiones singulorum membrorum corporis articulatim inuestiget. Primo de mēbris animalibus, utpote an assint

De informatione.

vigilia, subeth, somnia terribilia, dolor capitis, tinnitus, vertigo & similia. Secundo de membris spiritualibus, utpote si insit tussis, & an sit sicca, difficilis, cum pūctura lateris & anhelitu anxio, et caumate circa pectus, et an sentiat, vel quando senserit catarrhos descēdentes per guttur, raucedinem & sputi grossi multitudinem post somnum inducentes: & an sit eis spiritus ordinatus vel suspirijs intercisus, & similia. Tercio de mēbris naturalibus, an assit prostratus appetitus, amaritudo oris, sitis, fluxus ventris, vel stypticitas, hypochondriacorum dolor, lenitas mirach, mollities corporis, & extremorum æqualis caliditas vel inæqualis lateris flexibilitas, vomitus, nausea, vrinæ retentio vel exuberantia, ardor vrinæ, dolor articulorum, labor spontaneus musculorum, qui sunt in ambitu corporis totius, & similia. Ex his namque omnibus dirigitur, ut differētiās pulsus, conditiones vrinæ & egestionis & sputi plenius diiudicet & cognoscat. Tunc igitur vul tu maturo & deliberatione sollicita pulsum utriusque brachij quatuor suis digitis decenter extensis, sufficienti tempore contingat, eius notans differētiās secundum longum & curtum, magnū & paruum, fortem & debilem, durum & mollem, rarum & spissum, velocem & tardum, ordinatum & inordinatum. Tunc non fans, neque respiciēs sed oculos in terram vel ægri faciem prudēter defigens, latum se exhibeat. Ex ijs veritatē percipiet, & fidem ægri ad se trahet. Deinde soletter ad vrinam procedat in loco luminoso, quem radij solares non tangāt, quarēs qua hora noctis fuerit proiecta: & an fuerit corrupta & postea rectificata, et cōsiderans eius differētiās secundum substantiā, an subtilis, an grossa, an perspicua, an turbulēta: & secundum quātitatē, an exuberās, an diminuta respectu potus, et secundum qualitatem, an citrina,

an rubea & c. & secundum contenta, an hypostasis sit alba, lenis, æqualis, pyramidalis: an nebula pendens, aut spuma, vel granum natās, vel scabies in fundo residēs, vel arena, vel pilus, vel filū spermaticum. Neque illa hora negligat de renum & vesicæ dispositione perquirere: vitupera si circa alchatin, vel lumen dolores sentiat, ne renum vel vesicæ vitio decipiatur, attribuēs epati vel venis quod ipsorum est, aut econverso. Deinde gradatim ad egestionem tendat, earum substantiā colorē, & quantitātē & horā exeundi discutiens. Similiter & de sputo, si forte te pererit in paropside conseruatum. Quibus omnibus ordinatim pertractatis, si sciens eris in arte medicinæ, poteris infirmo passionem & causam passionis aliquāliter declarare: ita ut se per te magis quam per seipsum cognoscat: quare te admirans sapiētem & excellentē prædicabit, & firmabitur in te fides sua, & cōfortabitur virtus: & surget contra morbum subito cum crisi, vel gradatim cum melioratione de die in diē, & sanabitur perfecte. Iuxta illud Galeni in commento primi prognosticorum: Medicus (inquit) optimus est: qui plures sanat: plures ille sanat in quibus plures confidunt. Et illud Avicē. in canonicis suis: Plus valet confidentia ægri de medico, quam medicus cum oibus suis instrumentis. Tertia est de processu ad actum curatiuum. Quādiu igitur medicus causam morbi perfecte non cognouerit, medicinas non ministrare: sed cum temperata diætā & blanditijs ægrum suspendat. Iuxta illud Avicē. 1. cañ. scñ. 4. ca. 1. circa finē: Cum autem ignoras quod sit ægritudo, relinque eam naturæ, & non properes: quoniam aut natura superabit ægritudinē, aut ipsam manifestabit. Postquam autē causam noveris ad actum curatiuum procedas cum ordinatione diætæ & administratione medicinæ conuenientis. Diætā autem (si aliquo modo possibile fuerit) fiat in cibis et potibus et

hora sumendi secundum appetitum & consuetudinem infirmi, iuxta illud Hippo. secundo Apho. 2. ca. Parum deterioribus & potus, delectabilior vero melioribus quidē, sed indelectabilibus præferendus est. Et ibidem: Ex multo tempore consueta, & c. Morbū tamē & eius causam, & horā exacerbationis, vel status nullatenus prætermittat. Medicinā vero si possibile fuerit, sint potius cibi medicinales q̄ medicinā purā, quia minus per eos natura terribiū. Et si nō sufficit, procedat ad puras, a leuiorib⁹ gradatim incipiens, & ad fortiores paulatim necessitate urgente transcendens. Quia hic est ordo sapiētiæ vt dicit Mesue, & magis p̄ exterius q̄ interius eas administret. Soluriuas autē medicinas quo ad pōr euiet, & ipsarum vsum differat: & si necessitas ipsarum ingruerit, ipsas consolatas & rectificatas in virtute & sapore propinet, dosim eius pensando in se, et respectu propositi corporis: quod fieri potest per reuelationē infirmi, vtp̄ta quia forte frequenter ipsas assumpsit, & se forte solubilem facile vel difficile cognouit. Quod si non ita res se habeat, scire oportet, q̄ corpora q̄ vt plurimū faciliter solvuntur, sunt rara & macilentia: quæ vero difficulter, sunt solida & grossa p̄ naturam. Humores etiā educendos cōsideret. Quia cholera est facile educibilis, melancholia difficile: sed flegma medio modo se habet. Similiter cholera sæpe educitur per vomitū, & proprie in æstare, & corpore consueto, vel facile vomēti. Manchoia vero nequaquā crassitie prohibente. Flegma per vtranc⁹ potest educi regionem. Consideret igitur regionem, per quam natura educit spōrancee, et illac etiā educat per artem, iuxta illud Hippo. par. 1. Aph. Vnde cumq̄ repit natura, medicinis opiat⁹ & stupefactiuis nequa q̄ vtiatur, nisi extrema necessitate cogēte: vtp̄ta si dolor vel insomnietas

ægri ad defectionē perduxerit, vt docet Gal. 12. de ingenio sanitatis. Tūc vtratur eis potius per exterius, q̄ interius: & si per interius, potius per inferius q̄ superius: & si per superius, potius versus diē atq̄ vigilias, q̄ noctē & somnū: ne frigiditas per ipsum vltimetur, neq̄ ipsis aliquo mō vtratur, nisi cū suis consolat⁹. Quarta est de processu ad actū prognosticū. Consideret medicus tenorē virtutis, & bonitatē vel malitiā signorū cū ipsorū numero, & diligēter trutinēt, quæ quibus præualeat in fortitudine & multitudine. Et si post hæc certa videat signa salutis, vel mortis, certum quid & determinatum pronuntiet: quia non minus laudabile neq̄ artificiosum perituro mortem prædicere, quā saluādo vitā spōdere. Tuncq̄ ab ipso fugiat, neq̄ auxilia vltiori inutelia proferat, ne ars medicinæ ludificetur, vt dicit 9. de ingenio sanitatis cap. 4. Quia mortituri solis signis prognosticis sunt relinquendi, vt dicitur in commento illius Aphorismi primæ particulæ: Quando in statu est ægritudo. Si autē dubius fuerit in prognosticatione, suspendat amicos & astantes cū amphibologico sermone dicens: Oportet me expectare plura signa, vel alium vel alium diem. Quod si adhuc dubius fuerit, verba magis applaudētia dicat: Videū mihi q̄ stantibus signis presentia iter visis, neq̄ mutata virtute ægri ad deterius, sanabit⁹ hic, vel moriet⁹ alter. Q̄ si magis iportune affines ægri medico insisterint, sit medicus magis pronus ad mortē q̄ infirmi salutē pronūtiādā. Quia si æger salu⁹ euaserit, gloria fiet medico: sin autē, nō inculpabit⁹ de morte. Et q̄littercūq̄ res se habeat, nō debet medic⁹ infirmo dicere, nisi de vita & salute: ne forte timorem incutiēs virtutem ægri prosterнат. Quinta est de astantibus informandis. Debet ergo medicus ante omnia ordinare de industriosos, humiles & sollicitos

De informatione.

astante, qui diætā & medicinas conuenienter & decenter (sicut sibi præcipitur) hora præfixa administret, quicq̃ referre sciat, quā hora æger dormire coeperit, vel expergefactus sit, & qualiter in somno se habuerit secundum os & oculos & modum decubitus, & an cum tremore vel terrore euigilauerit, an post somnū se leuius senserit, & an æger sit obediens iussis medicorū. Quia vt dicit Hippocrates: Oportet non solum seipsum præbere (quæ oportet) facientem, sed & ægotantem & astantes, & ea quæ extrinsecus sunt, scilicet expensas, & caute lam ab incendio, casu, & percussione. Neq̃ sit in talibus vltra debitum familiaris, siue sint potius patientis, siue non: imo potius erga ipsos teneat se vt præceptor magis vel magister, q̃ socius vel amicus: aliter ars ludificaretur, & lucrum sanantium abijceretur. Sexta de medico in cura suo socio. Si igitur habeas cōsociū literatū, amicabilem ad eum te habeas, de morbo et causa cū ipso conferas in camera seorsum, non in infirmi vel amicorū præsentia, ne si forte ab ipso discrepes, sonū vel rixam cōcitans, te vel tuam scientiam illudas. Si vero p̃sona sit placabilis, magis eligēs veritatem q̃ gloriam, ipsum apud ægrū & eius amicos commendā, sicq̃ mutuum capientes ambos simul vos in cura esse sollicitos, ac largo munere mulcendos, nec non prudentes, a contradictionibus abhorrentes plenarie demonstratis. Si vero effrenis et elatus fuerit, tibiq̃ detrahens, erga ipsum similiter te habeas, quia sic ars deluditur arte, & conare vt post eius recessum ab ægro, intro eas, & de ordinatione cibi & potus interroges: & si potes, rationabiliter eius consilia refutes. Si vero idiota vel ignarus fuerit, erga ipsum non tanq̃ sociū, sed subditū, vel vt ad discipulū te geras, ne hoc sibi in gloriam redundet literalem, nisi

forte humilē se exhibeat, & te apud oēs publice præcōmendat. Tunc namq̃ merito aliqua superficialia consilia erunt referenda, semper subtilibus & arduis in corde tuo conclusis. Septima est de apothecario eligendo. Procuret sibi quisq̃ medicus apothecarium in arte sua peritū, humilem, & fidelē, ne forte apparatū medicinæ retardās, vel eius substantiam permutans, vel eius pondus diminuens, vel eius recentiam & bonitatem falsificans, te & tuam artem illudat, & proprie in medicinis laxatiuis. Vnde cōsulo, vt medicinas laxatiuas glibet medicus per se potius habeat, q̃ ab alio recipiat, cum in eis sit maior timor & ingloriatio medicorum. Octaua, de consilijs porrigendis fortuito occurrentibus. Cum quis igitur venerit ad te in domo vel platea consilium petēs, vel vrinam deferens, non sis promptus ad consilium adhibendum. Sed primo conditionē considera personæ, & consilium quod petiſ. Deinde vrinā formidanter respice, præuidēs ne sit acerum, vel liquor alius, vel vrina subiugaliū, quibus illudūtur frequenter medici, & si nihil horum affuerit, cōsiliū tribue. Si vero vnum ex eis videris, eos proteruo vultu repellas. Cōsueuerunt namq̃ vetulæ de beneficio, vel impregnatione, vel abortu vel menstruorum prouocatione versute cōsiliū petere, ipsis tamen sunt omnia talia protinus deneganda: & cum vrinam inspexeris, oculos & linguam cohibe, & intentum atq̃ sollicitum te prætende: neq̃ de vrinæ iudicio responde, donec a nuntio sexum, ætatem, querimoniam patientis & consimilia sigillarim inuestiges. Aliter in vrinæ signo decipieris, quia sæpissime certificatum est eandem vrinā secundum colorem & substantiam diuersas passiones, imo quandoq̃ contrarias indicare. Signa ergo prædistinguenda a narratione dicentis sunt præoccupanda:

quod respiciens solers Ioha. Damas. ait in suo libro sermonum diuersorū: Gloriorum superbiā, & ad vrinale multiloquium (si sapias) contēnas, neq; te ægrum per singula interrogare pudeat. Vrina enī nisi morbus intra venas extiterit, fallax nuncius est. Nona de salario perēdo. Cū igitur medicus ad perfectam experientiam & vulgarem puerit famam, non veniat ad ægrum aliquem omnino, nisi rogatus & de salario certificatus, nisi forte ægrotus sit intimus, & specialiter notus, vel amicus. Nā si veneris non vocatus, deperit ægrī fides de te. Aestimatur namq; te ignarum vel suspectum, alias ad sui curam te prius vocasset. Neq; sis contentus salario pusillo. Magnam quippe sciētiā, grauē sollicitudinē, turpem stercoreis, sputi & vrinæ visitationē, & demum delectabilem sanitatis recuperationem ac vitæ redemptionē (de qua penitus desperauerat) magna & condigna decent emolumenta: nisi forte laborās sit persona pauper & miserabilis, cū qua misericorditer est agendum, via scōrū. Lucæ euāgelistæ, Pauli, Cosmi & Damiani medicorum sublimium fideliter insequēdo. Si vero de præmio gratiam ægrī contempseris, post eius mortem nō nisi vituperia recipies: quē si saluari contingat, tibi vultum diabolicum, perfugum & diuerticula præterdet, quemadmodum in tui primitiua vocatione, & auxilij deuota imploratione vultum angelicum: deinde in sui resumptione vultum humanum demonstrabit. Decima de cōuersatione medici cum extraneis. Quibus cumq; viris literatis, & proprię facultatis tuę reuerentiam exhibeas familiarem, tam religiosis quā secularibus, vt eorum veridica simul & proficua commēdatione florescas: vulgariibus vero neq; familiarem neq; elatum te offeras, ne te nimia familiaritate con-

tēnant, vel superflua seueritate deuitēt. Vestibus & gestibus honestatem diligas, non pompam, litium & dissensionum partes fugias, & ad concordandū & vniendū te præesse interponas. Vulgilaudes ne cupias, laudat namq; vituperiosum & opprobrijs refertum, dignos vitians & deturpās. Propter quod ait Aristot. i. Ethic. Volo honorari nō nisi a sapiētibus, notis, & honestis. Quomodo quis praticare potest, quo penitus est nudatus? Reuerentias tamen sibi exhibiras cum pedes veleques per ciuitatē gressus suos direxerit, non spernat, vnicuiq; iuxta gradum honoris, diuitiarum, generis, prudentiæ, vel ætatis, responsum beniuolum porrigendo.

¶ De corpore medicando, siue regimine sanitatis, & varijs medici actibus. Cap. II.

ACTVS medici circa corpus humanū sextuplex est. Primus conseruatiuus oīm p̄cipuus, quia est respectu obiecti nobilissimi, sanitatis scilicet p̄fectæ, q̄ temperies ad iustitiā, vel prope id, a doctoribus nuncupatur. Secundus reductiuius priore sublimior, q̄ est respectu sanitatis defectæ, qua vnūquodq; corpus distēperatum degit sibi propria sanitate. Tertius præseruatiuus priore nobilior, qui est respectu ægritudinis sup̄futuræ. Quartus curatiuus oīm maxime necessarius, q̄ est respectu ægritudinis præsentis. Quintus prognosticus circa futuram salutem, vel pernitię p̄dicendam per artem in omni passione, qui est omnium gloriosissimus, & famosus. Sextus, resumptiuius oīm postremus, qui est respectu sanitatis habitæ post forem desolationem, siue desperationem. Ex quibus conspiciere possumus medicinālē sciētiā in oībus corporib; & oīb; locis & temporibus necessario fore consulendā, Et ideo dicebat Galen. m edi-

De regimine

eorum princeps in tegni tract. de causis circa principium: Si enim esset impassibile & immutabile nostrum corpus, & semper maneret optima eius compositio, nulla indigeret arte ipsum cōseruante: quoniam vero mutatur & corrumpitur & conuertitur, non seruans quam habebat ex principio consistentiā, secundum hoc curatione indiget. Et primo de regimine sanat. ait: Nequaquā quidem reperibile est corpus temperatum, vel si est, ad ictum oculi est. Sunt autem medicinæ consilia non quēadmodum textorum vel edificatorū necessaria, sed quēadmodum agriculturalium & nautarum probabilia. Propter quod ait Auerois 1. & 7. colliger: Finis huius artis non est ad sanandū, sed ad faciendū illud qd potest fieri & quantitate conueniēti & tpe conuenienti. Et postea debet expectari finis, sicut est in arte nautarum & regimine exercituum. Et Galenus in. 11. de igne, sa. Ars medicinæ & medicus non sunt principales causæ sanitatis, quia sanitatem non absq; mediocri facere possunt: sed cum quadā conueniētia. Quod exponens in reg. ait: Omnia quidem horum operatrix est natura, medicus vero minister. Et Hippo. 1. Prognost. Quāuis omnes minime curare possit, quod si possit, non iam futuri prouisor, sed diuinis prophetis melior reputaret. Et Philosophus. 1. Rhetor. dicit: Non est optimo coriarius qui facit optimos calceos, sed ut communiter, qui de contingentibus nihil omittit. Scripturi itaq; de arte curatiua & prognostica, pmittere duximus cap. de arte conseruatiua, præseruatiua, reductiua ac præuisiua, quod ad sanitatis regimen dignoscitur pertinere. Conferatur itaq; sanitas. 4. modis præcipuis, uorum primus est per dietam regularem, & hanc in methodo ponemus. Secundus vero per cōsuetudinis bonæ obseruantiam, & peccātis correctionem,

quam in emperleis dicemus. Tertius per regularem noticiam, quā in canone scribemus. Quartus per agritudinis sciendā cautelam, quā in prognosticis subiungemus.

Methodus Cōsistit in regimine dietę. Dieta autē in debito vīu sex rerum non naturalium, quæ sunt cib⁹ & pot⁹, inanitie & repletio, somnus & vigilie, motus & quies, aer nos continēs, & animi passionēs: de quibus per ordinē differemus. ¶ Regimē cibi. e. pfi citur modis, qui sunt, substantia, quantitas, qualitas, consuetudo, tēpus & ordo. Substantia quippe ciborum debet esse quæ generet bonum chylum temperatum, vel circa id: ut sunt caro pullo- rum, perdicum, fasianorum, omniū autem syluestrium, non a quaticarum, car- hœdorum saltantium, agnorum, vitu- lorum lactentium, bouum nondum arat- tium, porcellorum vnius vel duorū men- sium, capreolorum, ceruorum pinguiū, porcorum syluestrium. Et de legumini- bus: cicera fracta vel pīsa, & aqua cor- proprie. Et de granis frumētū: oryzum, far, farina auenę, panis triticeus bene co- ctus, fermentatus bene salus, collectus tempore sereno, bene conseruatus, non corrupt⁹. De herbis: horago, spianchia, beta, petroselinū, atriplex, endiuia, la- ctuca. De fructibus: ficus, vīa maturæ ante prandium, pyra & cōconeia assa post cibum. De piscibus: lucius & omnes pisces marini durarum carnium non vi- scosarum, vel alij pisces qui in aqua mū- da, arenosa, petrosa, capri sunt, habentes carnes solidas & frāgiles, lapidas, squamosas, & proprie assi super prunās vel elixi conditi cum sinapi, pipere, cro- co, zinzi, & alijs speciebus corrigētib⁹ eorum flegma. De lacticiis: lac caprę vel asinæ vel vaccæ bene pasta bonis herbis & foeno, & proprie ante cibum

sumptum in stomacho mūdo per se, vel cum zaccaro aut melle aut mica panis, caseus recens vel quasi recens ex bono lacte artificiose factus, oua recentia, parula, oblonga, sorbilia. Quantitas cibi debet esse, quæ satifficiat naturæ, non appetitui. Nam stomachus calidus appetit minus quàm oportet, frigidus plus quàm opus, temperatus autem tantum appetit, quantum bene potest digerere, ut dicit Galenus in teg. ca. de signis stomachi. De qua mensura ciborum loquens Auicenna primo cān. seſt. tertio cap. de regimine cibi & potus ait: Ex cibo nullus est ita replendus, ut non sit locus vacuus in stomacho: sed ab eo est cohibendus reliquijs desiderij adhuc in anima remanentibus. Hæ enim famis reliquæ post vnam horam destruantur, scilicet quando os stomachi corrugatum post cibum fuerit. Quantitas autem discretæ debet esse, ut numerus ferculorum binarium non excedat, quia in multitudine ciborum, & proprie heterogeneorum, neque per artificium cōcorum, bene temperatorum, necessario fit inæqualis digestio in stomacho. Quare vel coctus exiens trahet crudum post se, vel expectans eius digestionem aduretur, cū digestio non sit alteratio quæcūq; facta a calido naturali, sed determinata certo termino: propter quod ait Auicenna ibidē: Et nihil quidē est deterius, q̃ diuersa nutrimenta simul adiungere, & post hoc in comedendo tēpus prolongare. Cum enim postremum nutriens aduenerit, primum iam incipit digeri. Nutrimenti ergo partes in digerēdo non assimilantur. Qualitas ciborum debet esse in complexione quidem frigida & in hyeme actu & virtute calida: in complexione vero calida & æstate actu & virtute frigida: in medijs autem temperata. Quia omnis complexio siue sit temperata, siue distemperata, conseruatur per similia in forma et

gradu: sed furiosa redditur per similia in forma & excellentia in gradu, sed rectificatur per cōtraria in forma, similia in gradu: si sūt vsu moderato. Consuetudo pro posse est seruanda in cibo, quia dicit Hippo. 2. apho. Parum deterior & c. & ibidem: Ex multo tēpore consueta & c. & Auicenna c. allegato: Oportet prætere te scire, q̃ nutrimentum melius est, qd melius sapit: propterea q̃ stomachus, & virtus retentiuā vehementer ipsum amplectantur, cum bonæ fuerit substantiæ. Hoc autem addit insinuans, q̃ consuetudo ad malum cibum est gradatim abijcienda, non subito: quia repētinæ mutationes non sustinet natura: ut dicit Galenus in teg. Insuper ista abiectione consuetudinis non debet fieri, nisi in tempore sanitatis. Quia in cura cuiusque ægritudinis omnis consuetudo est toleranda: cum tūc sit basis & fundamentum naturæ: ut dicit Galenus septimo de inge. sa. assignās causam ibidem, q̃ si tēpore ægritudinis consuetudinem mutaueris quocūq; lades naturā tripliciter: primo per ægritudinē: secūdo p̃ medicinarū exhibitionē: tertio per delectabiliū ablationē: quare natura nō sufferens finaliter succumbit. Et Aristo. 1. Rhet. Consuetudo est altera natura: quia consuetudo est eorū, quæ ut sæpe: natura vero eorū, quæ ut semper. Sæpe autē & semper sunt sibi inuicē propinqua. Tempus anni est in cibo diligenter obseruandum: quia in hyeme est multus cibus simul sumendus: quia ventres hyeme & vere calidissimi sunt natura propter antiparistiam: & ideo tunc natura potest sufferre errores: & cibi grossi tunc sunt sumēdi, sed raro secundum numerum: quia tunc paucæ fiunt a corpore resolutiones. In vere autem parum & raro est comedēdum, quia præcessit per totam hyemem mulatarum superfluitum collectio. Et hoc tempus bonitate suæ cōplexionis oēm materiā expellit,

Deregimine

& oēm agritudinē manifestat. In æstate est comedendū sæpe bis vel ter in die, pro vice tamē parum, et de cibis subtilibus defacili digestibilibus: quia tūc calor naturalis est debilis, & resolutio plurima. In autūno vero aliquantulum plus pro vice de cibo est sumēdum, sed rarius secundū numerū. Et est maxie insistendū illo tempore in v̄su bonorū et laudabiliū ciborum: quia naturalis calor est debilitatus plurimū per æstatē præcedentem, & per malitiam cōplexionis aeris præsentē. Et cauendum est a fructibus: quia generāt chylum facile putrefactibilem illo tēpore: licet quādoq; in æstate comedere possint pruna, cerasa, ad reprimendū choleram, & præcipue ante omnē cibū. Tempus etiā ætatis est obseruandū: quia pueri qui crescunt, sunt diatandi diætā hyemis in cōtinuo, sed non in discreto: quia multum & sæpe debent sumere cibum. Sed iuuenes, & ætate perfecti diætā hyemis omnino: quia calor naturalis est in vltimo fortitudinis, & corp⁹ nō indiget appōne ampliori. Senes vero diætā vernali: seniores diætā æstuali in cōtinuo & discreto: sed autūnali in ciborū substantia sumēdorum. Tempus præterea diei considerandum est, quia vt ait Auicēna, ca. de descensu cibi a stomacho: Corpus tēperatum debet tribus vicibus sumere cibum intra duos dies naturales vt vnicuiq; trium refectionum cedat numerus sexdecim horarū naturalium: quod est cōmune tempus digestionis & euacuationis superfluitatum primarū: licet homines nostri tēporis communiter in die bis cibum sumant: in prandio scilicet & cœna: quod propter consuetudinem antiquam nō valde vituperabilem est tenendum. Quoniam apud homines irregulariter viuētes tēpus primæ digestionis nō est vnum: quia apud quosdam est duarū horarū, apud alios quatuor, vel sex secūdum diuersitatem cōplexionis stomachi,

vel ciborum in quanto & quali. Sed omni tempore conandum est, vt cibum ætate sumant horis diei magis frigidis, & locis frigidis arte vel natura: In hyeme contrario modo: In vere & autūno medio modo. Ordo etiā in cibo est attendēdus. Nam si stomachus fuerit tēperatus et tēp⁹ tēperatū: tūc nō debēt in stomacho cibi commisceri diuersarū substantiarū, sed homogenei in substantia, et temperati in cōplexione, qui supradicti sunt: ne fiat inæqualis digestio. Si vero stomachus fuerit calidus et cholicus natura, debet cibis grossius p̄mitti subtili, quia cum melior digestio, & maior caliditas sit in fundo stomachi, sicut melior appetitus & sensatio sit in ore eius: adurere forte subtile, antequā digeretur grossum: quare si subtile fuerit præmissum, egredietur pyloron post sui digestionē, & deinde grossus paulatim. Propter quod ait Gale, i. alimen, de stomacho cholerico, q̄ melius digerit carnes bovinas, q̄ pisces petrinos: quia adurit subtilia, sed tēperate excoquit grossa. Si vero stomachus sit frigidus natura, procedatur econuerso. Si autem sit stypticus et siccus naturaliter, præmittātur lubrica stypticis. Si vero humidus & fluens, fiat econuerso. Si vero famelicus & exercitatus, præmittant grossa subtilibus: ne forte corrugatur velociter super subtile respuat grossum. Si autē sit fastidiosus & otio gaudens, fiat econuerso. Vniuersaliter tamen cauendū in omni stomacho a sumptione ciborum valde diuersorū in substantia: quoniam diuersis digeruntur tēporibus & difformibus elaborantur gradibus caloribus. Fit igitur in eorum mixtiōe plus nocitui q̄ iuuatiui. Vtrum autem maior cibis sumēdus sit in prandio vel in cœna, scribemus copiose capitulo de diminutione & corruptione digestionis in stomacho. parag. de caus. potus etiā regule i substantia, quātitate, q̄litate.

et ordine, de q̄ dicemus ca. de siti. parag. de cañ. Vnum tamē hic ponemus præter illic dicenda, quod conueniēs est om̄i stomacho, & om̄i corpori seruare volenti propriā sanitatē, vt potum permixtiū, i. quē hora comestionis assumit, partriatur in vices plurimas a principio comestionis vsq; in finē: ne forte potus plurimus simul sumptus cibum fluctuare faciat, & permixtionem bonam prohibeat, et retentiua m̄ stomachi deiciat. Et hic potus conueniens est, vt in principio comestionis sit vinum purum, clarum, potens in cōfortatione digestionis: sed in medio sit lymphatum parumper gratia melioris commixtionis: quia talis potus erit calidus ratione vini, & subtilis substantiæ ratione aquæ: quæ duo maxime conferunt penetrationi: in fine vero sit vinum lymphatum vsq; ad medium, vel per se naturaliter pōticum, vel aqua pura, ne fumus sursum caput percussat: Et ideo experitū est, q̄ magn⁹ haustus aquę frigidæ post crapulā sumptus aut tollit, aut dimiuit ebrietatē. Et hæc de prima re non naturali sufficiat. ¶ Dicamus de secūda, quæ est inanitiō & repletio. Vbi sciendum est, q̄ par est peccatum stomacho famelico cibum denegare, & fastidioso repleto cibum offerre: vt dicit Auic. primo cañ. fēñ. 3. ca. de regimine cibi & potus. Primum nāq; stomachum replet malis humoribus: secūdum vero plethoriam, opilationem, putrefactionē, apostemata, lepram & se. inducit. Quicūq; igitur cupit custodire sanitatem, surgat omni mane hora determinata, assueta, & vniiformi, postquā somnum & digestionem compleuerit pfecte. Deinde conetur diligēter ad expulsionem superfluitatū primę & secundæ digestionis stans erectus & fixus in eodem loco, donec propriā grauitate deorsum tendant. Postea caput diligenter fricat pectine vel digitis: vt pori capitis aperiantur, & va-

pores exhalent. Postea conetur ad scietum & sternutationem per se vel per artem, si reuma senserit: postea exercitetur gradatim a motu debili ad fortem redeundo ad debilem, & tandiu huiusmodi motum continuet, donec aliqualem sentire cōperit lassitudinem, vel sudorem, & balneetur & vociferet, & in sole ambulet ieiunus. Post hoc quiescat in loco temperato vel vergēte ad frigidum: donec calor naturalis vniatur, & famem sentiat, & saliuā subtiliari cōperit: tunc ilico cibum prædictum capiat sine mora. Post comestiones vero non exercitetur, nisi prout dicitur: neq; sub sole vel æstu habitet, ne cerebrum vaporibus repleat. Et idem ordo seruandus est ante coenam. ¶ De tertia re nō naturali, quæ est somnus & vigilia: sciendum q̄ tempore Hippo. vt patet 3. prognosti. omnis somnus diurnus, & vigilia nocturna fuerant vitiosa: minus tamen si a mane vsque ad horam diei tertiam se tenuerint. Vnde patet tunc fuisse regimen sanitatis optimum. Tempore autem Gale. vt dicitur ibidem in commento, consuetudo principum et magnatum cōcepit canem violare. Tempore autem moderno (vt ait Auicē. ca. de regimine cibi & potus) non omnis somnus diurnus est vituperandus: & præcipue, si in eo quinque conditiones obseruentur: Prima, vt sit consuetus: Secunda, vt nō sit ilico super cibum: Tertia, vt nō sit capite depresso: Quarta, vt non sit longus: Quinta, vt non fiat ab ipso subita & repentina expergefactio, sed morosa. In om̄i autem somno conuenit, vt fiat in loco non calido & vaporoso, sed temperato, vel parum frigido. Corpus tamē perfecte panis calidis cooperiatur plurimis, vt calor naturalis redire ad interiora non formidet, neq; membra exteriora mortificentur: quia in his duobus magis consistit bonitas tertiæ digestionis, scilicet sto-

De regimine

machi, epatis, & membrorum. ¶ Quarta res non naturalis, quae est motus & quies, taliter est regenda: ut ante omnem cibum, & post euacuationem superfluitatum fiant exercitia fortia praedicta: Post cibum vero illico conuenit vel quiescere sedendo, vel erigi stando, vel moueri paulatim breui tempore deambulando: ut motus non sufficiat ad cibi conuassationem, sed eius in fundo stomachi locationem. Primum namque sitim, angustiam, & indigestionem inducit. Secundum vero labia oris exiccat, os stomachi corrugat, & digestionem confortat. Et si contingat talem proficisci pedibus uel equo, totam diaram vel circa id ieiunus perficiat: neque hospitatus illico cibum vel potum capiat: nisi postquam quieuerit, & calor ad interiora redierit: tunc cibum paruum recipiat. Et si necessarium est ultra progredi, somnum breuem super cibum dormiat, antequam iter arripiat: ne cibum concussus in stomacho corrumpatur. Optima namque digestio fit somno & quiete: ut dicit Galenus septimo de inge, cap. de cura stomachi siccis. Et licet post exercitium vel vigilias promptius fames superueniat: hoc non est nisi vel propter cibi descensum ad intestina, vel membrorum resolutionem, vel sensus oris stomachi acuitatem, quae in somno non contingunt. ¶ De quinta re, quae est qualitas aeris continentis, taliter videtur dicendum: quod omni tempore cauendum est ab aere pestilentiali, ne forte epidemiam vel lepram inducat. Rectificetur ergo aer cum suffumigio storacis siccae, vel thuris, & utat ipse pillulis de aloë, quae dicuntur libro secundo capitulo, de feb. pestilentiali, & obstructione domus & camerae a ventis meridionalibus vel occiduis, & eorum euatione, & apertione ad plagam orientalem vel septentrionalem: Et cautela a communicatione leprosoꝝ, scabiosoꝝ, ophthal-

micorum, epilepticorum, & omnium patientium morbos contagiosos: & custodiatur ab aere, in quo sunt cadauera, vel paludes. Et si aer sit frigidus, rectificetur cum igne: si calidus, cum ratione aquae rosae. et strameto rosae. nenuphar, violarum & similium. Si siccus, cum glandiolis, maluis, iuncis, folijs salicis, vel populi vel vitis. Si humidus, cum suffumigio xilooloes vel nucis muscatae: & utatur per interius electuarijs calidis, vel frigidis, prout oportet. Et vestiatur vestibus calidis, laneis, mollibus, vel lineis vel sericis, subtilibus, prout necessitas postulauerit. De aere dicit commentator Hali super regni, quod est inter res non naturales praecipua, ex eo quod ambit, & ingreditur corpus nostrum & membrum nobilissimum, quod est cor: Nec ab eius qualitate possumus vnica hora separari propter necessitatem anhelandi. Quare in eius custodia & rectificatione plurimum est operae adhibendum. ¶ De sexta re & vltima non naturali, quae sunt animi passionis, sciendum: quod conuenit in regimine sanitatis gaudio & laetitia uti: quia animum fortificant, spiritus subtiles, & sanguinem laudabilem generando. Idcirco conuenit uti vestibus ornatis, xenijs aromaticis, anulis nobilibus, sonis musicis, & omnibus gaudiis: Quia timor, tristitia, & sollicitudo assidua mentem deiciunt, sanguinem grossum & frigidum multiplicant, spiritus tetros & caliginosos generant, calorem mortificant, humores incinerant, et sic melancholiam confirmant.

Emperica. Reperiuntur aliqua emperica, quae propter hominum consuetudinem plurimum videntur conserre ad regimen sanitatis, de quibus nunc dicamus. Si igitur sanitatis conservator quandoque propter errorem regiminis purgatione indigerit, tunc ab anno aetatis suae 14. vsque ad 64. vel circa id poterit

istis medicinis vti secure omni tempore anni. Nam ante tempus ætatis prædictæ, & post non est flebotomandum, nec farmacandū: nisi necessitas magna præcipiat, & robur virtutis & carnositas corporis id ipsum concedant: prout dicit Auerro. septimo colliget. de Auenzoar medico peritissimo, qui flebotomauit filium suum sinocham patientem, cum esset vnus anni, & ipsum liberauit a morte. Si igitur sanguis indiget euacuatione, fiat flebotomia. Si cholera, fiat cum 3. 1. vel secundo reubarbari optimi puluerisati & incorporati cum 3. 4. vel 5. aquæ decoct. prunorum damascenorum, dando actū calid. in aurora vel ante diem. Si flegma, fiat cum medicina de turbith, quod est pharmacum leue & nobile, quo sæpius in opere præsentī vti intendimus. & sic fit. ℞. turbith albi. elect. & mundati. 3. 1. vel 3. 1. & ꝑ. zinz. 3. 1. zuc ca. 3. 2. fiat puluis ex ipsis, qui detur totus ante diem cum aqua calida, & differratur cibus post ipsum: quia est tardæ solutionis. Et si vis acuerē, adde hermod. 3. 1. vel ꝑ. Si melancholia, fiat medicamen istud. ℞. sene. 3. 5. zinz. 3. 2. carthami. 3. ꝑ. cynamomi. 3. 2. fiat puluis ex omnibus, de quo detur. 3. 1. vel 2. ante prædium per duas horas cum iure carniū actū calido. Si humores adusti sunt, sic fiat medicamen. ℞. medullæ cassiæ filmannæ, tamarindā añ. 3. ꝑ. dissoluantur in 3. 5. vel 6. aquæ decoct. prunorum & coles. & totum detur ante diem actū calidum. Et si nolueris recipere omnia, sume de vno eorum. 3. 1. vel 2. Si autem leuiter mundificare massam sanguinis intendis: sicut consueuerunt homines facere in principio veris & autumnī. ℞. thy. epithy. sene. añ. 3. 2. quinq; myrobolanorum añ. 3. ꝑ. cynamomi electi. 3. 1. gariofi. 3. ꝑ. reupontici boni, vel loco eius reubarbari optimi non putrefacti, tur-

bith albi & electi. zinz. albi. añ. 3. ꝑ. zuc cari. 3. 2. fiat puluis ex omnibus his, & detur totum ante diem cum 4. 3. aquæ decoct. anisi vel feniculi actū ca. & differratur cibus sup ipsum. Et scias, q̄ medicinæ laxatiuæ non debēt dari, nisi præmolito ventre vna die vel 2. cum syrupo aliquo vel cibo lubricatiuo: sicut sunt iura carniū pinguiū, & olera mollificatiua. Scias etiam, q̄ non debēt dari cum liquore plurimo: quia disgregat, & corrumpit virtutem medicinæ, sed cum tali & ranto, qui sufficiat ad deferendum virtutem, & vaporem medicinæ per membra: neq; debent dari sine omni liquore: quia pigritaretur eius operatio: neq; in hora magnæ famis, ne forte super ipsas se conuertat natura, & in chymum pessimum scilicet sui generis trāsmutet. Verbi gratia. Turbith in flegma, scamoneā in cholera: sene in melancholia. vt dicit Galenus quintō de simplicibus medicinis. Postquam autē medicina satis operata fuerit: tribue in potu vnum haustum magnum pitianæ colatæ, vel iuris pullorum, & proprie galli veteris: vt reliquæ medicinæ abstergantur, & stomachus & intestina abluantur. Si autem medicina exhibitā non soluerit, vel tardata fuerit omnino: tunc licet regulariter non competat illa die dare medicinā aliam (vt dicit Auicenna primo canon. capitulo quarto:) tamen communiter operantes propter vitandum vituperium, & infirmi terrorem, tribuunt. 3. ꝑ. vel 3. 2. elect. de zuecero ros. laxatiuo cum aqua calida: quia tunc prior medicina incipiet operari cum adiutorio secundæ. Si venter alicuius sit stypticus naturaliter, vel propter errorē, lubricetur ante cibū cū suppositorio vel clystere, vel cibo lubricatiuo: sicut dicemus ca. de stypticitate ventris. parag. de empericis. Quia nihil

Deregimine

deterius est in regimine sanitatis, quam retentio fecum in corpore, q̄ vaporātes sursum inficiūt cibum, & caput replēt, & torporem inducunt, & tandem ægritudines p̄niciosas, scilicet apostemata, febres putridas, cholicam, hydropisim, tympaniten. Expertum est etiam, q̄ licet mixtio diuerforum ciborū in eadem mensa in regimine sanitatis sit prohibita: sunt tamen quædam peiores alijs: sicut est mixtio piscium & lactis, vel vini & lactis, Et vniuersaliter omnia contraria in cōplexione vel modo substantiæ. Sicut autem conuenit ante cibū sumere de electuarijs calidis digestionem confortantibus: ita nocet eis vti post cibū: quia ipsum sursum fumare faciunt, & corrumpūt digestionē, & sitim cum dolore capitis inducunt. Utendum ergo calidis aromaticis ante cibum, & frigidis stypticis post cibū. Sunt præterea corporū variæ consuetudines & inenarrabiles. Consueuerunt namq̄ plurimī melius digerere cibos diuerfos simul, quam homogeneos: Et sunt qui delectātur carnibus vulpium & luporū: Similiter plurimī somno refesciunt ilico super cibū: Alij comedunt quater vel pluries omī die & mittunt crudū super semicoctū: & sic de multis alijs: & tamen dicūt se p̄ hoc melius & sanius habere, iuxta illud Galeni tertio de simplici medicina: Quod quædam puella fuit nutrita nappello, nec ex hoc moriebatur, sed sibi concubētes solo anhelitu interficiebat. Alia quædā hyoscyamo, alia fūgis siue rebus alijs complexione vel substantia venenosis. Quapropter ait Auicenna. i. cañ. fen. 3. capitulo duodecimo de regi. cibi & pot. Regiones quæ naturas habent proprias, & vsus & cōsuetudines, sunt extra rationē. Et hoc quidē obseruandum est, & oportet vt in hoc experimentum vincat rationem. Est namq̄ cibus qui solet comedi, in quo aliquod est

nocumentum, & est conuenientior bono non v̄sitato. Vnaqueq̄ em̄ natura, & complexio cibum habet conuenientem & consimilem, ad quē mutandū, si voluntas affuerit, nocumentum ei faciet & impedimentum. Sed contra istas malas cōsuetudines subdit ibidem: Ille vero, in quo mala digeruntur cibaria, ob hoc non decipiatur: quoniā post dies aliquot generabuntur in ipso mali humores ægritudinem facientes & perneccantes. Et Constantinus in viatico: Nō gaudeant malo cibo vtentes: quoniā si in præfenti non læduntur, in posterum percussione non euadent. Sumus igit̄ perplexi ex dictis circa consuetudines, an ipsas obseruemus an mutemus. Ad quod videtur dicendum, quod consuetudo vel est conueniens naturæ, & tunc oīs est seruanda: vel est dissimilis & inconueniens, & hoc dupliciter: Quia vel parum discrepat, & tunc adhuc est seruanda: vel plurimum recedit a natura: & hoc est dupliciter: quia vel est habituata vel non. Si secundo modo, non est tenenda. Si primū, hoc est dupliciter: q̄a vel est corpus ægroiās actū, & tunc iterum est seruanda: quia tempore ægritudinis oīs consuetudo, & omnis naturalis cōplexio quantumcumq̄ distēperata, penitus toleranda est vsq̄ ad perfectam sanitatē: vel est infra latitudinē sanitatis: & tunc est permutanda, non tamen subito, sed gradatim parū post parum. Quod si non fiat, in posterum pœnam non euadent: sicut patet in delectantibus in esu carniū antiquarū salitarū, aut piscium magnorū, aut vulpiū, aut hircorū: qui tandem lepram aut morpheā incurrunt. Intelligendū præterea, quod sublimior medicinarum in regimine sanitatis est abstinentia, i. moderata cibi & potus sumptio: cum naturæ pauca sufficiant, appetitui vero omnia diminuta sint: propter quod accidit nostro tempo

re plures occidi crapula q̄ gladio. Cibus nanq̄ superfluous sui qualitate & resistētia calorē naturalē opprimit & extinguit, & per consequens facit corpus in frigidari, & accelerari mortem naturalem: sua quantitate replet vasa, & apoplexiam & rupturam subitam inducit sua substātia crassa vel viscosa opilat, & transpirationem prohibet, & per cōsequens putridas febres, & apostemata generat pernicioſa. Si quis igitur superfluum cibū vel potū assumpserit vna die: maneat famelicus sequenti die, & in qua die senserit crapulā, vtatur somno plurimo pro posse in loco tēperato, donec cibū digesserit. Quod si somnus non aduenerit, vtatur plurimo incessu suauī & cōtinuo sine quiete & interceptione, vt cibus digeratur, vel ad intestina descendat, & parum boni vini puri bibat, & sic permaneat, donec totam crapulā per se, vel cū clystere, vel suppositorio euacuet: nec postea sumat cibum, nisi redierit appetitus. Dicit tamē Auicē. cap. de regimine vini & aquæ: q̄ cōueniens est omni mense semel inebriari potu vini plurimi: quia cerebrum purgat, spiritus multiplicat, & animum lætificat. Quod credo tamen intelligendū in corpore nō vtente vino: sicut faciūt Hīspani & oēs Saraceni: sed in terris vino vtētibus omni hora & proprie in septentrionalibus illud non competit: quia repletio adderetur repletioni.

Canones. Conetur sanitatis conseruator & custos, vt pro posse omni tempore vtatur cibus puris non medicinalibus, nisi cum opus fuerit p̄seruatione. Voco autem cibos puros, qui sic alterantur a corpore, q̄d perfecte mutantur & conuertuntur, absq̄ eo q̄ corpus nostrum omnino alterent & immutent, vel circa id: sicut sunt cibi superius nominati. Voco autem cibos medicinalē, qui licet alterētur & elaborētur: alte-

rant tamen corpus, & permutant paulatim, sicut sunt omnes cibi in qualitate aliqua excedentes. Nā si sunt calidi, adurunt sanguinē, sicut saluia, mēta, piper, apium, allia, & similia. Si frigidi, mortificant & congelant: sicut lactuca, portulaca, &c. Vel si magis sunt frigidi, interficiunt paulatim: sicut fungi, & hyoscyamus &c. Si humidi, putrefaciūt, et caniciē inducunt. Si sicci, virtutem dericiunt, & caluitiem inducunt. Si viscosi, opilant. Si diuretici, tenes macerant & corp⁹. Si vinctuosi, supernatāt, & nauseam inducunt. Si amari, nonnutriunt: q̄a solū dulce nutrit per se vel cōmixtū: vt dicit Galenus. 1. de simplicī medicina. Si salsi, adurunt, & stomachū corrodūt. Si pontici, constingūt, & opilant. Si acetosi, cito senescere faciunt. Solis igitur vtatur cibus dulcibus, & nulla quantitate sensibili excedentibus, vel circa id. Si autē propter excessum alicuius qualitatis accidit nocumentum: rectificetur per suū cōtrarium, verbi gratia: Si propter styptica, dētur vinctuosa: Si propter vinctuosa, dentur styptica: vt caseus, pira, citonia: Si propter salsa, dentur aqua & acetū: Si propter acetosa, mel & zucarcū: Si propter viscosa, incisua, vt sinapis: Si propter acuta, portulaca, lactuca, & similia. Item dicit Galenus. 8. de ingenio sanitatis: quōd omnis distemperata complexio, similiter & mala consuetudo reducendā sunt ad temperamētum suo contrario, saluis quatuor conditionibus. Primo, vt hoc fiat tempore sanitatis: secundo, quod fiat gradatim: tertio, vt corpus sit sibi ipsi sufficiens. Pauperes enim necessario comedunt id q̄d habere possunt: quarto, vt sit ociosum. Melius est enim fabro, vt sit naturaliter flegmaticus quam temperatus: & piscatori vel fulloni, vt sit cholericus: & aratori vt densus & compactus. Item licet in puero & iuueue sit calor natura

Detegimine

lis æqualis in radice, & per consequens digestio aque fortis in vtroq; quia in iu uene est maior siccitas propter caliditatem, quæ depauit humidum suū radicali aliquantulum: idcirco conuenit, vt pueri melius digerant, & melius nutrantur a cibis calidis & humidis: iuuenes vero a calidis & siccis solidis. Detur ergo pueris lac & caseus recens, caro agnorum annalium castratorum, & cibi elixii: iuuenibus vero vitulorum, porcorum, bouum non arantium, panis siccus, & cibi assii vel frixi. Ex hoc intelligere potest dictum cōmune autorum medicine: Quia in digestionem sunt duo, scilicet alteratio & conuersio siue assimilatio. Alteratio est decoctio cibi in stomacho: et hoc magis fit a calido naturali. Sed assimilatio est conuersio eiusdem cibi decocti in membra, & hoc fit magis ab humido radicali, qd est ipsa molliora & spōgiosa faciens, & cibū in poros minimos vehens & passibilem faciens, & ipsum apponēs, vniens & perfecte cōformās. Ex quo scire potes, quare corpora quædam debilia melius nutriantur aliquo cibo determinato, quam aliqua corpora robusta propter similitudinē forme specificæ, quæ est potissima causa conuersionis & nutritionis. Item dicit Auicenna primo cañ. sen. 3. ca. de regimine cibi & potus: qd nihil est deterius, quam saturitas post diurnam famem, & econuerso. Sed ramen primum est deterius, quia stomachus longa inanitione afflictus, virtutē digestiuam amittit, & eius corpulentia constringit: vt neq; digerere cibū, neq; recipere valeat, nisi valde paulatim: sicut patet in incarcerationis post liberationē, & annis fertilibus post sterilitatem. Quot namq; homines se tūc superflue repleuerunt, & suffocati interierūt? Item in eodem: Oportet vt ad lectū vadens, primo super latus dextrum saceat paucio tempore, donec cibis ad fundum

stomachi descēderit, et os stomachi clauserit: postea super sinistrum reuoluatur, vt epar bene stomachum comprehendat: quia stomachus de sua complexione paucam caliditatem participat: cum sit membrum spermaticum & nervosum: sed caliditatem recipit a membris circuniacentibus, scilicet a corde superius, felle inferius, epate a dextris, splene a sinistris, zirpo adipino antierius (quod rete dicitur) et a vena kili posterius: deinde reuoluat super dextrum, & tota nocte suum perficiebat somnum & digestionem. Item in eodem: Vinū quoq; post cibum est ex rebus magis impediētib; digestionem: quoniam facit penetrare cibum indigestū, ex eo quod velociter digeritur, & facit hæreditare opilationes & putrefactionem: ideo si post cibū superueniat sitis magna, aquam frigidā sumat, sed paucam, aquam sorbendo magis quam ingurgitando deglutiat: & sic sitim extinguet sine nocumēto. Idē in eodem: Res maxime opilantes, sunt res dulces, vel viscosæ, vel græssæ sustantiar. Dulces namq; attrahuntur, anteq; digerantur propter familiaritatem quam habent ad naturam: & sunt causa putredinis & hydropisis. Vbi igitur hæc tria simul reperiuntur, penitus sunt fugiēda: sicut mel, pasta, tortelli, vinum rubeum nouum, vinum turbidum, cereuisia, & oīa vinctuosa, & pisces non debite præparati. Idem in eodem: Corporibus raris & porosiss: sicut sunt corpora mollia & laxæ carnis, plus opus est a rebus nō naturalibus exterioribus præcauere: sicut sunt aer æstuosus resoluens: & frigidus congelans, vel exercitium debilitans, vel coitus excedens. Corporib; vero densis & solidis: sicut sunt corpora duræ & compactæ carnis, plus necesse est ab interioribus se p̄munire: sicut cibis & potib; grossis & viscosis opilans, plethoria replens, ocium superfluens, mar-

cesaciens & similia. Primi igitur a causis primitiuis primitus occupantur & febribus acutis. Secundi vero a causis antecedentibus, febribus, chronicis, apostemate & hydropisi perneantur. Itē Aucenna primo canonum, fen. tertia capitulo de regimine vini & aquæ dicit, q̄ bibere aquam frigidam post exercitiū superflūū, vel balneum, vel in siti aduentitia cōtingente in ieiunio: vel in siti mendosa cōtingente post somnium vel crapulam, est de numero maxime infrigidantium epas & stomachum, & digestionem maxime corrumpentium, & calorem naturalem mortificantium: quare perducit ad hydropem vel hecticam senectutis: quia si quis prædictorū plurima necessitate potus angustietur, abluat os suum aqua frigida, & anhelat aerem frigidum: quod si non suffecerit, bibat modicum aquæ frigidæ in vase stricti orificij: quod si nondum sufficiat, bibat prius vinum mixtum cum aq̄ calida, ne multitudine nocumētorū taliū cōtingat. Idem ibidem: Vinū grossum est melius illi, qui pinguis esse desiderat & fortis: tamen ab opilationib⁹ sibi caueat: vetus tamen clarum & purū melius est habenti complexionem flegmaticam & pinguedinem fugienti. Itē ibidem: Super cibū mali chymi bibere vinum dum comeditur vel ante vel post, est malum: quoniam facit ipsum in extrema corporis penetrare. Melius est igitur a potu omnino abstinere, donec cibus digestus sit: vel sitim extinguere cū pauco aquæ frigidæ: vel cibum deorsū expellere & ventrē lubricare cum haustu magno plurimæ aquæ puræ, sicut sit post pruna vel cerasa comesta. Idem ibidem: Vinū dare pueris, est sicut ignem igni addere in lignis debilibus: sed senibus quantū potest tollerare natura da, & iuuenibus temperate. Itē est peior repletio ex cibo quam ex potu. Pessima

vero quæ ex vtroq̄ simul. Qui ergo cupit multū bibere vna vice, paucum summat cibum & ecōuerso. Nequaquā vero plurimū sumat cibū & bibat: quia vinū cibū indigestū ad singulas venas perducit. Itē dicit Auicenna. i. ca. fen. 3. cap. de regimine somni & vigiliæ. q̄ sanitatē cupiēs seruare, debet de regimine somni diligenter cogitare, vt tēperate exhibeat & debite: quia virtutē fortificat quæ fuit debilitata ex plurima exercitij resolutione, vel coitu, vel labore. Similiter corpus roborat, impinguat, et colorat. Ipse namq̄ oēm digestionem adiuuat, humores bonos multiplicat, spirit⁹ generat et augmētat, et mēbra lassā recreat. Et est res maxime proficiēs senib⁹, q̄niā in eis humiditatē radicalē cōseruat ne peat: et perditā recupat p̄ generationē humidifluētis. Est autē somn⁹ tēperat⁹ et debitus, si septē cōditiones obseruē. Prima vt sit hora debita, scilicet nō illico super cibum, sed postquam cibus descēderit ad fundum stomachi: quia dū cibus est adhuc circa stomachi, fluere ad caput, ipsum replens & grauans, & somnia plurima & terribilia, & angustias cum reuolutione assidua de latere in latus, & stomachi clausiōem prohibens: propterea si eius descēsus tardauerit, et somnus necessarius fuerit: debet parumper incedere, & postea dormire. Secunda conditio, non sit in die, nisi obseruatis quinque conditionibus supradictis, paragr. de tertia re non naturali. Vel nisi quis somnum nocturnum perdidit, propter sollicitationem & laborem: tunc enim potest dormire a mane vsq̄ ad horam tertiam, quod est tempus incōueniēs minus: vt dicit Hipp. 2. prognosticorū. Tertia, vt sit super alterū laterē modo & ordine prædictis, vel super ventrem, si eā cubandi consuetudinē habuerit, quia satis magnū cōfert in digerēdo auxiliū: propterea q̄ ventrē et calorē naturalē apprehēdit et

De regimine

auget. Nequaquam autem fiat supine super dorso, quia vel materias facit deorsum fluere: & tunc est causa catarrhi empirmatis, et ipneumonix, phthisis, tieterix & indigestionis. Vel materias facit sursum manare: & tunc est causa apoplexiæ, epilepsix, paralyxis, phrenesis, incubi, lethargix. Et quomodocumque modo res se habeat: membra debilitat & musculos. Quod si talis consuetudo fuerit, est protinus immutanda. Quarta, ut non sit super vacuitatem & famem, quoniam est malum & virtutem deiciens & corpus macerans, & colorem citrinans, stomachum replens malis humoribus, os amaricans, & appetitum prosternens. Quinta, ut non sit profundus, ut non appareant somnia vel delectabilia: quod significat cibi a stomacho perfectam comprehensionem cum digestionem optimam, & reuocationem spirituum & caloris naturalis ad interiora, completa & perfecta. Sexta, ut sit capite eleuato super molli culcitra, et cooperto pannis calidis plurimis super toto corpore: quia magnum præbet auxilium indigerendo cibum, & macerando superfluitates, expellendo in vigilijs, si corpus in somno bene cooperiatur, et ita colloce, ut a vertice usque ad plantam pedis sit processus gradatius ab alto ad decliue. Septima, ut sit quantitate sui neque excedens neque deficiens, sed moderatus & correspondens ciborum digestionem, & virtutis confortationem. Vnde Hippocrates. secundo Aphorismorum: Somnus & vigilia &c. quoniam si superfluat in quantum & quali, corpus infirmat, caput humectat, superfluitates multiplicat, stuporem & lethum causat. Si vero diminutus fuerit, digestionem non perficit, tarditatem inducit, corpus macerat, & faciem citrinat. Sunt igitur somnus & vigilia concausæ sanitatis, ita, ut somnus deseruiat digestionem & maturationem: vigilia vero ope-

rationi & resolutioni: superfluitatū expulsionem: ut dicit Galenus vndecimo de ingenio sanitatis.

Prognosticatio. Restat nouissime locum qui de actu præuatorio: quia non parum necessarius est in regimine sanitatis. Si quis igitur certis anni temporibus consuetus sit aliqua ægritudine laborare, antequam hora vel tempus periodi superueniat, debet uti alterationibus contrarijs. Et si sit mala complexio diuersa sine materia: ut est febris ephimera, dolor capitis calidus, quia si sit cum materia, conuenit ut utatur euacuationibus & diuersionibus: ut puta phlebotomia, pharmacia, vomitu & sudore, menstruoque vel hæmorrhoidarum prouocatione, & similibus. Si quis fastidium vel appetitum cibi superfluum, vel saporem oris alienum sine causa manifesta, vel pigritiam cum lassitudine membrorum, vel somnolentiam, vel vigilias superfluas, vel sodam, vel vertiginem, vel anhelitus maliciam, vel sudores plurimos sine causa manifesta, vel somnia plurima terribilia præter consuetudinem, & ad vltimum quodque rarum & nouum neque assuetum incurrerit: ægritudo prognosticabitur, quare ad euacuandos & alterationes recurrere conuenientes. Si quæ euacuationes consuetas, puta per vomitum sanguinis vel phlegmatis, vel per hæmorrhoidas, seu menstrua, seu per fluxum sanguinis narium: vel per sudorem seu fluxum ventris: modo restrictas vel diminutas habuerit: ad ipsarum festinet prouocationem & corporis mundificationem, ne superfluitas in corpore remansens sine causa manifesta morbos materiales inducat. Econtrario. Si tales euacuationes non fuerint consuetæ, sed de nouo superfuerint, ad earum restrictionem non subito sed gradatim procedat, primo considerans, an sint naturales vel cretice: et tunc omnino non impediatur ipsas,

*ma phorm
ed delectab
in*

nisi valde superfluant, & virtutem deiciant: an symptomatice & accidentales: & tunc ad restrictionem ipsarum festinet. Saltus faciei plurimus fortis & perdurans, tortura moris, vel paralyfim porredit vicinam: quare purgetur phlegma vehementer, & subtilietur diæta, & alteretur ad calidum & siccum: & sic prohibeatur a vino omnino, & fiant gargari smata & euacuationes cum oxymelle squillitico vel aceto & sinapi & melle, & sternutationes cum condisi, & frictiones particulæ, cum aceto forti, digestionis turg saluæ, absinthi, & mentastri. Saltus corporis totius fortis & perseuerans, spasmus de repletionis prædicat: quare purgetur cum medicinis fortibus, frequenter exercitetur in ieiunio pro posse. Sudet in balneo, famem & sitim tolet. Stupor & formicatio, & in moribus debilitas in corpore toto vel in latere altero, paralyfim eiusdem partis significat, quare cum medicinis scriptis de paralyfi succurratur. Dolor capitis vehemens cum feb. acuta, rubore oculorum, apertione venarum, fluxu involuntario lachrymarum & cum impotentia intuenti claritatem luminis vel solis phrenesim præfigurat: quare phlebotometur basilica vel cephalica, & mundificetur cholera ex reubarbaro & scamonea. Confortetur cerebrum cum emplastris, vnguentis, epithematibus percutissimis, factis ex aqua ros. aceto, succo siperuiug, solatri, nenupharis, lactucarum & similium. Incubus & vertigo si sæpe acciderint & fortiter, epilepsiam minantur: quare subueniatur cum medicinis ad epilepsiam conuenientibus. Si timor, pusillanimitas, & tristitia, faciei deiectio, sollicitudo & risus sine causa manifesta multum tempus habuerint, melancholicam passionem significant: vt dicit Hippo. 6. aphorif. quare succurratur cum purgationibus, & alterationibus ex ea, de melancholia. ¶ Si fu-

ror & instabilitas cum agitatione in moribus, & garritu plurimo pleuraeuerint: maniam & dæmonium lupinum præstigurant, quare purgetur humores melancholici adusti, & alteretur mala complexio cerebri cum medicinis scriptis suo capitulo. ¶ Si catarrhus descenderit frequenter ad stomachum, lienteriam vel vomitum inducit: Si ad pectus, & pulmonem, phthisim, asthma, vel suffocationem causat: Si ad cannam pulmonis, raucedinē inducit. Quare purgeſ caput cum pillulis cochleis frequenter & emplastre tur abrasis capillis cum emplastris stypticis, exiccatiuis, & rubificatiuis scriptis capitu. proprio: Subtilietur coena, tardeſ somnus post cibum, multiplicentur vigiliæ pro posse. Sudor multus in nocte, vel in somno factus sine manifesta causa, si gñificat quoniam corpus superfluo cibo vitur: Si vero cibum superfluum non summentibus acciderit, significat: quoniam purgatione humorum superfluetum in venis & poris membrorum indigent: vt dicit Hipp. quarta particula aphorismo rum. Aliter febres putridas, aut apostematata non euadent. Corpus naturaliter sanguineum est diligenter a feb. putridis conseruandum, ad quas maxime pronū est: vt dicit Gale. 11. de ingenio sanitatis. Quare fleborometur frequenter, vel purgetur cum medicina conuenienti in principio veris & autumnii. Aperiantur eius pori cum balneis & frictionibus, vt transpirabile & bene euētabile sit omni hora, Corpus stegmaticū ex regimine vel natura, studio solerti ab apostematibus, paralyfi & apoplexia est custodiendum, ad quæ plurimum est inclinatū: Corpus vero melancholicum ab hectica senectutis præseruandum est, similiter & virtutum animalium perturbatione. Corpus cholericiū per naturā, regimen, & diætas vel ætatem, diligenter a feb. hectica præseruet, ad quā maxime pronū est: vt dici-

De regimine

ter quarto de ingenio. Quare prohibea-
tur a ieiunio, ira & siti, & alteretur cum
cibis & medicinis frigidis & humidis,
& custodiatur a vigilijs & solitudini-
bus pro posse. ¶ Si cor tremorem fortē
& frequenter patiat, & virtus defecti-
onem sine manifesta causa, mortem su-
bitaneam minatur: vt dicit Hippo. secū-
do apho. Qui exoluuntur fortiter & fre-
quenter &c. Fiat ergo flebotomia, &
purgatio humorum melancholicorum
adustorum, venenosorum cum polypo-
dio, sene, epithymo & elleboro nigro. Si
corpus valde repletum fuerit secundum
vasa & virtutem: rupturam venarum,
extinctionem caloris, vel vomitum san-
guinis, & tandem apoplexiam porten-
dit. Vnde dicit Hippo. prima particula
aphorismorum. In exercitantibus &c.
Et cum subdit in 2. Crassi valde secun-
dum naturā &c. Quare statim cum fle-
botomia forti succurratur, postea cū me-
dicina laxatiua, diæta tenui, & sudore,
& exercitio in ieiuno. ¶ Si sensus coe-
pē rint turbati subito sine manifesta causa,
& motus voluntarij tardari cum verti-
gine & grauedine capitis, & repletionē
plurima, timēda est apoplexia: quare si
ant flebotomia, purgatio, & gargari-
smata suo capitulo scripta. ¶ Oris fetor
plus solito cum fetore egestionum vel
vrinæ plus debito, indigestionem & pu-
trefactionem humorū significant, & fe-
brem putridā, et proprie si sit cum opila-
tione venarum & pororum cutis & ten-
sione hypochondriorum & carētia bal-
nei & exercitiij consueti & antecessione
gulositatis diuturnæ. Quare siāt purga-
tiones materiæ conuenientes, & subtilie
tur regimen. ¶ Facies & oculi & extre-
mitates si inflari coeperint, hydropem et
cachexiam significant futuram. Egestio
liquida cum traulis & rugitu vētris ex-
pulsus, indigestionem significat præsen-
tem in stomacho, & malam dispositio-

nem epatis, scilicet opilationem vel fri-
giditatem, & sic per consequens liente-
riam, vel hydropem significat futurā.
Quare subueniatur cū diureticis calidis
& electuarijs et emplastris calidis stypti-
cis pro posse. ¶ Cum quis senserit lassī-
tudinē in toto corpore cū acuitate qua-
dā & ardore circa cutim & horripilati-
one: se, interpolaram prædicit futurā, ni-
si cū purgatione succurratur. Quod si fu-
erit cum forti fractione membrorum, et
obumbratione visus, & grauitate omnis
sensus: febrem continuam minatur, nisi
subito cum flebotomia succurratur. Ex
quo patet, q̄ prostratio appetitus, & las-
situs spontanea sunt p̄sagia feb. vtrius-
que. ¶ Vrinæ ardor perseuerās, & a titil-
latione ad puncturam paulatim proce-
dens, vesicam & virgam scabie vel vl-
cere hæreditabit: nisi succurrat cum me-
dicinis, quas suo loco dicemus. ¶ Pruri-
tus ani non a vermibus causatus hemor-
rhoidas significat futuras. Rubor faciei
plurimus cum permixtione liuiditatis,
& angustia anhelitus & rauedine vo-
cis, quasi loqueretur per nares, et pruritu
siccō totius corporis, & concupiscentia
venereorum plurima, & alteratione su-
bita ad frigiditatem & caliditatem, &
asperitatem cutis, & nodositatem iūcturarū,
& punctura cutis in modum acus & for-
micatione quadam stupida membrorū,
lepram inchoatam significat. Succurrat
igitur siccō anteq̄ confirmetur, cum me-
dicinis purgatiuis humores adustos bal-
neis humidis, & cibis frigidis, vt dicem⁹
suo loco. ¶ Doler articuloꝝ continuus
vel periodicus cum inflatione iunctura-
rum et motu difficili, podagram vel chi-
ragram minatur, nisi succurratur cū pur-
gatione flegmatis grossi, vel cholera, et
abstinētia a cibo superfluo, & potu vini
& esu aceti, & coitu omnino. Cum quis
leuem se senserit, & in cōmestione & so-
mno & incitibus animalibus & corpo-

reis optime se habuerit, vel secundum consuetudinem, vel circa id: tunc omnem medicinam postponat. Quoniam (ut ait Galenus primo de interioribus) natura non indiget adiutorio medici: nisi cum morbo magnificato, amplius natura sibi ne quiverit dominari.

Hæc de regimine sanitatis breuiter dicta sufficiant.

Proximum primi libri: In
quo de Anatomia corporis
humani agitur.



Orpus humanum sanabile ægorabile, a nobis operabile per artē (quod est subiectum artis medicinæ) diuiditur in stipitem et ramos.

Rami quidem in brachia, manus, crura et pedes: sine quibus omnibus aut pluribus vita potest aliquo tempore perdurare. Stipes autem diuiditur in tres partes principales, quarum venter animalis, venter spiritualis, et venter naturalis: sine quorum vnicuique vita non potest aliquo tempore perdurare. Scripturi itaque in hoc libro de passionibus membrorum atque de remedijs singulorum morborum, corpus ipsum in quatuor sectiones diuidimus iuxta prædictas quatuor partes principales. Sectionem vero quolibet distinguimus per tractatus: quemadmodum quæque prædictarum partium per membra sua distinguitur, quibus integratur. Et venter quidem animalis ex membris illis componitur, quæ sunt a vertice cranei usque ad epiglottidem: ex quibus omnibus præcipuum est cerebrum: quare ipsius passionem a principio tractemus. Incipientes igitur dicamus, quod passionem capitis famosa sunt decem. Prima, dolor: Se-

cunda, vertigo et scotomia: Tertia, stupor, subeth et congelatio: Quarta, frenesis: Quinta, lethargia: Sexta, vigilia: Septima, permixtio virtutum sensitiuarum interiorum: Octaua, epilepsia: Nona, apoplexia: Decima, incubus. Cum autem dico caput, intelligo aggregatum ex cute, carne, craneo, dura matre, pia matre, cerebro, ventriculis et cauernosis ratibus eius: quorum compago per anatomiam ab autoribus talis est deprehensa. Quoniam sub cute, quæ est solida densa et compacta plusquam in alia parte corporis, est cranium quodam subtili panniculo interposito supra conuexum cranei fabricato. Sub craneo est dura mater, panniculus solidus superficiei ipsius concauus vndique orbiculariter subductus ad defensionem cerebri propter casum vel percussionem. Sub dura matre est pia mater, totam medullam cerebri amplectens: cum sit panniculus mollis: & subtilis a quo postea alij ramificantur panniculi cerebri anterius a posteriori distinguentes, necnon diuersos anfractus anterioris cerebri penetrantes, et eius sectiones colligantes: quemadmodum pulpa colligit grana granatorum, et fauus continet mel. Quapropter dictum est a medicis, quod ab hoc panniculo cum cerebro oriuntur omnes nervi, ita ut omnes nervi sensitiui oriantur a cerebro anteriori præter auditiuos, qui a posteriori oriuntur cerebro, a quo et omnes nervi motiui oriuntur, præter nervos narium, atque palpebrarum, qui ab anteriori oriuntur cerebro. Tactiui vero nervi ab utroque simul oriuntur: cum tactus sit sensus communis totius corporis. Cerebrum autem in se duas continet partes, substantiam, loco, et operatione distinctas, scilicet partem anteriorem, quæ simpliciter dicitur: et est mollis, alba, humida

Prooemium primi libri.

occupans frontem, & verticem cranei fere totam: in cuius medio est pars cerebri cãdidior, purior, & nobilior intus cõcauitatem habens oblongam, angularem, quasi ad figuram quadrãguli, quæ ventriculus anterior nominatur: & est locus sensus communis atq; fantasie, quæ & imaginatiua dicitur: Et ab hoc ventriculo fere circa medium descendit via spaciola transiẽs per medium palati (q̃ lacuna siue colatorium appellatur) per quam cerebrum anterior a suis superfluitatibus emundatur. Et cum hoc colatorio concurrũt duo foramina nariũ: propter quod anhelitus ore etiam clauso atrahitur, & mucore narium quandoq; per fuscationem expuuntur. Quare si colatorium illud accadat quandoq; opilari ex flegmate grosso & viscoso, fiet anhelitus difficilis, nisi ore aperto, & proprie post somnum. Alia vero est pars cerebri posterior, quæ dicitur occiput, et est dura, subalbida, quasi figuræ triangularis, cuius basis est versus collũ, a quo oritur nucha replens dorso sphondilos, cum sit eius velut vicarius: quoniam ab ipsa nerui oriuntur, quia a cerebro anteriori non poterãt deriuari, propter ipsius paruitatem, atq; distantiam a membris, ne forte in via creparẽtur: Eius vero conus versus verticem est erectus: quoniã hæc figura promptior est ad recipiendum, & firmitior ad retinẽdum: quod etiã necesse fuit ventriculo consimilis figuræ ipsius medio fabricato, q̃ subseruit virtuti memoratiuæ, & reminiscitiuæ. Est præterea quãdã trãsitus strictus, lãgus, ac rectus ab anteriori procedẽs ventriculo, & tendẽs ad conũ ventriculi iã dicti, vt species sensatas & fantasias veloci cursu traducat ad cameram memoratiuã, et ecõuerso. Et hic dicitur medius ventriculus ad seruandũ virtuti æstimatiuæ (quæ in hominibus cogitatiua, vel ratio particularis, vel intellectus passiuus nuncupatur)

sagaci natura subtiliter fabricatus.

¶ Finis prologi siue prooemij.

¶ Incipit tractatus primus primæ sectionis: cuius sunt decem capitula.

¶ De dolore capitis. Cap. I.



Olor capitis ab Auicenna communi nomine soda dicitur, & si totum caput occupet, ouum, vel cephalea, vel galea appellatur: si vero partem capitis obtineat, siue dextrã, siue sinistrã, siue anteriorem, siue posteriorem, hemicranea nũcupatur. Sunt autem eius diuersæ causæ, species & modi: sed quocunq; modo fuerit, vel est morbus, cum sit per se incipiendo a sua causa primitiua, antecedẽte, vel cõiuncta: vel est accidens, cum sit sequendo morbum, sicut vmbra sequitur corpus: vt dicit Gale. 1. de accidente & morbo. Eius autẽ species, causæ seu modi sic possunt deprehendi, & proprie simplices. Nam de soda ex causa composita dicitur, cũ de apostemate calido & frigido cerebri dicemus. Soda igitur cũ est morbus, aut fit a causa intrinseca, aut primitiua. Si intrinseca, aut a mala cõplexione, aut solutione continui. Mala namq; compositio dolorem non causat: vt dicit Gale. in techni. Si a mala cõplexione, aut cũ materia, aut sine materia. Si sine materia, sic sunt tres species eius. Primæ a mala cõplexione calida: secunda a frigida: tertia a sicca. Quoniam humida non potest facere dolorem, nisi cum materia. Si vero sit cum materia, aut ventosa, aut humoralis. Si ventosa, sic sunt duę species: quia vel ventositas eleuatur ab humore frigido, vel insigitur ab aere & vëro frigido. Si humoralis, sic sunt quinque species. Prima est a sanguine: secunda a cholera: tertia a flegmate: quarta a melan-

cholia: quinta a materia composita ex
ijs, q̄ & variatur pluribus modis. Si a
soluōe cōtinui, sic est vna species, scili
cet ex flegmate salso; vel cholera rubea
corrodente & vlcerante durā & piām
matrē. Si a causa primitiua, sic sunt dug
species, scilicet ab aere continente, vel a
casu vel percussione. Si vero soda fuerit
accidens, tunc iterum aut fit a causa pri
mitiua, aut intrinseca. Si primitiua, sic
sunt tres species, vtpote vel ab aere, vel
a vento frigido, vel a sole, & balneo ca
lido, vel ex coitu, & labore superfluo.
Si intrinseca, aut consequitur morbum
vniuersalē, aut particulare. Si vniuersa
lem, sic fit vna species, scilicet quę fit in
febris continuis, & interpolatis hora
crisis, vel hora maioris afflictionis, Si
particularem, sic fiunt septē species. Pri
ma, quę fit ex vitio stomachi repleti
malo cibo vel potu, vel humoribus cor
ruptis: Secunda, quę fit ex vitio epatis:
Tertia, ex vitio splenis: Quarta, vitio
matricis: Quinta vitio renum: Sexta, vi
tio mirachi, vel alterius membri exteri
oris: Septima, vitio intestinorum, et eo
rum quę in eis sunt. Et sic in genere sunt
24. species sodæ: quę adhuc plures con
tinent modos sub se, prout dicitur.

Methodus. Dolor cerebri si fiat a ma
la cōplexione diuersa ca
lida, sine materia, signa habet ista: sen
titur caput calidum ad tactum, apparēt
oculi rubei, & sentit infirmus agitatio
nem intra craneum, & pulsationem in
temporibus, & quia iuuatur a frigidis
applicatis per exterius, & nocetur a ca
lidis: Et si fuerit ista caliditas a causa pri
mitiua, antecessit expositio capitis ad
solem, vel ventum calidum. Cura eius
est, vt alteretur caput ad frigidum cum
inunctione olei ros, vel olei de nenufar,
mixti cū populeo, vel aqua ros, & ace
to, vel lacte mulieris, vel lacte papau
eris, vel cum succo lactucę, semperuiue,

solatri, & similium per se, vel mixtorū,
imbibendo in eis pannos lineos, & po
nendo actu frigidus super frontem & tē
pora frequenter, sed nequaquam tanga
tur pars cerebri posterior ex eis, scilicet
occiput: quoniā naturaliter est frigida, et
nucha, & nerui motiui inde oriuntur. Si
vero fuerit a mala complexione diuer
sa frigida sine materia: sentitur caput ad
tactum frigidū, iuuatur a calidis, & no
cetur a frigidis, & forte antecessit am
bulatio in aere frigido, siue vento bore
ali. Cura eius est, vt caput ante cibum
fortiter frietur cum pannis calidis, &
sacclletur cum puluere thuriser bacca
rum lauri contritarum, vel cum semine
nasturtij et sinapis, postquam calida in
fusa fuerit in aceto albo forti: et post hoc
in saccello calefacta super lapidem igni
tum, & oratum cum eodē aceto, & po
test addi carui, cymīnū, anethū. Et in isto
saccello remaneant semina: Olibanum
vero & bacca lauri contrerantur: & ca
put abluatur sæpius dum ieiunus est cū
vino albo, veteri, puro actu calido, in
quo ruta, salvia & castoreū sint bullita:
vel inungatur cum oleo laurino, vel de
lilio, & odoret res calidas aromaticas
ante cibum, & stet in sole calido, vel ad
ignem ieiunus: Et vtatur cibus actu ca
lidis & virtute, conditis cum speciebus
aromaticis: bibat vinum vetus, purum,
vſu tamen moderato. Et scias quod sin
ciput frequentius alteratur ad calidum
propter sensus & spiritus ibi plurimos
occiput vero ad frigidū magis, propter
neruos ibi ortos. Si vero fiat a siccita
te, apparet cōcauatio oculorum, & an
tecessit fluxus ventris per se, vel per ar
tem, vel vigilia, vel exercitium, vel col
tus, vel studium, & sollicitudo, & appa
ret narium & labiorum ariditas cum
ardore aliquali. Cura eius est vt cibis
impinguantibus pro posse, vt sunt iura
carnium hœdorum, pullorum, agnorę

Tractatus primus

annalium condita cum .33. cynamono, croco: & balneis humectantibus, vt est balneum aquæ dulcis tapide, post cibū illico, vel completa digestionē prima sine mora in ipso, ne fiat corpus euaporabile. Potest quandoq; vti piscibus recentibus, petrosil conditis cum speciebus non acutis: sicut sunt nux mulcata, macis. 33. cynamonum, gariofilī, & crocus. Bibat sæpe ieiunus lac per duas horas ante cibum cū melle, vel zuccaro, vel mica panis de simila, & propriē si sit consuetus, & in ipso delectetur, & stomachus sit mundus: quia faciliter corrūpitur in stomacho cacochymo vel plethorico, in calido quidē ad fumosum, in frigido ad acetosum: quare tunc capitis dolorem inducit grauatiū sursum vaporando: vngatur ex oleo violaceo. Si fuerit ex complicatione duarum qualitatum sine materia, tunc signa adulterari videntur: quare cura componatur. Scias autem, q̄ soda raro fit a caliditate sine materia simpliciter, & difficile ē ipsam cognoscere, nisi a posteriori, scilicet cum medicus procedit in cura cum solis alteratiuis prædictis: & si non conferunt, cognoscitur, q̄ est cum materia: quare euacuatione indiget, vt dicitur. Si vero fiat a mala cōplexione diuersa cum materia ventosa, sentit infirmus tinnitum in auribus, et vertiginem, & pulsationem fortem sine acuitate, vel punctura in capite, & scotomiam: Et certū signū sodæ ventosæ est, quoniam dolor mutatur de loco ad locum. Ista autē ventositas vel fit a causa primitiua, vel humoralī. Si primitiua, tūc antecessit expositio ad vētum capite nudato. Et cura eius est si vētus fuerit calidus, odoret oleum ros. vel nenupharis & camphoram, & ros. vel mala maciana, & faciem suam irroret cum aqua ros. Et faciat emplastrū vel saccellationem ex rosis, nenuphare, & similibus: & ponat de eisdem oleis inter

nares & aures: sicut emutatio cum cōdiso vel pipere: Bibat vinum granatorum vel berberis, vel vinum ponticum lymphatum: vtatur in cibis suis aceto vel agresta. Et si ventus fuerit frigidus: odoret castoreum, & moschum sæpius: caput vngat & nares & aures cū oleo de castoreo, vel spica nardi actu calido, vel oleo communi, in quo dissoluta sint castoreum, euforbiū, vel carui, ameos, & cyminum, & roret faciem cum vino forti frequēter. Abluat caput in loco calido ieiunus cum lixiuo acuto, facto ex cinere quercus vel vitis: in quo saluā, calamentum, & rutha, maiorana, flores camomillæ, mellilorum, baccæ lauri, & similia sint decocta: & fricet post hoc caput cum pannis calidis tempore longo, postea cum pectine. Neque vadat ad aerem frigidum, donec caput perfecte exiceetur. Si autem ventositas fuerit a causa humoralī, quod scitur: quia non fuit vēto expositus, tunc digeratur primo slegma grossum, viscosum contentum in capite et stomacho vel in testinis (quia ab illis eleuatur ventus) cū oxymelle composito vel squillitico: deinde purgetur cum pillulis cochis, dādo. 3. i. vel. 3. i. & f. cum itur dormitū sine coena: vel cum medicina de turbith, quæ sic fit, ℞. turbith al. duri, bene mundati, hermodacti. 33. ana. 3. f. zuccari. 3. i. terantur omnia simul, & derur totum mane cum vino decoctionis ameos, anisi, carui, cymini, vel piperis longi, actu calido: et tardetur cibi post ipsum: quia tardē solutionis est, & leuiter euacuat: Vel cum 3 benedictæ laxatiua. Vtatur sæpe post euacuationes diatrion pipereon, diagallanga, dianiso, vel diacymino. Sumat in septimana semel stomacho ieiuno. 3. f. tiriaca veteris electa cū vino decoctionis prædictorum: & cum eodem vino sæpe gargarizet, & ipsum in ore teneat: Fiant sternutationes præ-

dictæ, masticeet ante cibum masticem, piper, carui, cyminum, anisum, cum expuitiõe saliuæ. Saccellet caput cū milio et sale torrefactis: vel cum orobo, fenogracæ, fursure, rutha, saluia, calamentio, origano, serpyllo, mentastro, pullegio contritis & bullitis in aqua & aceto forti, deinde expressis diligenter, & positis in sacculo super caput actu calido frequenter in ieiuno, reitendo postquam in frigidatum fuerit, abrais primo capillis, vt virtus medicing penetret et apertis poris cum fricatione cum panis calido: vel saccelletur cū seminibus & pulueribus calidis positis in cura soda frigida sine materia. Et embrocetur cum vino parum calido dicto ibidem. Fiat ablutio cum lixiuo predicto semel in septimana, & inunctio cum oleis prædictis, vel cum oleo de mastice, in quo baccæ lauri sint contritæ. Vtatur cibis bonis conditis cum speciebus aromaticis & calidis & proprie cum pipere longo, nuce muscata, cubebis & croco. Bibat vinum vetus, potens, vsu moderato: quod si non habeat, lymphet suum vinum cum aqua decoctionis gariofil. & piperis longi. Posset quandoque fieri caput purgium cum succo ruthæ vel calamenti, inijciendo naribus cum instrumento. Si vero soda morbus fiat a mala complexionē diuersa cum materia humoralitunc vel est sanguis, vel cholera, vel flegma, vel melancholia, vel compositum ex eis. Si sanguis, signa eius sunt rubedo plurima faciei cum apparitione & repletionē venarum, pulsatione temporum, saliuæ dulci sine causa manifestā, somnolentia cum apparitione fantasmatum rubeorum & homicidij in somno: dolor acutus non valde, qui augetur ab aurora vsque ad prandium, siue horam tertiam (quod est tempus sanguinis) & habitudo car-

nosa & antecessio ciborum multiplicantium sanguinem: sicut iura bona, carnes nobiles, vinum dulce. Et si vrina fuerit grossa, rubea, magis certificaberis. Potest autem sanguis peccare in capite, & alius humor in epate: quare hora illa mutabitur vrina. Cura eius est, vt primo fiat flebotomia cephalicæ in brachio vel manu: si virtus & ætas consenserint: vel ponantur ventosæ in spatulis, vel cum scarificatione longa & profunda, similiter super collo & super mento, & super vertice cranei: prius tamen abrais capillis diligenter, vel flebotometur vena frontis: quia secundum Hippo. quinta parti. aphorismo. Posteriora capitis dolentia, recta vena incisa in fronte inuat, scilicet quando materia est sanguinea. Secundo laxetur venter omni die ante cibum cum suppositoio vel clystere. Tertio epithymetur frons & tempora cum aqua rosæ. & modico aceti vel succo solatri & semperuiuæ. Vltimo, scilicet hora declinationis abluatur caput aqua decoctionis anethi, florum camomillæ, & rosæ. rubeorum: Et vnguatur cutis frontis cum oleo anethino, vel camomillino, vel vtroque simul actu calidis, abrais capillis. Et scias, quod in principio istius sodæ confert plurimum fluxus sanguinis narium per se, vel per artem productus cum fetis porcinis. Cibetur farre, farina ordei, vel auenæ, lacte amigdalorum dulcium, lentibus, lactucis, portulacis, cucur. mica panis lota in aqua frigida, vel vino granatorum: vtatur prunis, persicis, pomis, pitris assis. Bibat aquam decoctionis berberis, vel aquam coctam simplicem: vel aquam mixtam cum vino granatorum, vel vinum album aquosum mixtum cum triplo aqua frigida. Si vero cholera sit in causa, signa eius

Tractatus

Sunt facies citrina, maera, dolor pungi-
uus vehemens acuitatis sine grauitate,
qui proprie augmetur ab hora diei ter-
tia vsq; a Ithoram nonam (quod est tem-
pus cholerae) & instantia vigiliarum, pul-
satio temporum, & apparitio fantasma-
tum, vt ignis vel incendij in somno: &
rubedo nasi cum caliditate, & strictura
siue humiditate plurima: & vrina subti-
lis citrina, et forte egestio tinctorum, sicut vi-
tellum oui. Cura eius est, vt in principio
digerat cholera cum oxyzacarro vel sy-
rupo rosaceo: postea euacuetur cum ele-
ctuario de succo rosaceo laxatiuo, vel
cum pillulis de reubarbaro: quae sic fiant.
℞ reubarbari electi. 3. duas, mastitis. 3.
ynam. 3. vnum: formetur pillula, cum
succo apij, vel rutae, vel vino: & fiant
tribus diebus, ante q̃ ministrentur. Den-
tur ex eis in media nocte. 3. duae, vel 3.
vna. Et aliam descriptionem earum po-
nemus capitulo de catarrho. Quod si pil-
lulas recipere noluerit: licet perfectio ope-
rentur circa membra remota: tunc detur
in aurora decoctio. ℞ tamarindorum
vncias duas, mane vnciam vnam: dis-
solvantur in libra semis aquae decoctio-
nis sprunorum, & coletur. Et si aeger sit
fortis, addatur mirabolanorum citrino-
rum tritorum perfecte vncia vna: vel pur-
getur cum medullae cassiae fistulae vncijs
duabus, vel vna vncia & semis dissolu-
ta cum eadem aqua: potest acui cum dra-
gma vna reubarbari puluerisati. Et si
propter hoc non curetur, flethorometur
cephalicarum vel fiat ventosatio in spatulis
sine scarificatione, similiter & super col-
lo & super mento propter diuersionem:
Post illud vero super vertice capitis, abra-
sis capillis diligenter: roretur frons, & te-
pora cum aqua rosacea et aceto, & oleo
rosaceo, vel nenupharino: ponendo ex eis
et am intra nares septies omni die: & fri-
centur extrema cum aceto & sale. Insta-
tu vero caput emplastre- tur cum floribus

camomillae, rosa, mentha, maiorana, ce-
ctis in aqua, & contusis, & incorpora-
tis cum oleo camomillae: & cum eadem
aqua embrocetur caput ab alto. Quod
si haec omnia non contulerint, & dolor
& vigiliarum aegrum ad defectionem per-
duxerint, applicentur primo narcotica
leuia per exterius. ℞ olei rosae. vnciam
vnam, opij 3. f. acet. 3. i. misceantur si-
mul, & calida inungantur circa frontem
et tempora cum penna. Et si hoc non suf-
ficat: dentur vesperi cum patiens cupit
dormire, vel mane troscisci, qui sic fiant.
℞ diapaueris vel philonij recentis, vel
tiriacae confectae intra sex menses. 3. f.
opij granum i. & misce: Post hoc da bi-
bere duo cochlearia vini mixti cum tan-
tūdem aquae: vt virtus medicinae euapo-
ret ad caput. Post hoc purgetur iterum
sequenti die cum aliqua medicinarum
praedictarum: vt cholera purgetur, &
medicamentum narcoticum eradicetur. Sed
plura somnifera vitilia ad sodam pulsa-
tiuā dicemus capitulo de vigilijs & fre-
nesi. Post purgationē vtatur diaprunis,
simplici rosata nouella, diarod, abba-
tis, zuccaro rosae vel violae. Si autem haec
non contulerint: fiat remedium cum chi-
rurgia: quia fortissimae medicinae nouis-
sime sunt administrandae. Fiant ergo cau-
teria in commissura capitis in occipitio
sub duobus cornibus: vel fiat caustica-
tio colli cum cantaridibus in corporatis
cum diaquilone, vel fermento, abscessis
capitibus & alis, donec locus vesicetur,
& humor attrahatur: tunc trahatur fi-
lum de lana vel serico per vesicam, &
dimittatur stare, donec plurima humidi-
tas effluerit. Et si vis, vt causticatio non
dilatur: pone tūc circum circa pannos
lineos infusos in aqua rosae & albumine
oui. Post septem vel nouem dies consoli-
detur locus cum vnguento albo vsitato,
vel vnguento de cerussa, quod sic fit.
℞ ceræ frustatim incisae. 3. i. olei rosae. 3.

quatuor, dissoluatur primo cera in casu la: addatur oleum, tunc deponatur ab igne, & addatur tantum de puluere cerussæ, donec inspissatum fuerit agitatio continue cum spatula: tunc misce cum eis duo albumina ouorum, postq̃ infrigidatum fuerit, & addatur in fine aliquid camphoræ. Si vis fortificare, adde opij grana 12, iusquiamis grana vigintiquatuor, pulueris corticis mandragoræ 3, 1. hoc enim vnguētum ardorem reprimat, & omnem vlcérationem consolidat, siue fuerit ab igne, siue cauterio, vel melancholia adusta, vel flegmate salso, vel cho. vel aqua feruenti, vel oleo. Diæta eius sit, sicut in soda sanguinea: sed magis declinet ad frigida: quia calor cholerae acutior est q̃ sanguis, vt dicit Gale, in lib. de mali. cōpl. diuersæ. Simplicia itaque frigida caput sua proprietate respicientia & alias medicinas ad ipsum ducentia, sunt viola, nenuphar, rosa, camphora, salix, cucurbita, granatū, solatrum, lactuca, sandali, myrtus, plantago, semperuiua, portulaca. Et est notandum, q̃ ex his, qui magis aromaticæ participant, magis capiti conferunt, & appropriantur: ex quibus possunt componi medicamina alia præter supra scripta huic casui conuenientia. ¶ Si flegma sit in causa, signa eius sunt frigiditas temporum & capitis ad tactum, dolor grauatiuus sine punctura, somnolentia & pigritia. In moribus debilitas oculorum, quandoq̃ cinnitus & pulsatio temporis propter opilationem plurimam, & apparitio fantasmatum de piscibus, de pluuiis, balneo aquæ frigida, fastidium & multitudo saliuæ & spuri & muscillaginis narium, color faciei subalbidus vel pallidus cum habitudine squalida augetur: dolor in nocte: quia est hora flegmatis: et si vrina sit alba grossa, egestio: quida non tincta, verior erit significatio. Cura eius est, vt digeratur flegma cum syrupo de

sticados: qui dicitur capitulo de debilitate visus, vel oxymelle composito: Purgetur cū pillulis cochleis, vel iterapigra: postea fiat sternutatio cū pipere, vel condisi: vnguatur caput cum oleo nardino, vel de lilio, vel de castoreo calido adu, vel cum vnguēto marciaton ad ignem vel solem: Fiat emplastrū supra caput abrais prius capillis: quod sic fit. 18. prassij rosarum ru. ablinth. florum camomillæ, anethi, manipu. 1. farinæ fenigræci, vel sel. lini. lib. 8. conterantur omnia & bulliant in aqua: Deinde detur. 3. 6. tiriace veteris, vel aureæ alexandrinæ vel diacastorei, vel methridati, vel theodorici anacardini cum 3. 1. vini decoctionis gariofil. & fiat ablutio cum lixiuo supradicti, vbi agebatur de ventoso dolore capitis. Diætæ diæta calida et sicca: In suis cibis vratur petro. fen. & speciebus calidis aromaticis, si febris non prohibeat. Si autem per ista non curetur fiant cauteria prædicta, similiter & causticatio atq̃ scarificatio: quia si per medicinas curari potest, curabitur: prohibeatur a somno superfluo proprie in die, ne cadat in subeth. ¶ Si melancholia sit in causa: tūc signa eius sunt frigiditas capitis ad tactum, vigilie plurimæ cū cogitationibus corruptis et apparitione fantasmatum nigrorum in somno: vti putat de fumo, fuligine, et similibus: color faciei plumbeus, dolor cum plurima grauitate, quæ multiplicatur ab hora nona vsq̃ ad occasum solis: quod est tempus melancholice perfectæ per adustionem: vel post occasum solis, quod est tempus melancholice perfectæ per congelationem. Sapius tamen est in nobis calidum adurens, q̃ frigidum mortificans: vt dicit Gale. 2. de cōplexionibus: et paucitas supfluitatis oris et narium, et vrina glauca subtilis, et egestio foetida, liuida vel plumbea vel nigra. Cura eius est cura fere doloris eadem cum peccato flegmatis, præterq̃

Tractatus primus

q. purgatio debet fieri cū isto apozimate. ℞. myrobalanorum kebulorum, indorum, ana. ʒ. i. turbith, ʒ. i. fene, thymi, epithymi ana. ʒ. semis, pistēt & bulliant in li. i. aquæ. Sed i fine decoctionis addantur fene & epithymum, & non in principio: quia virtus eorū resolueretur. Dantur de ista decoctione, postquam colata fuerit, ʒ. quatuor, & dulcorentur cū zucaro: detur ante diem per vnam horam, & dimittatur dormire super, quousque medicina fuerit excitata: tunc vigilet, et moueatur paulatine, donec tota virtus medicine fuerit cōsumpta. Et plura alia pharmaca dicemus capitulo de perturbatione virtutum animalium sensitiuæ, scilicet de melancholia. Non dimittatur solitarius, nec habitet in loco tenebroso. Utatur solarijs & gaudijs pro posse. Nutriatur cibis humidis, sicut sunt iura carniū hœdorum, pullorum, agnorum, animalium castratorum: vitet carnes bouinas, hircinas, ferinas quascunq; & vinū rubeum, & omnia generantia sanguinē grossum, melancholicum: quæ sunt duorū generis. Quædam enim hoc faciunt sua substantia: vt lentis, caules, carnes bouinæ suffumigatæ, panis azymus, ova dura assa vel frixa, & similia. Quædā sua qualitate: quod accidit dupliciter: quia quædam caliditate adurente: vt sunt peper, allium & sinapis, & carnes ferinæ proprie salitæ vel fricatæ. Quædam sua frigiditate condensante: vt faba, lactuca, portulaca, risuni, & similia. Et diligenter succurratur huic sodæ: quia finaliter perducit ad passionem melancholicam. Si autem materia humoralis fuerit cōposita ex aliquibus prædictis quatuor vel cū omnibus æqualiter seu cum dñio alicuius vel aliquorum: tunc signa et cura erūt cōposita suo modo. Et scias, q̃ raro est reperire sodam, vel morbum alium ex causa homogenea pura, sed cōposita vt plurimū, quod est propter ho-

minum gulositatem & ciborum confusione: propter quod & humores generantur in corpore diuersi: quorum varias calamo scribi non potest, nisi modo generali & communi. ¶ Si autem soda fiat a solutione continui facta cum ferro tū eam chirurgicis derelinquo. Si vero siat ista solutio ab humore acuto corrosiuo, sicut est cholera vel flegma salsum: tunc si sit intra cranium, difficile & impossibile est ipsam consolidare: quia medicinæ non possunt applicari: sicut etiā dicet in capitulo de fluxu sanguinis natiū. Et si curari pōt, curetur in principio, & ante cōfirmationē vlcēis cū infrigidantibus sanguinē (q̃ dicentur eodē capitulo) & cauterio in vertice profundo vsque ad cōmissuram, remanēte longo tēpore aperto. Si vero illud vlcus sit extra cranium, curetur cū vnguento albo vel de cerusa supradictio. Si vero soda fiat a calu & percussione sine vulnere, cuius signa patent ex relatione infirmi: tunc cura eius est, vt in principio statim radant capilli circa locū, & vngatur particula lassa cum oleo rosæ, & emplastretur cū puluere mirtilloꝝ, rosæ mixto cum aqua rosæ, oleo rosæ, & aliquantulo aceti ad re-percutiēdum materias, & confortandū particulā. Postea flebotometur cephalica partis cōtrariæ, vel mediana: vel fiat ventosatio in sparulis & cruribus, si flebotomia fieri nō potest. Et laxetur venter omni die ante cibū suppositorio vel clystere factio ex aqua decoctionis violæ, mal. folioꝝ alchææ lib. f. olei cōmunis, ʒ. iij. mellis ʒ. i. sal. ʒ. f. furfuris, p. i. Si venter sit stypticus, emplastretur omni die locus cum oleo rosæ mixto cum bolo, arsan, dra. ter. sig. puluere mirtilloꝝ. Nutriatur cum farina ordei vel farre, vel lactucis, portulacis. Bibat ptisanam, vel aquam zuccari, vel aquam decoctionis berberis, vel mirtilloꝝ: in qua sit aliquid zuccari: vinum omnino vitet, &

carne illa hora, nisi virtus sit debilis: tunc
vtratur carnibus alteratis cum portula-
ca, lactucis, cucurbita, rapis. Bibat vi-
num ponticum lymphatum cum duplo
aquæ frigida. Et si sanguis exierit ab au-
re vel naribus: cibetur cerebro gallina-
rum hœdorum castratorum: quia signi-
ficat nocumentum peruenisse ad cere-
brum, & ipsum magis confortatur ex nu-
trimeto cerebri, quā alterius rei: quia simi-
le membrum confortat simile: ut dicit
Auerrois, colliget. et ras. in lib. diuisio-
num ca. presentis. Et sic regatur, donec lo-
cus securetur ab apostemate: tunc con-
fortetur cum vnguento styptico facto ex
pulvere myrrhe, thuris, mastice, ana. mi-
xtis cum oleo de camomilla, quod suffi-
cit. Nam ista sunt calida & sicca: ideo
confortant particulam læsam, & adæ-
quant eius complexionem naturalem,
et resoluunt reliquias materiarum. Si au-
tem hoc modo non curaretur: tunc secu-
re potest euacuari cum pillulis cochis:
& iterum procedatur cum alijs prius di-
ctis. Si autem cum hoc cranium fuerit
fractum vel cōtūsum, recurratur ad chi-
rurgiam. ¶ Si vero soda fuerit propter
coitū superfluum, vel exercitium: signa
sunt concavatio oculorum, palliditas fa-
ciei: & certius signum est infirmi narra-
tio, & dolor alkatim, id est dorsū, vbi
situati sunt renes. Cura eius est, ut cōfor-
tetur corpus cum cibis humidis nutriti-
uis, ut est caro pullorum, hœdorum ca-
stratorum cum iuribus eorūdem, pisces
recentes petriui, ova sorbilia, vinum ru-
beum dulce: vnguantur nares cum oleo
violatum, & renes cum vnguento im-
pinguatiuo, quod sic fit. ℞. olei violarū
3. quatuor. ceræ. 3. f. a dipis anseris, anatis
vel gallinæ. 3. 1. dissoluatur omnia in ca-
sola, & incorporentur perfecte: vtratur
diaphazition diamsusco, electuario ducis
restauratiuo: quod ponemus capitulo de
seb. ethica. Bibat omni mane ieiunus, lib.

℥. lactis caprini recentis. cum zuccaro, vel
cum mica panis: & non comedat desu-
per cibum aliū per duas horas ad mi-
nus. Et hæc de soda morbo.

¶ De soda, prout est accidens.

Soda prout est accidens si conseq-
atur morbum vniuersalem: signa ha-
bet ista. Quia aduenit cum feb. vel
circa id: & augetur cum augmento fe-
brium, & remittitur cum remissione fe-
bris. Cura eius est, repercutere materias
fumosas cū epithymate facto ex aqua
rosacea & modico aceti, vel succo sola-
tri, vel semperuiæ, vel lactucis, vel la-
cte mulieris, imbibendo in eis pannos li-
neos, & fronti & temporibus apponen-
do actū frigidos cū reiteratione frequen-
ti: quia defendit cerebrum a mala com-
plexione actū calida & apostemate. Et
plura dicemus capitulo de febr. & cap.
de vigilijs, & cap. de frenesi. Attamen-
ter illic dicēda, dicemus hic syrupū cō-
tra sodam, sitim & vigilias in feb. quā
plurimum superfluum, deiciunt virtu-
tem. ℞. seminis papaueris, lactuce, por-
tulacæ, cucur. añ. 3. quatuor, se. aneli. 3.
tres, croci, myrrhæ, añ. 3. 1. iusquiami. 3.
duas, mandragoræ, opij. añ. 3. 4. pusillij.
3. 2. succi liquiritiæ quantum volueris:
pistentur & bulliantur in lib. duabus
aquæ, donec tertia pars fuerit consum-
pta: coletur, & addatur zuccari. lib. 1. &
fiat syrupus, & detur ex ipso 3. 1. & f.
cum 3. 4. aquæ frigida in æstate, vel ca-
lida in hyeme sero cum itur dormitum.
Vnguantur tempora & nares cum po-
puleon distemperato cum oleo viol. vel
ros. vel lacte papaueris: & in fine cibi
vtratur pito vel citonio assio actū frigi-
do: & leniatur venter omni die cum sup-
positorio vel clystere lenitiuo: ut dice-
mus capitulo de bolismo: & regatur

Tractatus primus.

prout feb. exegerint in declinatiōe feb.
& soda embrocetur caput ab alto cum
resolutiuis: sicut est aqua decoctionis fio-
rum camomillæ melliloti, semi, lini, &
anethi actu calidis. Fiat desuper fricatio
leuis assidua cum pannis calidis: donec
caput perfecte siccetur. ¶ Si autem soda
consequatur morbum particularem: &
hoc est vt plurimum, vel vitio stoma-
chi, vel intestinos, vel epatis, vel sple-
nis, vel marris, vel renum, vel vesicæ.
Si sit vitio stomachi, hoc est tripliciter,
vel ratione cibi & potus corruptorum
in stomacho, vel ratione malorum hu-
morum congestorum in ipso vel ratione
veneni assumpti. Si primum, tunc signa
eius sunt antecessio nausearum satietatis,
eructuatio foetida, fumosa vel aceto-
sa, angustia corporis cum reuolutione
de latere super latus, & insomnietas, &
apparitio fantasmatum plurimorum ter-
ribilium in somno, & prostratio appeti-
tus cum nausea & fastidio. Cura eius est
vomitus, vt dicemus capitulo de boli-
smo, capitulo de empericis: & inunctio
stomachi cum oleo masticeis & nardino
addito pul. gariof. calefactis in vase du-
plici, vel cum vnguento marciaton, ad
ignem calidum ante cibum: vtatur ele-
ctuarijs calidis diagal. & diatrion, pipe-
reon, electuarijs ducis, et similibus. Quod
si vomere non potest, pro posse dormiat
sine cibo, donec digestio perficiat. Quod
si dormire non potest: ambulet leuiter et
assidue sine quiete, donec tota die cibum
vel digeratur, vel ad intestina descēdat.
Emplastretur stomachus cum calamen-
to, absinth. ros. anisi. carui, cymino, ma-
stice, myrrha. añ. bullitis in vino rubeo
styptico, & expressis perfecte & positis
super os stomachi actu calidis cum reite
ratione frequenti, postq̃ infrigidatura fu-
erit: Vel fomentetur cum filtro recenti
infuso in aqua calida decoctionis earum
dem rerum. Et si eructuatio fuerit fumo-

sa: vtat rosata nouella vel diaro. abba-
tis vel zuccaro ros. Et si crapula per se
non exierit, educatur cum medicina vel
clystere: & fiant omnia, quæ dicentur capi-
tulo de debilitate digestionis, & capitu-
lo de cura feb. ephimere ex nauseatiua
satietate 2. lib. & cap. de eructuatione,
& capitulo de vomitu, si vomitus vel
eructuatio superfluxerit. Si autem ratio-
ne vini vel alterius potus superfluentis
in stomacho inebriantis vel nō inebrian-
tis: tunc signa trahuntur ex narratione
infirmi. Et eius cura est, vt fiat vomitus
& inducatur pro posse somnus & epi-
thymentur frons & tempora cum aqua
rosa. & aceto vel succo solatri vel sem-
peruiui. Et faceat & q̃scat in loco ob-
scuro capite bene elevato super cenuca-
li molli: Vtatur repercussiuus ebrietatē
prohibentibus: sicut est magnus haustus
aquæ frigidæ vna hora simul, & vinum
granatorum, & aqua decoctionis berbe-
ris. Post somnū et digestionē balneetur,
& sudet, & laboret ieiunus: neq; come-
dat, donec tota crapula consumatur, &
appetitus redierit. Medicamen tamen
expertum ad ebrietatem prohibendam
est, comedere cepas cum aceto, vel ceri-
andrum cum zuccaro & aceto, vel odo-
rare camphoram & sandalos, vel bibe-
re aquam frigidā cum aceto. Sicut econ-
uerso medicina faciens ebrietatem subi-
to, est potus aque decoctionis iusquiami-
nigri cum cortice mandragoræ, donec ru-
bere coeperit, siue per se sumatur, siue cū
vino. ¶ Si autem soda fuerit ratione hu-
morum congestorum in stomacho: tunc
signa & cura eius trahuntur ex capitulo
de indigestione & debilitate stomachi:
veruntamen ex distinguendis oportet
addere duo signa. Primum est, q̃ soda
facta vitio stomachi est proprie decli-
nans ad partem capitis anteriorem, scilicet
frontem & tempora. Secundum est,
q̃ si cholera peccauerint: tūc dolor magis

infestat ante quam possit. Si vero flegma vel melancholia, dolor magis infestat post cibum, quam in ieiunio. Si vero materia sit mixta & composita, tunc dolor fiet erraticus in ordine, & est permixtus ex acuro pungitiuo & repletiuo grauatiuo. Si autem fuerit ratio veneni bibiti, ilico succurrat: vt dicemus capitulo de sincopi cum vomitu & tiriaca veteri, & de venenis libro secundo. Si vero fiat vitio intestinorum, tunc accedit vitio vermium vel humorum putridorum in ipsis: Signa eius sunt facies tenebrosa & pallida, scætor oris, & pruritus nasi, concavitas oculorum, multitudo comestitionis cum egestionemodica & habitudine corporis macra. Et sensibiliter quandoque egrediuntur vermes cum secessu, & quandoque cum vomitu: licet nõ generetur in stomacho sed in testinis tantum (vt dicitur quinto de accidenti) vel in ano, propter stomachi nobilitatem, & eius necessitatẽ pro toto: Et accedit ista passio vt plurimum pueris gulosis proprie in autumno propter vsum fructuum plurimorum. Cura eius est abstinencia a rebus dulcibus vinctuosis, & vsus aceti & agrestis, & nucleorum persicorum, & amigdarum amatarum: quia sicut dulcia sunt materia vermium: sic amara interficiunt eos. Et si æger sit infra decimum quantum annũ ætatis suæ, purgetur cũ vncia vna & semis, vel cum vncijs duabus cassiis, dissolutis in vncijs quatuor aquæ feruentis: coletur, & detur ante diem, vt intestina lubricando mundificet. Vel fiat clystere lenitium, cui addatur aliquid ierepicis vel benedictæ laxatiuæ. Si autem sit iuuenis vel senex, purgetur cum eisdem vel pillulis cochij, vel cum medicamine de turbith dicto in principio capi. Vngatur totus venter cum succo absinthij mixto cũ aloë, agarico, & aceto, vel oleo amigdarum, vel nucleorum persicorum, & fiant omnia

quæ dicuntur capitulo de cholica ex vermibus. ¶ Si autem soda sit vitio epatistunc signa eius sunt dolor declinans ad partem capitis dextram cum tensione & dolore aliquo hypochondrij dexteri, opilatione epatis, vrina subtili subcitrina vel rubea clara. Cura eius est flebotomia basilicæ in brachio vel manu lateris eiusdem, & epithyma epatis cum aqua rosa. & sandalorum & modico acetati, & alijs rebus, prout materia opilians requirit: de quo dicetur capitulis de debilitate et opilatione epatis. Epithymetur frons & tempora cum frigidis sepius. ¶ Si fiat soda vitio splenis, signa eius sunt dolor declinans ad partem capitis sinistram, cum dolore & tensione hypochondrij sinistri. Cura eius est flebotomia basilicæ brachij sinistri, vel saphe næ pedis sinistri, q̃ est intus in talo, vel saluatellæ pedis sinistri, q̃ est inter anularem & auricularem: Et positio emplastri de opiliatis supra splenem, quod dicitur capitulo de permixtione virtutum animalium, parag. de empiricis. & capitulo de opilatione splenis per totum: & positio repercussiuorum circa frontem & tempora sæpè dictorum. ¶ Si vitio matricis: signa sunt dolor capitis inter frontem & commissuram, quæ est in vertice crani: & antecessio retentionis menstruorum, vel abstinencia a coitu: dorsi dolor & spatularum, prout patiens tibi referet. Cura eius est eadem cum cura soda de vitio splenis. Si vero soda fiat ex renibus: signa sunt dolor capitis declinans ad posteriora, scilicet ad occiput, & grauitas circa albarin & circa locum renum in fine dorsi: & forte antecessit coitus superfluous, prout patiens referet. Cura eius est sicut cura soda de vitio epatis, si sit cum materia: Si autem sine materia, cura eius dicta est supra para. de soda propter coitum. ¶ Soda mirachea si fiat vitio membrorum exteriorum, a quibus

Tractatus primus

q̄dam modo eleuatur materia fumosa q̄ sursum ascēdens ad caput percutit cerebrum: Tunc signa eius sunt: quia sentit ager q̄dam eleuari a mēbro illo: puta coxa, crure, vel mirach. Post illud sentit vertiginem vel dolorem in capite: & forte cadit et sit epilepticus. Cura eius est si cut cataleptis, q̄ dicitur capi, de epilepsia.

Emperica AD omnem dolorem chronicum capitis perdurantem maxime confert cauterium cum ferro ignito in vertice capitis profundatū vsq; ad cranium, vbi est commissura recta concurrens cum coronali versus frontem & lauda versus occiput: quia materiam resoluit, et malam complexionem cerebri rectificat, & adæquat: si dimittatur apertum vno mense, anteq̄ consolidetur: vel causticatio colli cum cantharidibus: vt dictum est in methodo. Item ad sodam, cuius causa est ignota, confert embrocatio cū aqua decocti onis florū camomillæ, melilori, anethi, viola, ros. seminis lini, salicis, et surfuris colata actute pida, effusa ab alto: quia resoluit, repercutit, confortat, & quietē inducit. Similiter & emplastrum factū ex eisdem super frontem & tempora frequenter. Quod si volueris somnum prouocare: adde corticē papaueris, fol. vel se. lactucæ solatrum, semperuiuam. Et si magis a dhuc, adde semen iusquiami & corticis mandragoræ. Sed post ista stupescat illa, fiat in crastino embrocatio pure resolutiua, ne cerebrum noceatur. Item vnguentum Iohann. Mesue in suo de appropriatis ad sodam calidam. ℞. olei ros. & viola. cum pauco aceto & agrestē succo & modico camphoræ, contunde, donec impinguescat, & capiti frigidum appone, & fac ipsum odorare aqua mentro. & nares intingere pro posse. Item masticatio secundum eundem in soda flegmatica eradicans eandem materiam cum sputo et saliuā. ℞. masticis et

thuris. p. 2. piperis pyretri. p. 1. ceræ, quod sufficit. Inde formetur formæ vt pillulæ, masticet diu in ore & expuatur. Itē gargarisma ad idem secundū eundem. ℞. oxymellis compositi vel squillitici. 3. 2. hierapicræ, 3. 6. misceantur cū aqua decoctionis hyssopi organi, pyretri, sinapis & similibus: vel gargariset sinapim conditam cum melle & aqua calida, & odoret castareum et muscum, cynamomum. Item embrocatio ad sodam calidam pulsariuā. ℞. ros. viola. nenupha. foliorū salicis, foliorum vitis albæ, foliorum maluarum, seminis cucurbitæ, cucumeris aut corticis eius, ordeum excorticatum, pillium, semina lactucæ, portulacæ, omnium, ana. decoquantur in aqua vsq; ad consumptionem quartæ partis, quæ ab alto fundatur super caput cum canella vel spongia plena sero cum iuerit dormitum, si non timeas catarrhū: Si autem sit cum pmixtione vel mania, multiplica pilliū & semina prædicta: Si vero cum vigilijs & insomnie tate, multiplica semē papaueris & corticis eius: In fine vero gratia resolutionis, adde seminis lini, seminis altheæ, florū camomillæ, melilori, fiat embrocatio, sicut prius. Similiter & manus & pedes & facies & crura cum ea lauentur: quāā accidentalem calorē totius corporis extinguit, & materias resoluit, & inducit getē. ¶ Ad sodā frigidā confert linimētū ex oleo irino & laurino aut nardino: et si fortis facere volueris, cōsorta virtutē eorū cum costo, castoreo, euforbio et pipere puluerisādo aliqd eorū vel oīa, et dissolue in eis aliquid tiriacæ veteris, vel mithridati in eisdem oleis vel in succo mēthæ, & suppone. Exptū est. Et si insomniatē patiē, adde myrtiæ, opijā. Cōfert etiā sodā frigidā emplastrū ex fumo colūbino, sauinā, baccis lauri, origaneto coctis, pistatis & incorporatis cū aceto multē fortitudinis, vel succo absin

thij. Confert etiā soda frigida & proprie post vniuersalē euacuationē odor pomi facti ex castoreo, ruta sicca, & storace, calamento, & gariofil. añ. par. 4. conficiendo cū glutino dragagati: qm̄ odor aromaticorū vsu moderato, & in corpore mūdo cerebrum calefacit, & confortat, & residuū soda remouet. In corpore vero cacochoymico, vel in corpore etiā mūdato, si vsus eorū fuerit immoderatus: replet cerebrū vaporibus: cum odor nō sit sine fumali euaporatione secundum Aristotē. Itē pillulæ Ioannis Mesue in suo de appropriatis ca. de soda frigida conferentes soda antiquæ & educentes humores grossos, graues, & conferētes sanitati oculorū & aurium abscindentes catarhum sic fiūt. ℞. colloquintidæ, turbith añ. 3. 4. agat. 3. iij. stica. 3. 2. scamoneæ. 3. 3. & f. spicæ squānti, xylocassia, xylobalsami, carpobalsami, azari, ro. viol. epithymi, ablinthij, cynamomi, croci, masticis añ. 3. 1. aloes, cicorini & optimi ad pondus oīm cōficiant cū succo ablinthij. Itē pillulæ de mastice secūdū eundē mundificātes caput & stomachū: & accipiunt oīm tēpore & ante cibū & post & cū itur dormitū, sic fiūt. ℞. al. subtil. 3. 7. masticis, ro. zinz. añ. 3. 4. turbith electi. 3. 10. confice, vt prius. Dosis earū est a 3. 2. vsq; ad 3. iij. Itē ad hemicranēā frigidā difficilē & chronicā. ℞. baccarū lauri. p. 1. olibanī. 3. f. tere. & misce cū aqua vel oleo: et linias sup locū: vt dicit Mes. autoritate Hippo. Et alij addunt foliorū rutę. p. 1. sinapis. p. f. cōfice, vt prius. Ad hemicranēā vero calidā difficilē cōfert linimentū super locū, qd sit ex attramēto sicco trito & dissoluto cū aceto multæ fortitudinis & octaua parte opij. Oportet autē, vt plurimū elaborē in cōtritōe sicut p diē vnū. Et liniant tēpora ex eo, & stringatur sup ipsum. Alij acut hoc linimentū addēdo succi agrestæ & myrrhæ, añ. 3. 1. & croci. 3. 1. gratia penetrati

onis. Confert etiā soda calida caput purgiū ex lacte mulieris cū modico cāphorig. Et si necessitas postulauerit: addē opij quantū de camphora, et distilla ex eis in aurē & narē lateris læsi, & distilla de ide oleū viol. post horā cū lacte mulieris, donec nares et aures emūdent et medicina educat. Latius aurē de soda scripsimus: qm̄ eius cura non solū p se est necessaria sed stomacho & pectori. Plurima sunt hic dicta iuamēta, quibus per totū hoc opus indigemus.

Canones. Soda cū fe. vel sine fe. raro est morbus, vt plurimū vero accidens passionis stomachi & intestinorū: propter quod Auic. can. fen. 3. ca. de cognitiōe ægitudinū p colligatiā ait: Cerebrū cōpati stomacho ē vt multū: stomachū vero cōpati cerebro ē pparū: propterea, qd caput esse caminus totius corporis dicit. Ex hoc seq̄ aliud canō. Quod in cura sode nihil melius est, q̄ lenificatio ventris omni die cum suppositorio vel clystere, si per se non obderit, omni die bis ad minus. Cum autē est accidens, sit maxime propter fe, cholericas vel flegmaticas: quarum causa antecedens & coniuncta in stomacho et intestinis continetur vel venis meseraicis. Item in oīm soda nil reperies magis nociuum, q̄ coitum, & proprie super cibum: nisi forte fuerit propter retentionē spermatis vel menstruorum: tunc namq; cōfert coitus vsu moderato factus: neq; ilico super cibum. Item vsus ciborum fumosorum nocet, & proprie in fine cōmissionis: sicut sunt brodia piperata, allia, cepe, & vinum potens & electuaria calida: quare sunt calida sumenda in principio cibi, sed in fine frigida: vt sunt pira, vel ciconia assa, vel poma odorifera. Item lac non conuenit in soda, nisi forte in calida vel sicca sine materia: vt dictum est in methodo: quia lac est de numero facilliter corrupti

Tractatus primus

bilium. In stomacho enim calido conuertitur ad fumosum & inducit sodam calidā pulsatiuā: sed in frigido, ad acetosū, & inducit frigidā grauatiuā. vñ Hippo. in .s. apho. Lac dare caput dolentib⁹, &c.

Prognosticatio. Dolor capitis si superuenit in fe. cōtinua & proprie acuta in die critica post signa digōnis, pfectā crīsim significat p fluxū sã, narium, vel vomitū, vel sudorē: q̄re nō appōant̄ re p̄cussūa sup caput, ne crīsis impediatur: sed suspendatur æger cum blanditijs vsq; ad horā crīsis. Et si appuerit signa cri. p vo. puta tremor labij inferioris, subuersio animi, & vertigo: iuuetur cum pōne digiti vel pēnæ intinctæ in oleo in profundum gulæ. Si vero apparuerint signa crīsis p fluxū san. nariū: puta apparitio fantasmātū rubeorū circa oculos cum obtenebratione visus, & grauitate capitis & rubore faciei, & surditate auris: prouocetur cum pōne setæ porcine inter nares vehementer cōprimendo. Si signa sudoris appareant: puta color cutis frontis cum humiditate rorida: detur potus magnus iulep, & aqua zuc. actu calida, & tegatur pannis calidis, & vapores aqua calida posita in vase aliquo sub tegmine, & fomētētur latera & venter cū vesicis plurimis repletis aqua calida, iuxta Hip. in apho. Vbi cumq; natura recipit &c. Attamen si natura per se crīsim cōpleri potest, nihil fiat secundū illud ibidem. Ea, quorum crīsis fit &. Neq; iuudā est natura, ante q̄ via crīsis certificata fuerit: ne forte intendas ad aliam regiōnem a natura. Item soda superueniens in fe. acuta, in die indicatiua, puta .4. significat crīsim in die critica, puta .7. Et si virt⁹ sit fortis, & signa digestionis pfecta, sit salubris: sin autem mortale. Itē dolor capitis si perseuerauerit in latere vno & ex perit oculi obtenebrari: cataractam vel telā araneā minatur, & de-

mū cecitatem. Succurratur ergo cū purgantibus & alterantibus, & cauterio, & subleuetur arteria & cauterizetur. Item soda si perseuerauerit, neq; rationalia cōtulerint remedia: frenesim vel maniam minatur, si sit acuta pulsatiua: vel subeth, vel lerargiam, vel apoplexiam, si sit frigida grauatiua. Item hemicranea in parte anteriori capitis est vt plurimū a causa calida, in posteriori a frigida. Itē soda calida, est vt plurimū transiēs, frigida vero perdurans & proprie cum materia plurima grossa aut viscosa. Itē hemicranea difficilior est atq; p̄culosiōr cephalæ: quoniā onus integrum grauius premit se diuiso: quare plerūq; ducēs est ad perniciem, si perdetur. Item in hemicranea & proprie calida pulsatiua sudor capitis exuberās, vel fluxus sanguinis ex nare eiusdem lateris superueniens tollit agritudinem, quemadmodū & in fe. vomitus voluntarius & spontaneus, vel fluxus ventris dicitur conferre. Vnde Hip. .s. apho. cap. dolēti & circūdolendi sanies aut aqua aut sanguis defluens secundum nares, aut secundū aures, aut secundum os, aut secundum oculos, soluit agritudinē. Item ibidē: Quibuscumq; sanis dolores repente fiunt in capite, & cōtinuo sine voce fiunt, & sterunt: in septem diebus pereunt, si se. non accipiat eos. Ratio: q̄ isti sunt vere apoplectici, cum in se habeāt tria signa apoplexiæ, scilicet dolorē capitis subitū, & carentiā loquelæ, vel malitiam anhelitus, quare suffocantur a materia plurima, nisi se. eā exciret, & resoluat & proprie febris acuta, spontanea, vel partē introducta. Itē particula septima. In plagavel p̄cussione in capite stupor aut desipiētia malū. supple siue p̄cussio sit cū vulnere, siue cū cōcussione sola, q̄a significat nocumētū cōmunicatū eē substantiæ cerebri & ventriculis eius. Itē q̄rto aph. Quibuscumq; yrinx febribus con-

turbata & conuersa velut &c. ga in fe. vrina grossa turbulenta agitationem & ebullitionē diuersorū humorū significat fumariū ad caput. Quare succurrat cū repercutiuis circa frontē & tēpora. Itē si cerebrum fuerit læsum & concussum ex casu vel percussione, necesse est fieri vomitum & animi defectionē propter cordis & oris stomachi compassionem, & proprie in corpore cholerico, & atate & consuetudine & tempore calido. Vnde Hippo. sexta parti. aph. Quibuscūq; cerebrum sursum conuertitur, necesse est feb. &c. Item si ex percussione vel casu lædatur cerebrū, necesse est accidere sin- copiam vel apoplexiam per tempus ali- quod, donec cerebrum refocilletur: qua- re non conuenit, vt mortui iudicentur, ni si post tertium diem. Vnde Hippo. 7. par. aph. Quibuscūq; cerebrum motum fue- rit ex aliqua occasione, necesse est eos fi- eri sine voce statim. Item in cephalæa et hemicranæa forti pulsatiua, seu alio do- lore corporis quocūq; si subito dolor de- litescat nec sentiatur nō præsente aliqua rationali alleuiatione, scilicet per fluxū sanguinis narium, vel sudorem, vel vo- mitum, vel egestionē, vel diminuta exi- stente atq; imperfecta: mortale: quoniā cerebri læsione & virtutis animalis defe- ctionem siue destructionem demonstrat. Vnde Hippo. 2. aph. Quicūq; dolentes aliquid corporis, ipsum dolore nō sen- tiunt: ijs mens ægrotat. Item in 6. Vesicā incisam, aut cerebrum, aut cor, aut dia- fragma, aut epar, aut renes, aut aliquod intestinorū gracilium, aut vētrem, id est stomachum mortale, & supple matri- cem, cistim & splenem.

¶ De vertigine & scotomia.

Caput II.

Vertigo & scotomia est, cum vi- detur homini qd omnia voluant in gyrum. Et si quidem fuerit cū

fixione corporis, dicitur vertigo: si vero cum casu ipsius super terram, dicitur sco- tomia: Et sic patet, qd hæc duæ passiones neq; differunt causa, neq; subtilitā siue essentia formali, sed solo gradu, scilicet secundum magis & minus. Sunt autem quandoq; morbus, quandoq; accidens, sicut & dolor capitis. Morbus quidem, cū per se & immediate a sua causa pro- cedit. Accidens, cū morbi consequit.

Methodus. Vertigo vel scotomia morbus quandoq; fit a causa primitiua, quandoq; a causa an- tecedēte. A causa quidem primitiua vt ab intuitionē rerū volubilium puta rotæ, vel reuolutione corporis super se (sicut faciunt pueri) vel casu, aut percussione lædēte anteriorem ventriculū cerebri: propter quod fantasatur & imaginatur res aliter, q̄ sint. Si fiat ab intuitionē rerū volubilium et reuolutione corporis super se: signa patent ex relatione patiē- tis. Cura eius est quies a talibus: quia in omni motionē corporis cum quis cepe- rit &c. 2. aph. Si fiat a casu vel percussi- one, curatur, sicut diximus in cura dolo- ris capitis ex casu vel percussione. A cau- sa vero antecedēte prouenit: puta a ven- tositāte, aut humorum vitio in cerebro contentorū. Et si sit ventositas (quod est vt plurimum) tunc sentitur tinnitus auri- um, tenebrositas oculorū longa & fixa: Similiter & diminutio gustus, & odra- tus, atq; pulsatio temporum, & anteces- sio doloris capitis perdurantis. Et cura eius est euaporatio capitis cū aqua deco- ctionis florum camomillæ, absinth. ros. rub. melilori, maioranæ: Similiter et ster- nutatio cum cōditi, vel euforbio: & ma- licatio piperis & cymini & carui, & vsus diacymini: & facellatio facta ex milio & sale torrefactis super lapidem ignitum: & abstinētia ab omnibus legu- minibus, a fructibus, a rapis et oleribus, a nucibus, a rebus cōditis cum nucibus,

Tractatus primus

et a vino forti puro: et sumere debet post cibum aliquid stypticū: puta pirum vel coroneū assum. Et si hæc non sufficiunt, purgetur cum pillulis cochijs, vel hieralogodio, vel hierapicra, post qđ reiteretur localia iam dicta. Et si hæc iterū non sufficiunt, fiat cauterium in summitate capitis in loco, in quo terminatur medius digitus patētis, quādo radix palmæ ponitur super radicem nasi: quia ibi cōmissura recta concurret cum cōmissura arcuali: quia per hoc fiet perfecta resolutio vaporum. Si vero sit humor: tūc siue sit sanguis, siue cholera, siue flegma, siue melancholia, siue cōpositum ex his, si ent signa & cura, quæ dicimus in cap. de dolore capitis, prout est morbus sub signis distinctis. Vertigo vel scotomia accidens, quandoq; sequitur morbum vniuersalem, quādoq; particulare. Morbū quidē vniuersalem sicut in fe. & tunc significat futuram crīsim per superius, scilicet per vomitum, vel per fluxum sanguinarium, vel sudorē: ita qđ si hoc appareat post signa digestionis completæ, stāte virtute fortij, salutem promittit. Si vero ante signa digestionis vel cū signis indigestionis & proprie virtute debili, mortem portēdit. Si vero medio modo, crīsim malam et diminutam promittit. Cura eius est, vt nihil fiat, nisi qđ æger cū blanditijs cōfortetur, & pertrahatur, donec vera crīsis apparere cœperit, & hoc si per vomitum suuetur natura cum immissione digiti in os, vel pennæ linitæ in oleo. Si autē per fluxum sanguinarium: sumantur setæ porci, ponantur in nās, & comprimaturs nās. Si autem per capitis sudorem, caput regatur cum pannis calidis. Vnde Hippo. Vnde cūq; tepit natura &c. Sed quādiu nihil horū cœpit apparere, nihil fiat oīno circa caput. Nā si repulsiva approximaret: crīsim prohiberet: et sic mortē induceres. Si resoluetia: tūc materiā plurimā attraheret, et for

tes frenesim induceres: & qđ piculosū ē, viā crīsis impedires. Qđ si poneres calefactoriū circa caput: sudorē faceres, cū forte natura vomitū intēderet. Vñ. Hip. ibidē. Ea qđ crīsis &c. Mortū particulare cōsequit in multis modis: quia qñq; fit vitio stomachi, et hoc vt multū: qñq; vitio in testinorū, epatis, splenis atq; matricis. Et signa et cura sunt illa, qđ diximus ca. de dolore capitis sub signis distinctis.

Emperica. Decoctio saluæ in aqua, vel vino curat vertiginē capite ea loto. Et ipsa alligata frōti, vel tēporibus cōfert oībus morbis factis de frigiditate. Vinū p̄terea decoct. peoniæ, vel castorei scotomiæ valet plurimum: & semen peoniæ bibitur somnia vana remouet. Item ruptorium factum super vertice cranei vel super collo, est vltimum iuuamētum post purgationes, qđ dicemus ca. parag. de empericis.

Canones. Vertigo vel scotomia morbus fit vt plurimū vitio vētositatis eleuata a flegmate viscoso cōtēto circa anteriore vētriculū cerebri: qđ propter indigemus alteratiuis propter vētositatē, & euacuatiuis propter flegma, et sternuatorijs propter vitiumq;. Vertigo autē & scotomia accidēs fit vt plurimū vitio stomachi et intestinorū: cōstipatorū: quapropter intēdimus ad rectificationē stomachi & lubricationē ventris cum suppositorio vel clystere. In vertigine et scotomia oportet cauere a porris, allijs, leguminib⁹, nucibus, et vinctuosīs oīb⁹: qm̄ hæc oīa materias a stomacho eleuāt ad caput: Similiter & vinū verus pus, similiter & lac: quia facilliter corrūpitur in stomacho & corruptum sursum mittit vapores. vnde Hippo. Lac dare caput dolentibus, malum.

Prognosticatio. Vertigo vel scotomia cum longinquo tēpore perdurauerit, neq; beneficio artis vel naturæ remoueri possit: futurā

epilepsiam vel apoplexiam portendit.

¶ De subeth, stupore & congelatione. Caput III.

DE istis tribus passionibus vno diemus ea. quoniam earum notificatio ex differētia ipsarum adin uicem completur. Sunt quādoq; morbi, quandoq; accidētia morbi. Morbi quidem, cū fiūt p se incipiēdo a suis causis immediate in cerebro contentis. Accidētia, cum morbos alios, puta letargiam, vel febrem flegmaticā, vel apoplexiā vel hemitriteum consequuntur. Conueniunt autē istæ passiones in duobus, primo, quia quolibet ipsarum est passio capitis primo & per se, sed ex consequenti totius corporis. Secūdo, qā in vnaquaq; earum fit impedimentum in sensibus et motu voluntario super totū corpus. Differunt autem per duas essentias & proprietates, quod est: quia subeth est propria passio ventriculi anterioris cerebri: verū qm hmōi ventriculus est magis origo sensus q̄ motus: vt dicit Gale, in teg. idcirco in subeth fit magis impedimētū in actu sensationis q̄ motionis voluntariæ: quapropter in subeth sunt oculi semper clausi: & si vocē vel cōcussur fortiter in principio subeth, & proprie salubritūc apit oculos, licet denuo claudat. Accidit autē hæc passio ex flegmate puro domināte illi parti: fit tamen qñq; ex vaporib; frigidis, vt coringit post potū opij aut iusquiami. Stupor nō est aliud q̄ subeth diminutū. Stupor nanq; fit ex flegmate cui pars cholerae fuerit cōmixtū: quapropter etiā in stupore nō est somn⁹ adeo profundus, sicut in subeth: fit etiā qñq; a vapore frigido nō in vltimo, velut contingit post esum fungorū. Fit etiā a sola qualitate sine materia, velut accidit in infrigidatis in niue capite nudato. Fit etiā qñq; a casu vel percussione, qñ pereat cerebrū: læditur vehemēter, iuxta

illud Hippo. 7. parti. aph. In percussione capitis stupor aut delipientia malum. Et scias, q̄ stupor qñq; dicitur a medicis somnus profundus vel subeth vigilatiua, sed nō debet dici somnus longus: quia somnus longus pure est naturalis in quali: licet sit innaturalis in quanto: vt accidit ebriosi, & exercitātibus & cōualescentibus: sed somnus profundus, qui dicitur stupor, est innaturalis in quali, et in quanto. Stupor etiā quādoq; sumit pro passione neruorū vel mēbroꝝ neruolosorū: et tūc idē ē qd obdormitatio: vt dicit in ca. de tremore. Cōgelatio est proprie passio ventriculi posterioris: verū qā iste ventriculus est magis sors mot⁹ q̄ sensus: idcirco fit oculis statibus fixis & aptis. Fit autē congelatio ex materia melancholica dñante illi p̄culæ. Et licet in congelatione doleat anterior ventriculus cerebri: hoc tñ nō accidit, nisi qā ipse est sensitivus magis: vel qā hūor opilans p̄tē posteriorē coartat anteriore. Et cōgelati remanēt sub situ q̄ repit eos cōgelatio: q̄re si repit eos scribentes vel sedētes, remanēt secundū illā formā. Et fit qñq; a causa primitiua: vt contingit ambulāti in niue lōgo tēpore, nudato capite: qd qdē fit vt plurimū: vt dicit Gale, in cōment. illius aph. Somn⁹ & vigilia. Istæ tñ oēs passiones pro se invicē ponūtur ap̄ medicos: q̄re de noib; nō est curandū, & proprie, cū res sint propinquæ. Nā istæ tres passiones sunt valde propinquæ in subiecto, cura & causa: vt patet ex dictis & dicendis.

Methodus. Cura subeth ē hæc. Nā cū ois subethicus sit sine sensu & motu, non requiritur approximatio alicuius medicinae, per os, sed ilico supponatur ei suppositoriū de sale gēma, vel iniiciatur clystere acutū, quod sic fiat. ℞. colloquintidæ agartici, centaureæ añ 3. f. meliloti, stica, bletæ añ. M. i. pistentur &, bulliantur in aqua: de illa aqua accipiat li, i. et f. et 3, 4. mell. et 3, iij.

Tractatus primus.

olei communis, & 3. 2. salis. & miscetur simul, & iterum reducatur ad ignē, & cum totum bullierit, coletur: & cum colatura tepida fuerit, inficiatur cū clystere, & frequenterur illud toties, donec patiens sentiat, & moueatur, & ligetur extrema vehementer omnia propter diuersionem, et tunc ponatur in os infirmi 3. 1. tiriace veteris cum vino calido, vel mithridati, vel aureæ Alexand. vel diapliris. Post hoc autem abrafis capillis, fricetur caput cum panno calido, & liniatur cum oleo de spica, vel de lilio, in quo sit dissolutū castoreum, vel bdelium, vel se. sinapis, & se. cicute. Deinde cum sufferre poterit: purgetur cum pilulis cochijs, vel foetidis, aut aureis, vel cum cirapi. Nullo modo bibat illis temporibus vinū, nisi fortassis cum salua, vel castoreo bullitum: vel hydromel, qd sic fiat. ℞. aquæ lib. iij. mellis, 3. iij. bulliantur aliquantulum & coletur. Famē & sitim toleret pro posse, laboret, & exercitetur, & sudet in ieiunio. Nutriatur cibus calidis siccis: masticer qualibet die cum surgit a lecto, pistrum & piper, factis ex eis cum mastice velut formis pilularum. In fine vero fiat cauterium in vertice cranei, vel causticum super occipite raso ex cātharidibus tritis & incorporatis cum fermento & sinapi, vel ex calce viua & ficibus siccis incorporatis cum stercorebus columbarum & succo rutæ viridis. Fiāt gargarismata cū oxy melle cōposito vel squillitico & aqua decoc. hyso. & ireos, vel cum sinapi: prouocentur sternutationes cum condisi vel pipere: & sic regatur vsq; ad perfectam sanitatem. Cura stuporis est eadē præterq; q; in clystere recipimus nō solū agaricum, sed aloen & turbith, cū materia nō sit ex frate puro sed mixto cum cho. Fiant autem omnia alia velut in subeth, & fricentur plantæ pedum cū aceto & sale vehementer. Cura congelatio

nis est eadem cum prædicta, præterq; q; in clystere recipimus ellebori ni. 3. 6. loco colloquintidæ, & loco centaureæ recipimus polypod. 3. 1. in alijs fiat sicut prius. Cum autem istæ passiones euenerint a dicta causa primitiua, puta frigiditate aeris: competit balneum aquæ dulcis calidæ: Similiter & alia dicta ca. de do. capitis in causa frigida sine materia. Cum autē venerint a sumptione opij vel fungorum vel iuquiami: conuenit primo vomitus cum aqua & melle & raphano: deinde oportet vt clysterizetur clystere acuto, dicto cap. de cura subeth. Post illudumat sepe de tiriaca veteri, vel de theodorico anacardino, vel de mithridato. Confert etiā vsus allij & nucum: Similiter vinum decoctionis pyretri, vel piperis, vel castorei: similiter & aqua decoctionis organi vel rutæ cum sale condita: similiter & vinum vetus potentillimum in multa quantitate potū, & proprie calefactum. Et iterum, si sumeretur assæ fetide aureum, i. cum 3. iij. vini albi puri aromatici cōferret. Fricentur extrema vehementer, & caput proprie. Et oportet, vt prohibeā a somno propositum cum sternutatione facta ex euforbio & elleboro albo, & cum tansionem capillorum. Vnguatur caput & totū corpus cum oleis calidis prædictis, vel de balsa. mo, si sit possibile: quia confert a proprie. Comedat iura piperata gallinæ et auium: bibat vinum decoctionis cinamomi, in quo sit aliquid muschi. Cum autem euenerint a casu vel percussione: curentur sicut dictum est capitulo de dolore capitis ex casu & percussione.

Emperica. In omni passione, in qua est somnus superfluus: ap proximant quidam fumigia foetida de vngulis & pannis laneis & capillis super carbonibus positis: quoniam existimant, q; virtus animalis cerebri sentiens læsionē inducat expergefactionem, Alij econ

verso faciunt suffumigia aromatica, scilicet ex olibano, alypta muscata, thymia, storace sicca: quia existimant, quod per ea cerebrum confortetur: sed huius rei veritatem capitulo de letargia vide.

Canones. Si in aliqua istarum passio- num corpus repletum sit, & facies rubuerit, & venæ magnæ apparuerint in oculis & facie: tunc in cura eius conveniens erit uti flebotomia cephalicæ in brachio seu manu vel venæ rectæ frontis, vel venarum magnarum, quæ sunt sub lingua, vel venarum in collo, quæ guidegæ appellatur: vel fiat in scapulis, collo, & sub mento scarificatio profunda ratione diminutionis quantitativæ non qualitativæ. Item in cura istarum passionum nunquam debet apponi percussiva: quia autem generaliter dispositio frigida, & per consequens passio: sed fiat diversio materiæ cum ligationibus, & deinde cum evacuationibus dictis prius.

Prognosticatio. Si subeth fuerit accedens letargia: tunc si subsecuta fuerit frenesis, bonum est: quia subtiliationem & calefactionem materię significat. Si vero contrarium, malum. Subeth præterea ratio fit per se incipiendo, sed ut plurimum consequendo se, flegmaticas continuas vel interpolatas. Item subeth est mortale, cum anhelitus deficit, & æger exercitari non potest, & iacet supinus, quantumcunque super latera revolvatur. Item istæ passiones interficiunt non nisi quia anhelum prohibent, opilandò vias eius. Item sæpius a causa humoralis intrinseca antecedente, quam a causa primitiva. Item dicit Hipp. in percussione capitis stupor aut desipientia superveniens, malum. Item istæ passiones ex toto suo genere sunt magis mortales, quam salubres: quare prognosticis relinquantur. Item licet sint a causa frigida, tamen cito interficiunt: quia interficiunt opilandò: opilatio autem ista subito fit.

De frenesi. Caput III.

Frenesis est apostema calidum capitis intra cranium: verum quia materia est subtilis, & penetrativa: idcirco hoc apostema est in panniculis tegentibus cerebrum sub craneo, quæ sunt pia mater & dura mater, Quoniam in anteriori cerebro est maior caliditas, quam in posteriori propter multos ibi spiritus animales circa organa sensuum. Ideo istud apostema fit tamen in anteriori cerebro: quæ admodum letargia fit in posteriori. Ex quo sequitur, quod frenesis est apostema calidum anterioris partis cerebri & panniculorū eius. Est autem quandoque morbus, quandoque accedens morbi. Morbus quidem, quando materia per se colligitur in loco prædicto, & causat apostema: & hoc est valde raro. Accedens autem, quando consequitur alium morbum: & hoc est ut plurimum, ut contingit in febre de causa calida & prope in continuis: utpote tertiana, causone, & synocha: quoniam humor qui est causa antecedens leuigatus calore febre, & furiosus effectus per venas arterias & nervos ad cerebrum sursum rapitur: & ibi ad apostema colligitur. Et iterum maxime fit in febre conclusa atque continua in qua emunctoria sunt oriosa, & caliditas non expanditur extra corpus, sed remanet intus: quapropter maxime fit in febribus consequentibus apostemata viscerum: utpote pulmonis, epatis, stomachi, pectoris, vel matricis, & plus nervorum locorum. Consequitur enim hemitritæum quandoque, & proprie si tempus, ætas, complexio sint causa vehementer. Frenesis autem dividitur in veram & non veram. Vera quidem dicitur, cum est morbus, & est a causa pure calida, utpote sanguine, cholera, vel utroque: Sed non vera dicitur, cum est accedens: quemadmodum omnis alienatio facta in febre, hora crisis salubris vel mortalis, potest dici frenesis. Vel non vera dicitur, quando est mor-

Tractatus primus

bus, sed non ex materia calefacta pura sed mixta cū aliquantulo flegmatis vel melācholiæ. Signa frenesī, in communi, sunt permixtio rationis cum actione furiosa: quia calidi est agitare, sicut frigidū quietare, & motus oculorum circum circa, & rubor eorum: & se. vehementis caliditatis cum frigiditate extremorum vel tepiditate: & insomnietas, & multitudo imaginationum & proprie apud principium somni: quare expergefit velut fatigatus: & vrina al. cum proxime die præterita fuerit rubea & ampullosa: similiter & pulsus frequens & velox. Signa propria frenesī. veræ, q̄ fit a sanguine, sunt cum prædictis rubedo faciei & oculorum proprie: magnitudo pulsus cum velocitate, repletio venarum: habitudo corporis carnosa, & antecessio ciborum generatiorum sanguinis: vt bona caro & vinum: similiter & horror luminis, dolor capitis, lingua nigra inflata: vigiliæ plurimæ, & abhominatio loquelæ, & clamor post suum dormire, & anhelitus inordinatus. Et ista cum apparuerint, significant apostema esse confirmatum. Sed vrina ru. grossa & spumosa, & multiplicatio risus sine causa, est ex exteriorib⁹ signis super materiam sanguinis. Signa propria frenesī. veræ de chol. sunt se. continua valde arsiua, saltus, & alienatio vehemens, & antecessio ciborum generantium cholera: vt allia, cepe, sinapis, cyminum, piper, mel, vinum acutū: Similiter & pulsus velox & spissus vehementer, & desiderium attrahendi aërem continue ultra solitum, & citrinitas faciei & oculorum, & lingua citrina vel nigra, vel inquietudo super lectum, & vociferatio plurima cum rixa. Si autem cholera fuerit adusta, vel san. adustus: tunc omnia accidentia prædicta sient fortiora, donec fortassis superuenierit dæmonium lu-

pinum, & spiritus magnificetur, & patiet circumquaque cum manibus velut rem aliquam quarens, & oculorum turbatio maligna. Si autem istæ materiæ sint compositæ, tunc & signa composita erunt. Signa frenesī non veræ quæ est accidens, sunt: quia vt dicit Aucen. iij. cañ. ca. de karabito. Frenesī. huiusmodi sequitur in fortitudine sua fortitudinem feb. Verbi gratia, quia in augmento vel statu febris est fortior, quàm in principio, & in die exacerbationis est maior, q̄ in die quietis: sed in frenesi vera totum est e conuerso: quia quanto se. est extra remissior, tãto materia plus rapitur ad caput: siue cerebrum. Signa frenesī non veræ quæ est morbus, sunt accidētium remissio, plusquam in frenesi vera, quæ est morbus.

Methodus. Istud apostema, sicut & omne aliud apostema, inio vniuersaliter omnis morbus salubris habet quatuor tempora, secundum quæ diuersificatur cura, scilicet principium, augmentum, statum, & declinationem. Cura igitur frenesī veræ quæ est de sanguine, est vt statim a principio, hoc est ante spatium trium dierum vel quatuor ad plus, fiat flebotomia fortis in die vel nocte de cephalica in brachio vel manu, si virtus & ætas consenserint: vel fiat secundario, si virtus sit debilis omnino. Quod si timor fuerit de sincopi in actu flebotomandi, sicut in quibusdam solet contingere propter consuetudinem, non propter debilitatem cordis, tunc cibetur hora flebotomandi & ante & post cum mica panis infusa in vino granatorum, vel aqua frigida: quoniam a sincopi custodit. Et fiat scarificatio in spatulis circumquaque, similiter & in cruribus: & ligentur extrema dolorose, & fomententur cum

aqua calida ante & post fricationem: quoniam talis fomentatio, similiter & fricatio cum panno aspero infuso in aqua rosæ, & aceto, materias diuertit & somnum inducit. Et fiat apertio hæmorrhoidarum in corpore consueto cum appositione sanguisugarum, vel ceparum circa anum: quia materias diuertunt. Et si aperiri non possunt: fiat flebotomia de saphena, quæ est sub cailla pedis intus in talo: quia hæc flebotomia habet prouocare menstrua & hæmorrhoidas. Vnde Hippo. sexto parti. apho. Melancholicis & freneticis hæmorrhoidæ innatæ, bonum. Deinde subito fiat vel vnguentum, vel embrocatio percussiva super caput cum succo solatri, vel semperuiuæ, vel populeon mixto cum oleo rosæ, vel cum oleo de salice, vel nenupharæ, vel cum aqua rosace. mixto cum aceto. Et si somnum prouocare intendis, adde eis oleum de papauere, vel de mædragora, vel granum. opij, vel lac papaueris vel decoctionem eius. Non tamē vire stupefactiuis frequenter, quia finaliter calorem naturalem extinguunt: sed tunc solum, cum superfluunt vigilie & furor. Deinde continue vsque ad finem principij intentio tua versetur circa lubricationem ventris cum clystere lenitiuo vel suppositorio de penidij: quia acutam mitigat se, quod sic fiat. ℞ viol. ʒ. 2. malue. manip. 1. prunorum. lib. ʒ. bulliantur in aqua, & in lib. quatuor illius aquæ dissoluatur ʒ. 1. tamarin. & ʒ. 1. mannæ. & ʒ. 2. zuccari vel zuccari violarum & ʒ. iij. olei viol. & ʒ. ʒ. salis & iterum bulliant parumper. Deinde coletur, & tepidum iniiciatur omni die semel ad minus, nisi per se assillaue rit bis vel ter in die. Postquam ægritudo diem tertiam aut quartam transierit: tunc non competit flebotomia super prædicta: quia tunc apostema est confectum, & materia tota fluxa est ad lo-

cum: quare non valent diuersimodè. Sed tunc erit incendiandum euacuatiuis eradicatoriis: vt dicit Almanfor. cap. presentij. Flebotometur ergo tunc vena recta, quæ est in fronte vel naso: quia hac flebotomia euacuatur aliquid de materia, præter quod attrahat, cum supponimus morbum in statu esse vel prope statum. Idem etiam operatur flebotomia venarum sub lingua vel quindegi in collo apud tempus augmenti si fortis sit virtus: vel ponatur sanguisuga in fronte inter duo supercilia: quæ si non adheret, applicetur cum sanguine alicuius animalis illic illinito: deinde fiant linimenta frigida prædicta circa caput & non supra caput, ne forte impediatur resolutio quæcunque. Post illud vero applicentur calefactoria leuia confortatiua cerebri, velut est emplastrum de floribus camomillæ & meliloto, & gallus viuis scissus per medium, vel catulus vel pulmo porci calidus actu. Fricentur extrema cum aceto & sale simul conquassatis. Leuiter iaceat in loco obscuro non luminoso, ne sensus exteriores laborent: neque omnino vmbroso, ne sensus interiores fatigent. Sint secum assidue dilecti & amici sui, qui taceant & quiescant, & ægrum signis & blanditijs, vel quandoque minis coercent a furore: quoniam somnus & quies in loco tenebroso est ex melioribus rebus in frenesi. Cibeatur ex lactucis, portulaca, conditis cum aceto vel agresta. Similiter & cucurbita aut succo ordei vel auenæ conditis cum lacte amigdalorum vel papaueris: similiter & pomis assis frigidis actu, vel carnibus pullorum vel hædore alteratis cum herbis prædictis. Si virtus sit debilis, bibat in die sapius syrupum de nenuph. vel de papauere cum vino granatorum & aqua decoctionis prunorum vel ordei: & sit syrupus ʒ. 1. & ʒ. et vinum granatorum ʒ. 1. & ʒ. aq. ʒ. iij. vel bibat syrupum

Tractatus primus

viol. vel ros. vel syrupū de berbere cum eisdem aquis: & hoc fiat nō hora uestitionis, sed ante per vnā horam vel duas, similiter & post. Hora autem uestitionis bibat ex aquis prædictis per se: & plures aquas sitis extinctiuas atq; nutritiuas dicemus ea, de perturbatione virtutum animalium, parag. de mania canina. Ne prohibeatur a potu aquæ frigidæ omnino, sed bibat de ipsa quantum velit, etiā si apostema sit in visceribus: cū melius sit malum aliquod ægris gignere, quā sinere eos in mortem cadere: vt dicit Galenus 6. de ingenio sanitatis. Cura frenesis veræ de cholera est, vt in principio & ante oīa purgetur corpus cum medicamine mundificante cholera: quod sic fiat. ℞. manne. 3. i. tamarid. rū. 3. i. & semis, dissoluantur cum. 3. 4. aquæ decoctionis prunorū. Coleā aqua illa, & detur infirmo ante diem. Aliud fortius aliquantulum. ℞. reubarbari. 3. 2. aquæ decoctionis prunorum. 3. 4. puluerisetur reubarbarum, & ponatur in aqua illa & addatur. 3. 2. syrup. viol. & dimittatur hoc totum stare sic per horas 12. Postea coletur, & detur ante diem, vel purgetur cum 3. 6. electuarij de succo ros. vel cum stomatico laxatiuo: sed nō de ei medicina fortis: quā materiā agitarer, & frenesim augmentaret ante tempus declinationis. Si vero materia fuerit adusta, tunc si volueris vti apozimate, primo siue secundo, nihil aliud fiat, nisi q; in decoctione prunorum addatur sene: & epī. ana. 3. 2. polypodij. 3. 6. deinde cum ista aqua decoctionis dissoluantur tamarindi & māna & reubarba. & fiat sicut prius. Facta autem huiusmodi euacuatione, secure potest fieri flebotomia cephalicæ in brachio vel in manu, vel fiat prouocatio hæmorroidarū vel scarificatio in spatulis & naribus: quia sicut dicit Auicē. 4. cano. fen. 1. cap. de karabito. Si materia ægritudinis

nō fuerit sanguis, primo in cura debemus incipere a mundificatione, secundo a flebotomia. Si vero fuerit sanguis, primo a flebotomia incipiendum est: deinde statim fiat embrocatio, & inunctio circa caput supradicta rōne: & conare vt euites generationem apostematis, quantum potes, vel saltem eius confirmacionem: quia postq; confirmatū fuerit, quod forte est post tres vel quatuor dies ad plus, impossibile erit curare frenesim propter cerebri nobilitatem & sui necessitatem pro toto. Et in omnibus medicinis approximandis per exterius, siue calidis siue frigidis, vt ut acetum, quia est ipsarum vehiculum, & iuuat ad penetrandum. Sumat in aurora, si possibile est, pro digestionē. 3. i. vel 3. i. et. f. oxy-zuccari cum tribus vel quatuor. 3. aquæ frigidæ, vel aquæ decoctionis prunorū: vel sumat. 3. i. syrupi acetosi simplicis cum eisdem aquis. In omnibus suis cibarijs, decoquantur semina papaueris al. & lactucæ & scariolę inuoluta in petia al. munda, & psilium aliquando per se, aliquando cum eisdē. Fiat laxus omni die secundum ventrem cum clystere vel suppositoio dicto superius: & in oībus alijs fiat, sicut in frenesi de sanguine.

¶ Cura frenesis non veræ, quæ est morbus, est eadem cum prædictis: nisi quod est vtendum in ea remissioribus & non tantæ frigiditatis: neq; tanto potu aquæ frigidæ: quia est securior aliquantulum, quam frenesis vera. ¶ Cura frenesis non veræ, quæ accidens est, sicut est illa quæ contingit in feb. est, vt fiant omnia, quæ dicta sunt de prouocatione hæmorroidarum, scarificatione, ligatione, frictione & embrocatione & inunctione, prætequam de flebotomia: quia illa non est vtendū: quia natura est debilior propter ægritudinem præcedentem: nisi forte corpus sit carnosum & robustum: quia tunc talia sufferre potest, neq; cadit in

eis timor. Verum quoniam hæc frenesis intenditur cum se, idcirco stude ad resistendum ei quantum potes, antequam veniat augmentatio se, cum reperculsionibus & diuersionibus supradictis, ne fortassis fiat apostema, vel confirmetur: quia fieret necessario mortalis. In fine autem frenesis veræ de sanguine, vel de cholera adusta, si qua vestigia alienationum remanserint: fiant embrocationes resolutivæ, spargendo super caput ab alto, quæ sic fiant. ℞. flor. camomillæ, anethi, maioranæ, ros. ru. añ. m. i. bulliatur in aqua. Ad idem. ℞. flor. camomillæ, seminibus anethi, fœnigræci, radic. maluausc. ana. m. i. bulliatur in aqua & fiat embrocatio.

Emperica. FEL leporis cum vino bullitum facit hominem freneticum dormire semper, donec sibi dederis acetum. Item somniferum extremitatibus fortitudinis, similiter & narcoticum. ℞. populeon. 3. i. olei. mandragoræ, olei ros. viola. ana. 3. 2. aceti. 3. i. opij. 3. i. misceantur omnia perfecte, et liniantur ex eo frons & tempora actu frigido, reiterando frequenter, vel infundantur in eopetia & applicentur toti parti anteriori capitis, sed non posteriori: quia frigida est, & inde oriuntur nucha & nervi. Itē fiat emplastrum ex lacte papaveris, succo lactucarum, succo solatri, & semperuiæ, vel nenupharis añ. 3. 2. aceti nō fortis. 3. 6 cum quibus incorporetur farina ordei. 3. i. farina fœnigræci. 3. 6. florū camomillæ modicum. Et in ea, de vigilijs plura dicentur. Item somniferū probatum in frenesi. ℞. olei ros. vel viol. vel nenupha. modicum. opij granum. 1. vel 2. cocri parumper. misce omnia, & inunge intra nares frequenter. Item ad idem embroca in se, in qua timetur de frenesi. ℞. foliorum vel sem. lactuc. malux añ. M. i. viol. 3. 6. corticum vel foliorum papaveris, M. 6. & modicum

mandragoræ, decoquantur in aqua, & collerur. Item odorumamentum in frenesi ℞. camphoræ iulquiami, opij. ozimi, croci. ana. cere, quod sufficit, & aq. ros. confice ex eis pomū, quod in manu teneatur. De expertis ad frenesim, est flebotomia cephalicæ: & post hoc flebotomia nasi vel sanguisugatio eius, vel venæ frontis, vel potus aquæ frigidæ immediate desuper: quia choleram extinguit, & cerebrum confortat. Et intelligo de frenesi vera. Similiter & scarificatio aurium, & flebotomia venarum sub lingua, & proprie si causa sanguinea videatur.

Canones. Dicunt quidam, quod in frenesi non debent poni re percussiva super caput: quia fieret impedimentum in resoluendo: sed ponantur circa frōtem & tempora. Itē dicit Ras. in diuisionibus, quod freneticus verus non debet prohiberi ab aqua frigida omnino, neq. si sit ex sanguine, neq. si sit ex cho. Mesue vero illud prohibet omnino, quod est: quia Ras. eius frigiditatem & extinctionem respexit: quam facit aqua, & proprie si sit plurima: Mesue vero eius euaporationē, & proprie si sit pauca: quare ipsam prohibet in catarrho.

Prognosticatio. Frenesis vera ex quacūq. causa sit, si confirmetur & per tres dies duraverit, cassa est eius cura: ante vero hoc tempus quandoq. curatur, licet difficiliter. Item si frenesis non vera, quæ est accidens consequens febrem, aduenerit post signa digestiōis & virtute cōstante: est salubris. Si vero ante signa digestiōis coeperint apparere ei vestigia: est mortalis. Quia omne signum ceticum apparet ante signa digestiōis est malum: ut dicit Galenus. 1. & 3. de crisi. Item si in frenesi vera vel non vera fluxus sanguinarum exuberans, vel sudor fortis capitis venerit

Tractatus primus

statim a principio cum virtutis constantia: salubre. Item dicit Auicenna 3. canone. de carabito. q̄ nullus habens carabitus. i. apostema calidū in cerebro, cuius vrina apparuerit alba, visus est liberatus. Propter quod ait Hippo. 4. parti. apho. Quibus vrinæ lymphæ aut albæ, malum, maxime si in freneticis apparent: quod & verum intellige in frenesi non vera. Item frenesis vera plerūq; permutatur, in pleuresim peripneumoniā: quem admodum accidit & e contra. Item si freneticus nō alienietur p̄ approximationem remediorum rōnabiliū prima vel secunda die, ipsum statim deferat. Item si frenesis superuenerit lethargiæ, bonum sed si e cōuerso, malum vt dicit Hippo. Et ideo cum vides freneticum cadere in somnum profundū & taciturnitatem & mentem malam, & cum hoc extrema frigent & liuēt, & oculi concuātur, statim ipsum dereliquas. Item si in fe. arsiua vrina sit rubea, spumosa & statim cras appareat subtilis, aquosa: necessario morietur a frenesi. Item si in frenesi quæ consequitur fe. nō recordatur post paroxysmum eorum q̄ dixit & fecit, neq; verecundatur præter solitum, morietur: quia passio communicata est toti cerebro ante & post. Item si nō sentiat se pati, vel si assit spasmus, vel sincopis, vel desipientia: morietur. Item si arteriæ tremant in tangendo pulsum, morietur: similiter & si oculi lachrymentur inuoluntarie vel si vrina retineatur vel egestio: similiter si se violenter projiciat a capite lecti ad lecti pedes, necessario morietur: vt dicit Hippo. in prognosticis, quia hæc signant maximam angustiam & dolorem. Scias præterea quod frenesis, quæ est morbus, est ex toto genere sui magis mortalis quā salubris: Frenesis vero quæ est accidens, e cōuerso, quia frenesis morbus est ex materia humoralis: sed frenesis accidēs

est ex materia vapōrali siue vaporosa.

De lethargia. Caput V.

LETHARGIA est apostema frigidum cerebri. Verum quia materia frigida est naturaliter grossa non penetratiua: ideo fit magis hoc apostema in meatibus cerebri, quam in substantia eius vel velaminibus: quia & posterius cerebrum est frigidus anteriori: propterea, quod pauci ibi sint spiritus, & propter eius maiorem distantiam ad emunctoria & colatorium palati: & ideo est illud apostema frigidum, scilicet cerebri posterioris & eius ventriculi atq; cauernositatum. Lethargia diuiditur in veram & non veram. Vera est apostema tantum ex materia pure frigida. Non vera est ex materia frigida cum paucō sanguine, vel chole-
ra. Est autem quandoque morbus, quandoque accidens. Morbus quidē cum materia per se in loco colligitur, & facit apostema, & hoc est vt raro. Accidens vero, quando consequitur alium morbum: & hoc fit vt plurimum: plerūq; enim sequitur fe. continuam de flegmate, vel hæmitræum minorem, vel peripneumoniā: quoniam in huiusmodi passionibus flegma actione febrilis caloris subtiliatur, & rapitur ad cerebrum sursum. Et hæc fe. quandoque remanet cum lethargia: quādoque vero deficit fe. continua in die septima, & remanet ista lethargia. Et omnis lethargia est passio omnino opposita frenesi, in causa, in essentia, in subiecto & accidentibus: & ideo cognitio eius & duratio aliquāliter apparet ex ca. de frenesi. quia qui bene diffinit contraria considerat velut in alia scientia demonstratur. Lethargia præterea

vera quandoq; sit de flegmate, & hoc est vt sapius: quandoq; de melancholia, & hoc est perparum. ¶ Signa eius, q̄ est de flegmate, sunt dolor capitis leuis cum fe. lenta: quia ad omne apostema intrinsecum sequitur fe. cōtinua, similiter & subeth, licet fe. quādoq; diminuat subeth. Neq; mirandū, fe. posse stare cum signis frigidis, quia nō est impossibile causam antecedentem esse frigidam, & cū debet fieri coniūcta, ipsam vel partem eius calefieri, & hoc per putrefactionem: omnis autem putrefactio calefacit: vt dicit Galenus. 2. de accidenti: similiter & obliuio: quia memoria refidet ibidem: quapropter habet os apertum, donec ab adstantibus claudatur propter pigr̄itiam & obliuionem. Et aduenit quandoq; singultus propter compassionem oris stomachi: & est ipsorum lingua alba, & os saliuosum, & decubitus supinus, licet supra latera reuoluitur: & vrina grossa & alba velut subiugaliū & puerorum gulosorum, & egestio humida: pulsus rarus, satis tamen magnus, vndosus & tremulus. Et accidit ei quādoq; frigiditas extremorum cum aliquo tremore propter superabundantiam flegmatis & oppressionem spiritus & caloris. Signa eius q̄ est de melācholia sunt, quod oculi remanent aperti non palpitantes, velut oculi intuentes vnam rem absq; motu: & fe. lenta & dolor parum fortior, quam in ea de flegmate: & oculi prominētes, & quandoq; alienatio cum rixa, similiter & obliuio vrinandi, nisi ab hoc excutitur: vrina alba subtilis: color oculorum albus valde: pulsus paruus, strictus, spissus, durus, difficulter apparens: nisi forte hoc fiat ratione caloris fe. Signa lethargiæ non veræ quæ est morbus, est mixtura siue adulteratio signorū prædictorū. Signa lethargiæ non veræ quæ est accidens, sunt, cum fe. incipit augmentari, so-

molentia & pigr̄itia præter debitum & solitum: & habitudo flegmatica, & diminutio sitis, & taciturnitas loquēdi, & vrina al. grossa vel carpos, & quandoq; ruffa, spissa propter calorē febrilem insertum in grossa materia: & egestio fluida, aquosa, & quādoq; al. grossa. velut flegma viscoso.

Methodus. Cura lethargiæ verę de flegmate ē, vt statim a principio apparitiōis signorum vsq; ad tres dies, fiat inunctio percussiva circa caput continua cum oleo ros. & pauco acetī simul mixtis, donec locus securetur ab apostemate: & in hoc cōueniūt Almōf. & Auicē. Deinde scđm Auicē, debet fieri flebotomia cephalicā i manu, si virtus et ætas cōsenferint: quia flebotomia euacuat multitudinē humorū, licet non qualitatē: sed Almanf. flebotomiam prohibet: post ista vero conueniunt, vt fiant clysteria acuta frequenter actu calida. ℞. colloquintidæ, agarici, centaur. caritami, seminis vrticæ, radic. cappari, calamenti añ. 3. f. anethi, florum camomillæ, azari, ana. m. i. pistentur & bulliantur in aqua. & ex li. i. istius aquæ, & 3. 4. olei cōmunis. & 3. tribus mellis. & 3. f. salis fiat mixtura, quæ iterum bulliatur ad ignem: deinde coletur, & admixtref. Similiter & illud. ℞. colloquintidæ. 3. i. olei. 3. 4. mel. 3. 3. sal. 3. f. fiant sicut prius. Et valent suppositoria de sale gemma vel fellis, acutis: & opus, vt ligentur coxæ & adiutoria ligatura dolorosa, & fricentur volæ & plantæ pedum fortiter cum sale & aceto vel vrtica: quæ sicut fricatio leuis inducit somnū, ita aspera fortis inducit vigilias: vt dicit Gale. 7. de ingenio. Patiēs ponat in loco calido vel tēperato luminoso valde: neque pmitrat dormire, quantū fuerit possibile: imo trahat p capillos: quia summum remedium huius passionis sunt vi-

fellis acutis

Tractatus primus.

gillæ: propterea, quia spiritus animales tunc sua præsentia in cerebro digerunt materiam. Et fiat ventosatio sine scarificatione, incipiendo a nucha & collo & descendendo ad scapulas brachia & crura: quia est res efficax. Effundatur aqua calida super extrema cū eorum fricatione ex pāno aspero perdurantē: quia materias deorsum trahit cū vitute. Similiter & scarificatio pulpæ aurium, & prouocatio menstruorū & hæmorrhoidarū, prout dicemus suis locis. Et præcipit Mesue vomitū a principio, sed nos id abhorremus: quia materias sursum trahit, nisi sit spontaneus & facilis in corpore consueto. Et si retinuerit vrinam propter pigr̃tiam vel obliuionem, excitetur ad vrinandum & egerendum, & exprimat vesica cum manibus. Et fiat emplastrum super pectinem & vesicam calefaciēs illa membra factum ex floribus camomillæ meliloto, folijs seu semine apij, calamēto, radic. lilij, et oleo camomille, quod sufficit: quia habet prohibere mortificationem in collo vesicæ: & facit vt trāsglutiat aliquid tirsice vel mithridati: quoniam est conueniens: Transactis autem tribus diebus, & adueniente augmento, administrentur resolutiua gargarismata oxymelle composita et aqua decoctiōis hyssopi, oxymelle vel squillitico & aqua calida simplicis, vel ex aqua calida calamenti & origani. Fiant etiā sternutationes cum puluere ellebori albi, vel piperis & sinapis: similiter & masticationes ex pipere pyretro, sinapi, & similibus acutis. Et si posses ipsum purgare cum hierapicra, vel cum pillulis cochij, vel pulueribus earum, cōferret: deinde in statu, & quando tota materia fluxa est ad locum, fiat emplastrum resolutiuum, acutum, tubificatiuum super posteriorem partem capitis abrais capillis: quod sic fiat. ℞. stercoreum columbarum, cepæ crudæ, si-

napis, mellis, confice cum aceto, & fiat emplastrum. Et cōtinuetur omni die clystere, quia multum confert, & vngatur locus super fricationem fortem cū marciaton calefacto, vel cum oleo de lilio, vel de spica, vel de castoreo, vel euforbio, vel de costio. Cibetur ex carnib⁹ hœdorum & pullorum & farina ordeī vel auenæ: & sit diætā non grossa, vt consuatur materia. Potetur ex hydromelle facto ex lib. iij. aquæ & 3. iij. mellis, in quo decoctus sit hyssopus et ireos, vel ex aqua cicero & pisorū, vel aqua ordeī cum pipere & porro, si non est febricitās multū, & alienetur aqua frigida omnino ab eo. Cura letargiæ de melancholia est, vt fiat clystere. ℞. florum camomillæ, anethi, senæ epithy. colloquintidæ, polypodij aī. m. i. calamēti anisi, olei camomillæ 3. iij. mellis 3. iij. salis 3. f. confice vt superius: in omnibus alijs fiat sicut prius. Cura letargiæ quæ est accidens febris, est eadem cū prædictis, nisi q̃ oportet considerare initium apparitionis signorum eius: quare tunc vehementer cū euacuationibus & diuersionibus & repercussionibus resistatur. Est cauendum quātum possibile est, ne fortassis apostema confirmetur: q̃ si sic sit, necessarium est vti valde calidis: & non timeas fecū oīno: quoniam oportet magis intendere ad illud quod magis infestat.

Emperica. Dicitur, q̃ caput vespertilionis, vel cor eius in pāno nigroligatū & suspensum ad dextrū brachium, somnum letargici prohibet. Idem faciunt fel & oculi philomenæ positi in lecto ægri sub ceruice. Emplastrū bonum rubificatiuum. ℞. affodille, sinapis, allij, ireos, hyssopi, ana. 3. x. castorei, euforbij aī. 3. s. distemperentur cum succo rutæ vel affodili, vel sambuci. Epiht. ad idem. ℞. castorei 3. f. bulliat in succo rutæ & aceto & oleo, ex quo si at vehemens occipitij cōfricatio. Subfu

migium bonum fit ex assa fœtida, vel serapino vel galbano vel armoniaco vel oppoponaco, ponēdo sup carbones & fumum naribus applicando. Nil etiā magis excitat lethargicum, q̄ capillorū humanorum adustorū fumus, vel cinis eorum, si conficiatur cum modico aceti & castore, & naribus applicetur, vt di. Ioh. Hebeme. ca. p̄senti. Si vero patietis os fuerit clausum, aperiatur cum ferro, & ponatur cunens inter dentes, vt salina egredi possit: ne fortassis inducat suffocationem: & in ore eius ponatur 3. r. ti riacæ veteris, vel anacardi vel mithridati, vel aureæ Alexandrinæ. Hæc igitur dicta ad curam ordinata pertinent: veruntamē cum vadis ad infirmum, cuius stupor est magnus, & virtus satis constans: tunc propter timorē periculi intendēde magis accidēti, scilicet subeth, dimittendo causam antecedentem & coniunctā: vnde factis fricationibus extremorum, & ligationibus, & apposis localibus remedijs ori & naso iam dictis, ordina cito ruptorium tale super occiput, abrafis capillis. ℞. thymum combustum, & cantharides, confice cum emplastro apostolicon: q̄a in periculo mortis nihil est meli⁹: statim em extrahit humores. Postq̄ aut æger poterit vti medicinis, ordina syrupū, q̄ sic fiat. ℞. radi. apij, hyssopi, petro. bruci, sparagi, penta filon, graminis vtriusq̄ saluix, endiuix, scarioli, scolopendrix, capil. veneris, polyttrici, fumiterræ, añ. m. r. anisi, marathri, carui, camedryos, floræ boraginis, polypodij añ. m. f. fiat syrupus cum lib. r. mellis. detur de omni die 3. r. & f. cum aqua calida. Deinde purgetur frequēter cū benedicta, vel blanca vel pillulis cochij. Si vero nihil remediorum physicum contulerit: igniatur patella, & capiti applicetur, vt capillos vrat: quia cerebrum vehementer exiccat & a somno excitat. Et si lethargicus cœpit per

medicinas meliorari: siāt duo cauteria, vnū quidem in vertice, & aliud in occipitio sub cornibus duobus, & dimittatur diu stare apertum: quia nihil melius reperies in exiccatione cerebri a superfluitatibus quibuscūq̄ & proprie adhærentibus profundis. Dubitant operantes an in lethargia ministrari debeant repercussiva: quoniam augetur ex eis frigiditas, & fit maior stupor, & materia incutatur: sed hoc est contra Auicē. & Rasim, vt dictum est superius. Dicēdum autem videtur, q̄ communiter operantes, raro vtuntur in principio principij repercussiuus sed potius apud augmentū, q̄re sic operantur, & bene. Vel dicendum q̄ Ras. & Auicē. considerauerūt morbū, & causam magis q̄ accidens: sed communiter operatēs magis considerāt accidēs, scilicet stuporem & subeth: cum sit astantibus horribilius. Et dicunt q̄ sternutoria non debent approximari valde fortia, et proprie in principio: ne propter fortem motum dissoluatur materia, & fiat maior opilatio, & per consequens suffocatio festina.

Prognosticatio. Dicit Hipp. si lethargicus fiat freneticus bonum: si vero contrariū, malum. Item lethargia cum febre difficiliter curatur: quemadmodum hydropisus cum febre. Si lethargico sternuter appositis sternutatorijs, bonum: si autem, malum. Si adhibitis remedijs conuenientibus, vrina nō cœperit colorari, sed tremor superuenire, vel membrorum frigiditas, mortale. Sudor frigidus in capite, mortem significat. Si sanguisuga applicetur fronti, nec adhæserit, mortale. Item in lethargia rigor vel tremor superueniens, remanente lethargia, mortale: quoniam multitudinem materiæ frigidæ significat. Si vero post hoc minores lethargia, bonū videtur: quoniam expulsiōe materiæ ceticam demonstrat. Et sic intelligē-

Tractatus primus

duſ eſt ille apho. Hippo. 7. particulæ. In lethargico tremor, malum. Item lethargia quandoq; apud horã principij cõuerſitur ad paralyſim vel peripneumoniã: quia cerebrum propellit materiã ad partem debiliorem: et hæc quidem permuratio videtur bona, ſi ſit ad vitã, quẽadmodum accidit et in ſubeth et in apoplexia. Item ſi nullũ prædictorum affuerit ſignorum, & accidentia continue incipiunt mitigari, & virtus fortificari: ſignũ eſt veræ curationis & ſalutis.

De vigilijs ſuperfluis.

Cap. VI.

Vigiliæ ſuperfluxæ ſiũt multiplici de cauſa. Nam cũ ſomnus naturalis habeat fieri a vaporibus ſuauiſſis & mulcebribus, aſcendentibus ad cerebrũ a cibo bono & debite digeſto in ſtomacho qualitate & quantitate conuenienti, opilantibus vias ſpirituum animarũ in ipſo, & retrahentibus ipſos a ſuſ operationibus: propter quod reuocantur ad cor, & ibi multiplicantur denuo, & confortantur: accidere oportet vigilias propter contrarias cauſas, quæ ſunt duæ in genere: Vna ex parte membrorũ mandantium: Alia ex parte recipientium. Mandantia ſunt duo, ſcilicet ſtomachus & membra generationis. Recipiẽs eſt vnum, ſcilicet cerebrum.

Methodus. Stomachus eſt cauſa vigiliarum tribus modis. Primo dum penitus nihil mandat ſuſum: vt cõtingit in ſumma indigeſtione, atq; lienteria. Quod ſi indigeſtio fuerit in cauſa, tũc accidit proſtratio appetitus, inflatio ſtomachi, rugitus ventris: & quandoq; vomitus eius ſegmatis viſcoſi. Et cura eſt, vt vtratur ſepe diatriopipereon, diagal, diacardamo, et pulueribus et ſpeciebus calidis, ſtypticis, aromaticis: et vt virtus retentiua ſtomachi atq; digeſtio confortentur. Si autem fuerit in ſtomacho

cho materia, quod patet per exeuntia: tunc requiritur, qd fiat vomitus cũ oxymelle ſquillitico, & aqua decoctionis anethi, rafani, & modico aceti vel olei. Deinde purgetur cum 3. ſemis benedi-ctæ laxatiuæ, vel blacæ vel hierapicræ. Et emplaſtetur ſtomachus cum emplaſtris calidis ſtypticis, & inungatur cum oleo maſticino & nardino mixtis, & in vaſe duplici calefactis, addito puluere garioſil. & fiant omnia quæ dicuntur cap. de proſtratione appetitus, & cap. de indigeſtione. Si autem ſit cum hoc lienteria, ſiue fluxus ventris cibalis: dentur troiſci de karabe cum aqua planta-ginis & calamenti: quos in ca. de fluxu v̄tris dicemus. Quod ſi præſtores alia non fuerit: dẽtur zuccari roſ. veteris partes ſex cum parte vna pulueris boli armeni, maſticis, olibani, & gummi arabici aſſi: vel detur electuarium de thura poſitum ibidem. Secundo modo ſtomachus eſt in cauſa: quia parũ mandat: ſicut accidit in corporibus conſumptis, vel etiã naturaliter ſiccis ſecũdum complexionẽ ſtomachi, aut heſticis aut habentibus fluxum v̄tris diuturnum, aut ſuperflue laborantibus. Et cura eius eſt corpus impinguare cum iuribus carniũ bonarum pinguiſſimis conditis cum lacte papaueris albi, vel lacte amigdalorum dulcium, in quibus ponantur ipſa ſemina papaueris. Dentur etiã pulſes factæ cum eiſdem rebus. Bibat vinum rubẽũ, dulce, aromaticum lymphatum cum aqua, in qua ſtererit papauer: vel ſi neceſſe fuerit iuſquiami, vel mandragora. Fiar embrocatio ſuper caput ex aqua decoctionis lactucæ, corticis papaueris, & modico iuſquiami. Vngantur nares & tempora cum populeon temperato cum oleo roſ. Vtratur balneo aquæ dulcis tepidæ & omnibus humectantibus propoſſe. Tercio modo ſtomachus eſt in cauſa: quia mandat vapores diuerſos

& mordaces: sicut accidit in febribus vel habetibus choleram circa os stomachi, vel cibos corruptos in ipso. Et cura eius est ponere in cibis eorum papauer, lactucas, viol. pruna, & curare se. & euacuare choleram & cibos corruptos cum medicinis vomitiuis & secessiuis, & facere embrocationes circa caput humectatiuas & infrigidatiuas: ut alterent cerebrum, & repercutiant vaporem: & fomententur crura cum aqua decoctionis florum camomillæ, foliorum salicis, & fursuris cum frictione leui: quoniam trahit calorem ad inferiora corporis: & suam horam illa diapaupauer cum vino lymphato. Si autem assumptum esset in cibo aliquod venenosum: tunc statim fiat vomitus fortis pro posse: Deinde detur 3. i. tiriacæ veteris, si venenū sit frigidū, vti opium, iusquiamum, mādragora, papauer, propter quæ consequitur pigritia & subeth: et prohibeatur a somno omnino. Sed si sit venenum calidum, & consequatur angustia, & sitis & mordicatio stomachi, & amaritudo oris: sicut cōtingit post sumptionem calcis, arsenici, euphorbiæ: tunc detur post vomitū prædictū. 3. i. tiriacæ factæ infra sex menses: quæ si nō habeatur, ponatur in veteri granum 1. vel 2. opij. Et fiāt ligationes extremorum, prohibeatur a somno pro posse, & fricentur pedes & crura cum aceto & sale. ¶ Membra vero generationis sunt causa vigiliarum: quoniam sperma vel mēstruum diu retinetur: sicut accidit monachis, viduis & impregnatis infra 4. menses: quia sperma retentum adurit & ab ipso sumi pessimi eleuantur, qui peruenientes ad cerebrum inducunt vigilias, et quandoq; maniam caninam, peruenientes autem ad cor, sincopim et tremorem, sed ad matricem peruenientes, suffocationē inducūt. Et causa istarū vigiliarum non potest cognosci, nisi per relationē infirmi, similiter et priuationē

aliorum signorū omnino. Et quia facies bene cōstat in sui dispositione, nisi quando sentiat paries dolorem capitis et tēnū, & stomachi indigestionē, et in vultu ment testiculi: et sit apparitio seminis lasciuorum, Cura eius est coitus frequēs et vti medicinis diminuentibus sperma: quas dicemus. Et confert vsus assiduus aceti, lactucæ, seminis agni casti. Cerebrum est causa vigiliæ: plus omnibus per suam complexionem siue naturalē siue accidentalem. Quia sicut complexio frigida et humida inducit somnum, ita calida et sicca vigilias: quemadmodū apparet in fe. et ambulantiū in sole, et balneantibus in stupha calida, et videnti cibis, vel seminibus diureticis vsu superfluu: propter quod vix spiritus elargantur, et opilari non possunt. Et cura eius est, vti embrocatiōib; circa caput, et cibis et potib; dictis ca. de frenet. vsu tamen moderato magis q̄ illic. Fiunt etiam vigilie propter causam primitiuam, scilicet iram, vel sollicitudinē, vel gaudium immoderatum. Et cura eius est abstinentia a talibus, et vti cōtarijs: quia in omni motione corporis & c. vt dicit Hippo. secunda parti. apho.

Emperica. Si nescis, quæ sit causa vigiliarum superfluarum: fac embrocā ex resolutiuis et somniferis simul, quæ sic fiat. ℞. florum camomillæ, meliloti, pīllij, corticum papaueris, lactucis, mal. decoquantur in aqua omnia simul: quia resoluit cholericos vapores, si qui sunt in capite: et cum hoc infrigidat & humectat: & præterea fundatur lac mulieris vel bestię vel papaueris super caput. Item iusquiamum coque in vino dulci, et unge nares et aures et labia, et statim quiescet. Itē opij, iusquiamum, se. lactucarum, se. papaueris commisce cum succo lactucarum vel solarij, et emplastra super frontem.

Tractatus primus

Item semen papaveris coctum cum vino bibat. Itē ex aqua decoctionis foliorum iusquiami, vel mandragoræ, vel papaveris fomētur frons, tempora & pedes & crura: Omnia em̄ ista extinguunt calorem accidentalem & humectant cerebrum manifeste. Item vnguentum somniferum extremæ fortitudinis ℞. populeon. 3. 2. olei mandragoræ, olei rosæ, olei viol. ana. 3. 2. aceti parumper gratia penetrationis opij 3. 1. intingantur cum isto petiæ frigidæ, & ponantur super tempora: liniantur etiam cū eo nares, vt ad cerebrum virtus perueniat: cōfert in frenesi & fe. arsiua. Item odorentur rosæ, violæ, cortices papaveris, iusquiamus, semina lactucæ, florum nenuph. posita in sacculo simul. Item ex medicinis diapaouer, filonium recens, & tiriaca recens. Item papauer al. iusquiami semen albū distemperatum cum albumine oui & lacte mulieris, & fac emplastrū super frōtem.

Canon. Scias consequēter, q̄ in om̄i causa, maxime somnifera cibaria conferunt: quia sunt magis amica naturæ q̄ medicinalia, quorum in cibus præcipua sunt pultes, vel iura confecta cum papauere pistato, vel cum eius lacte temperato cum lacte amigdalæ dulcium: quia multum conferunt in desiccatione cerebri. Sed in potibus est vinum, in quo sterit iusquiamus vel mandragora: et hæc dantur frequenter in die, & non solum hora, qua petitur somnus. Oportet præterea, vt post huiusmodi haustum fiat epithyma capiti somniferum, vel embroca aliqua supius dicta. Quæ si prius fierent, opilarēt vias angustas cerebri, & impedirent attractionē administratorum per. interius. Et omne quidem epithyma vel emplastrum applicetur capiti abrafo circa frontem & verticem in medio, vbi sunt commissuræ, ita vt penetret. Similiter et circa tem-

pora & nares, sed nequaquā in occipite: quia est membrum naturaliter frigidū: & inde oriuntur nervi & nucha.

Prognosticatio. Vigiliæ si superflue: inducunt debilitatē virtutū vitaliū, animalīū et naturalīū, propter spiritūū resolutionē sine restitutione necessaria. Et si magis superflue: inducunt marasum, & excitationem corporis propter humorū consumptionem, et propter indigestionem omnem. Et si iterum magis superflue in virtute forti, furorem et maniam propter spiritum animalīū agitationē, sed in debili, mortem propter caloris extinctionem. Item Hippo. 7. parti. apho. In vigilia spasmus et desipientia, malum: supple et mortale, si corpus sit inanitū. Item secunda particula: Somnus et vigilia, vtraq; magis, &c.

¶ De perturbatione virtutum animalium sensitiuarū interiorū. Item de melancholia, & maniaca passione. Cap. VII.

Virtutes sensitiuæ interiores sunt tres in genere: quarum prima est imaginatio siue fantasia, cuius operatio est retinere species sine materia rerum sensibilium absentium. Et eius sedes propria est in anteriori cerebri ventriculo. Secunda est virtus æstimatiua siue cogitativa: cuius operatio est discernere inter vtile et non vtile, honestum et turpe: cuius sedes est in medio cerebri ventriculo. Tertia est memoria et reminiscētia, cuius operatio est retinere species rerū sensibilium post longam ipsarum absentiam (sicut imaginatio post breuem) cuius locus est in posteriori ventriculo. Po test autem quælibet istarum virtutum pati actionem læsam: vt patet per Gal. 3. de accidenti. Actio læsa est triplex: di

minuta, ablata, & corrupta. Diminuta quidem dicitur, cum sit operatio virtutis pigrior, imperfectior & obtusior. Verbi gratia, de imaginatione, vt si quis discens sciētiās mathematicas, non posset imaginari clare lineas vel figuras: quod in illa sciētia requiritur. Verbi gratia, de æstimatoria, vt pueri, qui parum discernunt inter vtile & inutile. Verbi gratia, de memoratoria, vt senes qui paucorum etiam breui tempore recordantur. Ablata vero dicitur: cum operatio virtutis omnino tollitur, velut nihil imaginans, nihil æstimans, & nihil recordans. Corrupta dicitur: quādo aliter sit operatio q̄ debeat et deceat. Verbi gratia, De imaginaria, vt Galen. ibidē exēplificat de Thesalo, qui ægrotans putabat histriōnes & buccinatores circa lectum stare, quos iussit expelli subito, quia caput suum læderent: & sic imaginaria fuit corrupta, sed æstimatoria sana. Verbi gratia, De æstimatoria: vt si q̄s projiceret vas extra domū ab alto, nesciēs p̄ hoc ea rumpi. Verbi gratia, De memoratoria, vt si quis memoraretur Petri, & putaret se recordari Marcū. Sed procedendo vltterius dicamus, q̄ frigidū siue sit cū materia, siue sine materia, est causa immobilitatis et quietis et ingrossatiōis: quare sit causa actiōis læsæ diminutæ vel ablatæ, quando dñatur in ventriculo cerebri deseruiēte virtuti læsæ, vel ventriculis pluribus simul: q̄a ingrossat & figit spiritus animales: vt libere non possint moueri: neq̄ species res deferre ab organis sensuum quinq̄ exteriorū, prout illi virtuti cōgruit & eius opationibus. Ecce uero autē causa calida siue sit cū materia, siue sine materia, est causa furoris, motus, & agitationis: quapropter est causa actiōis læsæ corruptæ, quādo dñat sup̄ ventriculū vel ventriculos, deseruiēte vel deseruiētes virtuti vel virtutibus læsis actiōe corrupta. Ex dictis igit̄ cognoscere

potes, quæ virtus sit læsa, et q̄ pars cerebri sit discrasata: & q̄ qualitas, vel materia sit in causa, per quæ maxime iuuheris in cura talis possionis. Actio autē læsa imaginationis et fantasie siue sit diminuta, siue ablata, siue corrupta, vnū nomen commune recipit secundum me dicos, scilicet corruptio imaginationis. Eodem modo actio læsa memoriæ & reminiscētiæ dicitur cōmuni nomine obliuio. Actio vero læsa virtutis æstimatoriæ siue cogitatoris siue cognitiuæ, quod est idem, sortitur nomina diuersa: quæ licet apud diuersos scribentes diuersificentur: nos tamen penes mētem Auicē. prout cōcipere possumus, sic nominamus. Nā si sit actio diminuta vel ablata, quæ nō differunt, nisi sicut magis & minus, dicitur talis passio cōmuni nomine melancholia, q̄ postea habet duas species sub se. Quarū prima est stoliditas, siue amētia, siue infantilitas, siue fatuitas, quæ idem sunt. Secunda vero est melancholia, quæ nomen generis sibi vsurpauit propter diuersos modos, quos sub se continet: vt infra dicitur. Si vero sit actio læsa corrupta: sic dicitur cōmuni nomine mania: & habet duas species famosas: licet modi sint plurimi. Prima dicit̄ permixtio rationis, siue alienatio: Secunda mania canina, siue dæmoniū lupinū. Cognitis igitur causis et subiectis & numero istarum passionum, quæ sunt sex. Prima corruptio imaginationis: Secunda obliuio: Tertia amētia: Quarta melancholia: Quinta permixtio: Sexta mania canina: videamus de accidētibus significantibus sup̄ eas, & cura ipsarum per artem.

Methodus. Signa corruptæ imaginationis in cōmuni sunt ista: quia imaginatur quod non est: & videt̄ ei, q̄ videat res coram se, quæ non sunt: & debilitat̄ imaginādo longo tpe, neq̄ apparent ei somnia & visiones nocturnæ.

Tractatus primus

nae, vel parum apparent, & cito labuntur ab eius memoria. Si autē cholera sit in causa: tunc cū prādictis erunt vigiliae & motus & instabilitas omnino. Si flegma: erit somnolentia, pigrificia, & humiditas oris & narium. Si melācholia: erit oculorū siccitas, & aurium & nasi frigiditytas sine supfluitate viscosa. Et cura eius est, si cholera sit in culpa: vt primo fiat flebotomia cephalica in brachio vel in manu: quia cū sanguine educit cholera ei cōmixta. Deinde cōtinue infrigidetur frons cum aqua ros. paribus. 2. & aceti parte vna mixtis simul, infundendo petias in ipsis, vel epithymetur cū oleo nenupha. & oleo ros. vel viol. vel de salice, addendo parū aceti propter penetrationē. Et si cholera adusta sit, & vigiliae fortius superfluant: ponatur granū vnū opij, vel aliquid mandragorā in prādictis: donec virtus in ea transeat, & euacuetur sicut infra de melancholia dicemus. Si vero flegma sit in culpa: detur digestiū primo, s. oxymellis, simplex vel compositum cum decoctione rerū ducētium syrupi virtutem ad caput, ex quibus sunt scicados, flores camomillae, nux muscata. Deinde parget cū pillulis cochijs aureis, aut hierapicra. fiat gargarisma ex oxymelle cōposito vel squillitico cum decoctione sinapi vel hyssop. Utatur aurea Alexandrina tiriaca vel diapliris. vltimo fomentetur caput cum decoctione florum camomillae anethi & meliloti, & fricetur cum panno calido, & vngatur quandoq; cum oleis calidis famolis, similiter & balsamo. Si vero melācholia sit in culpa: siue sit adusta, siue non: fiat sicut dicitur in isto capitulo. parag. de melācholia. & parag. de mania canina. Et accidit in quibsdā propter corruptionē imaginatiōis, similiter & propter corruptionē virtutis aëstiatuæ & memoratiuæ, vt in somno appareāt eis fantasmata adeo fortia, vt

virtutes sensitiuæ interiores ex ipsis excitatae excitēt virtutes motiuas volūntarias: quae surgūt, & operātur opa vigilatium. Et ipsius cura est, vt fiant oia quae dicta sunt, & dicetur p totū capitulū, quia istud procedit ex corruptione oīm virtutū animalium simul: licet maxime ex corruptione imaginatiōis: quae imagināte se vigilare & indutos esse, et in tali & tali loco: cū ita nō sit. Et quibsdā accidit, vt mingāt in lecto: cū imaginātur se esse in loco debito micturū: vnde in hoc prācipuū est remediū, vt verberētur virgis in somno, similiter & post: quia p hoc virtus memoratiua reponēs speciē doloris intra se, refrenabit imaginatiuā & aëstiatuā ab actionib; prādictis.

Obiitio. Signa obliuiois in cōmuni sunt: quia patiens nullius recordat, vel debilitet & paruo tēpore: & fit vt plurimū ab humore flegmatico domināte postremae cellulae: quare fit cum hoc somnus profundus, pigrificia, & grauitas. Fit etiā quādoq; ab humore melācholico ibidē dñante: & tunc difficulter imprimis memoriæ spēs aliq, & fit insomneitas, & res pteritae melius cōseruātur, q̄ p̄sentes, vel de propinquo factae. Et est cura eius, si fiat de flegmate: vt fiant oia dicta ca. subeth. Verū tamē cōueniēs est, vt vltimo fiat cauteriū in parte posteriori vsq; ad craneū cū ferro, vel vesicatio cū cantharidibus vel cū calce viuā, arenico, & similibus dictis ca. de lethargia. Si autem melācholia sit in causa: inducatur somnus, & pro posse gaudium per medicinas somniferas dictas superius ca. de superfluis vigilijs, & comedat saepe diapaouer. Mundificetur cū geraldod. vel apozimate facto ex senethymo, epithymo, popypodio, in quo dissoluta sit, 3. i. cassiae sic. colatae & mundatae: & impinguetur corpus eius pro posse: quapropter conuenit, vt bibat vinum clarum lymphatum, & sorbeat iu

ra pingua, & pulvis humectatiuas, et carnes agnorę Schoedorum & pullorum & vitella ouorum forbilitum, vratur ex oleribus, feniculo, borragine, buglossa, spinachijs, & bletis. Et dicitur, qđ ebrietas eis confert facta semel omni mense: quoniā ipsorę cerebrũ mundificat & humectat, & proprie pmissa vniuersa purgatione, vt ait Auicē. pri. can. fen. tertiaca. de regimine vini & aquę.

Amentia. Signa amentię siue stolidi-
tatis sunt: quia desiderat esse cum pueris, & ridet de rebus quas facit, sicut pueri, & difficiliter potest corrigi: & fit piger. & facit ædificia ex luto et bacculis, & ætate. Hęc em̃ oia accidunt propter frigiditatem & humiditatē, vel propter frigiditatē & siccitatem lo minātem in cerebro secundum mediũ venticulũ. Et cura eius est cōmunis, quocũq; duorũ modorę fuerit, vt calescat cerebrum cum electuario de muscho: quod sic fiat: ℞. muschi. 3. f. cardamomi, liquiritię, gariofilę, zinz. piperis longi añ. 3. f. cynamomi. 3. i. ligni aloes 3. i. croci. 3. 2. cōficiantur cū melle in hyeme, & zuccaro in æstate: detur sero & mane ad modum castanę. Confortat namq; cerebrũ et cor & stomachũ. Vrat electuario pliris, & electuario ducis, & aurea Alexandrina, & tiriaca veteri, & dianihos cū muscho. Ponatur in loco luminoso: cōuerſetur cū amicis & dilectis & prudētibz tractātibus negotia ardua: vratur solatijs diuersis, Et scias, qđ ablutio crurũ cū decoctione florũ camomillę, meliloti, & anethi, est valde cōueniens in om̃i specie melācholię.

Melancholia. Signa melācholię in cōmuni, sunt pusilla nimitas, & timor sine causa manifesta. Neq; mirũ est, si timeāt, quoniā assidue causam timoris secũ deferūt. s. humores & spiritus caliginosos: vt ait Gale. 1. de accidenti & morbo: & desperatio in di-

uitijs & honoribus: ælimatio mala, vel locitas irę, dilectio solitudinis, tremor, vertigo, sonitus & tinnitus & proprie in mirach. Hęc em̃ oia accidētia proueniunt ex dominio humoris melācholici super mediũ vētriculũ cerebri. Iste aut̃ humor melācholicus, vel sit p viā cōgelatiōis & infrigidatiōis: & tūc est causa amētig: vt dictũ est, vel p viā adustiōis: & sic est causa p̃sentis passiōis. s. melācholię. Sed diceret, ergo melācholia fit a causa calida, quod supra negatũ est. Dicēdum est, qđ licet melācholia ista fiat per aduſionē, quia tamē aduſtio nō valde vincit super eam, sed solũ adeo, vt resoluat subtile vinctuosum, inflammabile, & derelinquāt grossum, terrestre: ideo ista melācholia remanet naturaliter frigida: sicut apparet in carbōe extincto. Si namq; materia foret calida, & in ea valde supflueret aduſtio: fieret causa manię caninę, vel permixtionis rationis: vt infra dicitur. Cuius exemplũ apparet in carbone ignito vel cineribus. Postq̃ aut̃ melācholia fuerit confirmata: tūc apparēt accidētia variā, rara & mirabilia. Nam qđam purant se dominos, qđam gallos, qđam lupos qđam putāt se demergi si exirēt domũ vel camerā, qđam putāt inuerecũdũ fore, si cōderēt corā hoibz, qđam propter imaginatiōis corruptionē plurimā, se interficiūt vel demergūt: nisi custodiānt: et sic de alijs modis infinitis, secundũ qđ melācholię talis sunt modi aduſtiōis plurimi. Nā qñq; hęc melācholia, qđ est causa huius passiōis, sit solũ ex sano, cui grossum et seculētũ remanet, et subtile resoluūt: Qñq; ex aduſtiōe flegmatis: qđ tñ raro cōtingit, vt dicit Aui: Qñq; ex melācholia naturalis non aduſta, sed corrupta i malas q̃litates: Qñq; ex cho. igrossata p aduſtionē a aliq̃le. Itē qđcũq; istarę materię fuerit causa melācholię: tūc vel est in cerebro cōtēta vel in to

Tractatus primus

to corpore, vel in stomacho, vel in splene, vel in mirach: et signa vniuscuiusq; propria iam dicemus. Signa melancholiæ propria, si materia sit sanguis fex, & sit cõterea in cerebro, sunt firmitas cogitationis, & assiduitas solitudinis, & assiduus aspectus in rem vnam, & inclinatio visus in terram, & multiplicatio risus & gaudij sine causa manifesta, & tristitia non plurima, & vrina rubea, spissa: & pulsus mollis, & color faciei rubeus & fuscus: & somnietas cum grauitate quadam: & sapor dulcis in lingua, in quo apparebit quandoq; a maritudo, quandoq; falsedo propter aliqualem adustionem: habitudo corporis vt plurima carnosa: venæ magnæ & repletæ. ¶ Signa melancholiæ propria, si sit ex flegmate, sunt cum prædictis pigritia, & obliuio, & grauitas capitis: & non erit ridēs, neq; gaudēs: & vrina alba, & suppalida, spissa: pulsus paruus, mollis: color faciei pallidus vel albus. ¶ Signa melancholiæ propria, si sit ex cholera, sunt cum prædictis agitatio & instabilitas, & clamor, & claudacia, & rixas: pulsus velox, durus: vrina citrina vel subrufa, subtilis omnino: similiter & color faciei citrinus: habitudo sicca. ¶ Signa melancholiæ propria si sit ex melancholia: sunt cum prædictis odiū diuturnū, cogitatio plurima, neq; rixabitur, neq; fit audax, sed quietus: vrina subtilis, pallida: pulsus strictus, durus. Si autem materia non continetur in cerebro, sed in toto corpore: apparebit nigredo corporis & asperitas cutis, & retentio eius quod consuevit euacuari ex splene, stomacho, hæmorrhoidibus, vel menstruis: & multitudo pilorum nigrorum, & antecessio ciborum generatium humorem melancholicum, & antecessio fe. compositarum vel erraticarum chronicarum: quia his succedit humor melancholicus: sicut cinis succedit lignis

combustis: vt dicit Gale. de fe. ¶ Si vero fiat vitio splenis, erit rugitus iateris sinistri, & opilatio splenis assidua, atq; appetitus insatiabilis propter effusionē melancholiæ ad os stomachi: digestio- nis malicia, vt in fe. quartana: quādoq; & mordicatio ventris cum furia: quapropter dicitur, quod fere omnis melancholicus est splenicus quoquo modo. ¶ Si vero fiat vitio stomachi: signa sunt nausea, & repletio ventris hora digestiōis, et multiplicatio doloris apud comestionem & satietatem, quæ post digestionem minoratur. Si vero materia cõtineatur in venis & arterijs mirach ventris, quod est tota ventris carnositas cõtineans mēbra nutritiua: apparebit grauitas in ventre, & attractio ad superiora, & nausea inseparabilis & malitia animi, & corruptio digestionis, & eructuatio acetosa, & sputum humidum, & rugitus ventris, & multitudo ventositatum exeuntium, & inflatio mirach: & quandoq; sentitur dolor in stomacho: & quandoq; inter spatulas, & proprie post cibum vsq; quo digeratur perfecte. Et scire debes, quod vbiq; sit materia contenta, potest esse sang. vel cho. vel flegma & melancholia: quæ admodum & si continetur in cerebro: quapropter & signa supraposita cõtingit applicare membris alijs, sicut & fuerunt cerebro applicata. ¶ Et postquā iam diximus de speciebus melancholiæ, & accidentibus super ipsas significantibus, cõsequens est videre de cura ipsius per artem. Cura melancholiæ est fere vna & eadem secūdam omnes eius species. Proximo ergo prouocentur menstrua, vel hæmorrhoidæ, si corpus sit consuetum, ex appositione sanguisugatum circa anum, vel emplastro facto ex sinapi, cepis, & albumine oui, quod ponatur supra anū sæpius, donec bene adhæserit: & deinde violenter abstrahatur.

Vnde Hîp. 1. p̄rti. apho. Melancholicis & freneticis hæmorrhoidæ innatæ, bonũ. et Gale. ibidem in cõmentõ dicit, q̄ hæmorrhoidæ nõ solũ secundum purgationes soluũt has ægritudines, sed etiã purgandorũ humorũ qualitates malas. Et si aliter aperiri non possunt: fiat flebotomia saphenæ, quæ est sub cauilla pedis vel saluæellæ, quæ est in pede inter anularem & auricularem: quia hæ trahunt materias grossas deorsum a capite, & cum hoc prouocant hæmorrhoidas & menstrua a proprietate. Deinde secundum Aui. Rasim et Serapionem debet fieri flebotomia basilicæ vel medianæ dextræ vel sinistræ cum incisione longa extrahente san. grossum: ad quod confert plurimum antecessio balnei aquæ dulcis tepidæ, vel aquæ decoc. mal. uauisici, fol. salicis, & pupuli, et viol. ita vt post eius exitũ fiat ilico flebotomia prædicta, donec paulatim extrahat humor grossus a toto corpore cũ pmutatio ne ei⁹ in san. subtilẽ, et successiõe ciborũ et potũ humiditãtũ oĩ die, et proprie si materia sit sanguinea. Verũtamẽ eligi bili⁹ videĩ, q̄ flebotomia nõ fiat in melancholia, nisi pmissa mũdificatiõe plurima corporis cũ medicina purgãte materias adustas: quia flebotomia vt plurimũ extrahit humidũ subtile cũ calido, q̄d est curatiũ huius passiõis de melancholia. Et studiũ medici totale sit in ipinguando corp⁹ melancholici: vt siccitas remoueat, q̄ est potissimã causa hui⁹ ægritudinis. In alijs autẽ specieb⁹ melancholiæ, q̄ nõ sunt a sanguine, nullo modo fiat flebotomia: sed sit cõtẽt⁹ medicus in mũdificatiõe humorũ grossorũ cũ medicinis, quas dicem⁹, & diætã humida, & rebus cõfortatibus caput & naturã totã, & specialiter cerebrũ & cor: & cũ rebus rectificãtibus splenẽ: quia durities & copulatio splenis in cõm melancholico de (qua cũq̄ specie fuerit) necessario repiuntur:

vt dicit Hîp. & merito, cũ splen sit receptaculũ humoris melancholici: quare si melancholic⁹ humor in corpore habet aliquod dominiũ sup alia mēbra, primo dominabit⁹ spleni, in q̄ maior ei⁹ portio naturaliter cõtineĩ. Syrupus cõferens in oĩ specie melancholiæ siue sit de san. siue de alio humore quocũq̄: quia rectificat splenẽ, & deopilat mēbraicas, & pparat ad expulsiõe, & oĩa nutritiua corroboret, & cõfortat, sic fiat. ℞. polypodij lib. 6. buglossæ boragi, melisse. añ. M. 1. cypri, capparis, acori, azar añ. 3. 1. senæ epithymi añ. 3. 2. semis lactucæ, & endiuiæ añ. 3. 3. pistent oĩa grosso modo pter senæ & epithymũ, q̄ dimittantur sicut sunt, bulliãtur aut oĩa pistata in lib. 4. aq̄, donec medietas sit cõsumpta: tũc in sine addat⁹ senæ & epithymũ: post q̄ bullita sint, dimittat⁹ aqua cũ rebus quasi infrigidari: tũc fricẽt ea, q̄ sunt in aq̄ manibus fortiter: deinde coleĩ aqua. & in colatura addat⁹ lib. 1. mellis aut zuccari albi, & iterũ remittat⁹ ad ignẽ, & pmitatur aliquãtũlũ bullire: postea iterũ coletur, & reponat⁹. Dẽtur de eo mane stomacho ieiuno. 3. 3. cũ 3. 3. aquæ decoctiõnis epi. sticad. nucis muscatæ & ro. Et hoc fiat vsq̄ ad sex dies: tũc in sero recipiat sine cœna pillulas de lapide lazuli: quæ sic fiunt secundum Hebeĩ. ℞. lapidis lazuli abluti tricesies in aqua dulci & decies in aqua ro. semp terendo, & aquã renouando post quemlibet ablutionem in mortario. 3. 3. epi. polypodij, añ. 3. 8. scamoneæ, ellebori nigri salis indi añ. 3. 2. & 6. agari. 3. 8. gariof anisi, añ. 3. 4. hierapieræ. 3. 15. confice cum succo endiuiæ, & da. 3. 2. cum aqua casei. Educunt em̄ cum fortitudine humores adustos de cho. & melancholia: & ideo plurimum conferunt dæmonio lupino. Vel purgeĩ cũ pillulis de lapide armeno quæ sic fiunt. ℞. lapidis armeni præparati, sicut lapis lazuli, hierapieræ añ. 3.

Tractatus primus

3. epithymi, agarici añ. 3. 4. scamoneæ præparatæ siue diagredij 3. 2. & 6. gariof. salis indi añ. 3. 2. confice cum succo solatri vel lactucar. Velumat pillulas de elleboro: quæ sic fiunt. 1℥. senæ, epithymi añ. 3. 2. ellebori nigri 3. iij. scamoneæ, reubarbari, mastitis añ. 3. 1. mirobalanorum indorum 3. 6. fiant pillulæ cum succo polypodij, vel vino decoctionis epithymi: detur ex eis a. 3. 1. vsq; ad 3. 2. 6m materiæ multitudinem et virtutem. Si autem pillulas recipere non posset: licet fortius euacuent a remotis:umat decoctionem, quæ sic fit. 1℥. mirobalanorum in lorum 3. 1. & 6. pistentur grosso modo, & bulliantur cum 3. 2. prunorum siccor. in 3. tribus vini, vel 3. octo aquæ: donec medietas sit consumpta: coletur & dissoluatur in ea 3. 1. tamarindorum vel mannæ. Aliud ad idem. 1℥. ellebori nigri 3. 6. scamoneæ, 3. 1. puluerisent optime, & dimittantur per vnam noctem in 3. duab; mellis rosati, vel syrupi viol. Deinde in aurora ante diem dissoluatur hoc totum in 3. 4. aquæ decoctionis prunorum: & detur infirmo totum simul. Et aliquando loco illatis pillulis possumus dare pillularum foetidar. almanf. 3. 1. vel geraldod. 3. 6. vel hierarufi, vel dialene. vel catartici impialis cū aqua calida. Cum continuatione igitur medicinarum tam digestuarū q̄ solutuarū regatur infirmus tempore lōgo nunc digerendo, nunc euacuādo: & confortetur cerebrum & cor cum dianthos cum muscho & pliris arcoticon, & diamarg. & methridato simul mixtis: vel cum electuario, quod sic fit. 1℥. serici combusti. 3. 1. coralli rubei. 3. 6. ossis de corde cerui 3. duas margaritarum nō perforatarum 3. iij. cardamomi 3. 6. pinearum mundatarum lib. 6. hyssopi, liquiri, nucis muscatæ, gariofil. piperis lōgi, cubebæ, gallanget. añ. 3. 1. & 6. cynamomi. 3. 5. macis, croci. añ. 3. 1. zuccari lib. sex coquantur

ad modum zuccari ros. In hyeme vero vel materia valde frigida existente, confici potest cum tribus lib. mellis despumati, & bene cocti: & addantur in fine 3. 2. muschi, si patiens in eo delectetur. Detur ex hoc electuario omī die in ieiunio ad modum castanæ: et post ipsum bibatur aliquid boni vini albi, odorisferi, clari et lymphati: quia cor et cerebrum confortat, et animam gaudere facit, et risum multiplicat: et remouet malas cogitationes et imaginationes erroneas, et rectificat memoriam perfecte, et confortat digestionem et multiplicat humiditatem naturalem corporis totius. Post tales igitur digestiones et purgationes bis vel ter reiteratas, et proprie in corpore carnoso, fiat flebotomia supradicta: vel flebotometur saphena, et proprie pedis sinistri: quia tunc sanguis grossus est in causa: et post hoc cephalica, & post hoc vena frontis: vel ponantur sanguisugæ ad nares: quoniam in tali permixtione confert flebotomia: vt dicit Mesue in suo de appropriatis capi. de cura manie et melācholix. Et si fuerit sanguinis superabundantia propter opilationem, quæ est in epate vel in splene fiat flebotomia ex saluatella dextra vel sinistra, nunc ex hac nunc ex alia, & fiat in flebotomia apertio venæ larga, ne extrahatur subtile & remaneat grossum, & ad illud plurimum confert balneari in tyna ante flebotomiam. In alijs autem causis nullo modo fiat flebotomia aliqua, sed sola continuitas medicinarum prædictarum cum diæta humida. Nutriatur ergo iuribus gallinarum, hoedorum, agnorum annalium conditis cum ouis et puluere, qui sic fit. 1℥. cardamomi 3. 6. granorum paradisi, cubebæ. añ. 3. 1. cynamomi electi 3. 6. croci. macis añ. 3. 1. nucis muscatæ. gariofil. folij añ. 3. 1. terantur, et cribrentur subtilissime, & spargatur iste puluis super ei

hos suos. Confectio diambrae, quæ est medicina sublimis in omni specie melancholice cerebrum & cor confortans & omnia membra digestionem procurat, & utentem ea laxificat, & membra nutritionis calefacit, senibus quoque conuenit & frigidis natura & mulieribus et proprie ægritudinibus matricis, sic fit secundum Hebemefue. ℞. cynamomi, daronici, gariosi, macis, nucis muscatae, folij gallangæ añ. 3. iij, spicæ cardamomi, maioris, & minoris ana. 3. i. ambræ aureum i. musco (si in ipso patiens delectetur) 3. f. zinzii 3. i. & f. sandal. ci. ligni aloes, piperis longi añ. 3. vnam. Confice cum syrupo rosæ, et aqua rosæ. Et da ex ipso 3. i. vel 3. f. cū vino al. aromatico. Caueat a carnibus syluestribus tam volatilibus quam gressilibus: quia sanguinem grossum melancholicum multiplicat. Bibat vinum clarum, aromaticum melius quod haberi potest lymphatum cum media veltertia parte aquæ claræ. Caueat a vino grosso rubeo vel turbido: vtatur etiam post purgationes lacte recentis capræ & amigdarum dulcium, & pineis, & fisticis, & auellanis mundanis a cortice ruheo et nutritis in lacte dulci per noctem: similiter & omnibus impinguantibus pro posse, ex quibus sunt balnea, quæ dicuntur capi. de feb. hectica. Demum & vltimum, si nihil aut modicum quicquid prædictorum videbitur conferre in omnibus speciebus melancholice, siue sint a sanguine siue a cho. flegmate, vel melancholia: fiat vnum cauterium in vertice capitis ea quidem parte, in qua terminatur medius digitus, quando radix manus ægri ponitur super radicem nasi: & aliud sub cornibus occipitij, quæ profundentur vsque ad os cranei, si sit possibile, & dimittantur aperta vsque ad dies. 40. vel circa id. Postea permittantur consolidari, & sic procedendum erit vicissim

cum continuatione medicinarum a principio resumendo vsque ad finem: donec nulum vestigium melancholice amplius appareat: quia curabitur, si per medicinas poterit curari. ¶ Fit etiam quandoque melancholia a causa primitiua, vt ab amore alicuius feminae, vel ex amore repatriandi: sicut accidit viris effeminatis & delicatis. Et signa patent ex relatione infirmi, & mutatione coloris faciei, & pullus, quando sermo fit de illa, quam amat. Cura est, vt obtineat rem quam desiderat, si sit possibile: quia in omni motior e corporis &c. Nunquam fit in loco solitario sed inter homines diuersa & solatio trahentes, & sit semper in loco luminoso: & dicantur sibi aliqua delectabilia, donec priorum obliuiscatur: quod si non sufficit, dentur sibi somnifera, & iura cõdita cum lacte papaueris, & pulres facti ex seminibus eius & vtatur dia papauere: & fiant omnia dicta superius de melancholia. ¶ Alienatio. Signa permixtionis rationis siue alienationis mentis communia sunt omnia signa dicta de melancholia, nisi quod in permixtione fit mobilitas & agitatio & velocitas ad operationes non rationales: Sed in melancholia est aliqualis pigritia, & tarditas ad talia: quia sicut supradictum est, melancholia & permixtio fieri habent ex dominio humoris melancholici super medium ventriculum cerebri, generati per viam adustionis, & ex alijs humoribus ad genus melancholicum reductis: nisi quia in melancholia fit adustio parua valde, quæ solum sufficit ad ingrossationem humorum: Sed in permixtione rationis fit adustio maior, quæ etiam sufficit ad inflammandum & agitandum spiritus animales in cerebro: sicut & in mania canina fit adustio maxima quæ esse potest. Fit ergo in utraque passionem actio laesa cogitationis vel assimationis, quod idem est: sed in permixtione fit cū hoc agitatio in operatione eadem:

Tractatus primus

Sed in melancholia est aliqualis māsue-
tudo, non tamen tanta, sicut in amētia,
quæ sit de causa frigida. Fit autem per-
mixtio quādoq; cum feb. propter vapo-
res adustos ascendentes ad cerebrū a mi-
nera putredinis. Et si sit cū virtute forti,
& post signa digestionis perfecta: tūc est
signū crisis salubris. Sin autem, est signū
crisis male, scilicet mortalis vel diminu-
tæ: & fit quandoq; sine feb. & sic sumit
in isto ca. quia est magis proprie tūc pas-
sio cerebialis per se, et est morbus: sed cū
fe. insequitur, est accidens. Et cura eius
quando est cū fe. est cura fe. & appositio
pānōꝝ lineōꝝ infusōꝝ in aq̄ ros. & ace-
ro, vel succo solatri & semperuiuæ, &
aceto super frontem & tempora: ne ma-
teria sursum rapiat, & causet frenesim:
& hoc est ante signa digestionis. Sed si sit
post signa digestionis: tunc non ponātur
repercussiuā circa caput: quia impedire
tur crisis, quam significat: sed suspenda-
tur cum blāditijs, & aliquibus remedijs
confortatiuis, donec fiat crisis: Et postq̄
venerit crisis, iuuetur per eandem viam,
per quā natura monetur, siue sit sudor, si-
ue vomitus, siue fluxus sang. narium si-
cut diximus cap. de dolore capitis, qui
fit in feb. similiter & in ca. de scotomia.
Et cura eius, quando est sine fe. est eadē
omnino cum cura melancholiæ in eua-
cuationibus, digestionibus, fletuoromia,
& diata omniq; sed in fine nō obli-
uiscaris cauterij in capitis summitate:
quia est conferens omnino.

Mania. Signa mania canina siue dæ-
monij lupini (quod idem est)
sunt prauitas maxima in accidentibus
furoris & agitationis: quæ dicta sunt in
ca. de frenesi: quoniam hæc passio & fre-
nesis licet differant in essentia (cum fre-
nesis sit cum apostemate cerebri: Mania
vero sine apostemate, nisi forte esset ac-
cidens frenesis) verumtamen non diffe-
runt in aliquo accidente, nisi in fe. quæ

est in frenesi ratione apostematis, sed nō
in mania. Fit autem hæc passio (vt di-
ctū est) ex materia per aduersionem ma-
ximam, & per pessimam corruptionē
ad humores multipliæ genus reducta, q̄
adulsiō non differt ab aduersione facta in
permixtione rationis, nisi secundum ma-
gis & minus. Et q̄ mania nō sit nisi per
aduersionē cholera: vel melancholiæ: Sed
permixtio fit per aduersionem humoris
cuiuscunq;. Et si fiat ex aduersione chole-
ra: apparet cōtētiō velox, et quies post
ipsam, & nō recordatur eius longo tem-
pore, et agitatio, & furor, et instabilitas.
Sed si sit ex aduersione melācholiæ: fit cū
quiete spacio longo: deinde mouetur, &
loquitur, & incipit ratiocinari cogitans.
Postea iterum quiescit, & iterum moue-
tur, neq; potest silere a clamore & locu-
tione: & non est extenuatio corporis ve-
hementior, & color ad nigredinem decli-
uior, & somnia deteriora q̄ in ea, quæ de
cholera: & euomit quādoq; aliquid ace-
tosum: quod proiectum super terrā vel
arenam bullit, & est de genere veneno-
rum. Mania etiam canina quandoq; fit
ex retentione pessimorū menstruorum,
sicut accidit mulieribus frequēter: quare
inflantur ventres earum vehementissi-
me, & cum dolore maximo: & loquun-
tur quādoq; de futuris & mirabilibus
mundi, & quādoq; literaliter licet do-
ctæ non fuerint, adeo vt videantur pos-
sessæ a dæmone. Quādoq; fit etiam ex
retētiōe spermatis superflua: sicut acci-
dit monachis et viduis: quia sperma diu
retentum conuertitur per aduersionem in
venenum, a quo sumi eleuantur ad cere-
brū, qui mouet ipsum ad diuersam ima-
ginationem, æstimationem, & memora-
tionē: & ijdem sumi quādoq; spargun-
tur per musculos, qui sunt in ambitu cor-
poris totius, & per membra nervosa. Ia-
certosa: & inducunt frigus rigore & tre-
morem absq; fe. & fastidium, & dolore

capitis & vigilias & tenebrositates oculorum & similia. Et fiunt hæc quibusdā hominibus omni tempore, & quibusdā periodice, prout materia cursum in corpore suscipit: & tunc creditur esse a dæmonibus, qui affligunt corpora tēpore sacro: quod licet secundum veritatem et fidem sit possibile: sapius tamē fit a materia prædicta: quare magis accidit mulieribus q̄ viris, & viduis q̄ nubentibus, & monachis q̄ secularibus, & pauperibus in sole multum laborantibus vtenibus allio, sinap̄. cep̄. q̄ diuitibus bonis cibis vtenibus, & necessaria pro medicinis & remedijs habentibus: quæ non fi erent, si semper a dæmonio fierent: cum dæmonium curam naturalem non recipiat, neq; distinctionē alium personarū.

¶ Et cura manix, si sit de cholera adusta, est vt primo locetur in loco obscuro, & sit intentio tua plus in humectando q̄ in infrigido cum medicinis & balneis aquæ dulcis, & cibis & potibus dicendis: vt vult Auicē. ca. præsentī. Dein de propter inobedientiam & instabilitatem infirmi incipiendum est a rebus inducētibus somnum dictis capitulo de vigilijs, & ca. de frenesi & fricationibus pedum, crurum: vt materia attrahatur ad inferiora. vnde Hippo. 6. partic. aph. Maniacis, varicibus, et hæmorrhoidibus innatis sit manix solutio. Deinde abradatur capilli, & vngatur caput cū oleo nenupharis, & oleo de papauere mixtis cum succo lactuce: in quo sit aliquid acetī, vel cum oleo viol. & oleo ros. & populeon in modico aceti fricentur pedes & crura cū aqua decoctionis foliorum salicis, florum camomillæ ro. rub. vel cum aqua decoctionis lactucarum, corricis papaueris, meliloti, ros. rub. Fomentē caput eorum cum lacte mulieris & proprie lactantis puellam: cum sit frigidus, vel cū lacte papaueris albi. Deinde post quietem inductā aperiat saphena pe-

dis sinistri intus in talo, vt prouocentur menstrua, & hæmorrhoides: deinde digeratur materia adusta cū syrupo de borragine & huglossa dicto superius ca. de melancholia: & purgetur cū pillulis dictis ibidem. Quod si furorem & agitationem materix ex medicina forti timeris: purgetur cum decoctione hac, quæ sic fit. ℞. sene. epi. añ. 3. i. prunorum 3. 2. bulliantur in lib. i. aquæ coletur, & cum 3. 5. vel 6. illius dissoluatur. 3. 2. mane & detur infirmo ante diem: deinde fortias. Recipe mirobalanorum indorum. 3. i. f. sene. epithy. añ. 3. f. prunorum numero 10. pistentur, & bulliantur in aqua & colet & cū quinq; vel sex. 3. illius aquæ dissoluatur. 3. i. manæ syrup. viol. & de ē ante diem. Fiat a principio omī die vel duobus dieb; semel clystere, quod sic fit. ℞. sene. epi. añ. 3. f. polypodij 3. 2. bletæ. m. i. pistentur, & bulliantur in aqua, & in libra. i. aquæ illius dissoluatur 3. 2. mannæ & 3. iij. olei viol. & 3. f. salis coletur, & tepidum supponatur: Potetur vsque ad finē furoris aqua, quæ sic fit, non cum alia re. ℞. nenuph. seminis lactucarū. añ. 3. i. papaueris. 3. f. zuccari ros. 3. iij. prunorum siccorū 3. quatuor ordei 3. i. & f. bulliātur in sex lib. aquæ: donec quinq; remanserint: coletur, & detur patienti semper hora potationis. Ad idem. ℞. granorum granatorum dulcium & musorum. añ. 3. 2. papaueris. 3. f. lactucæ 3. i. zuccari. 3. 2. prunotū siccorum 3. iij. bulliantur in 6. lib. aquæ: donec quinta pars consumatur. coletur, & administretur. Ad idem. ℞. ordei 3. iij. prunorum siccorum 3. quatuor, papaueris 3. i. zuccari 3. 2. bulliantur in octo lib. aquæ: donec sexta pars sit consumpta, coletur & referuetur. Et scias, q̄ isti potus (vt aslimo) conuenientes sunt, vt plurimum in frenesi quacūq;. Cibetur ex lactucis, portulacis conditis cū agrestis vel vino granatorum, vel etiam cum pultrib; ex or

Tractatus primus

deo, farre, vel auena factis conditis cū eisde rebus, vel si sit debilis: vratur car nibus pullorum, hœdorꝝ, agnorꝝ annali um coctis cum herbis prædictis & cōdi tis cū p̄dictis vel cū berberis, Non vta tur carnibꝝ syluestribꝝ, neqꝫ bouis, neqꝫ fumigatis, neqꝫ multū salis: vratur pi scibus bonis recentibus non salitis, Cu ra manie quæ sit de melâcholia adusta: est penitus eadē cum prædicta, nisi qꝫ in somniferis oportet multiplicare papa uer & nenuphar. Et si necesse est pro pter vigilias & furorē, addat vnū gra nū opij: mūdetur cū decoctiōe, q̄ sic fit ʒss. mirobalanorꝝ indorꝝ. ʒi. ellebori ni gri. ʒ. i. opij sene, epithy. ana. ʒ. f. pisten tur & bulliantur in aqua, coletur & in ʒ. quatuor illius decoctiōis dissoluatur: ʒ. i. medullæ cassiæ, & coletur & derur ante diem. Vltimo fiat cauterium in summitate capitis: q̄niam etiā res cōse rēs excellētē. ¶ Cura mania propter retentionē mēstruorꝝ vel spermatis est, vt prouocētur mēstrua sicut dicitur ca pitulo suo: q̄niam ad retentionē sperma tis corrupti congregati in matrice con fert prouocatio eius, & ordinetur si est possibile vt nubat: quia optimum est. Quod si nubere noluerit: fricat obstetriz vuluā fortiter, & vsqꝫ ad dolorē cū di gito inuoloto panno lineo iuncto oleo nardino, cū q̄ camphora vel muschus sint dissoluta, Bibat potū supradictū, et nō aliū: et cibis supradictis vetatur. Cō edat sæpe diapapauer, muschū cum zuccaro ros. Et post illud bibat aquā frigidam, Hæc em̄ extinguūt sperma tis pruritinem, & mēstrui feruorē. Et ex rebus ad illud vehemēter cōferenti bus, est exiccatio corporis assidua cum vigilijs, laboribus & abstinentia a cibis sanguinē multiplicātibꝝ: velut sunt car nes & vinū. Modus nobilis & bonus in hoc casu ad prouocandum mēstrua et educēdū sperma retentiū, est talis, & va

let in suffocatione matricis, & in omni casu, in quo passionis causa cōtrahitur ex mēstruorꝝ retētiōe, vel ex sperma te corrupto quoquomō. Supponatur cā dela inuoluta cū petia bene imbibita in oleo nardino vel de lilio, in quo dissolu ta sint tria grana muschi vel ambræ: et ligetur petia ad crura cōtra cādela m cū filo duplicato, & per mittat filū pende re extra vuluam. Vt cādela extrahi pos sit ad voluntatem patientis. Et hæc can dela continet quasi vsqꝫ ad perfectam curam intra vuluam deferať. Similiter & cū ea os matricis frequenter & forti ter fricet. Trahet em̄ matricē ad inferi ora, & sperma corruptū eicit, & q̄nqꝫ insensibiliter resoluit. Fiar electuariū in hoc casu optimū. ʒss. agni castri. ʒ. ʒ. mir tili. ʒ. f. terant perfecte, et non cribretur: incorporētur cum melle crudo non de spumato, & fiat electuariū. deť mane & sero, cum itur dormitū ad modū nu cis magnæ, & post bibatur aliquid vini lymphati secūdm medietatē. Exiccat nāqꝫ mēstruum & sperma a propieta re, & virgæ erectionem prohibet, et desiderium ad coitum diminuit, & pol lutionē custodit nocturnā: nec est ei me dicina similis in hoc. Et dixerunt excel len. qꝫ si adiungat. ʒ. f. peonia in hoc electuario: mirabiliter operatur contra epilepsiā. Et sufficiat hæc de methodo.

Emperica. In oibus p̄dictis passioni bus & proprie in mania, p̄mixtiōe rōnis, et melâcholia confert plurimum ipinguare corpꝫ cum pisci bus recētibꝝ, petrosifis, aut lacte dulci re cētī vehemēter calido ex mamillis, dā do ex ipso aliqd om̄i die in ieiuno p̄ se, vel cū mica panis sine cibo alio oino, nisi fortasse cū modico mellis vel zuc cari misceat, q̄niam prohibet ipsum in stomacho coagulari. I. ac em̄ comparē secū mel vel zuccarꝝ, & nullum cibū alium: vt dicit Gale., de inge. sanitatis

ca. 2. Conest medicus humectare cerebrum cum balneis, & ambrocis, & vnguentis humectantibus, & cibis & potibus, & somno & quiete in quibus sit studium non modicum. Conetur etiam pro posse confortare splenem, et exopilare, ut bene attrahat melancholiam corporis: pro ut dicemus ca. de opilatione splenis: & cum emplastro Gale. experto quod scribit. 11. de inge. sanitatis. Item, radicem caparis partes. 2. ablinchij partem. 1. bulliat diu in oxymelle (quillitico, pistent perfecte, & conficiatur cum eodem. Et potest addi oleum rutæ, & lauri, vel spicæ, vel de lilio: & extendatur super periam & applicetur spleni actu calido, præmissis euacuationibus vniuersalibus. Confortetur cor cum epithymatibus, electuarijs cordialibus famosis. Item anethum habet virtutem ugandi fantasmatum accedentia in istis passionibus, si locus ipso steretur, & similiter hypericon quoque modo.

Canones. Quando fit feboromia in melancholia, mania, vel permixtione rationis, inspiciatur san. qui exit: quia si sit grossus, niger: dimittatur egredi, si subtilis, clarus, rubeus, ilico restringatur. Qui canon licet sit generalis in omni passione facta ex grossis humoribus: verumtamen est hic maxime necessarius: quoniam huiusmodi san. lucidus, sicut licet frenum melancholiam: quare ex ipsius educatione maximum fieret periculum. Item in medicinis fortibus & ducetibus materias grossas lenientia non derelinquas: ut sunt pruna, thamarindi, viol. & manna. quoniam operationem solutionis beatificant: ut dicit Mes. præsentia ca. Item in omni passione cerebri & proprie de materia fixa & immobili docet Mes. in præsentia ca. autoritate Gale. ut patiens deuter acuta, ut est piper, sinapis, cepe, & urinam superfluere facientia: quoniam subtile egreditur, & remanet grossum præficiens lapidis essentiam.

Prognosticatio. Dicit Hipp. 6. part. aph. maniacis & melancholicis, variationibus, & hæmorrhoidibus innatis soluit ægritudinem, super siue fiat per se siue per artem: & ad hoc provocatio confert menstruum. Item ibidem, in percussione in caput stupor aut desipientia, malum. Item desipientia cum risu quodam factæ securiores: quod vero cum tristitia molestæ super, & difficile curabiles propter grossitatem materiam. Item 7. particula apho. In mania dysenteria superueniens, aut hydrops, aut extasis, bonum, quia per dysenteriam, materiam euacuat, sed per hydropolim eius alteratio, per extasim sit eius diuersio a cerebro. Item 5. parti. mulieribus, quibus ad mamillas san. conuertitur, maniam significat: & proprie si san. sit grossus, niger: qui in lac non posset conuertere: ut dicit ibidem commentator. Item permixtio rationis veniens in se, cum virtute debili & ante signa digestionis, mortale: ecouerso salubre. Item maniacis, permixtis, & melancholicis hydrops superueniens per se vel per artem, soluit ægritudinem. Item dicit Hipp. 6. part. apho. Si timor et pusillanimitas multum tempus habuerint, melancholicum perficiunt.

De Epilepsia. Ca. VIII.

Epilepsia est passio capitis diminuens sensum et motum corporis totius, cum spasmo vniuersali, propter opilationem ventriculorum cerebri vel paniculorum eius. Et dicitur epilepsia. 1. superioris membrorum lesio, et dicitur a quibusdam hierasmo. 1. sacra passio: quia sacra membra et animata occupat, dicitur etiam quoniam passio infantilis: quia ut plurimum infantibus accidit. Est autem maior et minor. Maior quodammodo ventriculi cerebri & proprie anteriores opilatur: & isti hora paroxysmi subito cadunt, & torquentur os & facies cum tumore ceruicis & tremore totius corporis, et detumescunt constrictione: imo

Tractatus primus

quādoq; vrina & sterus & sperma inuoluntarie emittuntur propter maximā angustiam & præfocationē. Minor vero, cū ventriculi cerebri non omnino opulantur: & isti quandoq; cadunt hora paroxysmi, & quandoq; non sicut & scoto misam patientes: neq; spuma in eis apparet magna. Et quæcūq; eorum sit, quandoq; attingit semel in die, quādoq; semel in mense, quandoq; semel in anno. Habet enim periodos, sicut & fe. materia: cum omnis periodus sit a materia: vt di. Gale. 2. de feb. Sed generaliter quanto tardius affligit, tanto tardius, & difficius curatur: quia materiam grossam adhærentem significat. Sed quanto frequentius affligit, tanto citius interficit, propter virtutis debilitationem & cordis suffocationē. Tres habet causas principales, scilicet defectum caloris naturalis tam influentis q̄ innati, & superflium abundantiam, & meatuum angustationem. Tres præterea sunt species secundum triplicem diuersitatem locorum: in quibus materia continetur: quia materia quandoq; continetur in cerebro vel in panniculis ipsius, nec venit aliunde: quapropter & proprie tūc dicitur epilepsia: & isti habent continuam capitis gravitatem, & sensuum omnium obscuracionem, & adueniente paroxismo, casum non præsentunt, propter eius festinantiam: neq; postea recordantur propter cerebri læsionem. Quandoq; vero materia continetur in stomacho & intestinis vel alijs visceribus, non quidem in concavitate eorum (vt quidam crediderūt) sed in venis, nervis, & arterijs, per quorū meatus materia bulliens rapitur sursum sub sumali euaporatione ad cerebrum: & tunc dicitur analepsia: & isti laborāt repletionem stomachi, & fastidio & indigestione, & casum præsentunt: & postea recordantur: & accedit ante casum tremor cordis, nauseæ, & quandoq; vomiti-

tus, & cōtractio siue gravitas inferioris labij propter continuitatem tunicarum labij eiusdem cum lingua & stomacho interiori: q̄ si materia sit in intestinis, sit quādoq; fluxus vētris hora illa. Si vero in vris vrialibus, emittitur vrina. Si in vas. spermaticis, emittitur sperma præter voluntatem. Quandoq; vero materia continetur in extremitatibus mēbrozum, vt pote coxa, vel cture, vel manibus, vel adiutorio, vel in musculis qui sunt in ambitu totius corporis, & tūc dicitur catalepsia. Et isti sentiūt ante paroxysmum aliquid eleuari versus caput, quasi essent formicæ ambulantes, vel summi frigidi ascendētes a mēbro illo: deinde sincopisunt, & cadunt, et sæpe præferuntur a casu, per ligaturā fortem illius membri. Et isti vt plurimum februnt: aq̄ propter fe, sit bullitio et ascensus materię ad caput: neq; sine fe. videntur euenire. Et quæcūq; istorum trium specierū fuerit, proprietatem quando materia cōtinet in capite vel sit a sang. vel flegmate, vel melācholia: raro autem vel nunq̄ sit a cholera: quia cholera sua subtilitate non pōt vias oppilare. Si sit a sanguine: apparet inflatio venarū, quindiges in collo, et dispositio quasi præfocatiua, salua dulcis sine manifesta causa, et rubedo cum quadam fuscedine in oculis et facie, et vapor sentitur calidus in capite: et in ea est stoliditas cum risu, et eius vrina est valde grossa, et rubea. Et si sit a flegmate: apparet in vrina quoddam simile vitro liquefacto & salua spumosa, grossa, clara, et pavor, et albedo oculorū et corporis totius, similiter et pigritia, et obliuio, et aliquñ vomit⁹ flegmaticus, et ætas et regio et tempus et cibi antecessantes flegmatici quoquomodo. Et si sit a melancholia, apparet vrina glauca subtilis cum circulo granuloso, et permixtio rationis diuturna non solum apud horam paroxysmi, et color oculorum et

faciei fuscus siue plumbeus, & siccitas linguæ, & antecessio ciborum melancholicorum, vt caulium & lentium & carniū salutarum. Et si sit a cholera, qđ esse non poterit, nisi adusta veneno fuerit vrina citrina, subtilis vehemēter et color faciei citrin⁹ subtilis vehemēter, & salua amara, stoliditas cum furia, siccitas linguæ cum siti, similiter & fortis afflictio hora paroxysmi, & eius paroxysmus spissior: sed breuior aliorū.

Methodus. Cura epilepsię in comuni est inducere se. cū vsu electuarij anacardini, quod ponet capitulo de apoplexia, vel aureæ alexandrinæ, vel thedoricæ anacardini, vel diamargariton, & omnium calidorū, & proprie se. quartanam vel quotidianam: quia vt dicit Auicē, hæc feb. propter chronicitatem suæ afflictionis digerit materias grossas: & alteratio sex rerum non naturalium ad caliditatem & siccitatem. Vnde Hippo. epileptico- rum iuuenibus, &c. Nullus epilepticorū vtatur vino pro potu, nisi plurimū lymphato: quia eleuat a proprietate oēs su- perfluitates ad caput: sed bibat hydromel factū ex aquæ lib. 3. & 3. 3. mellis coctis perfecte & colatis. Carnes assæ magis cōpetunt eis, q̄ elixæ & proprie cōditæ cū speciebus, præterq̄ in die purgationis: quia illa die debet dari elixæ: quia sic magis vētrem p̄parant, & venositatem materiæ purgandæ adæ- quāt. Vtatur sæpe pro cibo cerebro aui- um, pullos, agnos, annaliū assatorū proprie: quia cerebrum cōfortant: vt di- cit Auer. .s. coll. Caueat tamē, ne sto- machus noceatur: quia sunt difficilis di- gestiois rōe viscositatis. Caueat ab alijs, sinap̄, & oib⁹ acutis: quia faciunt materias effumare ad caput: nisi fortal- sis vsu moderato, vel cum cibo sicco, similiter & a leguminibus & brodtis piperatis, & potu & cibo superfluis. Si-

militer a timore, tremore, tonitruo: qñ- am ledunt caput: exercitetur fortiter sto- macho ieiuno præmissa stercoꝝ expur- gatione: fiāt fricationes fortes a pecto- re inferius, & pectinatio capitis, & eius calefactio fortis in ieiuno. Caueat sum- mopere a coitu: quoniam maxime cere- brum debilitat: spiritus resoluendo, & cerebrum colligando, & demum infri- gidando membra nisi fuerit epilepsia causata ex retentione spermatis: vt acci- dit virginibus, viduis, & deo deuotis. Si autem a sanguine: fiat cum prædictis a principio flebotomia saphenæ, quæ est intus in talo, vel frequentetur scarifica- tio crurum. Deinde mūderur cum apo- zimate. ℞. man⁹. 3. i. tamar in dorū 3. i. & f. dissoluantur. in 3. s. aquæ decocti- onis prunorum, & detur ante diē. Epi- thymetur caput cū aqua ros. vel oleo ros. mixto cū, alquantulo olei de absin- hio, vel de spica. Comedat lactu. bor- rag. feniculum, cucurbitas, & aquā piso- rum vel cicerum: sed carnes euiter: quia sanguinem multiplicant, nisi virtus de- bilitaretur: pro condimento ciborum su- orum vtatur agresta, vel vino grana- torum, sed non aceto. Bibat hydromel prædictum, vel aquā decoctionis zuc- cari, vel berberis, vel prunorum, vel si sit debilis, vinum album valde lym- phatum. Vltimo post flebotomiam & purgationes frequentes,umat semel in septimana in aurora. 3. f. citriacæ cum 3. 4. aquæ decoctionis peoniæ: & hæc oīa reiterentur roties, donec perfecte curet. Si autem sit a flegmate: quod & sapius cōtingit, purgetur primo frequēter cū pillulis cochis vel fetidis, vel cō hiera- picra, præmissa digestionē cū oxymel- le squillitico vel cōposito, & aqua de- coctionis rerum ducentum syrupi vir- tutem ad caput: vt sunt scicad. peonia, nux muscata, cubebe, cynamomū hy- lopus & rura. Fiāt etiā clystera acuta.

Tractatus primus

Recipe colloquintidæ, cartami, absinthij, hyssopi, agarici, centaureæ, ana. 3. semis, anisi, sivezeos, ana. vnciam vnam: pistantur, & bulliantur cum m. i. bletæ. Post decoctionem coletur, et de colatura accipiatur lib. i. et olei vnciæ quatuor mellis vnciæ tres, salis 3. 2. Bulliant hæc iterum, & colentur, & tepida injiciantur. Confortetur caput nasum cum marciatõ confirmando. Fiant sternutationes cum elleboro vel pipere & gargarismus cum oxymel, et sinap. & masticatio ex pyetro, pipere ligo, cubebe, partem vnam, macis partes duas facta ex eis forma pillularum. Vltimo fiat cauterium in vertice cranei, vel causticatio cum cantharidibus, & sinapi super collo. Vtatur carnibus bonis conditis cum cinamomo, galanga, cardamomo, pipere ligo, zedoaria & croco. Reiterentur hæc roties, donec curetur. Si vero sit a melancholia: purgetur primo cum geraldogod. vel pillulis fortidis, præmissa digestionem supradicta: & fiat clystera sæpius ex istis. ℞. sene, epithymi, añ. 3. f. ellebori nigri. 3. iij. centaureæ 3. i. polypodij 3. 2. fumiteræ, bletæ, añ. m. i. olei 3. 4. mellis 3. iij. salis 3. 1. fiat clystere. Fiant fricationes & inunctiones capitis: sicut dictum est de flegmate. Caueat hic epilepticus plus alijs a coitu, & nucibus, & cepis, & porris, a vino vero non sicut alij: quia cerebrum humectat. Si sit a cholera venenosa: purgetur primo cum pillulis istis. ℞. sene, epithymi, scamoniæ ana. 3. i. aloes. 3. iij. confice cum succo polypodij, vel vino decoctionis ellebori nigri: de quibus detur a 3. i. vsque ad 3. 2. fero cum itur ad lectum sine coena. Confortetur stomachus & caput cum oleo ros. Dietetur omnino, sicut dictum est de epilepsia de sanguine. Cura analepsia atque catalepsia est fere vna & eadem: quoniam earum utraque materia non est cerebro, sed solus vapor venenosus: quare

oportet, ut statim a principio materia purgetur. Post hoc vero fiat vesificatio, vel cauterium super locum, a quo infirmus sentit vaporem eleuari, & profundetur valde, si est possibile, ita ut comprehendatur intra cauterium totus locus infectus: quia materiam emundat: et cum fasciis ligetur fortiter idem membrum hora paroxysmi: ne fumi ascendant: in alijs autem fiat omnino, sicut in causa flegmatica.

Emperica. Refert Mesue presenti ca. autoritate Alexand. quod pillulae quibus nullae sunt fortiores, ad epilepsiam flegmaticam, & arthriticam, & podagram sunt istae. ℞. aloes, colloquintidæ, scamonæ, bdellij, ellebori nigri, corticis gummi ederae añ. partem. i. euforbij, baurach, añ. partem. f. confice cum succo caulium. Dos. est a 3. i. vsque ad 3. 2. post digestionem & preparationem completam. ¶ Accidit autem nonnunquam epilepsia a vermibus existentibus in intestinis, transmittentibus fumos pessimos ad cerebrum. Et signa eius sunt signa vermium, scilicet concauitas oculorum, & odor oris foetidus, & fricationarium, & obtenebratio faciei, & multitudo cibi cum habitudine macra & stercore modico: & fit plurimum pueris & gulosis. Et cura eius est interimere vermes: & postea eos educere: sicut dicitur cap. de colica. parag. de vermibus. Quandoque vero fit ex sumptione cibi venenosi, vel morsu canis rabidi. Et de ipsis scribemus tractatu de venenis libro secundo, si deus voluerit. Fit et quandoque propter cordis & cerebri & stomachi infectionem ex aere corrupto, & de ipso dicemus ca. de febribus epidemial. Sciendum est, quod epilepsia alia debetur cura hora paroxysmi, & ante paroxysmum. Nam hora paroxysmi secun-

cum communiter operantes, in omni specie epilepsiæ conuenit, quod æger sit in loco obscuro & sicco, sit ieiunus, si horam præuenerit, & habeat emunctoria omnia munda, aperta: & leuetur caput sursum, ut liberior sit inspiratio: extergatur spuma: & aperiantur dentes cum cultello, ut liberior sit inspiratio: & ligentur extrema, & proprie in catalepsia. Fiat sternutatio cum conditi vel pipere vel castoreo vel euforbio: & proprie in catalepsia & analepsia. Sed non fiat fricatio super caput in principio paroxysmi: neque sternutatio neque approximatio odoramentorum calidorum, sed potius in fine. Et si paroxysmus diu durauerit: fiat clystere acutum dictum capiti de lethargia, & ruptorium approximetur capiti dictum ibidem. Postea in fine paroxysmi conueniunt loca resolutiua consumptoria materiam: sicut est odor rutæ agrestis frequentatus, vel puluis rutæ sicæ naribus insufflatus, vel puluis seminis eius, vel succus rutæ viridis naribus instillatus. Extra horam paroxysmi regatur, sicut in methodo scriptum est. Caueat ab usu caniu caprarum & piscium omnino & caulium: imo epas caprinum vel hircinum comestum vel suffumigatio facta ex galbano & myrrha, vel ungulis caprarum detegunt omnem epilepsiam. Similiter & fungi, si comedantur. Caueat a balneo superfluo: quia neruos molliciat, & cerebrum humectat. Dicitur, quod omnis odor malus lædit cerebrum epileptici præterquam odor rutæ, castorei armoniaci, opposonaci factus usu moderato. Coena eius sit leuior prandio, & semper in fine cibi utatur stypticis: ut piroasso, vel corone &c. & somnum elonget super cibum. Utatur saepe stomacho ieiuno diafene confecto cum pliris arcoticon: quia materias euacuationibus adaptat. Euacuationes vero fiant

cum pillulis & sine coena: quia attrahunt a remotis. Item in cura epilepsiæ non negligantur dicta in cura melancholicæ: quia fere omnes epileptici sunt melancholici, cum in utraque passione materia grossa adhærens viscosa cerebrum occupet. Valer etiam prouocatio hæmorrhoidæ in corpore, in quo esse consueuerunt, & steboromia cephalicæ: si sanguis sit in causa peccato qualitatis & quantitatis: similiter & prouocatio mestrurorum, & cauterisatio in summitate capitis ubi sunt commissuræ, vel in occipitio sub duobus cornibus, vel supra cornua frontis. Summo opere omnis epilepticus abstineat a comestione apij & eius fumo, specialiter et pueri & mulieres lactantes: quia de proprietate epilepsiam incitat et inducit in pueris: similiter et comestio superflua petrosilini et trifolij. Sed dicitur e contra: quod cum suspensione radicum peoniarum ad collum eius, et cum subfumigatio facta ex semine eius, et cum sumptione 3. 2. usque ad iij. omni die mane seminis eius: et cum potione decoctionis aquæ radicum eius, in qua ponitur mel: plurimi visi sunt sanati, & proprie infantes & pueri, quorum ætas erat infra annos septem. Scias etiam, quod usus rutæ & siveleos in aqua & vino multum conferunt, & puluis celidoniae cum zuccaro comestus. Præterea si sumatur 3. 1. & 6. pulueris celidoniae cum 3. 2. aquæ celidoniae, & cum 3. 2. aqua decoctionis mirrillorum & piperis longi, auxiliatur specialiter post purgationem. Syrupus digerens a proprietate superfluitates in capite contentas, est syrupus de sticados: quem dicemus ca. de debilitate visus. Antem autem syrupos faciendi pro capite vel membro corporis quocumque, dicemus cap. 2. cum de fe. differemus. Hæc ergo sunt, quæ confecti epilepsiæ sua cōferre. A proprietate præterea reperiunt quædā cōferre, ut cerebrum vulpis

Tractatus primus

infantibus saepe datū: facit em̄, vt nunq̄
fiant epileptici. Item ossa hoīs, & pro-
prie cranei puluerisata & cōbusta sum-
pta stomacho ieiuno cum vino decocti-
onis peoniae & cubebarum profunt. Itē
odorare tutā & castoreum post purga-
tiones cōfert a proprietate: vt dicit Mes.
in suo de appropriatis ca. præsenti. Item
pyrettrum cōditum, quod sit sicut zin-
conditum a proprietate confert, si sum-
tur omni die. Similiter tiriaca, & mithri-
datum, & theodorici, & proprie post
purgationes. Item vesica apri cum tota
vrina exiccetur in furno, & detur ex ea
omni die in mane cum oxymelle ad fa-
bā quantitatem, sanat epilepsiam: vt di-
cit Mes. eodem ca. autoritate Alexan-
dri, qui se dicit expertum fuisse in quo-
dam curato vsq; ad tertiam diem. Simi-
liter & hīrūdines comestæ vel ad fumū
assatæ et comestæ in ieiuno: vt dicitur ibi-
dem. Item coagulum leporis cum aceto
bibitum per triginta dies in matutinis
ad modum orobi, vel in cibo mixtum.
Item puluis iecoris milui dicit̄ esse sum-
mum remedium. Item puluis factus ex
castoreo, opponaco, anthimonio, armo-
niaco gūmi & san. dra. datus quēcunq;
curat, & a pluribus est expertus. Itē scin-
de ranam per medium dorsi, & extrahe
eius epar, & inuolue eius epar in folio
caulis, & combure in sole in testa noua
bene obturata, & puluerem illum da bi-
bere cum optimo vino epileptico, dum
patitur: quoniam plurimi dicunt se libe-
ratos. Quod si vna vice nō curetur: reite-
retur idem de alia rana, donec liberetur.
Item lapis chelidonium ruffus ligatus in
panno lineo, & positus sub aſſella fini-
ſtra sanat maniacos et lunaticos om̄i-
no. Item si puluis rutæ siccae insufflet̄ na-
ribus hora paroxysmi, vel subsumige-
tur cum asaſſetam surget. Item testiculi
arietini comesti mirabilis dicuntur iuua-
menti. In omni præterea specie epilepsie

confert vsus electuarij de peonia, & spe-
cialiter post purgationem: quod sic fit.
℞. peonia 3. i. masticis, spicæ, croci, co-
ralli rubei, margaritarum non perfora-
tarum, masticis añ. 3. f. mirtillorum. 3. i.
& f. cynamomi, nucis muscatæ gariofi-
lorum, folij zinz. piperis lōgi, cardamo-
ni, nucis indicæ añ. 3. i. liquiritiæ raf. 3. i.
anacardi 3. vnam & f. muschi, ambrae
ana grana sex, zuccari quod sufficit in
æstate, & mellis despumati in hyeme,
valet epilepsia, paralysī, spasmus de re-
pletione, & omni morbo de causa frigi-
da. Et remouet dolorē vētris ex ventosi-
tate: memoriā reparat: datur in auro-
ra ad modum nucis: et post illud bibitur
hydromel, vel vinum lymphatum: po-
test etiam dari sero, cū itur dormitum.

Canones. Epileptici dicuntur lunatici:
quia eorum perīodus secun-
dum luminis in luna varietatem proce-
dit: quare fit in quibusdā in luminis defe-
ctu in luna: quia tunc humiditas male re-
gitur, quibus luna ex suā proprietate do-
minatur per lumen & morum. Quibus-
dam vero in plenilunio, propter humores
frigidorum exuberantiā. Alijs in nouilū-
nio, propter earum agitationē post quie-
tem diurnā. Quæ igitur est ex sangui-
ne, exacerbatur vt plurimum in plenilū-
nio, quæ vero ex ſlegmatē in nouilunio:
quæ ex melancholia, in lunæ defectu.
Sciendum præterea, qd in epilepsia sum-
mum remedium est cauterium in capi-
te post euacuationes particulares: Sed in
catalepsia cauterium in membro, a quo
vapor eleuatur. Sed in analepsia, prouo-
catio hæmorrhoidarum & mēstruorum,
& fluxus ventris debitus quacūq; die.
Si epilepsia acciderit puero lactenti: to-
tū regimen attribuat̄ nutrici: quo pro-
pter his herbis vtatur, scilicet hyſſopo. ſe-
neculo: & regatur ex cibis calidis siccis
quodāmodo. Quare si fuerint cacochy-
mica vel aplectorica, purgetur medici-

nis supradictis, donec virtus regiminis ex lacte transeat in foetum. In epilepsia præterea fit spasmus vniuersalis totius corporis: quia cerebrum sentiens sensatione naturali: licet nō sentiat sensu animali, læsionem contingentem propter opilationem vetriculorum eius, contrahitur in seipsum, vt materias exprimat a se: quapropter & omnes nervi necessarii contrahuntur, quorum est principium: & sic cadit patiens, cuius simile quodam modo reperitur in sternutatione: propter quod Auicenna dicit, qd sternutatio est epilepsia debilis: Epilepsia vero est quasi sternutatio fortis. In apoplexia vero nō fit spasmus, sed mollificatio totius corporis propter opilationem perfectam, adeo vt cerebrum contrahi in se non possit, & propter eius læsionem fortem cerebrum resistere non attemptet. Item in cura epilepsie quatuor dispositionibus oportet succurrere: paupertati caloris naturalis: superfluitatum multitudini, emunctio- riorum capitis opilationibus: & meatuum sanguinis & spiritus coartationibus.

Prognosticatio. Si epilepsia accedit ante pubertatem in masculino, vel ante menstruum eruptionem in foemella, & non soluitur beneficio medici vel naturæ in viro circa 25. annum, & in muliere circa mēstruorum primam apparitionem: nunq̃ de cætero curatur: Vnde Hippo. 3. par. aph. Quæcunq̃ vero permanent pueris &c. Item epileptici frequenter cadūt in paralytim & stuporem membrorum, propter depauperationem spiritus, & opilationem originis neruorum: quare considera dispositionem membrorum, vt ipsa rectiffices cum balneis calidis aromaticis, & vnguentis marciaton arragon & dialtea. Item quandoq̃ sub epilepticorum lingua apparēt venæ virides vergentes in colorem liuidum: quatum apertio remo-

uet inueteratam epilepsiam. Item si mulier impregnetur aduenit epilepsia, sicut euacuato cito soluitur. Item si epileptico superuenerit morphea alba, signum est curationis. Si epilepticus non recordatur post paroxysmū, significat fortē ægritudinē, a qua curari non potest. Item si infans natus cum epilepsia se expurgauerit, & multas superfluitates aquosas expulerit: significat curationem: si autem contrarium. Item si foetus cōcipiatur tempore menstruum, & fiat epilepticus, nunq̃ sanabitur: quia causa est ex principio generationis & fixa. Item si vis scire, quādo epilepticus sit curatus perfectē: subsumiga ipsum cum cornibus caprarum: & si non cadit, curatus est: si cadit, nō est curatus. Item epilepsia ex toto genere est difficilis curationis, & proprie inueterata: licet infirmus obediat, et me dicus recte opere, & necessaria extrinseca sufficiant: quare ab ipsis fugiendum est. Cuius causam puto: quia epilepsia vt plurimum est ex generatione, sicut et lepra: vt dicit Auerrois 4. colliger de lepra. Item Hippo. 5. parti. aph. Epilepsie quibus ante iuventutem nascuntur mutationem habēt: quibus vero 25. annorum fiunt, plerūq̃ commoriuntur. Alij tamē dicunt post annos 35. Hippo. intellexisse.

De apoplexia. Cap. IX.

Apoplexia est priuatio sensus & motus in corpore toto cum mollificatione membrorum propter opilationem omnium vetriculorum cerebri, & meatuum spiritus sensibilis & motui & cauernositatum eius. Est autē duplex secundum Hippo. 2. parti. aph. scilicet maior & minor. Maior quidem quando opilatio est perfecta: & tales nō sentiunt omnino, etiam cum punguntur: & anhelitus est cum angustia maxima, & spuma ante os: imo quandoq̃ nullus apparet anhelitus. Minor est: cum opila-

Tractatus primus

rio prædicta non est ex toto vltimata, neq; perfecta: & isti non priuati omni no sensu nec motu: sed est in eis angustia, & anhelitus est paucus, quandoq; diuersi absq; ordine, ita vt fortassis intercipiatur omnino: quare fit passio timorosa, & quandoq; diuersus cum ordine bono & sufficienti anhelitu: & aptis oculis nihil vident quadoq;, & quando que aliquid vidēt: sed loqui nō possunt. Sed secundū Gale, in cōmento eiusdem aphorismi, sunt tres species eius, scilicet maior & minor & media: verū tamen huiusmodi diuisio est eadē cū priori: quia minorē subdiuidit in duas. Fit autē apoplexia ex sanguine: & hoc est raro. Fit ex flegmate, & hoc vt plurimū. Et si fiat a sanguine: apparet rubedo maxillarū & faciei, & dispositio repleta quasi præfocatiua cū apertione venarū guindēgi in collo. Et quadoq; apparet facies nigra vel plumbea, propter sang. conculcationē et mortificationē caloris. Et si fuerit a flegmate, apparet mollificatio corporis, & albedo squallida cutis, & multitudo muschi natiū, & sputi linguę vel oris. Sunt præterea .12. numero passionēs in accidētibus multū similes, adeo vt cōmuniter operātes in ipsarū cognitiōe: similiter et cura sepius vacillēt: q̄ sunt. Subeth, Stupor, Cōgelatio, Somnolōgia, Lethargia, Epilepsia, Apoplexia, Paralysis, & obdormitatio, Spasmus, Syncopis, et suffocatio matricis: quarū differentiā essentialē, q̄ scire desiderāt, descriptionē ipsarū ī proprijs capitulis requirāt: differentiā tamē accidentalē hic prout colligifex diuersis autorib; vt poterim; aliq̄liter denotemus. Conueniunt enim omnes in hoc, q̄ significant priuationē sensus & motus: sed differunt ex alio: quia quidam significant priuationem sensus & motus in corpore toto, velut Apoplexia: lethargia: subeth. syncopis. suffocatio matricis: epilepsia: stupor: cō-

gelatio: quādam veto in parte corporis: vt paralysis: spasmus: obdormitatio. Item quidam ex eis sunt morbi tantum, vt lethargia: epilepsia: paralysis: apoplexia: quādam vero accidentia tantū: vt obdormitatio, syncopis: suffocatio matricis: quādam vero morbi quādoq;, & accidentia quādoq;: vt subeth sine lethargia, & subeth cum lethargia. Item quādam durant breui tempore: vt subeth, epilepsia, apoplexia: quādam plurimum adherēt ex sua specie, vt paralysis. Item quādam vt plurimum fiunt a causa primitiua, vt congelatio, et stupor: quādam a causa antecedente humoralis: vt lethargia, suffocatio matricis, epilepsia, apoplexia: quādam vero vtrōq; modo, vt subeth, paralysis, syncopis. Item quādam ex toto genere sunt præter naturam, vt lethargia, epilepsia: quēdā vero solum aliquo modo, vt somnus longus: quare tūc clarius apparebunt, cū notificationē propria: cum quodlibet describemus. Subeth siue somnus profundus est, cū quis gradatim procedit ad grauitatē capitis & somno lentiam non subito: quare tandē fit dormiens adeo profunde & oculis clausis, vt nullo modo ipsos aperire valeat, nisi vocetur & cōcussus: tunc parū aperit, & ilico claudit: sed si cōfirmetur, nequaquā audit, nec oculos aperit. Accidit autem hæc passio quādoq; a causa antecedente, quādoq; a causa primitiua, verbi gratia, frigiditate & humiditate aeris cōtinentis, vel sumptiōe opij. Fit etiā quāq; sine fe. & tūc est morbus: quāq; cū fe. & tūc accidēs fe. supeniēs: & lethargia nunq̄ est sine hoc accidēte, Stupor vero q̄ & subeth vigilatiua nūcupat, aliud est q̄ subeth dimiruta: quapropter somnus nō adeo est profundus, neq; grauior tanta sicut in subeth. Et quāq; fit a causa humoralis: quāq; a causa extrinseca, verbi grā, frigiditate aeris,

vel esu fungorū, vel casu vel percussione super caput, stupor quāq; sumit pro fornicatione nervorū & musculorū: & tūc idē est qđ obdormitatio. Cōgelatio vero dicitur: cū quis facit quasi dormiens oculis apertis: vt si fuerit sub situ operationis alicuius adueniēte passione, stat fixus sub eodem situ: & fit vt plurimū a causa primitiua vtpote frigiditate aeris vehemēti, nudato capite: quāq; etiā fit a causa humoralī melācholia in cerebro cōtenta. ¶ Somnus longus est somnus naturalis in quali, naturalē excedēs in quanto: sicut accidit cōualecētibus, ebriosis, fatigatis, & quandoq; pueris gulosis. ¶ Lethargia dicitur: cū quis habet apostema frigidū in cerebro, propter quod cōsequit febris cōtinua, lēta: & dolor capitis grauatiū cū pauca pūctura: deinde aduenit eis somnus profund⁹ et subeth: et sic apparet qđ in omī lethargia accidit subeth, & non ecōuerso. ¶ Epilepsia dicitur cū quis cadit per iudicem in terrā, & spasmat̃ secundū oēs articulos, & anhelat cū angustia, et habet spumā ante os: deinde cū p̃transit spasmus, surgit, & sentit, & mouet̃, sicut prius. ¶ Apoplexia dicitur: cū quis facit mollificatus secundū totū corpus sine sensu & motu, sine anhelitu fortassis: quia spiritus aīalis non potest puenire ad aliqua mēbra rōne opilationis viarum, nisi fortasse ad pulmonem & diaphragma: quia vita sine anhelitu subsistere nō potest tēpore longo: verūtamē quādoq; viā pulmonis opilantur: quare fit sine anhelitu oīno, & forte sine pulsu arteriarū perceptibili a medico, & si vocetur nō audit oīno. Et aduenit hęc passio non adeo velociter, sicut epilepsia: neq; adeo pigre, sicut subeth, sed mediocriter secundū festinantia, ita vt patiens præsentiāt eius aduentū: quare quandoq; clamat, & mugit, sicut bos, & tunc cadit sicut mortuus: & non fit color corpo-

ris fœdus, sicut in syncopi, sed liuidus & repletus, si sit a sanguine: vel albus & squalidus, si sit a flegmate: & est sine se, plerumq;: & antecesserunt eam vertigo perdurans, & icotomia, & scdā capitis, & inflatio venarum colli, tenebrositas visus, & tremor in toto corpore, et stridor dentium in somno, & grauitas & pigritia, & vrina eius grossa plena resolutionibus varijs, lactea vel pallida, Accidit etiam sæpius a causa primitiua, verbī gratia, casu vel percussione super caput: similiter & a frigiditate aeris cōtinentis, aut sumptione opij, & accidit apoplexia vt plurimū gulosis & bibulis aut grossis p naturam vel dietam. ¶ Paralysis esse dicitur: cū quis priuatur sensu & motu in aliquo determinato membro, s. brachio, vel crure, vel lingua cū mollificatione illius mēbri, vel in medietate totius corporis, scilicet in toto latere dextro, vel in toto latere sinistro, vel in toto corpore a collo infra, ita vt caput & eius partes sint sanæ. Nam si totū corpus careret sensu & motu cum mollificatione membrorū, necessario foret apoplecticum vel subethicum, quia tunc cor et cerebrum essent læsa, quod in paralyysi non contingit, cum sit passio nervorum et membrorum nervosorum. ¶ Obdormitatio siue stupor siue fornicatio est, cum mēbrum aliquod, puta manus aut pes, acqrit sensum obrysum et motū laboriosum propter malū sitū opilantē nervos deferentes spiritū sensitivū & motivū. ¶ Spasms⁹ vero dicitur contractio mēbri laceriosi, siue sit de plenitudine (vt in corpore plethorico) seu de inanitiōe (vt in corpore hectico et fe. cōtinuis cōsumpto) siue sit ex dolore, vt in punctura nervi. Quod si talis cōtractio nervi fuerit versus flexibilitatē mēbri, ita vt curuet̃ mēbrū, dicitur proprie spasmus si vero fuerit versus inflexibilitatē, ita vt mēbrū stet

Tractatus primus

ensum, dicitur tetanus vel alvusens. Syn-
copis dicitur: cū quis cadit amittens sen-
sum & motum subito cum fædo colore
faciei, propter passionem cordis ex reso-
lutione spirituum plurimorum, vtpote
post laborem vel balneum, vel propter
ipsorum conculcationem atq; permixti-
onem cum fumis capniosis, vt in tristitia
vel stupore: vel propter mordicationem
oris stomachi a re calida venenosa
cui cor compatitur, vt in sumptione ar-
senici, vel calcis viuæ: & est semper sine
se, quantum est de per se. Fit etiam quan-
doq; in se, propter virtutem totalem de-
bilitatam: vnde et se, dicitur syncopalis.
☉ Suffocatio matricis dicitur: quando ma-
trix non potest expellere suas superflui-
tates deorsum propter opilationē: qua-
propter constringitur, vt expellat eas sur-
sum: quare sentit mulier hora illa aliqd
quodammodo eleuari a pectine, vsque
quo perueniat ad os stomachi: & ideo
comprimatur diafragma, & impeditur
anhelitus, & fumi venenosi eleuantur
ad cor, & inducūt syncopim ad cerebrū
& auferunt sensum & motum: propter
quod tunc mulier subito cadit super ter-
rā, sed non deficit ei ratio sua: & fit con-
tortio membrorū, sicut in epilepsia: sed
nō fit spuma ante os, sicut in illa: et quā-
doq; suffocatur & moritur: & quādoq;
resuscitatur post desperationem. Nec ac-
cidit hæc passio, nisi post retentionē sper-
matis aut mēstruorum & in mulieribus
duris & grossis, quarum viæ sunt angus-
tæ: & quādoq; non sentitur eius pulsus,
nec anhelitus omnino.

Methodus. Cum omnis apoplecticus
sit absq; sensu & motu:
non requiritur in cura eius, nisi vt consi-
deretur dispositio faciei & oculorum &
anhelitus, & habitudinis torius corporis:
quæ si repletionem significant cum
abundantia caliditatis in materia, & p
consequēs q; sanguis est in causa: fiat ita

rim flebotomia simul de venis cephalicis
in manib; vel i curuatura brachij: et
tantū de sanguine extrahatur, quārum
possibile fuerit cōstante virtute. Virtus
enim in omni actu medici est consideranda:
maxime cum virtus sit principalissimus
iudex: vt dicitur 9. de inge. sanitatis.
& ventosatio, & omnis diuersio pro posse
ad inferiora. Tunc autem conueniens
videtur, vt eradicatio subsequatur cum
flebotomia venæ rectæ in frōte, vel venarum
magnum grossarum, quæ sunt
sub lingua, vel venarum guind. in collo:
quoniā prohibet suffocationē: postea
vero fiat clystere acutū gradatim, quod
sic fiat. ℞. colloquintidæ, agarici, centaureæ,
se. vrticæ. añ. 3. f. meliloti, scicad. bletæ añ.
M. i. pistentur & bulliantur in aqua:
& de illa aqua accipiatur lib. i. et mellis 3. 4.
olei communis 3. iij. salis 3. f. misceantur,
& iteq; reducuntur ad ignē, & bulliāt,
et cū bullierit, colet, et repidū inijciatur.
Et reiteret hoc clystere, donec sentire cōperit
pariēs aut moueri. Fiant li-
gationes extremorū: fortes, et fricationes
plantarum pedum & manuum aspersæ
cum aceto & sale: & cum sentire magis
cōperit: ponat in ore eius 3. i. vel 3. ii. ele-
ctuarij anacard. quod sic fit autoritate
Ioh. hehemef. & pannis tegatur patiens
yndiquaq;: quoniam calefaciet & suda-
re faciet, & fortassis se. inducet, quæ totā
materiam resoluet. ℞. zinz. pyretti, nigellæ,
costi, piperis longi, piperis nigri, acori, añ. 3. 10.
myrrhæ rutæ siccæ, assæ, aristologiæ,
baccarum lauri, castorei, capsicæ, sinapis,
gentianæ. ana. 3. s. mellis anacard. 3. s.
vngātur res istæ ex oleo nucum: conficiantur cum melle despumato:
est namq; conferens apoplexiæ, paraly-
si, torturæ, spāsmo de repletiōe, & vni-
uersaliter omni morbo frigido. Mel aut
anacard. sic fiat. Tere anacard. & pone
eos in aceto, & dimitte sic duob; diebus

postea coque eos lento igne, donec acetum
 tertia pars sit consumpta: tunc cola cum
 lintheo, & pone fecem in medicina lo-
 co anacardi: & cum aceto pone tantum
 dem mellis, & coque hæc simul vsq; ad
 spissitudinem: & hoc est mel anacardi.
 Vel si præstò nō sit illud, pone in ore in-
 firmi aureæ alexandrinæ. 3. 1. vel tiria-
 cę veteris. 3. 1. vel vnam ficum caricam
 in qua sit aliquid euforbij: et fac, vt ma-
 sticet, & inglutiat perfecte. Illis præterea
 temporibus nequaquā bibat vinū, sed
 hydromel, quod sic fit. ℞. aquæ lib. 1.
 mellis. 3. 1. bulliantur aliquantulum si-
 mul, & colentur. Digra sit tenuis ex ci-
 bis paucum sanguinē generātib;: vt
 sunt olera, farina ordeï, lentes. Non vta-
 tur carnibus, nec iuribus statim. Si vero
 si egra sit in causa: fiat statim a princi-
 pio clystere acutum, quod sic fiat. ℞.
 agari, colloquintidæ, ellebori albi, cen-
 taureæ minoris. añ. 3. f. meliloti, bletæ,
 stica. polij. añ. M. 1. pistentur, & bulliā-
 tur in aqua: colentur, & de colatura il-
 la capiatur lib. 1. & misceat cū. 3. 4. mel.
 & 3. 1. olei. & 3. f. salis. reducat hoc to-
 tū ad ignē iterum: & bulliatur, & cole-
 tur, & tepidū iniiciatur: & reiteretur hoc
 torrens, donec ad sentiendum redierit, et
 loquatur. Nam si per hoc non reuertitur,
 neq; loquitur, neq; mouetur, neq; sen-
 tit, signum est mortale. Fiant fricationes
 post clysteria in pedibus & curibus cū
 sale & aceto vehemēti, vngatur ei ca-
 put ex oleo nardino calido, in quo disso-
 luta sint euforbiū, & castoreo. Fiant
 gargasmatæ cum oxymelle squilliti-
 co, & aqua decoctionis hylopi, ireos,
 sticad. & rutæ. vltimò si antisterpnati-
 ones cū euforbio vel pipere vel ellebo-
 ro albo. Et cū loqui cōperit: ponatur in
 ore eius. 3. 1. & f. electuarij anacardi. p-
 dicti, vel tiriacę veteris: & post illud bi-
 bat aquā mellis supra dictā. Cum autē
 erectus fuerit, & obediens cōsilijs medi-

cina: purgetur sapius cū pillulis cochijis:
 similiter & digeratur materia ante &
 post purgationē in cibis alteratiuis fre-
 quētibus cū aliquibus medicinis dictis ca-
 pitulo de epilepsia: quæ dicētur capitu-
 lo de paralyti. Vt aut carnibus hædonæ,
 pullorū, & bibat hydromel: sed vinum
 nullo modo, nisi virtus sit debilis: tunc
 bibat vinū albū debile lymphatū. In
 fine vero fiāt cauteria diuersa cū ferro
 vel cantharidibus: vinū qdem in cōmis-
 sura, vbi terminat medius digitus, quan-
 do radix manus patiens ponitur super
 radicē nasi: & aliud in occipitio abra-
 sis prius capillis, quæ dimittantur pluri-
 bus diebus aperta. Si vero nihil p-
 dicto rum remediōrū profecerit, neq; eger
 ea ad intelligentiam redierit: ignia sar-
 rago, & ponatur circa supficiē capitis,
 ita q; capilli vrantur, & calefiat cutis.
 Quia vt ait Aui. p-
 senti ca. vehemēter
 exiccat materiā capitis, & cōfortat ca-
 put, & neruos, & excitat apoplecticum.
 Vel capiti raso atq; calefacto cū p-
 nō calido supponat emplastrū rubificati-
 uū dictū ca. de lethargia actu calid. fre-
 quēter. Ista namq; remedia sunt vltimæ
 fortitudinis in exiccando et excitando
 patientem.

Emperica. Communiter operantes,
 quādo vocantur ad apo-
 plectiū, solum intrēdunt accideri. s. in sen-
 sibilitati, negligentes pro tūc cām. Li-
 gant igitur primo extrema fortiter, vt
 dolor vigilias inducat, & materias di-
 uertat: & fricāt plātas manū & pedū
 vehemēter cū aceto & sale, & imponūt
 pul. ellebori albi vel pipis naribus, &
 cōcutiunt corpus. Quod si hæc oīa non
 excitant ipsum, radunt caput rasura sic
 ca: & faciunt cauteria prædicta oīa vel
 qdam: vel faciūt ruptoriū supra caput
 ex cantharidibus cōfectis cū emplastro
 apostolico, vel cū semine: vel approxi-
 māt sarraginē prædictā. Et postquā ex-

Tractatus primus

citatus fuerit, intendunt causā euacuando & digerendo: quia vigilia sunt maximæ & præcipue in causâ curę apoplectici, caput excicādo et spiritus igniando. Sunt etiam signum certissimum: quia si significat ægrum posse vti medicinis cōuenientibus. Euacuatio optima fit cū pilulis Mesf. positis ea. de epilepsia, vel cū pillulis cochis vsutatis.

Canones. Fit apoplexia maxime illis qui nimium vinū bibunt, et caput sæpe lauant cum aqua, & proprie in loco frigido & humido: & qui frequenter sudāt circa caput sine manifesta causa. Et si caput sit naturaliter debile, magis hoc contingit. Quia vinū indigestū ad cerebrum & neruos repit a sui proprietate: & ibi in flegma cōuertitur, & sua qualitate sensum & motū paralyticat, & sua quantitate origines neruorum et cellulas vitruū animalū opilat. Item in apoplexia non fiat euacuatio, nisi cū pillulis, & in sero dentur sine cōna: quia a remotis euacuare perfecte.

Prognosticatio. Apoplexia maior ē impossibilis curatio nis, minor vero difficilis, media mediocriter. Vnde Hip. 1. par. aph. Soluere apoplexiā fortē qdē impossibile: est em̄ mortalis quasi ex tota specie. Itē si apoplectici nō pōt excitari per media conuenientia rationabiliter exhibita, mortale. Itē apoplexia maior prima die interficit, scilicet suffocādo: apoplexia media non interficit vsq; ad tertiam diē, vel in paral. lateris debilioris cōuertitur, scilicet propter diuisionē materię ad partē illā, Item sepultura apoplectici debet semper differri ad tres dies: vt di. Auic. Quia vita nō pōt diutius stare sine anhelitu et sine sensu: & motu: & qđ certius est sine pulsu perceptibili qđ 72. horis naturalibus ad plus: ante vero hoc tēpus aliqui reuiuiscūt & sanātur. Itē si apoplexia superuenit ebriolo fortiter et subito, mortale. Vnde

Hip. 1. par. aph. Si inebriatus a signa repente sine voce &c. Item apoplexia est magis periculosa inter 40. annos et 10. quia tūc calor naturalis minorat. Vnde Hip. 1. par. Apoplectici sūt maxime a 40. annis vsq; ad 60. Item taciturnitas subito superueniēs significat apoplexiā vel melācholiā. Apoplexiā quidē, si sit cū impotentia loquendi, & priuatione sensus & motus. Melancholia vero, si sit cū voluntate tacēdi et bonitate sensus. Vnde Hip. 7. par. apho. Si lingua intēperata repente fiat: aut apoplexiā aliquid huiusmodi vel melācholiā fiet, distingue igitur per talia. Sciendum præterea, qđ minor apoplexia durat vsq; ad dies 7. ad plus: aut conuertitur ad mortem, aut ad vitam manifeste, aut ad paralysim partis debilioris, aut peripneumoniā. Vnde Hip. 1. parti. apho. Quibus cuncq; sanis dolores repente fiunt in capite, & continue sunt sine voce, & stertūt: in septem diebus pereunt, si non ea, eos accipiat: quia ista sunt signa certissima tria apoplexiæ confirmata. Item Hip. 2. parti. apho. Crassi valde secundum naturam cito moriuntur magis gracilibus. Item apoplexia ex sanguine suffocatur ex improviso. Vnde Hip. 1. parti. apho. In exercitantibus &c.

De incubo. Cap. X.

Incubus est passio: in qua homo sentit, cū ingreditur somnum fantasma graue super se cadens, & comprimit ipsum, & angustiatur eius anhelitus &c. & interseciatur vox eius, & motus ipsius. Et fortassis præfocāt propter opilationes, & cum ab ipso separatur, excitat ipsum cito a somno, et dicitur ab incubo: qđ dæmon esse creditur apud eos, qui intellectum exollere nequeunt super sensum: vel dicitur incubus, quoniam incubat corporibus, quasi ea suffocando.

Methodus. Fit quandoq; ab assidua plethoria ratione multitudine sanguinis in toto corpore. Et signa eius sunt rubedo oculorū, & diminutio somni, & antecessio ciborum multiplicationum sanguinem, scilicet vini, carniū, & piscium: vrina rubea grossa, & pulsus magnus fortis: & habitudo carnosa & salua dulcis sine causa manifesta. Et cura eius est, vt primo fiat flebotomia cephalica: deinde ventosatio crurum assidua cum scarificatione & minoracione cibi & dimissione vini. Vtatur pro cibo lentibus, ordeato, auenato, oleribus. Vtatur pro condimentis aceto, agresta, vel vino berberis: bibat aquā. Fit quandoq; ex dominio flegmatis in toto corpore, & proprie in capite, & circa origines neruorum. Et signa eius sunt tarditas, pigritia, hebetudo sensuum, & multitudo sputi et mucilaginis. & mollificatio totius corporis, antecessio orij & ciborum flegmaticorū, vrina grossa alba, & pulsus mollis latus vndosus: & cura eius est cura epilepsie de flegmate.

Emperica. Fit incubus ex omni causa, ex qua fit epilepsia: vt dicunt communiter operantes: & signa eius sunt manifesta non nisi ex relatione infirmi. Et ideo fit quandoq; vitio materię in cerebro contentę: quandoque in stomacho vel aliquo alio viscerum. Cura eius est cura epilepsie ibi posita. Cum incubus nihil aliud sit, q̃ epilepsia parua siue imperfecta, differens in hoc solo: quia epilepsia accidit tempore vigiliarum, sed incubus tempore somni, & proprie circa principium ipsius. Confortetur cerebrū, & cor cōtinue cū diamargariton & dianthos cū muscho p se, vel simul mixtis, vel cū electuario de peonia posito capi. de epilepsia: vel cū aurea alexandrina, & electuario ducis, qd cōuenit sumendo per se vel cum alio mixtum. Sumat post purgationes bis in septimana

qualibet vice tiriaca veteris in aurora cum aquis decoctionis peonia 3. 4. quoniam confert a proprietate.

Canones. Quidam putant incubum fore passionem cordialem ex angustia anhelitus accidere: quare applicant medicinas, & cauteria ad pedes & cor: vix in hoc cadit error: qm̃ in epilepsia et apoplexia edis anhelitus, cū sint passiones aiales: quare conferunt in epilepsia exiccatoria, similiter & cauteria super caput. ¶ Sciendum præterea, qd in morborum cura nō semper applicantur remedia localia membro primo fontali, sed & secundo manifestatio principalis, prout euidenter probat Auerrois secundo colligit contra gal, qui illud asserbat. Ponimus em̃ emplastra super oculum in debilitate visus: licet virtus visiva sit totaliter in corde.

Prognosticatio. Incubus si sæpe contingit: est antecessor vnius trium ægritudinum, scilicet apoplexie vel manie vel epilepsie. Nam si sit a sanguine, sequitur apoplexia: Si a flegmate, sequitur epilepsia: Si a melancholia, sequitur mania. Item incubus sæpe contingentem, sequi consuevit spasmus de repletione, vel paralytis, et quandoq; subita suffocatio cordis. Itē si post excitationem sudet sudore frigido, & si sit cum tremore cordis, vel spasmō, vel syncope: mortale.

TRACTATUS SECVNDVS primæ sectionis. De passionibus neruorum.



Neruorum passiones famose sunt quinque. Prima paralytis: secunda spasmus & tetanus: tertia tortura: quarta stupor & tremor, siue debilitas neruorū: quinta alitatio & oscitatio. Cum autē dico neruos, comprehendendo & chordas & musculos siue lacertos totius corporis,

Tractatus secundus.

De paralyfi. Cap. I.

Paralysis est mollificatio solius membri, vel membrorum plurium in quacunque parte corporis: propter quam priuatur sensu, vel motu, vel utroque simul: proprie tamen mollificatio totius corporis dicitur a collo infra, ita ut lingua et caput totaliter sint sana. Fit quandoque a causa antecedente humoralis: quandoque a causa primitiua. Si a causa humoralis antecedente, hoc est dupliciter: quia hoc fit ab apostemate opilare radices & origines nervorum: propter quod membra, quibus deseruiunt, priuantur spiritu animali, & mollificantur: vel fit ab humore grosso crudo flegmatico opilante loca predicta atque inhibere. Si vero a causa primitiua, scilicet a casu vel percussione, fit etiam dupliciter: quia vel ista causa laedit spondiles, ita ut fiat dislocatio in eis: & per consequens in nervis fit opilatio procedentibus a nucha, vel laedit nervos ipsos, & radices nervorum contudendo & scindendo. Signa eius, quae fit ab apostemate: similiter & curam ponemus capite de doloribus dorsi, & capite de gibbositate. Signa eius, quae fit a flegmate: sunt albedo coloris faciei absque venis manifestis, & habitudo corporis flegmatica. Sed non videtur posse fieri ab humore calido, propter eius subtilitatem, nisi forte raro valde ex sanguinis multitudine. Et signa & cura: sunt eadem cum eis, quae diximus de apoplexia suo capitulo, cum de causa sanguinea loquebamur. Signa eius quae sit a dislocatione spondilium: sunt difficultas anhelitus, cum qua aduenit mollificatio membrorum. Signa eius, quae fit ex latione nervorum, patent ex relatione patientis. Sciendum praeterea quod omnem paralyfim factam a causa humoralis, antecedit necessario tremor, & stupor siue formicatio membrorum cum minoratione sensus in eis. Urina autem

ipforum apparet lactea, vel karapos ex natura, propter obtusionem calidi naturalis ab humore crudo. Verum quandoque fit per accides tincta & rubicunda: quia cum epas & renes sunt debilitata per passionem, non possunt generare sanguinem laudabilem, neque discernere ipsum ab aquositate urinalem: quare remanet urina similis loturae carnis: quemadmodum accidit in debilitate epatis, et in hydropse. aschire, ut dicit Auicenna. in tertio can. cap. praesenti.

Methodus. Cura paralyfis, quae fit a causa humoralis flegmatica, & est illa quae maxime contingit: est ut praemissa digestionem cum oxymelle squillitico, vel syrupo de sticad, puelle cum pillulis foetidis, vel cochleis vsitatis dando de sero, cum itur dormitum sine coena a 3. i. vsque ad 2. omni septimana semel: vel cum pillulis de euforb. Ioh. hebenes: quae sunt optimae ad educendum flegma grossum, quod descendit ad nervos, quare conferunt mollificationi, podagrae, spasmus, torturae, & euforb. colloquin. agarici. bdellij. serapini. an. 3. aloes 3. s. fiant pillulae cum aqua portul. Dosis earum est a 3. f. vsque ad 3. i. dentur in sero sine coena, & hoc continues aut tribus aut quatuor vicibus reiteratis. Post hoc vnguantur membra paralytica, & spondiles colli & dorsi totius cum oleo costino: quod sic fit. & costij. 3. i. piperis, pyretri, euforb. an. 3. castorei 3. 2. terantur, & cribellentur, & misceantur cum lib. f. olei de spica, vel de lilio, vel de lauрино, vel cum balsamo: quod melius est omnibus vnguentis praedictis. Diebus vero quietis vtatur in ieiuno electuarijs confortatiuis. Sumat ergo in aurora 3. f. diacastorei, & cibum differat per 4. horas, vel oppononaci recentis, vel Theodorici anacardini, vel diapli, vel mithridati, vel aureae alexand. & melius omnibus est pyretrum conditum, quod sic fit. Ut

zz. conditum, vt dicit Mef. Omnis em calida sicca medicina exhibitā post purgationes, lacertos & nervos corroborat: et propter hoc si feb. efficit, sanitas subsequetur: ad quod facit non modicum; si fuerit acuta penetratiua. Si vero per talia non acceperit sanitatem: abstineat p̄ dies aliquot ab omni medicina, donec virtus confortetur, & obseruet solum diætā, quæ dicitur: & post hoc redeat ad vsum medicinarum. Nequāq̄ igitur huiusmodi patiens bibat vinum vsque ad dies 40. vel amplius: sed sit contentus hydromelle suo, dicto ca. de lethargia. Post dies prædictos potest bibere vinum album odiferum, in quo salua et castoreū sint bullita: ipsa nāq̄ habent proprietatem mirabilem in confortādo nervos & iuncturas: quemadmodum per contrarium vinum & acetum membra nervosa debilitant omniuaq̄ cum sua penetratione subita p̄ vias angustas, priusq̄ digerantur. Regatur hic patiēs cum carnibus pullorum et hœdorum elixis cum feniculo & petroselino: similiter & assis conditis cum sinap̄, trita & confecta cū melle, velut in formam saponis. Abstineat a iuribus & brodijs pro posse, nisi fortassis cōditis cum puluere, qui sic fit, ℞. piperis 3. 2. zz. 3. f. cardamomi, piperis longi, cynamomi, zedoarij añ. 3. 1. spicæ, macis, croci añ. 3. 1. terātur & cribel lētur subtilissime. Et scias, q̄ in cura paralyf. istius, si fuerit virtus fortis: nihil melius reperies q̄ euacuationes fortes frequentatas: propter quod dicit Mesue præsentī cap. autoritate Gale. q̄ ægritudines neruorum & iuncturarum non nisi forti agente rectificantur: quapropter inter euacuationem & euacuationē interueniat tempus, quo confortetur corpus cum cibis & potibus & tiriaca & methridato. Vltimo vero si nihil prædictorum contulerit: fiant super membrīs paralyticis singulis cauteria diuersa pro

fundata. Cura paralyf. q̄ fit a casu vel percussione, est vt statim a principio fiat flebotomia diuersa: deinde curet vnus secundum chirurgiam, & confortentur nerui & membra laxa cum emplastro, quod sic fit. ℞. farinæ foenigræ. sebeen vel lini, se. malua, maluauisci, resine, armoniaci, bdellij, adip. anatis, cere. añ. olei de lilio vel de spica, quod sufficit ad incorporandum: & addantur, & pistentur omnia, & bulliantur simul, vt liquefiant in casola: deinde colentur, & misceantur. Hoc nāq̄ emplastrum sup̄ p̄uitates currētes ad loca debilia mollicat, & resoluit & dolorem mitigat, & lacertos & nervos confortat. Vngatur etiam cū oleis calidis vt de lilio, vel de costo, vel de spica, vel cum oleo communi: in cuius. 3. 1. dissoluta sit euforb. 3. 1. & castorei 3. 2. Diætā sicut supra.

Emperica. Scias, q̄ si exhibeatur paralytico 3. 1. assēfetidæ cū vino calido omni die in aurora, & proprie post purgationes bis vel ter reiteratas, effectum inducit mirabilē super nervos & lacertos: similiter & 3. 1. electuarij anacardini positi cap. de apoplexia. Istæ nāq̄ medicinæ ilico vt consumuntur: faciunt sudare patiētem, & proprie pānis calidis coopertum, & fortassis se. efficiunt sua caliditate vehementi: quapropter materias insensibiliter resoluūt, & post hoc nervos corroborat cum sua stypticitate potenti. In cura præerea paralyfis humoralis oportet, vt ordo seruet̄. Primo nāq̄ cōuenit, vt humor calid⁹ digeratur cū syrupis calidis acutis, velut oxymelle cōposito & squillitico, & proprie cū potat̄ cū aq̄ calida; i q̄ cocta sūt sticad. peonia, hyssopus, poliū montanū, nux muscata, cubebe: q̄ virtutē syrupi deferunt ad caput & nervos. Cauendum tamē ab vsu superfluo oxymellis: quia materias deferit & profundat in nervis: & proprie si sit acetosum valde. Mino-

Tractatus Secundus

retur igitur acetū, & augmentetur mel, & radices diureticæ penetratiuæ. Secundo vero conuenit, vt humor humidus purgetur cū medicinis fortibus attractiuis, velut sunt pillulæ, in quibus agaric⁹ & colloquintidæ ponūtur. Tercio requiritur vomitus frequens ex raffano atq; elleboro albo. Similiter & clysteria acuta dicta cap. de apoplexia: quoniam reliquias eradicāt, et diuertunt. Quarto vero requiritur successio regiminis calidi sicci vehemēter in cibis & potibus atq; medicinis similiter & vigilijs & siti & labore. Quinto sternutatio frequens cū pipere vel condisi. Sexto corporis frictio vehemens in æstuario vel balneo tinnarum & cum sale & se. vrticæ. In cura paralyfis, quæ sit a casu & punctione, cōfert inunctio cū adipe canino vel vulpino, & embrocatio talis. Accipiat vulpes, & viua decolletur, & bulliat in sanguine suo reiectis eius intestinis: aut viua cū aqua & oleo, donec caro ab ossibus dissoluatur, & ex illa aqua et oleo fiat ablutio vel balneū in ieiuno: est enim vehemēter conferens in omni passione arthetica, & proprie apud declinationē. Itē ad paralyfim, quæ sit ab humore vitio, cōfert hoc vnguentū, & proprie post purgationē, ℞. vulpem pinguem eiectionis visceribus, & contere cū ossibus & carnib⁹ minutim: deinde pone in frixorio cū istis gūmis, scilicet bdellio, serapino, opoponaco, eufor, assafœtida: deinde in vase resoluantur circa ignem, & coletur liquor, qui fluuit inde: & cum pinguedine castorei & medulla ossium leporis, vel vituli, & ceteræ, quod sufficit, fiat vnguentum: cum quo vngatur posterior pars capitis, & collum, & spina tota, proprie quādo exit balneum siccū scilicet æstuariū, vel aquā tinnaræ, vel decoctionis saluæ, absinth. foliorū lauri, menthe, radicis porro, pullegij, & similiū: vel postq̃ fecerit vapo-

rem ex ipsis, q̃ tangat mēbrum paralyticū, cū nō vult ingredi balneū. Illud vngentū calefacit nervos cōfortat, & deopilat: quemadmodū & oleum de castoreo vel de spica mixtum cū pinguedine castoris, si vngatur cū ipso omni seio (cū itur dormitum) caput rasum, & collū cū spina tota, Similiter & aqua vitæ de bono vino artificiose cōfecta: & ex vnguentis similibus: sicut sunt marciatō, arrogon, agripa: & proprie apud declinationē. Et adhuc fortiora & nobiliora dicemus remedia in cap. de passione arthetica, si deus voluerit, cōferentia paralyfi, torturæ, spasmus, atq; tetano. Sternutatio præterea cū condisi, pipere, castoreo, pyretro, & eufor, simul tritis et cōmixtis cōfert vehemēter: & quādoq; cōuenit, vt fiat caputpurgium cū succo rutæ, & cum myrrha, & castoreo dissolutis in eodem succo inficiendo cum instrumento. Similiter & gargarisma cū oxymelle squillitico, cum aqua decoctionis sinapi, rutæ, vel saluæ & sauinæ. Et non negligas confortare partem capitis posteriorem cū oleis & vnguentis calidis p̃dictis (quoniam est origo omnium neruorum) & sternutatorijs, & caputpurgijs: vt materia diuertat ab ipso ad partem anteriorem, vbi est colatoriū palati. Similiter cum gargarismis acutis, & proprie apud declinationem. Est namq; cōferens ad quancūq; partem Paralyfis declinauerit.

Canones. Dubitauerunt excellentes, virū paralyfis sit semper de genere malæ cōplexionis frigidæ & humidæ per naturam: propterea q̃ autores assignātes eius causas antecedentes vel cōiunctas, assignant frigiditatem aut humiditatem. Propter quod dicit Mes. in suo de appro. ca. de. agritu. neruorū in cōmuni: q̃ nerui & iuncturæ nō patiuntur a caliditate vel siccitate, nisi quādoq; propter q̃d verificatū est,

q̄ se. superinadens curat omnes eorū
passiones propter malā complexionis
frigida alterationem, & materierum
crudarum exiccationem, vnde Hippo.
9. parti. apho. frigidum inimicū est ner-
uis & ossibus: calidum autē vtile & ami-
cum. Similiter & ob causam aliā, q̄ est.
Nā in diffinitione paralysis ponunt mol-
lificationē: sed mollificatio est effectus
humidi: vt dicitur. 4. meteorog. Itē ex
alia, nam passio q̄ fit subito, est neces-
sario a materia fluxibili: vt dicit Gale.
2. de fe. & per cōsequēs humida. para-
lysis autē subito fit. In oppositū videtur
esse Aui. 3. cañ. fen. 22. ca. de cura gibbo-
sitratis: vbi dicit, q̄ q̄dam est paralysis
sicca, quādam humida: sicut & spasmus.
Et probatur ratione: q̄a paralysis fit ab
opilatione: nūc autē sicut fit opilatio ab
humiditate obstruēte vias, ita fit a sic-
citate, & ab arefactiōe corrugare eas.
Respondēdū autē videtur, q̄ paralytim
esse de genere malā complexionis sicce
potest intelligi dupliciter: scilicet raro
vel sæpe. nō sæpe propter rōes primas.
Si raro, hoc tripliciter: vno modo essen-
tialiter, & hoc non est verū: quia para-
lysis est essentialiter de genere acciden-
tis. Alio modo causaliter, & sic est ve-
rum: q̄a potest fieri propter corrugatio-
nē originis neruorū atq̄ lacertorū: quē-
admodum ostēdī in corporibus cōsum-
ptis: & ista paralysis fit gradatim, non
subito. Tercio modo effectiue: q̄a ad
paral. alicuius mēbri sequitur eius exic-
catio & maceratio propter diminutā
nutritionē ratione opilationis: q̄d et sæ-
pi⁹ contingit: et proprie cum fit mali-
gna, vehemens, antiqua.

Prognosticatio. Cura paralysis du-
biofa est ex quacū
que causa cōringat. Item si paralysis cō-
tigerit ex casu, vel percussione, vel vul-
nere profundo: vsq̄ ad radices neruorū
& post curationem attritionis neruorū
confirmatam, & consolidationem vul-

neris si remanserit paralysis, nōq̄ cura-
tur: quia læsio peruenit ad neruos. Item
si paral. fuerit a casu vel percussione, &
mollificetur corpus ex ea torum, aut ali-
quod membrum, & post illud remāserit
eius mollificatio secundum dispositionē
neq̄ minuat: tunc non est eius cura possi-
bilis, vt dicit Rasus in diuisionibus. Sed si
minuitur, & non remanet secundum suā
dispositionem: tunc curatio eius est possi-
bilis, et proprie in principio, cum nondū
attritio confirmatur. Item si in principio
se. apparet vrina viridis, signat paral. su-
turam. Item in senibus difficulter potest
paral. aut tremor, aut spasmus curari: in
senioribus vero nullo modo. Item tre-
mor superueniens paraly. bonum: simili-
ter & feb. superueniens bonum: &
proprie, si cum ipso minoretur stupor o-
mni die: quod si non minoretur, morta-
le: q̄a fortis est ignis, q̄ in aqua nō extin-
guitur, & cōuerso. Item paral. similiter
& spasmus, atq̄ passiones aliarū cerebri
vel neruorū nequaq̄ interficiūt, nisi vias
anhelit⁹ opilādo: quapropter cū asthma
supuenerit, suffocationē infra diē & no-
ctē expectabis. Item si paral. venerit ex
dislocatione mēbri, aut ex maxima ner-
uorū cōtritione per trāsuersum nerui vel
musculi, non recipit curā. Item si mēbrū
paralyticatū minoretur, & color eius ci-
trinetur, valde malū est: quia defectum
certificat virtutis nutritiue: propter q̄d
tunc modica spes est in curatione: quēad-
modū & in spasmus de inanitione. Itē si
paral. sit a remotiōe spōdiliū a suo loco,
est mortifera propter impedimentū q̄d
adducitur in anhelitu.

**De spasmo, tetano, & alcu
seth. Cap. II.**

Spasmus est agritudo nervosa, qua
mouentur lacerti ad sua principia,
& inobedientes fiunt in dilatione
vel constrictione, prout ipsum describit
Auicenna; Et si fiat in lacertis membris

Tractatus Secundus

interioribus, membrum contrahitur: & tunc proprie dicitur spasmus. Si vero in iunctis exterioribus: tunc membrum statensum, neque flecti potest, nisi cum magno dolore: & tunc dicitur tetanus vel aluceth. Et sic patet, quod tetanus est periculosior spasmus: quia in tetano vixque lacerari possunt tensi. In spasmus vero non: & fit a maiori causa: & ideo eius crisis est velocior: quia natura magnum morbum diu tolerare nequit, quin terminetur ad salutem, si virtus vincat: ad mortem, si materia morbi vincat. Spasmus item vel habet proportionem ad materiam, vel non: si sic, vel fit de repletionem vel inanitionem. Si non, tunc vel fit a dolore, ut contingit in punctura siue vulnere nervi: vel a frigidity sine materia, ut accidit congelatis in aere vel in aqua frigida: quoniam si fuerit a caliditate sine materia, ad inanitionem pertinet. Signa spasmi de repletionem sunt, habitudo flegmatica cum plurima plethoria, & quia fit subito: quia materia cito fluit ad nervos, nisi sit valde grossa: & tunc non fit subito: eo quod non subintrat velociter in membra ut oleum vel unguentum, nisi cum adest caliditas addita seu fe. & pulsus est latus, mollis, vndosus: & facies & oculi sunt tensi, repleta cum pallore vel rubore plus debito. Et in hac specie spasmi quandoque retinetur urina vehementer, & est ut plurimum sine fe, veruntamen quandoque subsequitur fe, humoralis colligantem humores, qui postea fluentes ad nervos & lacertos & chordas replent, & extendunt ea secundum latum, & accurtant secundum longum: ut contingit in corio humectato, vel in chordis cithararum humectatis. Signa spasmi de inanitionem sunt: quia praecessit euacuatio plurima nervorum & nervosorum membrorum excoriatio, & vias spiritus obstructiva. Haec autem euacuatio vel est sensibilis, ut illa quae provenit ex vomitu spontaneo perduran-

te, & fluxu ventris assiduo, & solutione cum medicina effreniter laxante, & fluxu sanguinis narium. In crisi symptomatice superfluente, & haemorrhagia sanguinis in vulnere & sudore plurimo: similiter & menstruum & haemorrhoidarum cursu immoderato: vel est euacuatio insensibilis, ut quae fit in fe, acutis et arsiuis, & fe, chronicis, propter quarum caliditatem aduruntur, & resolvuntur, & exsicantur humiditates substantificae, & influentes membrorum: & in ieiunio & labore & vigil, & aere calido: & quia fit gradatim & non subito. Signa eius, quae a frigidity aquae vel aeris continentis, vel a dolore sunt, antecessio causarum talium: quas ex relatione agri percipies. Et scias, quod spasmus omnis, & proprie quod fit ex humoris vitio, vel euacuazione, vel punctura et vulnere: quandoque est particularis, et in determinato membro, et tunc non significat, nisi super illud membrum, et proprie super cerebrum vel nucham, quoniam ab eis omnes nervi oriuntur, ita ut si sit humoralis, est perdurans: si ventosus, est cito transiens, quandoque vero est universalis toti corpori ut in epilepsia, et spasmus de inanitionem: et tunc habet si significare super totum, scilicet mortem vel salutem.

Methodus. Cura spasmi de repletionem ne duplex est, quemadmodum materia replens. Quoniam autem est calida sanguinea: et sic sibi competit cura apoplexiae sanguineae: vel frigida flegmatica, quare fit ei conveniens cura apoplexiae flegmaticae: similiter et cura paralyse, supradicta. Post curam autem generalem, confert ut patiens sepeliatur in arena calida, si sit aestas, usque ad gulam, vel cinere calido, aut clibano calefacto per ignem, vel in stercorebus animalium, si sit hyems, aut aquis tinarum, et introducatur fe, quia ut dicit Hippo. quarta par. apho. A spasmus et tetano habito fe, su-

perueniens soluit ægritudinē, et proprie apud morbi declinationē: cū iam p̄ceserint euacuationes et digestiones plurimæ vicibus alternatis, ne fortassis feb. superueniens colliguet plurimā materiam, et mēbra magis extendat. Introducatur autē se. dando, 3. 1. electuarij anacardi, positi in cap. de apoplexia, cū vino decoctionis castorei: vel dando ad quantitātē auellanæ castorei, et assæfætidæ, quibus permisceatur mellis duplum cor: similiter fricando corpus vehemēter cū panno aspero et puluere vel euforb. salis. Et si se. fuerit a principio: intende causæ et accidenti, scilicet spasmō derelinquendo dispositionem, scilicet feb. protunc: donec accidens reddatur minus timorofum: Vtatur ciboparuo calido & sicco: famē & sitim toleret pro posse. Bibat hydromel, aut vinum verus purum, amarum: vngantur mēbra læsa cū vngento agripæ. & marcia ton mixtis in simul, fricando diligenter ad solem vel ignem calidum post purgationes. Si vero spasm⁹ iste repletionalis fiat a ventositate: fricetur primo p̄tacula cū oleo de costo, vel de spica, vel de lilio, & panno aspero. Et fiāt clysteria carminantia ventositatē, quæ dicentur ea. de colica ventosa. Bibat vinum acutū parux quantitatis, in quo ponatur aqua decoctionis mellis, ameos, feniculi, dauci, cynamomi. Vtatur incibulo cōdimēto. ℞. piperis nigri, piperis lōgi, cardamomi, granorū paradisi, gallangæ, zedoarij, ʒz. añ vnciā. f. macis, croci añ. 3. f. terantur subtilissime, & cribellentur. Vtatur diacimino diacradamomo diatripipereon sæpius in ieiunio. In fine vero cū materia coeperit diminui, neq; sit timor de attractiōe rā in spasmō humoralī, q̄ ventoso: cōfortetur nerui & nucha cū oleo masticino, et oelo de castoreo actu calido, ipsa enim sunt calida styptica: quæ duo neruis con-

ferunt vehemēter. Cura spasmi de inanitione est, vt humectetur corpus pro posse cum balneo ex lacte recenti, vel aq̄ dulci: in qua sint cocta ordeū, viol. psillium, mal. sedendo in ea sæpe secundum numerum, sed parum secundū similitudinem, ne corpus fiat euaporabile. Et post exitum a balneo inungatur totum corpus cū oleo viol. vel oleo cōmuni, vel cum adipe anatis vel anseris & gallinæ: Et quandoq; si sit possibile, balneetur in oleo cōmuni tepido: quia plurimū humectat. Fiant in balneo fricationes mēbrorū leues, ita vt attrahant sine resolutione. Et post exitum a balneo bibat lac recens per se vel cum mica panis vel zuccaro: deinde postq̄ iac stomachum exierit: vtatur iuribus carniū, & cibis impinguatibus, & testiculis gallorū, & piscibus recētib⁹ petrosis: gaudeat ocio & quiete & lecto molli. Conferunt præterea balnea ex aqua dulci, in aqua cocta sunt oīa humectantia: sicut capita & pedes hœdorū, agnorum, & arierum pinguium. Et quandoq; si siant cū istis clysteria, cōferunt vehemēter, vt dicit Mes. præsen. capitu. & plurima humectantia dicem⁹ ea. de phthisi. Quod si sit feb. non despicias febr. imo semp humectantibus adde infrigidantia: et cōfortantib⁹ alterantia, velut ē zuccaro, vel viol. mixtū cū triasandali et rosa nouella, vel sicut ē diarod. abbatis cū diadragato. Et si fuerit cū vomitu, vel fluxu ventris, vel sudore plurimo: restitatur cum eis, quæ dicemus suis locis. Cura spasmi, qui sit a frigidiitate, est vt ponatur corpus in aqua dulci calida: deinde comedat cibos calidos actu & virtute: vngantur iuncturæ & spōdiles cum oleis calidis prædictis: vtatur diatrionpipereon: phiris, & similibus. Cura spasmi qui sit a dolore propter puncturam, vel vulnationem nerui (licet raro curetur) est, vt a principio statim po-

Tractatus secundus.

nantur anodina, & dolorem mitigantia super locum vulneratum & dolorosum, vt est oleum anethinum calidū, vel oleum camomillinum, vel oleum de semine lini. Et emplastrum ex floribus camomillæ, farina ordea. se aperi confectis cū oleis iam dictis ponēdo super locum læsum actu calidis. Et ponatur infirmus quasi cōtinue in balneo tepido aquæ de coctionis rerum positarū in emplastro: Quod si per hoc dolor nō minoretur: vngatur locus cum narcoticis priusquam vltimeretur, vt virtutem presternat: sicut est hoc oleum, ℞. olei ros. 3.4. opij. 3.℥. iusquiami. & semi. papaueris albi. añ. 3. i. corticis mandragoræ & semi. apij. añ. 3.℥. terantur, & cribellentur, & misceantur cum prædicto oleo, & aliquantulo aceri: & super vñctionem ponatur emplastrum prædictum actu calidum. Sic namq; liberabitur, si deus velit.

Emperica. Curatur quādoq; spasmus repletionalis cum ablutione aquæ frigidæ propter antiparistisim & proprie in corpore carnosio. vnde Hippo. 5. particu. apho. Est autem vbi in tetano sine vulnere &c.

Canones. Non sis audax a principio in euacuatione plurima apud spasmus de repletionem: ne forte materias agitari facias, & maiorem spasmus inducas. Et istud etiam attende in cura paralysis. Neq; sis timidus in humectatione & repletionem apud spasmū de inanitione ne forte virtus desiciatur, & humidum radicale consumatur. Neque sis tardus in doloris mitigatione apud spasmus factum ex dolore nerui: ne forte dolor virtutem prosternat. Spasmus igitur qui fit a frigidityte, est omnium lenissimus, & ad expectationem curæ magis sufficiens. Item dicit Hippo. quinta particu. aphorif. Frigidum quidem spasmus & tetanum &c. quare adproximentur calida, & alienentur fri-

gida. Scias præterea qd spasmus de inanitione duplex est, scilicet proprie dictus & improprie. Proprie quidem, cum nerui et membra lacertosa priuantur omni humiditate. Improprie vero: cum eadē membra penes se humorem habēt acutum, exiccatiuum, calidum: cuius exemplum patet in singultu. Fit enim quādoq; singultus a re calida acuta: vt pōre cholera prassina, vel pipere mordicante exiccante os stomachi. Singultus autem est quasi spasmus quidam: vt dicit Galenus quinto de accidenti, differens solū in subiecto, quia singultus non habet fieri circa membra lacertosa, sed circa substantiam stomachi, & proprie os eius non lacertosum. Cura igitur spasmi de inanitione superius posita intelligitur de spasmo proprie dicto. Spasmus autē improprie dictus non solum indiget alterantibus, sed & euacuantibus: vt vomitu cum syrupo acetoso, & purgatione cum reubarb. vel aloë.

Prognosticatio. Spasmus de inanitione proprie dictus, est mortalis, vt plurimum: quia vita nō stat nisi per calidum & humidum. Vnde Hippo. Spasmus ex elleboro. Item spasmus in febre frequentius accidit pueris, q̄ adultis, & facilius curatur in eis: quia habent virtutem animalem debilem, naturalem vero fortē: vt dicit Auicenna capitulo de causis spasmi: cum exponit & pertractat omnia, quæ dicit Hippo. 3. prognosticorum de spasmo. Item si vulnerato & flebotomato vel stimulado in loco nervoso superuenerit, spasmus, aut desipientia, mortale: quia passionem ad cerebrum significat petiigisse: quo læso impeditur anhelitus, & fit suffocatio. Vnde Hippo. 5. aphorismorum: In vulnere spasmus superueniēs, aut tetanus, mortale. Item Hippo. 4. parti. aphorismo. A spasmō & tetano habito, febris superueniēs soluit agrā

tudinem. Item habētes omnia membra iuncturalia extensa rigentia cum dolore maximo, raro euadunt. Et si euadunt ne cessario infra quartum diem euadunt per se vel beneficio medici: quod si ultra quartum diem ægritudo perseverauerit: erit mortale vt plurimum, si dolor remanserit in sua fortitudine: quia natura debilitata est, & magnum morbum diu nequit tolerare. Vnde Hippo. quinta particula aphorismorum: Qui apprehenduntur a tetano, infra quatuor dies pereunt: Si vero hos effugerint, salui fiunt: supple, si dolor minoretur post quartum diem: aliter vero non. Et sic concordabitur aphorif. cum commento Gale. ibidem: quia videntur contradicere. Cū Hippo. dicat: q̄ post quartum diem salui fiunt, Galen. vero, q̄ necessario moriuntur.

De tortura oris.

Cap. III.

Tortura est inclinatio oris & labiorum ad dextram vel sinistram cū impotentia claudēdi alterum oculū & cū exufflatione ex latere vno tantum, cum præcipitur vt sufflet. Fit autē duobus modis, scilicet de repletionē & inanitione. De repletionē quidē propter aggrauationem nervorum & lacertorū faciei propter dominium flegmatis super ea: & est species mollificationis. De inanitione vero propter exiccationem cutis & nervorū, & est species spasmī. Signa eius, quæ est de repletionē, sunt pigrizia in motu, sensuum turbatio, saliuū et sputi multiplicatio: & quod sentit æger invtrāq̄ parte leuitatem, nūc extensionē, & pellis est extensa sine rugis, & inclinatio faciei assidua ad inferiora: & est palpebra inferior oculi partis gibbosæ demersa ad inferiora propter aggrauationē. Signa eius, quæ est de inanitione: sunt sensuum turbatio modica, rugositas cu-

tis in parte vna, & extensio eius in parte altera: & paucitas sputi & saliuū: & quandoq̄ indurantur lacerti, & contrahuntur superiores: quemadmodum in ea, quæ de repletionē, relaxātur ad inferius: vt dicit Mesf. in isto cap. Et certius signū (quod esse potest) est: quia præcessit inanitio multa, vel a fluxu ventris, vel a febre arsiura, vel feb. chronica humoralī, vel hectica, & similibus.

Methodus. Cura torturæ de repletionē est eadē cū cura paralysis factæ humoris vitio ex parte purgationis & inunctionis, emplastrationis, & diætationis. Insuper post purgationes fiant gargarismata cum oxymelle squillicico, & aqua decoctionis stica. pyretri, & nucis muscatæ: & tenere in ore nucē muscatam, & masticare eam valet in omni tortura humida a proprietate: post illud fiat masticatio dissolutiua cum pilulis ex pyrethro, pipere, & sinapi, & cera confectis: deinde styptica ex masticæ vel thure. Vngatur locus & spondiles cervicis cum oleo de spica, vel de lilio, in quo dissoluta sint pyretrum, oppopona cum & sinapium, puluerisando ea subtilissime, & miscēdo cum oleis prædictis, & cum oleo anethino, in quo dissolvatur euforbium, vel castoreum, vel vtrumque: quia hoc est fortius prædictis: & ponantur ventosæ, & emplastra rubificatiua super cervicem: quæ dicuntur cap. de catarrho. Vltimo fiant cauteria duo: vnum scilicet in occipitio, & aliud in radice mandibulæ partis tortæ non gibbosæ. Cura torturæ de inanitione (si sit possibile) est, vt humectetur caput cum medicinis humectariis lenibus, cuiusmodi est vaporatio faciei cum aqua in qua decocta sunt malua, viol. alchea, scœnū-græcum, psillium, ordeum, capita & pedes agnorū, hædorū, arietum pinguiū, et balneetur in ea vel in lacte dulci, vel vaporetur cū oleo de lilio repido: quia licet

Tractatus secundus.

huiusmodi oleum, vel de spica sint sicca virtualiter, sunt tamen humida substantialiter: sicut & omnia olea. Et tendatur cutis frontis ad inferiora, deinde ligetur cum fascia, & ibidem confirmetur, donec tortura cessauerit omnino.

Emperica. In omni tortura conuenit, vt patiens saepe intueatur speculum, & conerur flectere labia & os in cōtrarium torturæ. Item in tortura humoralis conuenit diæta sicca, siue diæta sit sicca virtualiter, vt est fames, labor, & ieiunium, & sudor: siue substantialiter, vt cibi assi, vel cocti conditi cū speciebus calidis & siccis: vt. ℞. nucis musc. 3. i. piperis longi, castorei, gallæg. añ. 3. i. zedoarij 3. i. terantur, & cribellentur. Item post pillulas in cap. de paralyssi positas, conferunt pillulæ de oppoponaco, quæ sic fiunt secundum Melue. ℞. oppoponaci, hermodactilorum, serapini, bdellij, armoniaci, colloquintidæ añ. 3. s. & c. vide ibi. Item euitet potum vini omnino, vsq; ad declinationē: quod si fieri non potest: bibat vinū artificiale. ℞. calamenti, satureiæ, saluiæ, mēthæ, baccharum lauri. añ. & bulliantur omnia in vino vel aliqua ex eis: vel possunt bulliri in aqua & ex illa lymphetur vinum: & iste potus maxime conuenit in paral. humoralis, & proprie in corpore delicato. Conferit præterea, vt euaporentur sinaput, & spondiles colli, & mandibulæ totæ, & foras, & tempora cum aceto fortis albo, in quo cocta sunt calamentum, hylotropis, sticad. centaurea: donec cōsumptum fuerit acetum ad medietatem. & emplastreutur cum eisdem rebus. Inungatur collum & nucha in tortura humoralis & paralyssi: similiter et aures et pars tota cum vnguento isto: & proprie præcedente balneo stuphæ siccæ. ℞. serapini, oppoponaci, armoniaci, bdellij, euforbij, masticis, añ. 3. ij. dissoluantur primo in vino vel aceto, deinde conficiantur cū

oleo terrebentino & laurino vel masticino añ. 3. i. & f. ceræ. 3. i. emplastreutur collum & pars læsa cum huiusmodi. ℞. radicis raphani, extracto duro, quod est interius: & incide frustatim & optime tere: deinde cum oleo laurino rutaceo laterino & modico aceti & fursure sufficien- ti in patella decoque perfecte. Cauendū tamen, ne tangat oculum: quoniam est vehementer mordificatiuum & exiccatiuum & rubificatiuum. Abluatur omni hebdomada caput bis vel ter cum lixi- uio. ℞. cineris vitis vel quercus, & cū aqua permisce, cola, & in illa colatura bulliantur raphanus, sticados, saluia, ruta, satureia, mentastrum, camomilla, folia lauri, & proprie stomacho ieiuno & in loco calido: ita vt post hoc fricetur caput vehementer cum pannis calidis, donec perfecte exiccetur. In fine vero rei, si nihil prædictorū contulerit omnino: fiat cauterium post aurē partis læsæ per torturam. Chirurgia enim in omni ægitudine debet solum post desperationem omnium medicinarum exerceri: cum sit medicina fortissima, et a leuioribus semper est incipiendum, & ad fortiora gradatim ascendendum: qui est ordo sapientia, vt dicit Melue in suis de appropriatis isto cap.

Canones. In tortura de repletione, pars gibbosa est læsa: quare propter mollificationem cadit versus aliam. In tortura vero de inanitione, pars curua est læsa: quare propter cutis & nervorum corrugationem trahit aliam ad se. In prima igitur approxima medicinas locales magis parti connexæ. In secūda vero magis parti concavæ: in tertia tamen neutram partium derelinquas.

Prognosticatio. Tortura vero de inanitione (vt plurimū) est signum mortale in febribus cōtinuis arsiuis, & in consumptione corporis hec- tici: propter quod añ. Hip. primo pro-

gnosticorum. Primo igitur faciem ægri pernorabis, &c. Facies namq̃ tornatilis est mortalis. Cognoscitur autem tornatilis ex quinq̃, quæ sunt temporum macilentia, & concavatio oculorum, & acuitas nasi, & fœditas coloris, & spasmosa dispositio oris & labiorum: vt ibidē doct̃ commentator. Item si tortura repletionalis p̃ sex mēses durauerit; aut nunq̃ aut difficiliter curatur, propter scilicet fixationem materiæ. Item saltus faciei præcedit torturam humoralem, tortura paralytica, aut spasmus de repletionē, aut apoplexiam, aut epilepsiam. Item si tortura fortis supuenerit, in quatuor diebus interficiet: quos si transierit, curari potest: sicut dictū est in ca. de tetano. Item tortura humoralis, vt plurimū accidit: tortura vero spasmosa siue de inanitione, rarissime.

De tremore, stupore, & debilitate neruorū. Cap. III.

Tremor est motus cordosus, siue reciprocus membrorum neruolorū, scilicet capituli, manuum vel pedū cum difficultate fixationē, nouitūdem. Quod si consideres tremorē, prout est actio læsa motus naturalis, est species rigoris, q̃ fit in se, interpolata: sed de hoc nihil ad præsens capitulū. Est ergo motus compositus ex motu naturali grauium deorsum, & motu voluntario virtutis motiua sursum regitūo membri vel corporis torius: ex q̃bus quasi pugna assidua confurgit. Sed stupor est passio neruosa: & est idem quod fornicatio siue obdormitatio membri: propter quam videtur homini, quasi formicæ ambulent super membro: quod fit idcirco, quia in vna minima parte formali membrum sentit quiddam, & in alia iterū, et in alia non. Fiant ambæ hæ passiones quandoq̃ a causa primitiua, quandoq̃ a causa antecedente. A causa quidem primitiua fit

tremor, puta casu vel percussione facta supermembrum: propter quam contunditur vel incidit neruus moriuus, vt neq̃ motū perfectum facere valeat, neq̃ fixationem. Fixio namq̃ procedit ab eadem virtute, & per eosdem neruos per quos & motus voluntarius: vt dicit Gale. in commēto illo primi prognosticorū super illo verbo: Bonum est ægrum in altero laterum inuenire iacentem. A causa etiā primitiua fit stupor, vt propter sitū malum cruris aut pedis aut brachij: propter quod minus libere possunt spiritus animales per neruum transire ad illius membri sensum, & motum exercendum, opilatione, vel viarum incuruatione prohibente. A causa vero antecedente humoralis habent fieri ambæ passiones: vt potēte propter dominium sanguinis vel flegmatis super neruos mēbrorum tremulosorum & stupidorum: habēt etiam fieri propter potum vini superfluum. Vinum enim a proprietate suæ substantiæ ad neruos rapitur: quapropter si digestū ad ipsos peruenerit, sanguinem superfluere facit: Si vero indigestū, flegma abundare facit. Habent etiam ambæ passionēs quandoq̃ fieri a frigidityte sine materia: cum frigiditas sit qualitas contrarians animalibus. Et ideo Auicēna, primo cañ. de virtutibus ministrantibus, dicit quod frigidum est paralyticū faciēs. Accidunt etiā nonnunq̃ ambæ passionēs ex debilitate naturali neruorū: quæ debilitas nihil est aliud, q̃ raritas compositionis, vel delicatio cōplexionis eorum. Signa tremoris vel stuporis a causa primitiua, sunt manifestata ex re ipsa. Signa earum a causa antecedente sunt: quia si sit sanguis, apparet facies carnosæ, rubea vel fusca, et venæ apertæ in collo, & dulcedo saliuæ, & antecessio ciborum multiplicantium sanguinem: similiter & vrina rubea grossa. Si vero sit flegma: apparet color faciei al. et pallidus,

Tractatus Secundus

& habitudo mollis squallida cū pigritia motuum, et vrina alba spissa humorosa, & antecessio gulofitatis, & indigestionis assidua perdurans, & fastidij, & rerum generatiū flegma. Signa eorum cum fiunt a qualitate frigida sine materia, sunt habitudo melācholica macra: & cum tangitur corpus, sentitur frigidum: & antecessio ambulatiōis. & moræ in aqua vel aere frigido: propter qđ musculi labiorum omnes spasmanantur, ita vt quis intelligibiliter & prompte non loquatur. Similiter & statio perdurās in rupibus vmbrosis, propter quam mortificantur calor & spiritus lacertorum: sicut accidit incarcerationis, & captiuis inter muros. Signa eorū, cum fiunt a potu vini superfluo: quia aduenit bibulis, & proprie vinum bibētibz siue potantibus per se in ieiunio, cum raritate nervorū, & eorum imbecillitate per naturam. Signa tremoris causati a debilitate mēbri vel virtutis, scilicet quia patiens deſicitur ex quocūq; exercitio moderato: vt pote ascēdēdo scalas, vel trahendo, vel tenendo aliquid firmiter in manu. Et quia non potest tolerare laborem fortem, stando vel currendo: quare statim tremat eius corpus: & antecessio ægritudinum chronicarum est verior in significando.

Methodus. Cura tremoris & stuporis facti a causa primitiua, est vt primo curetur attritio: quapropter ponā vnguēta, & emplastra anodina super locū, donec dolor quieuerit, posita in cura paralysis a casu & percussionē: similiter & in cura spasmi: deinde confortentur nervi cū oleis stypticis, vt masticino, vel de castoreo. Cura eorum si fuerint vitio sanguinis (quod raro contingit) est vt primo fiat flebotomia cephalicā in brachio vel manu, si virtus & ætas consenserint: deinde cum pillulis cochij purgetur, vel cum hierapicra.

Sit contentus potu hydromellis, vel italep: gargariset oxymel squilliticum cū aqua hyssopi: post purgationes vngantur membra cū oleis iam dictis: vel cū vnguentis arregon, marciaton, agrippa: toleret famē & sitim pro posse: exerceatur & sudet in ieiunio. Cura eorum si sint vitio flegmatis (quod est vt plurimum) est cura paralysis factæ humoris vitio: quando tremor talis est quādā paralysis diminuta, vel incepta. Cura eorū si sint a qualitate frigida sine materia, est eadem cum ea quæ est de flegmate, præter quod non est opus purgatione, sed alteratione sola cum oleis, vnguentis, emplastris, balneis & diætā: quā vbi indigentia, nō oportet laborare. Cura eorū si fuerint a potu vini superfluo, est abstinere ab illo: quia in omni morbo ne corporis cum quis, &c. Et confortentur cor & cerebrum cum electuario pliris, vel dianthos. Cura tremoris propter debilitatem virtutis, est cauere a labore & exercitio forti omnino: & viciis & potibus impinguantibus, vt est caro bona, & ius carniū conditum cū speciebus aromaticis atq; inspissatum cum vitellis ouorū, & vinum clarū bonum aromaticum in odore vel claretū: & vti speciebus & electuarijs dictis ca. de paral. & confortare nervos & iuncturas atq; membra lacertosa cum vnguētis & oleis dictis ibidem. Et plura dicemus capitulo de arthetica passione.

Emperica. Dixerunt excellentes, qđ in tremore & stupore factis ex causa humoralis, cōferūt trochisci de sticados a proprietate, & proprietate post purgationes bis vel ter frequentatas: qui sic fiunt. ℞. sticad. 3. i. hyssopi. 3. i. peoniæ. 3. iij. fiat trochisci cum muscilagine dragaganti & melle ros. & sit vnusquisq; in pondere auri. i. dētur in aurora cum aqua decoctionis sticad. et mellis.

Canones. Scias, q̄ cognitio humoris facietis ægritudinem non semper potest per interiora haberi accidentia: quia potest humor peccans intus in profundo accumbere, & alius non peccans in superficie apparere: vt dicit Galenus in cōmento illius apho. In perturbationibus ventris. Si vis ergo certificari de humore peccante, fiat hoc per excrementa p̄ iuuantia & nocentia: vt dicitur nono de ingenio sanitatis. Effectus enim operis vnaquæq̄ actio comprobatur: vt dicit Galenus in cōmento illius aphorismi secundæ particulæ. Vbiq̄q̄, cibis. Et iste canon non solum in passionibus neruorum, sed etiā in omni morbo materiali, & proprie membrorum profund. verificatus reperitur: cum perfecta morbi cognitio sit eius semicuratio: vt dicit Galenus in libro de fe. ad Glauconem

Prognosticatio. Stupor & tremor a quacumq̄ causa fiant: super paralyfim illis membri, aut apoplexiam futuram significant. Item tremor & desipientia accidēs ebriosis, apoplexiam minantur. Vnde Hippo. 7. parti. apho. Ex multa potatione rigor & desipientia malum. Item stupor vel tremor, si fiant a casu vel percussione, & post curationem attricionis, & cōsolidationem vulneris remanserint: raro vel nunq̄ curantur: prout in ca. de paralyfi diximus: quia passionem significat profundatam fore vsq̄ ad neruos. Item si stupor & tremor fiant a casu & percussione & remanserint secundum dispositionem vnā, licet rationabiliter medicus operetur: significatur q̄ curari non potest: si vero cœperit de die in diē minorari dispositio, potest curari. Item stupor & tremor in senibus non curant.

De alitatione & oscitatione.

Cap. .V.

Alitatione est extensio alarum. i. brachiorum & crurū. Fit autē propter ventositates multas eleuatas ab humoribus flegmaticis, vel multitudine cibi indigesti replētis neruos et lacertos, inducentis in eis lassitudinem siue laborem spontaneum extensiuum, quem mēbra musculosa sentiunt sensatione quadam naturali: quia omne mēbrum corporis nostri sentit iuuamentū, vt ipsum attrahat: & nocumentum, vt expellat: cum talis sensatio sit operatio virtutis naturalis nutritiua, & animalis non cognitiua: quam Auerro. secundo colligit supra doctrinā Galen. addidit, et discretiua nuncupauit: quare extenduntur & mouentur, vt illam ventositatem expellant: & ideo fit maxime post quietem & somnum, & in habentibus nauseatiua satietatem. Oscitatio vero est operatio oris propter vētositates expellendas, ascēdētes a stomacho p̄ meri, vel iclusas in musculis & neruis mādibularum: & ideo fit maxime post somnum & ocium: quia sicut vigiliæ & labor ventositates carminant: ita somnus & quies ipsas augmentant.

Methodus. Cura istarū passionū est eadem oīno. Si igitur habitudo sit carnosa, & venæ apparētes, & color faciei rubeus, & subniger: et p̄cesserit vsus ciborū multiplicatiū sanguinē: fiat flebotomia cephalicē, quā se quāt fames, labor, ianitio, sudor, et vsus ciborū et saporū sanguinē diminuentiū: vt sunt lētes, agresta, vinū debile lymphatū ad medietatē. Si vero habitudo squalida flegmatica sit, color albus, palidus: et antecesserit satietas nauseatiua, et non apparuerint venæ in oculis et facie, digeratur flegma cum oxymelle composito vel squillitico: et euacuetur cum pillulis fœtidis vel cochis vsitatis, vel cum benedicta. vtatur cibis calidis et conditis cū pipere longo, gallāga, & zedoar: et similibus: et bibat vinū bonū,

Tractatus secundus

sed in parua quantitate, post euacuatio-
nes balneetur, & sudet & laboret.

Emperica. Hippo. docet curare istas
passiones cum potu vini
boni lymphati vsq; ad medium: vini
quidem propter digestionem: lymphæ
vero, propter impedimentum, quod vi-
num putrum inferretur. Vnde Hippo.
ait 7. parti. apho. Alces & oscitationes
vinum mensurate hibitum, soluit ægri-
tudinem: per mēsurate intelligit debere
esse tantum aquæ, quātum vini: sed cre-
dimus hunc aph. verum esse maxime in
causa flegmatica, quæ sæpius cōtingit:
nō in sanguinea. Credimus præterea ve-
rum fuisse tempore Hippo, sed non mo-
do: quia tēpore præfenti vinum causat
istas ægritudines, propter ipsius vsum
superfluum. Item Auicē. 3. canoñ. præ-
fenti cap. dicit q; masticatio acor a pro-
prietate curat istas ægritudines, & pro-
prie post euacuationem.

Canones. Scias, q; in cura cuiuscunq;
passionis humoralis, & pro-
prie cum corpus plethoricum vel caco-
chymicum videtur: hæc tria sunt per or-
dinem facienda, scilicet euacuatio vni-
uersalis, & euacuatio particularis siue
propria, & remedia localia, verbi gra-
tia. In passione capitis vitio flegmatis,
primo oportet euacuare flegma cū far-
maco a corpore toto: deinde approxima-
re sternutatoria & gargarismata & ma-
sticationes & caput purgia. Vltimo ve-
ro applicanda erunt emplastra, vnguen-
ta resolutiua, fricationes & balnea. Ra-
tio autem canonis secundum Gal. 11. de
inge. sanitatis. vbi loquēs de cura aposte-
matum interiorum, ait sic: Si namq; cali-
da resolutiua localia applicabuntur in
principio, magis attrahent ad locum: ex
eo q; omne resolutiuum est attractiuum,
cum plurimam materiam inuenit: nisi
forte fuisse melilotum aut camomilla, quæ
sunt leuia: vt excepit Auic. 2. can. de me-

lancholia. Si vero primo approximētur
repercussiuæ frigida circa mēbrum: tūc
reliqua membra circumiacentia non su-
scipient materias, cum supponatur cor-
pus esse plethoricum. Si vero primo fiat
euacuatio particularis & propria, eua-
cuabitur quædam materia præfens, sed
alia loco eius attrahetur a membris vi-
cinis.

Prognosticatio. Oscitatio & alitatio
cum multiplicentur
præter solitum, repletionem humoralē
significant immediate, sed febres putri-
das mediate: vt dictum est. Ventositas
vero eleuatur a materia semicocta &
indigesta: vt dicitur 5. de accidēt: quæ si
calori naturali non obediērit: putrescit,
& fiet per consequens causa antecedens,
& deinde coniuncta febrium putridarū.
Et in hoc finitur tractatus secundus.

TRACTATUS TER- tius primæ sectionis. De oculorum passionibus.



Culorum passiones licet sint
diuersæ, veruntamen quo-
niam ipsarum cognitio vt
plurimum corporaliter cir-
ca medicorum assistētiā,
perparum scripturis librorum addisci-
tur: idcirco dicamus tantum de quatuor
famosioribus: quæ sunt ophthalmia, la-
chrymositas, visus debilitas, & fistula
lachrymalis.

De ophthalmia. Cap. I.
Ophthalmia est apostematio o-
culorum & palpebrarum cum do-
lore plurimo, vel paucō: & quan-
doq; sit in altero oculorū tantum, quan-
doq; in vtroq; quandoq; in parte oculi
tātum. Fit autem a causa primitiua, scilicet
fumo, sole, puluere, casu vel percus-
sione: quoniam præter aliquod humorum
inducitur dolor in oculo: propter quod

materiæ currunt ad locum, & inducunt apostema. Aut a causa humoralis simplici, vel composita. Signa eius, quæ fit a causa primitiua, sunt antecessio alicuius istius: ad quod statim sequitur ophthalmia: quod scies ex relatione ægri. Signa eius, quæ est a causa humoralis, si a sanguine, sunt vehementia rubedinis oculorum in albugine, & palpebrarum: & magnitudo tumoris cum tensione: & apparitio venarum in oculis & fronte: & dolor grauius: & multitudo lachrymarum cum lippitudine: Si sit a cholera, fit dolor pungitius quasi fiat ab acu vel spina, & cursus lachrymarum adurienti maxillas, excoriantium loca super quæ currunt. Sed tumor & tensio est minor, quæ in sanguine, & color rubens vergens ad citrinum: Si sit a flegmate, fit dolor grauius non plurimus, inflatio oculorum magna absque rubedine: quæ cum tangitur, cedit digitis, & fit impressio in loco: & multitudo lachrymarum aquosarum cum lippitudine indigesta: et habitudo corporis humida. Si vero sit a melancholia (quod raro fit) apparet nigredo totius corporis, & extenuatio eius, tumor oculorum parus, paucitas rubedinis & lippitudinis & lachrymarum. Si vero materia sit composita, signa adulterabunt secundum conditionem simpliciū.

Methodus. Cura ophthalmiæ, quæ fit a causa primitiua, est tranquillitas & quies, & ut non videant lumen per aliquot dies: quia in omni motione corporis, &c. Humectetur seu abluatur oculi continue cum aqua decoctionis rosæ, nenuphar, viol. vel cum aqua rosæ. In qua psillium & caphora sint infusa. Et si per hoc prohibeat apostema, bene est: sin autem, curetur sicut dicitur postquam materia fluens fuerit cognita. Cura eius, quæ fit a sanguine, est ut primo curetur per flebotomiā basilicæ dextræ, si corpus est plethoricum: postea flōmetur cephalica

partis contrariæ, vel saphena partis eiusdem, ultimo vero cephalica partis ipsæ. Et si necesse fuerit: flebotomei post hoc vena recta frōris, vel prouocetur fluxus sanariū, vel diuerſa materia ad partē posteriorem cum scarificatione auris & veteratione colli et cauterizatione ipsius cum ferro aut cātharidibus: aut ad partē superiorem cum scarificatione verticis profundata post rasurā capillorū: deinde purgetur cum medicina sanguinē mundante. ℞. mānæ .3. tamarindorū .3. i. & f. dissoluatur cum aqua decoctionis prunorū, & sit aqua non ultra .3. necq; infra .4. de tōrti in matutinis: deinde distillantur re percussa intra oculū, sicut est lac mulieris, & proprie lactantis puellæ, & sicut est sieff memithæ. qd sic fit. ℞. memithæ, ros. aloes, licij, sandal. gallarū, croci ana .3. 2. terantur in ultimo, atq; cribellentur, & fiat sieff. i. torchisci, qui exiccetur in umbra. Et cum vti volueris: dissolue vñ ex eis in aqua ros. vel succo plantaginis, vel endiuix: & liniatur sepe intra oculos & super frontē circumquaq;: quoniam materias repercutit, mēbrum fortificat, & prohibet apostema. Similiter super oculos & tempora ponatur illud emplastrum. ℞. foliorū solatri, virgæ postoris, arnoglossæ, teneritatū rubi, foliorum vitis, & endiuix, se, papaueris, cicoreæ, acetosæ, sempivix, florū camomillæ, ros. rub. añ. m. i. pistentur, & bulliātur in aqua & incorporētur cum farina ordeī, & ponatē tepidū sup locū, vel ponātur sup frontē & oculū petiæ lineæ infusa in succo solatri & aqua ros. & aceto. In augmento vero & adhuc magis instatu addat aliqua resolutiua cum percussione: sicut ē emplastrū tale. Coquātur tria pomæ in cineribus vel prunis, & mundetur, & cum eis incorporētur tres vitelli ouorū et semē lini, & tepidū ponat sup locū: hora vero fortis doloris & proprie in prim

Tractatus tertius

cipio stilletur collyrium albi in oculos: quod sic fit. ℞. ceruſæ ablutæ 3. 4. ſarco collæ nutritæ in lacte aſinæ vel mulieris 3. iij. amyli 3. 2. dragaganti 3. i. opij 3. 5. terantur ſubtiliſſime, & cribrentur, & incorporentur cum aqua roſ. & fiet ſieff. .i. trochiſcus paruus: & cū vti volueris, diſſoluatur de eo parum in aqua roſ. vel in lacte mulieris, donec fiat ſicut mel curſens, & ex hoc ſtilletur ſæpe in oculos: quoniam dolorem ſedat, & materias repellit, atq; vlcus prohibet vehementer. Abluantur præterea ſæpe, & fomententur facies, manus & pedes cum aqua decoctionis ſtorum camomillæ, meliloti, ro. plantaginis cicoreæ: quia diuertit materias. Bibat aquam decoctionis prunorum vel berberis, vel aquā mixtam cū agreſta vel vino granatorū, ſed nequaquam vinum, niſi forte in declinatione: tunc namq; poteſt bibere vinum album debile lymphatum gradatim a multo ad paucum. Nutriatur cibus paucū ſanguinem generantibus: ſicut lactucis, portulacæ, farina ordeï vel auenæ. Quod ſi virtus fuerit debilis: vtiatur carne pulloꝝ vel hœdorum alterata cum herbis prædictis vel ſeminib; earū: vitet cibos et potus vaporoſos: vt ſunt allia, cepæ, vinum, porri: vitet etiā cibaria ſancturbaria: vt caules, fabas, lentes, ceruiſiam &c. Diminuat cœnam propoſſe, & ſomnum multiplicet, ſed non ilico ſuper cibum: quoniam ſomnus & leuitas ventris omni die ſunt medicamen bonum in omni ophthalmia, & proprie de cauſa calida. In ſtatu vero & adhuc magis in declinatione ſillet in oculos ex collyrijs, quæ dicemus poſtea in Emper. & capitulo de debilitate viſus. Cura eiꝝ q̄ ſit a cibo eſt, vt a principio mūdicetur cū medicamine ſupradicto, vel iſto. ℞. aquæ decoctionis prunorum 3. 4. in qua cū fuerit ſeruens, ponantur 3. 2. reubarb. pulueriſati, & dimittatur ſic per horas.

12. poſtea coletur, & in colatura illa ponantur 3. 2. ſyrup. roſ. vel viol. vel ſyrup. de nenupha. & detur totum ante diem. Deinde ſecure fiat ſiebotomia cephalicæ manus partis læſæ, vel ventolaſio in ſpatulis et collo: quia ſicut poſteriora capitis dolentia in fronte recta vena incifa iuuat, vt dicit Hippo. econuerſo, quia diuerſio materierum a loco omni quaq; iuuat, & ponantur embrocæ, & emplaſtra repercuffiua ſup locū dicta ſupius. Sed plus addatur de ſolatro & a ceroto, q̄ in ophthalmia de ſanguine: fomentent manus & crura ex aqua calida ſupradicta: quoniā materias diuertit ad exteriora. Stilletur in oculos muſcillago pſilli, vel muſcillago ſe. citoniorum: & ſi dolor ſit fortis, diſſoluatur in eis opij granum 1. Iſtæ adiutoria & coxæ vſq; ad dolorem: in fine ponatur collyrium album ſupradictum in oculos, niſi q̄ loco ſarco collæ poni debet pſilli 3. 1. in alijs fiat ſicut prius. Cura eiꝝ, quæ de ſlegmate, eſt vt purgeſ a principio cū pillulis cochijs vel cū his. ℞. turbit. 3. 1. et ſ. zinz. 3. 5. zuccari 3. 2. terantur, & miſceā ſ: & detur totum in mane cū aqua decoctionis ſeniculi. Super oculū ponat emplaſtrū calidū factum ex farina ſenigraci, & muſcillagine eiꝝ, & ſtorum camomillæ et meliloti, piſtando omnia & incorporando cū muſcillagine ſenigraci & dragaganti. Et potes addere duo vitella ouoꝝ quia bonū ſit et anodinum. Deinde poſt 6. vel 7. dies & poſt duas mūdicatio nes ad plus, pone ſuper oculum & intra, collyrium de ſarcocolla mūdicatiuū et incarnatiuū vlceroꝝ oculorū: quod ſic fiat. ℞. ſarcocollæ nutritæ in lacte mulieris 3. 4. licij, aloes, drag. añ. 3. 2. ſpumæ maris, croci. añ. 3. 1. & ſ. ſucci chelidonix 3. iij. terantur ſubtiliſſime: vt alcohol, & diſſoluantur in vino albo & aqua roſ. coletur, et liquidū ponat in oculos. Bibat aquā mellis vſq; ad declinationē.

vel aquâ decoctionis iuiubarum & mel-
lis, comedat aquam cicetum, farinâ vel
auenam. Condiantur cibaria sua cū pul-
uere facto ex cinamomi 3. 2. cardam. 3. 1.
eroci 3. 1. Cum autem morbus declina-
uerit, comedat carnes pullorum vel hoc-
dorum coctas cum feniculo, petro. bor-
rag. spinarg. & similibus, & tunc potest
bibere vinum album debile lymphatū.
Fiant ablutiones manuum, faciei & pe-
dum cum aqua decoct. absinth. mel. ro.
rub. storum camomil. Cura eius, quæ est
de melancholia, est vt primo purgetur cū
pillulis foetidis vel dialene: deinde post
mundificationem omni die abluatur se-
mel vel bis manus, facies pedes cū aqua
decoct. sumi terræ, absinth. ros. ru. viol.
meliloti: & balnearur in aqua dulci, &
inclinet faciem sup vapore aq calidæ dul-
cis in oculos & superponatur collyria et
emplastra dicta de flegmate. Cura eius,
q̄ est de materia cōposita, ē cōpositio re-
mediorū secundū exigentiā suę causæ.

Emperica. Dicit Hippo. 6. part. apho:
Dolores oculorū meri po-
tiosanat, aut lauachrū, aut flebotomia,
aut farmacia: quod pertractans Galeñ.
in commento ait, q̄ conuenit meri portio
si fuerit ophthalmia de flegmate vel me-
lancholia: & in corpore plethorico pro-
prie, & p̄missio balneo aquæ dulcis: sed
oportet vt sit merū lymphatū parūper:
& post eius potum dimittatur patiens
dormire. per hoc enim materia grossa
secca vel viscosa subtiliabitur, & hume-
stabitur, vt fluere possit extra oculos, et
dolor cessabit. Conuenit lauachrum, id
est balneū aquæ dulcis, saluis tribus con-
ditionibus: quarum prima est vt corpus
sit bene euacuatum euacuatione vniuer-
sali: secunda est, vt materia sit acuta, sci-
licet cholericā vel de flegmate salso: ter-
tia, vt materia remanens sit pauca, sic
namq̄ balneum euacuabit reliquias eua-
cuationis p̄missæ. Cōuenit aut ptyria. i.

fomēratio oculorū cū spongia imbibita
in aq̄ calida dulci, deinde exp̄ssa, donec si-
at aliquātulū rorida quasi sicca, vel py-
ria. i. inclinatio capitis super vapore aq̄
calide dulcis, sicut et balneū cōpetit. Ve-
rū in hoc refert: q̄ si materia sit plurima
augmentat̄ dolor oculorū propter attra-
ctionē: & sic dirigit nos in curā artificio-
sam, q̄ est q̄ euacuare debemus corpus
ante pyriam: Si vero materia sit pauca,
p̄fecte resoluet̄. Cōpetit si flebotomia, si
corpus abūdet in sanguine solo, vel i oib̄
humoribus simul aqualiter: qm̄ flebot.
euacuat multitudinē, vt di. Auic. Cōpe-
tit farmacia, si alius humor a sanguine
sit causa ophthalmiæ. Itē dicit̄ exp̄ti q̄
aliqud olei ro. cū duplo ei⁹ vini granatorū
acetofoꝝ cōquassatū, & positū sup rube-
dinē oculi vel sanguinē q̄ est ibi propter
fricationē, aut p̄cussionē sequēti die vel
tertia curat, & proprie post purgatoinē,
vel flebot. vel scarific. in collo & spatu-
lis. Collyriū exp̄tū ad oēm ophthalmiā
ex quacūq̄ causa fuerit, & q̄ cūq̄ t̄pe
morbi, et ad oēm visus debilitatē, sic sit
℥ss. tuthiæ extinctæ in aceto tribus vici-
bus, et sex vicib⁹ i aq̄, ros. 3. 2. ita q̄ post
quālibet extinctionē remoueat̄ acetū &
aq̄ ros. lapidis calaminaris, vel hamati-
tis extincti i aceto. 2. vicib⁹ et in aq̄ ros.
4. vicibus 3. 1. coralli. et rub. añ. 3. 2. ossis
sepiæ, cāphorę. añ. 3. 1. aq̄ ros. qd̄ sufficit
terat̄ oīa vt alcohol, cribellēt̄ p̄ pānū
sericeū de p̄ssum, & cōmisceat̄ cū aq̄ ro.
sicut decet collyria, et ex eo fūllēt̄ frequē-
ter in lachrymali: q̄ repercutit, stypticat,
et abstergit: quare cōfert̄ etiā in fistula la-
chrymali, & fluxu lachrymarū cū lippī-
tudine. Sed tūc loco aceti & aq̄ ro. capia-
tur aqua feniculi, & aqua chelidonis, et
aquā rutæ. & vrina pueri masculi non-
dū polluti. Et in causa ophthalmiæ cho-
lericā pōt̄ addi licij, acatiæ, amyli, dra-
gagari 3. 1. In causā vero flegmaticā pōt̄
addi sarcocollē intinctā i lacte mulieris

Tractatus primus

3. 2. In causa vero melancholica, climiæ aurilotæ & postea adustæ, & extinctæ in lacte mulieris 3. 2. In dolore forti pōt addicerusæ lotæ 3. 2. opij boni 3. 1. & est descriptio magistralis aggregata ex autenti. Mesue et Almanf. Puluis conferēs omni ophthalmiæ, & inflāmatiōi oculorum, & fluxui lachrymarum, & pruritui sic fit. ℞. thuthiæ, lap. hæmatitis añ. 3. iij. litij, climiæ auri, amyli, añ. aureū. 1. spicæ, opij, sumach, ana. 3. f. aloes rubei, boni 3. 1. zuccari, tabarzeth 3. iij. F. ex omnibus puluis subtilissimus, & imbibatur vice vna in aqua mirobala norum citrinorum, & vice alia in succo fen. & vice alia in succo coriandri recentis, quarta vice in aqua sumach, & quinta vice (si est tempus) in succo granatorum muforum: ita, vt post quālibet imbibitionem exiccetur: & curat perfecte. vltimo vero misce cum eis camphoræ quartam partem 3. 1. deinde iterū tere, & scribra per sindonem, & reserua in vase vitreo bene obturato, & pone ex hoc puluere in oculos: quia expertum est: vt dicit Mesue in suo de appropriatis ca. de ophthalmia, auctoritate Hamet. Et si velles ex eo facere collyrium sublime ad easdem intentiones & ad fistulam in lachrymali, ponerēs res omēs post quintam imbibitionem quando sunt sub forma mellis currentis, vel pulvis in alem-bico, & distelles, sicut faciendo aquam rosarum.

Canones. Dicit Ras. in diuisionibus: q̄ in omni ophthalmia ex quacūq; causa fiat, confert balneum aquæ dulcis in finibus eorum, quod est post digestionem materiæ, & euacuatiōnē. Confert præterea, vt medicinæ quæ applicantur oculis, vel membrīs alijs cerebro propinquis, nequaquā sint frigidæ vehementer actu vel virtute: quia materias incuneant, & membrorum nobilium destruunt calorem, Confert simili-

ter, vt oculi non intueantur lucē, sed sint in loco obscuro: donec spiritus visibiles congregentur, & fortificentur.

Prognosticatio. Ophthalmia si non curatur, perducit ad fistulam in aliqua tunicarum septē oculi: & deinde ad cæcitatem. Item Hippo. e. paticu. aph. In oculis patiētem a diarria accipi, bonum:

De lachrymositate oculorum. Cap. II.

Fluxus lachrymarū tribus fit modis: Primo post incisionē factā in cura vngulæ, vel caracaciæ: secundo ex effusione multarum materiarum ex cerebro & venis & arterijs, quæ sunt sub craneo per nervos opticos: tertio ex effusione materiæ ad oculos ex venis nervis atq; arterijs, qui sunt extra craneum, vel qui apparent in temporibus. Et vnde cūq; fluxerit materia, vel est acuta calida, vt pote de cholera vel flegmate salso: vel est frigida humida aquosa. Signa eius quæ sit propter incisionem vngulæ, vel alterius ægritudinis in oculo, sunt antecessio talis curæ. Signa eius, quæ sit ab humore acuto vel salso, sunt pruritus, & ardor & inflammatio in loco, quem lachrymæ tangunt: & gastrumacho ieiuno & tempore calido magis infestat: & quoniam vsus piperis, alij & ceparum et aliorum acutorum nocet. Signa eius, quæ sit ab humore aquoso, sunt multitudo lachrymarum sine ardore loci, super quem currunt, & quia ē pore frigido, & post cibum multiplicatur: & quia vsus ciborum humorosorū, & nimius potus vini eas multiplicat. Vtrum autem fuerit extra craneum vel intra, potest cognosci a iuuāribus & nocentibus rationabiliter exhibitis, & ex significatione & sensatione infirmi: & quoniam vena apparēs, vel arteria magis pulsatur solito vel debito in temporibus:

& est cum maiori timore, q̄ sint alia.

Methodus. Cura eius, quæ fit propter incisionem factam in cura alicuius passionis oculorū, est vt post incisionem confortetur oculus cum emplastro: quod sic fit. ℞. corticis granatorum, lentium excorticatarum, plantaginis, virgæ pastoris. añ. m. i. pistentur & incorporentur cum muscillagine dragaganti. Ad idem. ℞. succi solatri vel burse pastoris, vel semperuiæ. ʒ. iij. & misceantur cum bolo armenico, sang. draco. terra sigillata, & albumine oui, & ponantur super oculum & tempora & frōtem. Cura eius, quæ fit ab humore acuto vel salso, est vt præmissa digestionē materię cum syrupo de fumo terræ vel (si nō sit præsto illud) cum syrupo acetoso, & aqua decoctionis rerum ducentiū virtutē syrui ad oculum: & feniculus, eufrasia, nux muscata: purgetur cum pillulis cochijs de reubarbaro, dictis capitulo de dolore capitis. Post hoc flebotomē cephalica partis eiusdem, & super frōtem & tempora ponatur emplastrum. ℞. boli armenici ʒ. ʒ. mastitis, dragaganti añ. ʒ. 2. puluerisentur, & misceantur cū albumine oui vel muscillaginis dragaganti. Super oculum vero ponantur petiæ infusæ in succo semperuiæ, vel solatri mixto cum agresta & puluere gland. myrrhæ, & boli armenici: intra oculum ponatur collyrium albū: quod diximus capitulo de ophthalmia sanguinis. Cura eius, quæ fit ab humore aquoso, est vt præmissa digestionē cum syrupo de sticados, vel (præsto non sit illud) cū oxymelle composito, & aqua decoctionis feni, vel basiliconis. Purgetur cum pillulis cochijs vel fetidis, vel hierapicra, vel medicina de turbith. deinde fiat cauterium in vertice capitis, vbi terminat medius digitus, quādo radix manus patientis ponitur super radicē nasi, & profundetur vsq; ad cranium, & dimittat

apertum vno mense integro, ita vt om̄i die purgetur a sanie bis: vel rubificetur idem locus cum emplastris calidis acutis, dictis capitulo de lethargia: atq; scarificetur abrasis primo capillis. Similiter & super collum vicibus frequenter super oculum, & intraponantur omnia medicamina iā dicta. Sæpe abluantur oculi cū aqua pluuiali decoctionis gallarū, thuris, mastitis, myrrhæ, boli ar. nucis cypressi: & sit aqua actū calida apud eius vsum. Cibetur ex cibis stypticis, & carnis assis conditis cum agresta, vel vino granatorū, vel berberis: & huiusmodi sunt lentes excorticate: & aliquando sumat aquam pisorum, & herbam feniculi. Bibat hydromel, vel vinum rubetū debile lymphatum cum aqua pluuiali vel cisternæ. Sumat semper post prandium & cenā ʒ. ʒ. electuarij de citonijs, vel ʒ. i. diaolibani: & bibat desup aquā calidam, sed nō frigidam: quoniā exstat catarrhosa: vt ait Mes. ca. de catarrho.

Emperica. In constrictione lachrymarum, et cōsolidatione noui vulneris in oculo, conferunt collyria dicta capitulo præcedenti. Ca. de empericis. Confert ista cōfectio. ℞. tuthiæ. ʒ. ʒ. teratur perfecte in mortario mundo, & addatur ei. ʒ. i. aquæ ros. & ʒ. i. vini granatorum acetosorum in causa calida, aut vini alb. veteris clari in causa frigida: & post incorporationem perfectam istarum rerum in mortario colat hoc totum cum petiā munda: & de ista colatura ponatur om̄i die mane & sero intra oculum, et in breui tempore fiet lachrymarum constrictio, & vulneris cōsolidatio, præmissis remedijs vniuersalibus. Item communiter operātes in cura lachrymarum præmissa vniuersali euacuatione cum flebotomia vel farmacia supradictis, incidunt venas & arterias frontis per transversum, & proprie si fluxus sit extra cranium: sed in hoc erit ri-

Tractatus tertius.

mor casus palpebrarum: quapropter alij faciunt cauterium cum acu ferrea ignita cum filo laneo grosso traducto super collo & pulpis aurium, & dimittunt sic apertum, donec multa aquositas effluerit: quia per hoc fit diuersio materiarum: vel faciunt vesicationem cum catharidibus & fermento, si patiens cauterium abhorreat. Deinde ponunt in oculum collyrium album dictum, vel confectionem ex tuthia extincta. Item ad lippitudinem oculorum quidam accipiunt vitreolum, mel, et album ouium, antimonij partes aequales, et perfectetur, et incorporant in mortario, et ponunt super oculos sero, cum itur dormitum: et mane abluunt oculos cum lacte mulieris. Collyrium album sublime et expertum ad omnem maculam oculorum, et lippitudinem, et fluxum lachrymarum, visum custodiens cum virtute, sic fit. ℞. armoniaci, florum aris, arsenici ru. sandali, an. 3. ij. tuthie. 3. i. vitrioli, de quo fit incaustum. 3. iij. chelidonie, rute, an. m. i. succi feniculi lib. i. et si perficitur, et simul misceantur, et fiant madaliones, et ponantur in alembico super fornacem, et distillantur: sicut fit aqua rosae. Et ex eo stilletur in oculos omni die mane et sero: quia mundificat, abstergit, exiccat, et confortat oculos excellenter, et spiritus visuos subtiliat. Sieff de thure, quod ponitur in oculos in vlceribus eorum: quia exiccat, consolidat, & incarnat, & corneam confortat, ne ruptur, & vena egressi non permittit: sic fit. ℞. armoniaci, sarcocollae, an. 3. s. thuris. 3. ro. croci 3. 2. conficiantur cum muscillagine fenigreci, vel semis lini: & fiat sieff. i. trochisci parui: & cum vti volueris: pulueriscentur ut alcohol, & ponatur ex eo in oculos, vel dissoluatur cum aqua rosae. vel succo endiuiae ad modum collyrii subtilis. Sieff de plumbo, quod incarnat, & consolidat vlcus in oculo post rupturam ophthalmiam, vel casum vel percussione, & confert

plurimum fistulae lachrymali, & dolore oculorum sedat potenter, sic fit. ℞. plumbi adusti, gummi arabici, antimonij, tuthiae abluta aris vsti, dragagati. an. 5. s. opij. 3. s. fiat sieff cum aqua pluuiali, & vt uter collicut primo. Ars abstergendi omnes maculas accidentales in oculis prohibens visum, quae albumines vel vngulae nominantur, & proprie cum fuerit molles, tenerae, recetes, hoc est quia durae antiquatae, solo ferro remouentur. ℞. aris vsti, florum aris, arsenici ru. vel citrini, & proprie sublimati, salis nitri, vel salis armoniaci, gummi arabici, vitrioli adusti, vitrii combusti, sarcocollae, spume maris, licij, aloes rub. boni, myrrinae, croci, mirobalanorum citrinorum, baurach, ossis sepiarum piperis longi, omnium eorum vel quorumcumque ex ipsis volueris quantum vis tere ultimo, atque cribella per sindonem defumum, & ex ipsis in oculis pone modicum omni die, scilicet mane & sero, donec res eis addite consumantur. Est namque continens fere omnia corrosiua: quare nomina sortitur diuersa, ita ut a quibusdam puluis ru. ab alijs viridis, ab alijs albus vel citrinus, vel puluis de vitreolo nuncupetur. Quod si mordicatio nem & corrosione oculorum timueris ex ipsis, imbebe per noctem vnam aut amplius puluerem predictum in aqua rosae. vel lacte mulieris. deinde exicca in umbra, & tere, & cribella: sicut prius ex stypticis, incarnatiuis, quae sunt tuthia abluta & spodium & camphora corallium, rosa sicca, antimonium, plumbum vsti, atque thus. Si vero puluerem predictum facere volueris magis confortatiuum oculorum, ad de margaritarum & cathimiae auri & argenti. Si vero magis artificiosum, imbebe ipsum vice vna in vino albo, ventero, claro, & vice alia in vrina hominis sani perfectae, vel in vrina caprae, & vice tertia in aqua feniculi, vel succo eius, si tempus fuerit: & vice quarta in succo

rutę: & vice quinta in aqua chelidonie, ita vt post quālibet imbibitionem pfecte exiccetur, & iterum teratur, & cribellentur vltimate. Si aut collyrium ex ipso facere volueris ad eandē operationes, pone res oēs in alembico post quintam vel quartā imbibitionem, cū sunt sub forma mellis currentis, & distilla sicut aquā rosę, ex qua omni die bis stilletur aliquid in oculos, loco pulueris supradicti. Aut decoque res omnes tritas in aqua clara, vel vino albo pontico vel mixto ex eis aliquid, donec redierit ad quartā partem, & sit proportio pulueris ad aquā vt vini, sicut proportio quatuor ad sex. Prior tamen modus pfectionis reperitur: aut dissoluatur puluerum in aqua decoctionis acori, vel senę, vel rutę, postq̄ fuerit optime colata, & cum ea cōquassetur, sicut decet collyrium, & ex ipsa stilletur in oculos: quia est fortitudinis extremā, ita vt maculas abstergat in oculis equorū, aut cōquassentur res eadem cum aqua rosę, quia est lenior modus omnibus supradictis. Et si adhuc magis refrenare volueris eius mordicationē: adde ceru sabbulę bis in aqua rosę, vel amyli, & fiat ex eis collyriū album, de quo stilletur in oculos sæpius in ieiuno, & sero cum itur dormitum sine coena: omnia autem sicca terantur vehementer.

Canones. Medicina, quę ponuntur in oculis si sunt in substantia liquida, vt collyria, debent esse in vltimo claritatis & puritatis: Si vero in substantia sicca, vt sieff. & pulueres, debent esse in vltimo paruitatis & subtilitatis, qđ apud medicos alcohol dicitur quoniam oculus est mēbrum tunicosum pāniculosum, sensitivū cū acuitate vltima: q̄re medicinę grossę nō penetrabūt: sed stātes circa superficie tunicę corneę, & cōiunctione ipsam vlcera bunt. In medicinis p̄terea oculorū nō cōpetit vt

calidis acutis, nisi cū stypticis reprimāt: ne forte humiditates tres crystallinā albugineā & vitreā colligant, & tunicas septem oculorū corrodant: cū oculus ex p̄dominio cōstet aqueo: vt probat Aristot. in li. de sensu & sensato: propter qđ accidit, vt fumus, sulfur, coitus, allia, piper, oculis noceāt vndiquaq̄. Præterea dicit Ras. in diuisionibus, et Mes. in suo de appropriatis, cap. p̄senti, qđ si fuerit effusio materię ad oculos per vias, q̄ sunt intra cranium, raro est curatio, nisi sit i principio, & materia pauca: quod contingit propter difficultatē penetrationis medicinę. Et si quidē curari pōt aliquo modo, curatur cum puluere isto. *Isē, tuthiæ ablutę 3. i. o. aloes, corallorū, licij, gummi armoniaci assij, dragagati, masticeis, hæmatitis, olibani, oīm añ. 3. 2. corticū mirobalanorū citrinorū 3. iij. piperis longi 3. 2. fiat pul. subtilissimus: vt alcohol. & ponatur intra oculos: est em vltimum in restringendo.*

Prognosticatio. Lachrymę si restringi nō possunt, humores nutritiuos oculorū primo diminuunt: deinde humores tres q̄ sunt crystallinus, vitreus, & albugineus: & tandē substantiam oculorū consumēt. Et si fuerint acutę vel salsę, corrosione vel fistulā inducēt: & demum excitatē completā: quapropter in principio succurratur. Item lachrymę accidunt vt plurimū habetibus caput humidum catarrhosum: qđ si fuerit ex regimine, curatur facilliter: si per naturam & ex generatione, difficile.

De debilitate visus. Cap. III.

Debilitas visus appellatur, cū homo sine macula, vel aliqua manifesta oculorum passione, diminue videt: neq̄ discernit res, vt oportet: velut accidit in senibus & decrepitis per naturā, & quandoq̄ iuuenibus propter aliquam causam nō naturalem: vt puta

Tractatus primus

propter mutationem organorum secundum compositionem & complexionē. Hæc autem mutatio accidit iuuenibus ex mala complexione oculorum calida vel frigida, humida vel sicca. Senibus vero ex depascencia assidua humidit radicalis a calore naturali: quoniam cum aliqua causarum huiusmodi vehementer confirmatur, facit ipsorum tunicas inspissari, necnon humiditates accidentales augeri, quibus spiritus visibilis obtunditur: similiter & species rerum visibiliū prophanantur: veruntamen hic perpenditur necessitas mortis naturalis in animalī: quia propter actionem cōtinuam calidi naturalis in humidū radicale membrorum, & proprie cordis, tandem excutatur corpus, & consumitur humidum, & per consequens coextinguitur calidū. Et istam actionem vocant philosophi materiæ necessitatem: cum impossibile sit ipsam non reperiri omni tempore in rebus naturalibus conueniētiū in materia prima, quæ est hyle. Fit autē quandoq; ex humiditate: & signa sunt: quia multiplicatur post comestionem & nauseatiuam satietatē, & proprie post expgefactionem a somno: quia tūc apparet coram oculis ipsorum quoddam ad modum aquæ vel nebulæ. Et q; oculi emittunt lippitudinem indigestam, & proprie post somnum. Fit etiam quandoq; a siccitate: & signa sunt q; fortificat passio tēpore famis & in meridie, sed alleuiatur post cibum & somnum: & q; oculi semper apparēt sicci, et sentitur pruritus in ieiuno. Fit quādoq; ex malitia stomachi: propter quod ista debilitas visionis non est semper, imo fit fortis, cum est satietas nauseatiua propter vapores diuersos ascendentes: & discernitur omnino tempore famis: sicut contingit ebriosis & bibulis, et sentit citius alleuiationem ex medicinis mūdificatiuis, quādo est ex stomacho q̄ ex passiōe propria oculorum.

Methodus. Cura eius quæ est ab humilitate, est vt digeratur flegma in capite cū syrupo de sticados: cuius descriptio secundum Mes, hæc est. ℞. florum sticados arab. 3. 10. hyssopi, albasce, calamenti, origani añ. 3. 10. anisi, pyretri añ. 3. 7. piperis longi. 3. iij. passulorum enucleatarum 3. 4. mellis lib. 5. condiuntur cum cinamomo, calamēto aromatico, croco. zz. nucis musca, cubeb. omnium añ. 3. 1. & f. liga in panno raro, & suspende in syrupo hora decoctionis. Hic syropus a proprietate respicit caput, & digerit omnes materias flegmaticas in cerebro collectas: quapropter est conferens sodæ & catarrho frigido, vel digeratur cū melle ros. colato, addēdo in digestiue cum his syrupis. sticad: nucem muscaram & omnia ducētia ad caput. Post illud purgetur cū pillulis lucis minorib; vel cochijs vel foetidis: vel cum pillulis lucis maioribus, quia a proprietate purgant humiditates cerebri anteriores, & sensus omnes acunt & proprie visum: quæ sic fiunt secundum Mes. ℞. xylob. oppob. se. ru. squinanti, masticis, gariofil. añ. se. apij, cassielig. croci, macis añ. 3. 1. ros. viola. absinth. cubebe. calami aromatici, nucis muscatæ, carpopb. spicæ añ. 3. 2. reubar. boni, mirobal. omnium, agarici, sene. añ. 3. 4. colloquintidæ, licij, lap. lazuli loti. añ. 3. 6. confice cum succo fen. vel rutæ vel chelidonix, vel eufrasix, vel vino claro al. veteri. & da a. 3. 2. vsq; ad 3. 4. Et descriptio aggregata ex maioribus et minoribus: qm̄ modicū differunt inter se secundū compositionem vel virtutem: vel cum pillulis de agarico, quæ sic fiūt, ℞. aloes. 3. 2. colloquintid. sticad. turbith. añ. 3. 1. masticis ros. zz. cassiæ lignæ. añ. 3. 6. agarici. 3. iij. fiant pillulæ cum succo rutæ: quorum dos. est a. 3. 1. vsq; ad 3. 2. Hæc pillulæ euacuant potenter flegma, & omnem materiam grossam viscosam, & ab omni

parte corporis, & proprie a capite: & ideo valent in apoplexia, epilepsia, paralyfi, soda frigida, catarrho. Cibetur carnibus assis & cibus siccis: vtatur sæpe semi. fen. in cibo & potu, similiter & sivele. Bibat hydromel, vel vinum rubeū lymphitū parumper cum aqua simplici, & quandoq; cum aqua decoctionis rutæ, vel in aqua, vbi posita sit ruta: recipiat semel in septimana. 3. f. tiriæ veteris bonæ stomacho ieiuno cum vino, vel aqua decoctionis rutæ vel seminis fen. Et est de melioribus rebus in hoc casu. Exercitetur præterea, & sudet, & laboret in ieiuno, modifiet cibū & porum pro posse: distillet in oculos aquam basiliconis, vel chelidonæ eufor. bethonicæ, vel rutæ, vel fel caprinū, vel fel galli, vel fasiani, vel perdicis cū melle crudo purissimo, vel collyriū de fellibus, vel collyrium album positum capitulo de ophthalmia, vel collyrium de tuthia bonū, & expertū: qd sic fit. ℞ tuthiæ. 3. f. lapidis calaminaris. 3. i. faui mellis. 1. mellis crudi: sicut exprimitur a fauo. 3. 2. gariofi. numero. 2. terātur vt alcohol, & incorporentur cum vino al. veteri subtili: q; si timueris corrosione ex tuthia, igniatur super lamina ferrea 10. vicibus vel pluribus, & totiens extinguitur vel in aqua ros. vel plāraginis: & idem obseruetur de lapide calaminari. Sic namq; lachrymas exiccat, spiritus subtiliat, & vlcera consolidat perfecte. Cura eius, quæ est propter siccitatē, est impinguare corpus pro posse cum piscibus recentibus bonis, & iuribus carniū bonarum conditis cū speciebus dulcibus, scilicet cinamomo, cardamomo, croco, folio, gallāga, & zuccaro: vtat vino claro dulci. Comedat ficus, fisticos, auellanas, pineas, cicera fracta, & pisa, oua sorbilia, & pulres conditos cū lacte caprino dulci. Caueat a rebus acutis, & oleo, vino puro veteri, fumo, vte

to, a coitu, & oculorum fatigatiōe plura scribēdo vel studendo: sæpe balneet in aqua dulci tepida post digestionem pram præterq; q; sudet: aperiantur oculi sæpius in aqua frigida, vel stille in eos lac mulieris vel asinæ, vel oleum viol. vel abluatur quādoq; cum aqua decoctionis, violæ, fenigraci, & maluaufci. Cura eius quæ fit vitio stomachi, est vt rectificemus stomachum digerendo humores calidos cum syrupo acetoso, vel humores frigidos cuimoxymelle composito. Post illud purgetur cum medicinis porprijs vtriq; causarū, quas dicemus ca. de stomachi debilitate. Veruntamen hic pul. confert omni quaque. ℞. aloes. 3. i. myrrhæ. 3. i. masticis. 3. i. terantur omnia subtilissime, & cribellentur, & transgultiatu totum simul cum zuccaro, vel melle, vel alia re offuscante ei amaritudinem. Aloes enim licet sit indelectabile ori, est tamen delectabile & proficuum stomacho: vt dicit Galenus. 2. de ingenio sanitatis: & ideo in eius administratio ne debet lingua patientis extrahi, & aloes inglutiri. Vtatur omni die in ieiunio electuario pliris, diagallanga, diatriū piperon: & bibat desuper 3. iij. vel 4. aquæ calidæ. Nutriatur cibus & potibus dictis superius capitulo de debilitate visus propter humiditatem. Vtatur etiam collyrijs: & aquis dictis ibidem.

Emperica. MEDicamen sublime ad quacumq; causam debilitatem oculorū extinguitur in vrina pueri nondum poluti tribus vicibus: & in aqua fen. tribus vicibus, corallorum al. & ru. añ. 3. iij. extinguantur in aqua fen. vicibus. 2. margaritarum. 3. 2. camphoræ saphiurum, spodi. añ. 3. f. musci. 3. f. terantur omnia vt alcohol. Postea ponātur in mortario, & addatur aqua fen. donec

Tractatus tertius.

redeat ad spissitudinē pulmenti vel mel-
lis: & post hoc subfumigetur cum ligno
aloes, exiccetur, & iterū perfecte pulveri-
setur, & per sindonem cribelletur. Et de
hoc pulvere ponatur in oculos omni ma-
ne & sero, & cum vti volueris, fac ex eo
cum aqua feni. collyrium. Virtutem vi-
siuā confortat, humiditates exiccat, ma-
culas abstergit. Sunt præterea quidam
excellentes in hac arte, qui valde appre-
tiant hoc collyrium. ℞. sileris montani,
maioranæ, eufrafiæ, rutæ, chelidonis,
feni. añ. 3. iij. zz. spicenardi, piperis longi,
gariosi, tuthiæ extinctæ in purissimo suc-
co feniculi vel maioranæ, aloes, añ. 3. 1.
fellis aquilæ, accipitris, hirci incoletis
montana, fellis galli, perdicis, fiasiani, lu-
pi, leporis, vrsi, vel vulpis, vel vulturis,
vel capreoli, & omnium animalium vi-
uentium de rapina: dummodo sint sana
et ætatis perfecta, nō decrepita, de quo-
libet vnum fel. balsami. 3. f. mellis ros.
collati, 3. 1. puluerisanda puluerisuntur, li-
quesienda liquefiant, & conquassanda
cōquassentur in vltimo (sicut decet) cel-
lyria: & si sit æstas, misceantur in sole cali-
do per dies 40. quotidie semper agitan-
do, atq; commiscendo. Si vero fuerit hy-
ems: agitetur modo consimili in vase du-
plici ad ignē lentum, vel subtus cineres
& arenam calefactam: in fine vero co-
letur, & conseruet in vase vitreo, & ocu-
lis instilletur. Est enim tantæ virtutis, q̃
& decrepitū faceret legere literas minu-
tas. Sunt alij qui magis appretiant colly-
rium de aquis distillatis: quod sic fit. ℞.
aquæ chelidonis, rutæ, betonicæ, eufra-
siæ, feniculi, memichæ, caprifoliij, vel suc-
ci eorum recētium purorum, si sit tēpus
& succi malignanati acetosi, mellis de-
spumati, vini purissimi, lactis mulieris,
aquæ ros. fellis aquilæ, vel vulturis, o-
mnium 13. añ. 3. iij. aloes, tuthiæ, myr-
rhæ, cathimix, auri & argenti, sarcocol

læ, licij, amyli, costi, ros. coralli, al. am-
bræ, muschi, camphoræ. añ. 3. f. balsami
grana. 7. cōfice in vase vitreo vel argen-
teo ad solem, vel supra cineres calidos:
lauentur autem oculi ante & post colly-
rium cum aqua ros. vel plantaginis in
causa calida, sed cum aqua feniculi, vel
sileris montani in frigida. Nanq; potens
est & expertum ad omnem visus debili-
tatem: vt asserit Gilbertus. Collyrium
de balsamo visum recuperans, etiam si
tempore plurimo sit ablatus, saluo orga-
no, sic fit per eundem. ℞. piperis longi
& al. ambra, balsami, fellis vulturis,
vel tauri. añ. 3. 2. mellis attici, id est opti-
mi & purissimi 3. 2. vini albi veteris chy-
atum 1. camphoræ, croci. añ. 3. 1. tere dili-
genter, & adde succum feniculi, & simul
confice & inunge. Sunt alij solennes, qui
valde appretiant hoc electuarium in cau-
sa humida. ℞. se. fen. lib. 2. sileris monta-
ni lib. 1. camedreos li. f. seminis apij, pe-
trosil. añ. 3. iij. puluerisuntur, & confici-
antur cum melle despumato: detur de
ipso sero & mane: & multum valet ad
purgandum renes & prouocandum vri-
nam. Item ad idem tragea. ℞. se. fen.
anisi, añ lib. f. vel lib. 1. gariosi, macis, nu-
cis muscatæ, añ. 3. 1. puluerisuntur species
grosso modo: sed semina remaneant in-
tegra: deinde addantur lib. 2. zuccari, &
detur ante cibum & post. Item ad idem,
electuarium optimum, siue visus debi-
litas fuerit vitio humiditatis in oculis, si
ue vitio stomachi: digestiuam nanq; cō-
fortat, renes mundificat, lapidem fran-
git, vērositates carminat: dentur de ipso
sero & mane 3. 2. ℞. marathi lib. 1. sile-
ris montani lib. f. se. apij. feni. anis. petro-
cinamomi. zz. piperis, pullegij, florum
abrotani, hyssopi, eufrafiæ, añ. 3. 1. saxi-
fragiæ, granorum iuniperi añ. 3. f. con-
fice cum melle despumato, quod suffi-
cis. Item nux muscata visus sanitatem
custodit.

Canon. Dicit Auic. 3. cañ. ca. de debilitate visus, q̄ fricatio capitis cū peccine in ieiuno est valde vtilis in cōseruatione visus propter euacuationē vaporum plurimorum: similiter & claras legere literas, et intueri res virides, et mergere oculos aptos in aqua tepida ad frigidum vergente. Sed ea, de conseruatione visus dicit, q̄ iacere super collū & supine, est malum, propter fatigationē neruorum obricorę: similiter & iacere sæpe super faciē est malum, propter humoris inclinationem ad partem capitis anteriorem.

Prognosticatio. Debilitas vidēdi, & cæcitas nō differunt, nisi sicut magis & minus: quare est cauēdum a principio de cæcitate, & proprie, cum virtus visiva sit delicatissima virtutum animalium, quæ sunt in nobis: quia plures rerę differentias nobis ostendit: vt dicit Aristoteles p̄ primo metaphysicæ.

¶ De fistula lachrymali. Cap. III.

Fistula lachrymalis appellat̄ a physis: cū angulus lachrymalis oculi resudat, & quando comprimitur digito, virus vel sanies emanat: & interim apparet eminentia in loco extrinseco, quæ multoties aperitur, & cum comprimitur, concurrit sanies ad lachrymale: & tunc vere dicitur fistula: & aliquando non aperitur, sed expirat per cōpressionem ad lachrymale. Fit autem fistula ex materia flegmatica, vel cholerica descendēte ad locum lachrymale. Signa fistulæ sunt humiditas currens cum expressione a lachrymali & rubedo & largitas lachrymalis, & eminentia appa-

rens aliquando in parte exteriori, & foror oculorum.

Methodus. Cura eius passionis est, vt statim a principio digeratur materia, similiter & purgetur, prout docuimus capitulo de fluxu lachrymarum. Post illud fiat cauterium punctale cum acu obtusa, argentea, ignita, præmissa eius exiccatione & abstersione cum aqua rutę vel fen. vel cum aqua mellis, vel cum vino styptico, vel cum liquore mixto ex his fundendo in fistulam hora post horam, & exprimentum cum digito, donec virus ex ea egrediat̄: & cum hoc abstineat patiens a salis, acutis, cholericis & flegmaticis: & proprie a vino forti. Medicamen preterea nobile sic fit. ℞. olei veteris, vini veteris boni & electi añ. lib. 2. & f. & lithargyri puluerisati, & cribellati (vt alcohol) lib. 1. coquantur ista simul in calida ad ignem per diem integrum, donec nigrum & relucens fiat: deinde ex eo fiant tentæ, id est figuræ ad modum acus, qui ponantur in fistulis. De proprietate enim eradicant fistulam, & excicāt, & proprie si est aperta. Illud autem quod valde vtile, quando sanies expirat solum a lachrymabili, & non est virus, neq; apertio in extrinseco, est imponere puluerem citrinum, qui sic fit secundum Almanser. ℞. ziniar idem viridis æris siue florum æris, quod idem est, vitreoli vsti, añ. 3. 6. arsenici rubei, baurach, spuma maris 3. 1. salis aromatici 3. ij. dissoluatur armoniacum in succo rutę, & incorporentur species cum illo succo, & fiant trochisci, & excicentur: & cum necesse fuerit, terantur super marmore vel in mortario bene loto & munito (vt alcohol) & ponatur in lachrymabili. Et quidam addunt boli armenici, balauftiæ, antimonij, aloes, sarcocollæ, aluminis, sanguinis draconis,

Tractatus quartus.

thuris, myrrhæ, aristologiæ rotundæ, añ.
3. i. quoniam sit magis consolidatiuum.

Emperica. Collyrium probatum in fistula lachrymabili, siue sit aperta, siue non. ℞. tuthiæ contritæ, super marmor cōtritione vltima, dissoluatur cum collyrio albo posito c. de ophthalmia: & post dissolutionē coletur cū panno mundo lino, & reponatur. Et de hoc liquore stilletur omī die bis i lachrymale: & iaceat super latus sanum, quia finaliter exiccat fistulam, & proprie nō apertam. Item inungatur omnis angulus fistulatus omni mane & sero vsq; ad dies 30. vel 40. cum oleo ros. feruenti, siue fistula fuerit aperta, siue non, mundificata, a carne & osse corrupto, sanabit: & specialiter, si cum vadit dormitum, ponatur super oculum hoc emplastrum repercussiuum & stypticū. ℞. mūmiæ, boli armenici, tuthiæ, masticis, añ. F. ex omnibus pul. subtilis, qui incorporetur ad modum emplastri cū vino rubeo styptico.

Canon. Cum fistula lachrymabilis nihil sit aliud q̄ vlcus profundum: quemadmodum et fistula membrorum aliorum, vlcus autem sit terminus apostematis erupti, vel fluxus corosiuus: necessarium videtur, vt dicta ca. de lachrymis, et ca. de ophthalmia, præsentia ca. suffragentur.

Prognosticatio. Fistula nisi curata fuerit: corrosioem oculi minatur, cum suarum 7. tunicarū consumptione: similiter & humiditatis crystallinæ colligatione: quibus succedere facit cecitatem perfectam, quæ sex est & amurca corporaliū erūnarum.

TRACTATVS QVARTVS PRIMÆ SECTIONIS.

De aurium passionibus.



Vtrum passiones famosæ, & de quibus physicū sollicitari oportet, sunt quatuor: prima tinnitus: secūda surditas: tertia apostema siue dolor: quarta vlcus. Cum autem dico aurem, intelligo & miringas, & pāniculos eius, qui sunt intra craneum virtuti audituæ seruientes.

De tinnitu aurium.

Cap. I.

AVtrum tinnitus tribus potest fieri de causis: aut propter repletionem capitis flegmaticā, vel ventosam: & hoc est vt plurimum: aut propter debilitatem nerui auditui ex raritate suæ complexionis, vel delicatia complexionis: sicut accidit cōualescentibus: aut propter acuitatem sensus auditus. Signa eius quæ de repletionem est, sunt, q̄ accidit post facietatem nausearum & potum vini superfluum, aut post cibum illico superfluum, aut propter stypticitatē vētris, vel tēpore frigido humido. Signa eius quæ est de debilitate nerui, sunt q̄ omnis sonus fortis lædit, & non percipit nisi sonos dearticulatos, & q̄ semp sentit sibilum in aure. Signa eius, quæ est ex acuitate, sunt q̄ magis infestatur hora famis, sed post cibum & somnum quasi non sentitur.

Methodus. Cura eius, quæ est repletione, siue ista repletio sit in cerebro, siue in stomacho, est vt purgeſ cum pillulis cochis, vel scetidis, vel hierapicra, præmissa digestiōe materiæ cū syrupo de sticados, vel cū oxymelle cōposito dato septem diebus cū aqua decoctionis feniculi: & sit aqua quadrupla ad oxymel: deinde stilletur in aurē oleū de ruta, vel de spica cum succo porri & felle ouino, in quo dissolutū sit castoreū & euforbium: inclinet sape aurem suā

Stomacho ieiuno supra aquam calidam decoctionis lauinæ, sambuci, camomillæ, meliloti, origani, hyssopi recipiendo vaporem per trajectorium. Abstineat a cibo et potu vaporoso, vt sunt brodia piperata, allia, porri, nuces, & vinum purum. Abstineat a cibis ventosis, vt sunt legumina, rapæ: vtatur cibis calidis & siccis. Bibat hydromel, & vinum lymphatum: modifcet cibū & potum pro posse: laboret in ieiuno, & fiat stenuatio, & sudet in sicco balneo. Cura eius, quæ est ex debilitate nerui, est vt stilletur in aurē acetū, in quo decoctū sit absynthium, aut sticados, vel polium: vel vinum, in quo bullierint rosæ & ruta. Recipiat vaporem cum trajectorio aquæ decoctionis absynthiæ, sticad. & ros. Cura eius, quæ est ex acuitate et subtilitate sensus, est vt distilletur in aurem oleum ros. decoctum cum aceto: Et si non sufficit: stilletur in eo oleum ros. cū aceto, in quibus dissoluta sint duo vel tria grana oppij, vel aliqd de aqua decoctionis iusqui am: aut oleum coctum cum semine papaueris & myrtillorum. Vtatur per interuallum pillulis cōfectis de mastice & aloë post cibū: quia corpus mundificat, & membra confortat. Vtatur vino granatorum, vel berberis, vel aqua decoctionis sumach & agrestis in cibo & potu: vitet vaporosa & ventosa quæcūq.

Prognosticatio. Tinnitus si perdurauerit tpe longo, neq; remedia rationabiliter exhibita contulerint: surditatē mōstrat futurā, & proprie in senibus propter opilationem viarū, & alterationem miringarum auris, velut a causa.

De surditate. Cap. II.

Surditas quædam est naturalis: & hæc facit hominē mutum: vt dicit Arist. in li. de sensu & sensato: quare non curatur: cum medicus sit naturæ mi-

nister. Quædam vero est aduēticia & accidētalis: de cuius cura loquimur. Fit autem duabus de causis in genere, vel propter opilationem auris, vel propter malam complexionem diuersam. Sed opilatio est multiplex, scilicet vel propter apostema, vel carnem verrucosam, vel propter sordem, vel propter flegma & vērōsitate, vel propter aliquid cadēs in aurē, vt est lapis vel vermis. Mala autē complexio diuersa est miringarum frigiditas vltimata. Signa surditatis propter apostema, dicētur ea de dolore aurium, vbi & curam ponemus. Signa eius, quæ est propter carnem additā, sunt eius aperio, cum aspicitur in aurem apud solem: & cum æger sentit quandam grauitatē in ea: & q̄ foetor expirat ab aure. Signa eius, quæ est propter sordem collectam, ex visu etiam discernuntur. Signa eius, quæ est propter flegma et ventositatem grossam, sunt grauitas cum superfluitate in aure, & agitatio cum sonitu: & q̄ in nocte & tempore frigidus magis infestatur. Signa eius, quæ est a mala complexione frigida, sunt frigiditas capitis apud tactum, & vrina lactea: & forte antecessit ambulatio in aëre frigido.

Methodus. Cura eius quæ fit a carne superaddita est, vt corrodaturo caro illa cū vnguento viridi: quod sic fit. ℞. aluē, zuccari, flor. aris, mellis, aū. ʒ. i. teratur omnia subtilissime, & incorporentur cum melle, & cum eo locus inūgatur: vel mūderetur cum vnguento, quod sic fit. ℞. tartari ʒ. ʒ. calcis ʒ. ʒ. fiat vnguentum in modum mellis cum aqua cineris, & intromittatur in aurem cum coto vel tenta: postea consolidetur cum vnguento apostolorum: aut si præstō non sit illud, cum vnguento albo, vel cum vnguento fusco vlitato. Cura eius, quæ est propter sordem, est vt extrahatur cum instrumento ferreo, vel argēteo habēte latitudinem quandam cum cur

Tractatus quartus.

uitate, & mollificetur primo cum oleo cōmuni, vel camomillę calido, vt extra hi possit, deinde mundificetur cum coto vel tenta. Cura eius, quę est propter flegma & ventositatem (& hæc est illa q̄ sapius contingit) est vt digeratur materia cum oxymelle cōposito, & aqua decoct. radicū feniculi: & sit aqua decoct. quadrupla ad syrupum: postea purgetur cum pillulis cochijs vel foetidis, & hiera picra. Post purgationem ponatur in aurem oleum camomil, vel nardi: in quo sit aliquid euforbij. Recipiat vaporem per traiectorium in aurem aquę decoc. calamenti, sauinę, sinapis, aristologię, centaurię, & similium. Inungantur aures & totum caput fortiter cum oleo eodem. Post purgationem & suffumigationem & vnctionem, sumat de quarto in quartum diem sero cum vadit dormitū sine cœna de electuario anacardino dicto ca. de apoplexia. vel diatrion pipe-reon: & postea bibat aliquid boni vini calidi, & fiāt omnia dicta ca. de timitu. Cura eius, q̄ est a frigiditate cōplexiōis, est ponere in aurē et circa aurē oleū camo. vel nardinū, vel de cosio actu calidū, & purgare cū pillulis cochijs corpus, si sit cum materia. Utatur omni die mane & sero diapliris, diazinz. diatrion pipe-reon: & post illud bibat aliquid aquę calidę. Cura eius, quę sit a lapide, vel aqua, vel alia re cadēte in aurem, est vt fiat suctio fortis cū canula missa in aurē vel vaporatio prædicta, ad quā sequatur suctio vehemēs cum spiritu vel ventosa. Et ex rebus vehementer attrahentibus, est vnguentū fuscū, cū linitur ex eo stillum bombacinum, & calidum gestatur in aure. Similiter & emplastrum apostolicon. et pix Colophonīa. Vltimo inducatur sternutatio fortis cum condisi: et egrediet si deus voluerit. Et inclinet aurem super vaporem calidū illius aquę: & salter, & sternutet obturando nares:

vel ad solem ponatur, & aspiciatur, si extrahi possit cum ferro. Cura eius, quę est propter vermes, quos scies ex motu ticilloso in aure, est vt distilletur in aurē hora post horam oleum tepidum plurimum, vel vinum, & sternutet cum condisi, & retineat os & nares, vt ferat spiritus ad aures cum impetu. Et quādoq; ponatur ventosa in aures, vel radius cū bombace aut lana: & extrahantur vermes viui, ne mortui putrescant, & aurē corrumpant. Educuntur autem facilius, si primo interficiantur cum sellibus animalium, & euforb. distillatis in aurem cum aceto aut succo absynth. & sit totū actu calidum, cum infunditur auri: quia penetrabit, & interficiet omne viuū. Idem operatur succus rutę vel rad. centaureę, aut folios persicor. Item aliud. ℞. aloes 3. i. agar. colloquintidę, añ. 3. i. pulueriscentur, & misceantur cum aqua feruente, & distilletur in aurem. Item calx viua & sulphur viuū incorporata cum melle & aceto sunt vltima.

Emperica. Ad surditatē, quę sit propter flegma, & ventositatē quę sit propter flegma, vtile est illud. ℞. baccharum lauri 3. f. terantur & bulliantur, & misceantur cum oleo de lilio, & ponatur in aurem & circa, actu calidum. Ioh. hebemef. ponit trochiscos autoritate Serapionis, qui sunt. ℞. elleb. albi 3. 2. croci 3. iij. miri 3. 8. Conficiantur cum aceto: & cum vti volueris, dissolue cum aceto, et distilla in aurem per se, vel cum licinio. Quidam addūt castorei, pyretti, euforb. añ. 3. f. Item ad idē, ℞. colognidę, elleb. al. añ. 3. 2. castorei, aristolog. ros. succi absynthij añ. 3. i. baurach, euforbij añ. 3. i. costi 3. 1. fiāt sief. i. trochisci cū felle vaccino, & distillentur in aurē cū oleo rutę, vel de amigdalīs amarīs post euaporationē prædictā, vel cū vino potēri. Confert p̄terea oleū balsami cali

dū auribus instillatū frequēter: similiter cauteriū post aures profundatū vsq; ad craniū. Item dicitur, q̄ pulex vel culex, si aurē intrauerit: ponatur pilus vel pilū se ricī duplicatū i aurē, et applicabit ei aīal & extraheā sine difficultate. Itē ad surditatē accidentalē quācūq; .℥ss. oua formicā, & conterātur: & succus q̄ egreditur, stilletur in aurē: & obruretur postea cum coto vel lana, et dimittatur per tres horas, & reiteretur: quia a proprietate confortat virtutem audituiam, & organa eius.

Prognosticatio. Surditas superueniēs in febre acuta continua & proprie de cholera, & in die cretica p̄cedentibus signis digestionis & virtute cōstāte, significat crīsim bonā p̄ fluxum sang. nariū: & si cū malis signis fuerit: mortale, vnde Hip. 4. par. aph. Quibuscūq; in feb. aures surdescūt &c. Item surditas facta propter verrucas, reuocatur. Item surditas antiqua nō recipit curationē. Item si vermis intrauerit, neq; extrahi possit, mortale: quia si viuus sit cerebrum corrodet: si mortuus, putrefaciet & corrumpet.

¶ De dolore aurium.

Cap. III.

Dolor auris aut sit a causa antecedente & intrinseca: aut sit a causa primitiua extrinseca. Si fiat a causa antecedente, hoc est altero quinq; modorū. Primus est repletio sanguinis in loco extendens neruos auris. Secundus est effusio cholere, vel materiæ acutæ ad locū. Nā frigiditas non causat dolorē oīno vel paucum: vt patet per Auicennam cap. de causis doloris. Tertius est apostema auris calidum vel frigidum. Quartus est ventositas grossa inflans neruos & miringas auris. Quintus modus est vlcus recens vel antiquum in aure post

aperturam apostematis saniosi: vel potest esse quodlibet apostema. Si fiat a causa primitiua, hoc est altero duorum modorum. Primus est a casu & percussione. Secundus a frigiditate & vento aëris nos continentis. Signa eius, qui est a repletione sanguinis, sunt rubedo faciei cum grauitate frontis, & proprie cum reuoluit se super faciem & pulsatio temporum cum inflatione venarum, & salua dulci. Signa eius, qui est a materia acuta, sunt dolor acutus, citrinitas faciei, amaritudo oris, vomitus cholericus. Signa eius, qui est ab apostemate, sunt: quia si apostema sit calidum, sequitur febris acuta, & dolor acutus pulsatiuus, & sitis & vigiliæ. Si autem materia sit frigida, erit febris lenta, et dolor cum grauedine & imaginatione corrupta. Signa eius, qui est a ventositate, sunt tensio temporum, multitudo sonitus, & motionis cū capitis leuitate. Signa eius, qui accidit propter vlcus in aure, sunt: quoniam assidue & periodice egreditur liquor, vel sanguis absq; febre, sed cum plurima laterum grauitate. Signa eius, qui est a casu & percussione vel vento frigido, patent ex relatione infirmi:

Methodus. Cura eius, q̄ sit a repletione sanguinis est, vt primo fiat flebotomia cephalica in manu, vel brachio, aut in fronte: vel ventosatio in spatulis, vel collo: post flebotomiam mundetur corpus cum aqua decoct. mānæ, tamarindorum prunorum, dicta de ophthalmia calida. Intra aurem stilletur oleum ros. tepidum mixtum cum aceto & semine iulquami: viuet cibos & potus multiplicantes sanguinem. Bibat aquam, vel iulep, aut hydromel vsque ad cessationem doloris & resolutionem materiæ perfectam. Emplastrū ad hoc conueniens, sic sit. ℥ss. flos camomillæ, seminis aneti, sarinæ fenigræci,

Tractatus quartus.

seminis lini. añ. bulliantur vñq; ad spissitudinem, & in fine addantur 3. i. vel iij. olei de anetho, vel de camomilla circa aurem ponatur oleum de anetho calidū in quo sit vñum granum opij, & duo iusquia mi: si dolor sit immēsus. Cura eius qui sit a materia acuta, est vt purgetur cum decoctione reubarb. postea flebotometur cephalica partis contrariæ: ponatur oleum calidum ros. intra aurem, itaq; impleatur, vel lac mulieris cōquassatum cum albuminibus ouorum: cibetur farina ordeī & cucurb. & similibus. Bibat aquā, vel iulep: et in alijs fiat vt supra. Cura eius, qui sit ab apostemate calido, est vt statim fiat flebotomia cephalicæ in brachio. Et iteretur flebotomia, si dolor non cessauerit, vel fiat ventosatio in spatulis & collo. Purgetur cum decoctione mannae, & tamarindorum: sæpe stilletur in aurem oleum ros. tepidū mixtum cum aceto, in quo vñum granum opij, & duo grana iusquia mi & f. granum seminis anisi sint dissoluta, & circa aurem similiter, donec dolor cessauerit, & fluxus repercuriatur. Cessante autem dolore, & postq̃ transierit tertia dies, ponatur emplastrum resolutiuum super aurem. ℞. radicū maluauisici numero 12. coctarum & mundatarum a liigno interiori & cortice exteriori incisarum frustratim, pistentur, & incorporentur cum farina fenigræci, fabarum, ordeī seminis lini anethi, florum camomillæ, & butyro, quod sufficit. Diata sit vt supra. Cura eius, qui sit ab apostemate frigido, est vt primo purgetur cum pillulis cochijs: & si corpus sit plethoricum, fiat flebotomia postea cephalicæ gratia quantitatis non gratia qualitatē: intra autem ponatur oleum nardinum, & super aurem & circa ponatur emplastrum calidum. ℞. capita alliij. 10. numero: cepearum numero 10. coquātur perfecte in igne sub prunis, & pistentur postq̃ bene

mundata sint, & incorporentur cum 10. vitellis ouorum, & 3. f. butyri vel axungia porcinae. Bibat hydromel: comedat carnes pullorum & hœdorum. Cura eius, qui sit a materia vētosa grossa, est vt in aurem stilletur oleum de rura, vel de anetho calido, in quo dissolutum sit castoreum, aut euforb. & super & circa aurem ponatur sacculus de sale & milio mixtis & calefactis super lapide ignito, aut de fursure & sale. Modificet cibum & potū pro posse, et laboret in ieiunio: bibat vinum vetus clarum lymphatum: viuet olera et legumina. vtatur diapliris, arcticon, & aurea alexandrina. Cura eius, qui sit ab vlcere, suo dicetur capitulo: verum conueniens est, vt stilletur in aurem aqua decoctionis absynthij & mirtilorum actu calida, vel acetum, in quo hulsita sint interiora granatorum, vel thus & bolus armenicus: quia oīa illa exiccant vlcera, & stringunt fluxum. Si autem humiditas vel sanguinis cōgelatus sit in aure: distillet in eū succus rutæ mixtus cū aceto, aut succus porri, aut dissoluatur mel, aut sarcocolla in aqua, q̃ dū est calida, distilletur in aurē: qm̃ ē absteriua & dissolutiua. Verū tamen ordo sapientia est in cura vlcēis, vt primo fiat eius mūdificatio cū stypticis, vt ē aqua mellis cum vino vel lacto mixta & vlceri infusa hora post horam cum cancella. Secūdo absterlio cum radio inuolutocoto vel Jana. Tercio incarnatio cum eis quæ diximus capitulo de fistula lachrymali, & quæ diximus cap. de vlcere auris. ¶ Sciendum præterea, q̃ in actu præseruatio cauterium post aures, & post purgationes proprie in istis casibus, est sublimē. Cura eius, q̃ sit a casu vel percussione, est vt statim fiat flebotomia cephalicæ, vel ventosatio in collo & spatulis: vngatur auris intus & extra cum oleo ros. in quo granum vñum opij sit: super aurem ponatur emplastrum reper

cussium factum ex ros. mirtillis, farina ordei coctis & bullitis simul: vel ponatur pul. thuris minuti mixtus cum lacte inra aurem: similiter & super, si dolor extrinsecus appareat. Abstineat a carni bus & vinis vsq; ad cessationem doloris, & securitatem apostematis. Bibat aquã prunorum, vel granatorum. Comedat farinã auenę vel ordei. Cura eius, qui sit a vëto vel aëre frigidus est vt vaporetur locus cum milio calefacto, aut cum ruta & fursuribus mixtis & imbibitis cum vino & calefactis: vel cū pan no calido, distilletur in aurem oleum de spica, vel de ruta, vel de costo calidis.

Canones. Scias, qd medicina opiata et stupefactiua valet ad omnẽ dolorem auris, siue sit a causa calida siue frigida, & proprie cum fuerit vltimatus: quia sensationem remouet, quæ ponitur in diffinitione doloris: cum dolor sit, in contrarium impressionem sentire: vt di. Auic. 1. cañ. fen. 2. ca. de causa doloris: sed de causa frigida nõ debet sic continuari, neq; adeo audacter administrari velut in calida: quia adderetur frigiditas frigiditati. & prohiberetur materia resolui, & fieret fortasse spirituum animalium mortificatio: vt dicitur 12. de ingenio sanictatis.

Prognosticatio. Dicit Auerrois. iij. colliget, quod dolores maximi, sunt dolor articulorum, dolor dentium, dolor aurium, & dolor istum: quare ilico est eis succurrẽdum: cum dolor sit de maxime prostermentibus virtutem: vt dicitur loco præallegato. Item in dolore aurium vehementi, sudor frigidus, aut syncopis, aut alienatio superueniens, mortale.

De vlceribus aurium.

Cap. III.

Vlcus auris est solutio continui saniosa in aure, ex qua continue vel periodice fluit virus aut sanies. Et fit altero trium modorum, aut propter antecessionem apostematis, quod apertum est: aut propter materiam acutam vel salsam corrodentem: aut propter casum & percussionem. Signa vlceris, sunt dolor continuus cum acuitate & grauedine: & qd sanies egreditur cum foetore. Et si fit propter apostema, fuit & est adhuc cum febre continue acuta. Si a materia acuta, est sine feb. Si a casu & percussione, patiens habet referre medico.

Methodus. Cura eius, si sit propter apostema, vel propter materias acutas, est si vlcus sit recēs, ponatur cum tenta aliquid de oleo ros. mixto cū vnguento albo: quod sic fit. ℞. olei ros. 3. 4. ceræ. 3. f. fiat vnguentum, in quo in fine ponantur duo albumina ouorum. Purgetur caput a principio cum pillulis cochleis vel hierapicra. Bibat vinum album debile lymphatum. Si autem vlcus fuerit antiquum, abstergatur primo sanies cum oxymelle squillitico, vel cū vrina pueri mixta cum melle, vel cum vino & melle mixtis cum modico floris aris, inijciendo ex eis hora post horam per Syngam: deinde consolidetur cum medicamine, qd sic fit. ℞. aloes, sanguinis draconis, rutæ, spumæ maris vstæ, myrrhæ, sarcocolle, sand. licij, olibanij, añ. 3. 2. terantur subtilissime: deinde inuoluatur licinium in melle, & postea in isto puluere, & sic mittatur in aurẽ. Hæc medicina vlcera antiqua exiccat, & finaliter ea consolidat. Si vero vlcus fuerit in profundo, dissoluatur pulvis iste cū aqua mellis, & instilletur. Confert etiam vlceri antiquo, vt infundatur scorïa ferri in aceto mense vno vel pluribus: postea coletur, & distilletur in aurem. Cura eius si sit a casu vel percussione, est vt statim fiat flebotomia cephalicæ in parte con-

Tractatus quintus

eraria, vel ventosatio in collo & spatulis supra aurem, & circa ponatur emplastrum reperculsiuum & confortatiuum loci ex bolo armenico, mittilis puluerisaris & incorporatis cum oleo rosaceo vel aqua rosacea. Abstineat a vino, et a carnibus vsq; ad dies quatuor, donec securus sit de apostemate: deinde potest ponere emplastrum anodinum dictum in cap. precedenti.

Emperica. Cura vlcis in aure vel in cura vlcis cuiuscunq; vel vulneris saniosi expertum & probatū est vnguentum apostol. siue sit recēs, siue chronicum: quia mūdicat omne vlcus, & rectificat fistulas & scrophulas prauas cum facilitate: nec est aliquid ei simile: & mundificat vulnera ex carne mortua, & post consolidat: cuius descriptio est. lſſ. ceræ albæ, resinæ añ. 3. 14. opoponaci, floris æris añ. 3. 1. armoniaci 3. 14. aristologiæ longæ, thuris masculi añ. 3. 1. myrrhæ, galbani, añ. 3. 4. bdellij. 3. 6. lethargij. 3. 9. olei lib. 1. infundatur bdellium in aceto vini, postq; frustratim incisum fuerit, & dissoluentur omnes gūmæ in bdellio & oleo et cera ad ignē: & cum dissoluta fuerint perfecte, colentur, & addatur puluis aliarum omnium rerum, quæ possunt teri, & cribellari, sed non ad ignē: & in fine addatur flos æris, & agitur cum spatula continue, donec infrigidatum fuerit perfecte: tūc reponatur. hoc enim dicitur vnguentum apostolorum: quia est duodecim medicinarum: quemadmodum apostoli sunt duodecim. Et dicitur a quibusdam vnguentum veneris.

Canones. Scias, quod nullus fluxus humoralis, vel etiam saniosus est subito restringendus, imo gradatim, donec medicus experiatur an sit naturalis vel symptomaticus. Verbi gratia, si liquor vel sanies effluxerit ab aure peti-

odice cum alleviatione capitis, restringi non debet: quia purgatio est naturalis: imo prouocetur cum infusione fellis & aceti calidi, si restringatur. Post hoc vero purgetur caput, & diuertatur fluor ad nares vel ad colatorium palati cum masticatione pyretri vel piperis: & in ultimo apponatur vnguentum, & emplastrum confortatiuum styptica: donec locus perfecte securetur.

Prognosticatio. Vlcus auris nisi rectificatione fuerit, corruptionem auris & miringarum eius minatur: deinde fistulam malam parit & fetidam: & demum furditatem propter organorum corruptionem & viarum operationem. Dicit præterea Ras. in diuisionibus cap. de dolore in aure, q; quandoq; egreditur sanguis, aut liquor aquosus ex aure, non propter percussionem, aut apostema, aut vlcus, sed propterea, q; natura expellit ipsum per orificia venarum assidue vel periodice, & cerebrum mūdicat quemadmodum per fluxum sanguinis narium, vel sanguinis sputum: quare in talibus nullatenus restringatur: nisi superfluxerit. Et causa est, quia cum talis sanguis coagulatur: opilat & auditum prohibet. Cui succurrendum erit sine mora, primo cū calidis incisuiis, post hoc cum ripticiis abstersiuis, prout iam docuimus supra in ca. de dolore in aure. ne forte materia induretur, vel putrescat & faciat ægritudinem timorofam.

TRACTATUS QUINTUS. De passionibus nasi.



ASI passiones famosæ sunt tres. Prima est fluxus sanguinis. Secunda fetor, sub ea comprehenditur apostema & vlcus. Tertia defectus odorant-

di. De coriza dicemus cap. de catarrho.

De fluxu sanguinis narium.

Cap. I.

Fluxus sanguinis narium quâdoq; potest dici morbus, quandoq; accidēs, licet sit semper accidēs essenti aliter: cum sit de genere exeuntis a corpore mutati: vt patet 3. de accidenti. Dicitur autem morbus, quando est sine febre. Dicitur autem accidens cum sit in febre, vel in soda propriè pulsatiua. Fluxus sanguinis narium, cum est morbus, vel sit ab acuitate sanguinis, vel a multitudine, vel a casu & percussione. Si propter acuitatem, significant ipsum claritas & subtilitas sanguinis, & debilitatio virtutis ex ipso plurima: & quia paulatim stillat, & caput sentitur calidum. Si a multitudine: significant ipsum rubeo faciei cum repletionem corporis, & gta fluit multū & subito: ita q̄ etiā qñq; sequitur syncopis, & antecessio ciborum sanguinem generantium, & abstinentia superflua a flebotomia & coitu præter solitum, & antecessio doloris capitis vehementis. Et vterq; duorum fluxuum vel est ex arteria, vel ex vena, quorum signa distinctiua sunt hæc: quia sanguis arterialis egreditur motu tortuoso, & est subtilis, rubeus valde: & ad eius exitum sequitur syncopis magis subito, & difficulter restringi potest. Et conferant in eo medicinae positæ super cor magis, quàm positæ super epar. In sanguine autem venali, totum est econuerso. Si vero sit a casu & percussione, ex re ipsa fiet manifestum. Fluxus sanguinis cum est accidens, consequens febrem acutam: vel est bonus & naturalis, vel est malus & symptomaticus. Si si naturalis, tunc est creticus, & significat ipsum: quia sit in die cretica & copiose, & quem præcessit fluxus paruus in die indicatiua: & quia sit post signa

digestionis completæ: & antecessit dolor frontis, & habitudo carnea, & cholerica: vrina subrufa vel rubea vel intente citrina: & ante oculos apparuerunt imagines rubæ, vel igneæ: & signum certissimum est, cum post ipsum sequitur alleuiatio agri. Si vero symptomaticus, totum erit econuerso. Cura eius, qui sit ab acuitate sanguinis, est vt aspergatur facies cum aqua rosæ, & ponatur cotum inuolutum in aceto mixto cum albumine oui intra nares: & ligentur extrema, & testiculi virorum, & mammae mulierum: & ponantur ventosæ siccæ super epar & splenem: & si non sufficit, ponatur intra nasum & super pulueris boli armenici mixtis cum tela aranæ & albumine oui, & super spatulas & lumen ventris ponantur ventosæ siccæ & emplastrētur panni in aceto infrigidato in niue super epar, testiculos & extrema. Vtatur cibis stypticis ingressantibus & infrigidantibus sanguinem. Bibat aquam frigidam, vel vinum berberis, vel vinum granatorum. Et si adhuc restringi non potest, & propriè, cum fluxus est arterialis: ponatur super nasum & super frontem & tempora puluis camphoræ hypocistid, sanguinis draconis acaciæ. añ. 3. f. incorporentur cum albumine oui & succo solatri & tela aranæ & farina volatica molendini, vt fiat sicut mel currens, & cum licinio imponatur, & totum caput embrocetur cum aqua frigida vel cum aqua rosacea, in qua dissoluta sit camphora & psillium. Cura eius, qui sit propter multitudinem sanguinis (& ille est vt plurimum venalis) est, vt fiat illico flebotomia de basilica eiusdē lateris, & extrahat sanguis plurimus fere vsq; ad syncopin: vel saltē fiat flebotomia de basilica, vel manu dextra, si virtus sit debilis: deinde ponant ventosæ sup epar & splenē in alijs fiat sicut prius. Cura eius, q̄ sit a

Tractatus quintus

casu vel a percussione, est ponere intra nasum & super puluerem stypticū ex bolo armenico, vt dictum est prius. Et si timor sit de apostematōe nasi vel faciei, fiat flebotomia statim basilicæ vel cephalicæ in parte laesa. Cura eius, quæ sit in se. vel soda est, vt si fluxus sit naturalis & creticus, non restringatur, imo prouocetur cum setis porcinis positīs intra nares, nisi superfluxerit, & virtutem coepit deiscere: tunc restringatur cum epithymatibus, embrocis & ventolis & ligationibus iam dictis.

Emperica. Stercus asini siccum aut recens naribus insufflatū confert, vel testa oui combusta, vel pili leporis triti vel combusti: Similiter & stercus bouinum siccum, vel thus, vel sanguis draconis, vel terra sigillata, vel fistrum combustum, vel bombix adustus, vel gallæ, vel glandes adustæ, similiter & rasura pargameni puluerisata & incorporata cum albumine oui confert: & pannus lineus infusus in aqua frigida & inuolutus citra gulam confert, vel gipsum vel cinis papyri combustæ confert: vel emplastrū ex gipso & aqua rosæ confert positum super frontem & tempora.

Canones. Fluxus sanguinis narium quandoq; fit propter rupuram arteriæ vel venæ in frōte intra cranium vel in radice nasi, & iste non curatur: vt dicunt Serapio, Raf. & Auicē. Fluxus præterea omnis quinque modis tollitur per artem: quoniam cum euacuationibus, diuersionibus, percussionibus, stypticationibus, necnon & ingrossationibus sanguinis per diætā.

Prognosticatio. Quādo sanguis qui exit a naribus in se, continua nō exit in die cretica, neq; post signa digestionis, et exit paulatim & diminute, & est niger, mortale. Item sanguis niger etiam si exierit in die cretica,

non est bonus. Item si in die indicatiua, verbi gratia, quarta superuenerit in se, cōtinua fluxus sanguinis narium paruus atq; diminutus, significat crisim, in septima per fluxum eundem, & proprie si corpus sit sanguineum, vel cholicum, & ante oculos appareant imaginationes rubæ supradictæ: quapropter hoc modo fuerit iudicandum in septima: quoniam si fluxus huiusmodi superuenerit copiosus, & cum virtute forti, salutem indicat. Si vero diminutus et tardus & cū virtute debili, vel signis digestionis diminutæ mortem minatur eadem quia signat, q̃ natura intēdebat pugnam cōtra morbum in die indicatiua, quam perficere non potuit in die cretica. Item dicit Hippo. 4. par. apho. Quibuscunq; in se, sanguinis fuit multitudo vendicetque, his in resumptiōibus vētres humectantur, id est incurrunt lienteriam tempore conualescentiæ. Idem in eodem. Quibuscunq; in se, aures surdescūt, sanguis ex naribus fluens aut venter turbatus soluit agritudinē. Item in septima particula, in sanguinis fluxu siue per nares, vel per menstrua, vel per hæmorrhoidas, vel per vulnus, vel p̃ dysenteriam, desipiētia aut spasmus: malū. Item in quinta parti. Mulieribus menstruis deficientibus sanguinē fluere ex naribus, bonum est siue per se, siue per artem, & in plurima quantitate.

De foetore narium & polypo & cancro nasi. Cap. II.

Foetor narium quandoq; fit vitio stomachi transmittentis fumos & vapores foetidos ad os & nares, eleuatos a materia marcida & corrupta in stomacho cōtenta: quandoq; fit vitio nasi & partium propinquarum: quod est dupliciter, quia vel fit vitio humoris corrupti purridi in radice nasi collecti: vel fit vitio ulceris narium vel hæmor-

roidarum nasi, vel polypi, vel cancri in concavitate nasi ex flegmate cū in naribus caro molliis oritur, ex qua humores fœtidi stillant. Est vero polypus: cum in naribus caro cōpacta oritur ex flegmate & melancholia per viam assationis & putrefactionis, propter quod nasus acquirit duritiem & fœtorem. Et illa caro habet figurā ficus, quia caput grossum, & stipitem subtilem. Sed cancer nasi est apostema durum calidum ex melancholia per viam adustionis, delegata per venas & arterias a cerebro generatum, & in carnem conuersum duram & infiltratam in substantia nasi, & est habens in radice venas nigras plurimas repletas sanguine melancholico. Et nos quidē signa cancri completa in quocūq; membro acciderit: scribemus cap. de apostemate in matrice, similiter & curam qualis est possibilibus per artem. Signa eius, qui fit vitio stomachi, sunt, q̄ fœtor minoratur post cibum, imo tunc sentitur fœtor mixtus cum odore cibi. Et si in ieiuno, nares constringuntur ita, vt anhelitus egrediatur per os: sentitur fœtor ab ore vehementer. Signa eius, qui fit vitio materiæ contentæ in vijs nasi, est quia fœtor sentitur æqualiter ante cibum & post: & q̄ per os nō egreditur fœtor, cū nares stringuntur. Signa eius qui fit vitio vlceris in naso vel hæmorrhoidibus, vel polypo, vel cancro, patent ex intuitu intra nares patientis.

Methodus. Cura eius, qui fit vitio stomachi, est vt digerat materia flegmatica adusta vel salsa, similiter & cholerica cū syrupo de meliloto: qui sic fit. ℞. scolopēdrie, polytrici, adyanthos, capill. veneris, sumiterræ, polypodij, cicoræ. añ. m. i. senæ, epithy. añ. ʒ. i. cuscutæ ʒ. i. meliori viridis. ʒ. i. 2. f. vel succi eius ʒ. iij. prunorum siccorum numero ʒo. pistentur omnia præter pruna, & bulliantur in lib. 4. aquæ vel plus, do

nec medietas consumatur. Præterea coletur, & in colatura addatur tantum de zuccaro, quantū est de colatura, & iterū reducat ad ignē, & syrupo ē. Hic syrupus de proprietate suæ cōpositionis digerit omnem materiam adustam salsam & acutam, & ad purgationem præparat, & ipsam educit paulatine quaque die: quapropter est conferens puriginosis, omniuaq; die dentur ex eo in aurora. ʒ. 2. cū triplo eius vel quadruplo aquæ decoctionis prunorum siccorum vel viridum, vsq; ad dies 10. & postea purgetur cum benedicta laxatiua vel hieraprica vel cum decoct. quæ sic fit. ℞. tamarindorum, mannæ añ. ʒ. i. & f. dissoluantur ista cum aqua decoctionis prunorum, senæ, epithy. & polypodij, & sint aquæ. ʒ. 4. vel 5. quia educit humores adustos cū facilitate. Fiat etiam vomitus, qui sic fit. ℞. rad. raph. acuti incisi frustis ʒ. i. & f. feminis anethi, atriplicis, sinapis, ceparum. añ. ʒ. i. ellebori albi ʒ. i. pistentur, & bulliant in lib. 1. aquæ, donec medietas consumatur: coletur, & in colatura addantur ʒ. 4. oxymellis compositi. Modus autem, vt hoc vomituum, & aliud quocūq; fiat, est iste: quoniā oportet vt primo repleat stomachus ex piscibus salitis, vel siccis conditis cum sinapi & raphani acuti, vel cepis & porris crudis, similiter & fæcolis & pisib; & cicerebus & similib; & quiescat sic per vnā horam, vt cibus perfecte simul misceatur. Post illud veroumat prædictū vomitiū totū simul, & quiescat per quartam partem 1. horæ: deinde moueatur, & agitetur vehementer, vt totus cibus & medicina conuascentur. Deinde ponat ventrem suum super ceruicalem vel lignum, & fortiter ipsum comprimat: & exciteatur vomitus cum digitis vel pēna vncta oleo missa in profundū gulæ, donec isophagus fatigaretur. Post vomitum gargariser diamonon, vel vinum grana

Tractatus quintus.

torum, vel citoniorum vel berberis, vel
vinum rub. ponticum, & stomachus &
mery confortetur. Et abstineat post illud
a cibo per semidiem, et tuncumat cibū
& sit parua quantitatē: sicut est miliū,
far panicū, risum, caro assa, & similia:
& bibat vinū optimum in parua quan-
titate, tamen ne fluctuet omnino. Fiat
iste vomitus duobus diebus continue se-
quentibus, vt reliquæ primæ diei perfe-
cte educatur: & si fieret iste vomitus se-
mel in mense, melius conferret. In corpo-
ribus autem debilibus non debet poni
ells, oīa alia ponant, et est leuior & nobi-
lior medicinarū in euacuatione oīm hu-
miditatu in stomacho cōtentorū. ¶ Sciē-
dū tamē, q̄ oīs vomitus est timorofus,
in habentibus pectus strictum vel caput
& oculos debiles: propter quod nō debet
dari patiētibus sputum sanguinis vel sa-
niei, vel habentibus oculos eminentes
vel tenebrosos vel lachrymosos: quia
materiam deriuarentur sursum consuetu-
dinariæ. Neque detur difficile vomē-
tibus, ne debiles venæ rumpantur in pe-
ctore seu pulmone, & consequat phthi-
sis, sed purgentur talia corpora per deor-
sum. In causa vero cholerica repleatur
stomachus herbis, scilicet blea, spinar-
gijs, atriplice, anetho, et piscibus. Et me-
dicina vomitiua fiat ex aqua decoctio-
nis raphani, seminis atriplicis cum syru-
po acetofo vel cū oxyzacarro in eadē
proportionē, sicut prius. Abstineat pati-
ens a cibis generantibus humores adu-
stos. Et vtatur dicta dicta capitulo de
melancholia. Post remedia igitur vniuer-
salia fiant localia propria: quare sugat
omni die bis per nares vinū decoctionis
nucis muscatæ, aut dissoluat 3, s. theria-
cæ bonæ in vino odorifero, quod trahat
per nares. Aliud ad idē potentius. ℞.
aloes, myrrhe, croci, masticis, xyloaloes,
gariofil, añ. 3. 2. fiant pillulæ cū vino odo-
rifero: quarū tres transglutiantur in nocte,

& duæ in aurora: quoniā putrefactionē
humorū in stomacho & in intestinis &
venis potenter rectificat, & eos educunt
cū lenitate, & odorem oris bonū faciūt
quapropter cōferunt plurimū in se. epidi-
miali et cōtra aērē pestilētiā, si ex ipsis
omni die duæ vel tres transglutiantur i ieiuno.
Oporteret aut vt aloē 10. vicib⁹ vel puri-
bus abluat in aqua dulci, donec partes
eius acutæ resoluatur, et proprie, cū ama-
ritudo timetur, neq; solutio queritur, sed
sola stypticitas aromatizans: & modo
consimili dicēdum est de myrrha. Cura
eius, quæ sit propter vlcus in naso vel po-
lyp. siue cancerum, manuali attinet ope-
rationi: verum si tibi studium in hoc sa-
puerit, ad calum luriditatis & casum vl-
ceris in aure recurrēdum est: ibi plene do-
cuimus artē vlcera & superexcrecētiās
mundificandi cum ripticis, & cōsolidan-
di post hoc cum incarnatiuis: similiter et
capitulo de fissura labiorum oris. Cura
eius si sit vitio humoris putridi contenti
in radice nasi, sicut cōtingit in habētib⁹
nasum simū, quorū colatorium est ex na-
tura strictum, opilatū ita, vt libere nō
possint expurgari per os, neq; per nares
a reumatibus per noctem collectis: tunc
cura est, vt fiat localia oīa nūc dicta, &
prouocet sternutatio cū cōdifi, pyretro,
vel euforbio, vel pipere, attrahendo pul-
uerem istorum per nares omni die vehe-
menter in ieiuno: quia confert educendo
materias retentas.

Emperica. Ad omnem fœtorem oris
vel nasi confert tenere in
ore, & per nares transcere vinum melius
quod reperiri possit, in quo decocta sint
nux muscata, macis, cinamomū, cala-
mus aromaticus, ros. spica nardi, & si-
mililia, vel vinū calidum, in quo gallia
muscata fuerit dissoluta.

Prognosticatio. Fœtor nasi propter
cancerum curam non
recipit, nisi blanditiuam. Item fœtor ex

putredine humoris in stomacho vel pulmone, si fuerit perdurans antiquatus, nõ curatur, nisi blandiriue.

De defectu odoratus.

Cap. III.

Actio læsa i odorãdo siue virtutis odoratiuæ, est triplex: vna quidẽ ublata, cũ nihil p̃cipe p̃ot ex odoribus bonis: secũda diminuta, cũ nõ percipitur, nisi ex odoribus fortibus et acutis: tertia corrupta, cum percipiũtur odores alieni a re odorabili p̃sente. Fit autem a mala complexionẽ cerebri calida vel frigida vltimata, & proprie in poro eius aut propter opilationem narium & colatorij, quod est in palato, ex materia flegmatica ventosa, aut propter casum & percussioneẽ inducẽtem tortuositateẽ in ossibus & cartilaginibus nasi.

Methodus. Signa eius, propter malã complexioneẽ calidam, sunt siccitas narium cum ardore, & q̃ nõ sentit odores calidos, sed frigidos. Et cura eiũ est suctio p̃ nares assidua aquæ rosæ, & acetĩ, in quibus dissoluta sit camphora: similiter et aquæ decoctionis rosæ, coriandri & psillij, & euaporatio acetĩ ap̃ferri super lapidem ignitum. Est enim vltima. Signa eius propter malam complexioneẽ frigidam, quod sæpius contingit, sunt frigiditas nasi, & q̃ non sentit nisi odores fœtidos, vel calidos acutos. Et cura eius est suctio vini veteris, vel aquæ decoctionis saluie, calameti, sambuci, calami aromatici, rutæ, rosæ, & florũ camomillæ. Signa eius propter opilationem, sunt grauitas capitis, & q̃ nihil egreditur ex naribus vel palato, & difficultas attrahendi aẽrem per nares. Et cura eius, est digestio materiæ cum syrupo de sticad, & purgetur cum pillulis: & fiat sternutatio cum condisi, vel pipere, vel piretro, vel castoreo, vel (quod est fortius omnibus) cum euforbio: & suctio

frequens aquæ decoctionis hyssop, sitcad, azari, fumiterræ, maioranæ. Quod si non sufficit, sugat forti attractione intra nares aquam decoctionis colloquintidæ, aut bellij, aut vrinam pueri nondum polluti, vel aquam decoctionis rutæ, & castorei, ellebori, serapini & nigellæ.

Emperica. Caput purgium expertũ ad defectũ odoratus propter opilationem, & hoc est quod accidit vt plurimum, sic fit secundum Hebermef. p̃senti capitulo. ℞. nigellæ infusæ in aceto forti per noctem: & post hoc exiccata rutæ, fumiterræ, castorei añ. 3. i. teratũ subtilissime, & incorporent cũ oleo veteri, vel cũ oleo camomillæ, vel cũ vrina pueri, donec fiat i forma mellis currẽtis, & ex eo omĩ die in ieiuno attrahatur. s. vel 6. guttæ per nares cũ forti attractione aëris per nares, & capite inclinato ad posteriora, plusquam fuerit possibile, & ore repleto aqua: & hoc fiat tribus diebus aut pluribus, donec coeperit odorare. Et si volueris acuerẽ, adde euforb. colloquintidæ, añ. 3. f. Si autem patiens senserit ex hoc ardorem & dolorẽ intra nares, attrahat vicissim rosæ, vel aquam rosæ, vel aquam tepidam, ne locus ulceretur. Confert præterea in omni causa frigida odor assiduus rutæ, vel nigellæ, vel castorei per se sicut sunt, vel facti ex eis pomo laudano, additis gariofil, spica, calamento aromatico, & similibus. Confert etiam subfumigatio ex thure, aliptra muscata, nigella, xyloaloe, positis supra carbonẽs, & proprie post purgationem.

Canones. Defectio in odorando, vel fit ex generatione, & tunc fit (vt plurimũ) a mala cõplexione sine materia, adhuc magis frigida opilatẽ, raro a calida adurẽte, nisi in se. & frenesi, Itẽ si sit aduentitia, est qũq; chronica

Tractatus sextus

perdurans: & eius signa sunt cōturbatio, lachrymositas oculorū, & sensatio odoris vnius & nō alterius. verbi gratia, fœtidi, sed non aromatici, vel econuerso calidi, non frigidi, vel econuerso.

Prognosticatio. Defectio odorandi si sit ex generatōe, nō recipit curā. Si vero acquisita sit & antiquata, curatio est difficilis. Si sit ex casu & percussione, & remāserit post consolidationem fracturę vel apostematis, amplius non curatur.

TRACTATVS SE- xtus. De oris & linguę passio- nibus.



Oris & linguę passiones, de quibus oportet loqui physici, sunt quinque: Prima est labiorum fissura: Secunda fœtor: Tertia saluositas: Quarta casus vuluę, atq; eius elongatio: Quinta grauitas loquelę, vbi & apostema & spasmus linguę pertractamus. De linguę glandula nihil dicemus, quia spectat ad chirurgicum.

De fissura labiorum. Cap. I.

Fissura labiorum in oris est propter alteram duos causas. Prima est catarrhus calidus acutus de cholera vel flegmate falso descendente a cerebro ad partes inferiores vlceras ipsas & corrodēs: Secunda est contritio vel cōtractio musculi trāuersalis ipsius labij, & ihculcatio materię acutę in eo: quare accidit, vt scindat ipsum scissione profundata.

Methodus. Signa eius propter catarrhum, sunt antecessio coriæ cum sternutatione plurima, & rubor pulpę nasi & labiorum. Et fit quādoq; in eis bothor, i. apostema paruū: & quādoq; crustę & scissurę cum asperitate.

Et cura eius est digestio materię cum syrupo de meliloto dicto in cap. de fœtore nasi, & purgatio cum pillulis cochleis & hierapicra Galeni, & flebotomia cephalicę, si facies sit rubea carnosā: & ventosatio in collo diuertēs materias cum scarificatione: vltimo vero fiat loci reificatio cum vaporatione ex aqua & aceto, in quibus cocta sunt viol. ro. solatrū, semperuiua, plātago, myntha, rubus, & similia. Et si non sufficit, addatur ex resolutius & mollificatiuis: vt sunt camomilla, melilorum, malua, althea, vngula cabalina, & similia. Fiant omnia dicta cap. de catarrho. Signa eius propter contritionem musculi trāuersalis, sunt priuatio signorum catarrhi omnino: & quia plurimum fit in labio inferiori tantū, & difficultas curationis. Et cura eius est incisio labij profundata secundum talaritatem fissurę: & consolidatio cū puluere thuris, gallarū, & cinamomi subtilissime cribellato & intra incisionē proiecto, donec sanetur, & mūdetur primo locus cum vnguento viridi, & post hoc consolidetur cum vnguento albo vel vnguento apostolorum: quę omnia diximus cap. de surditate, &c.

Emperica. Vnguentum consolidans omne vlcus, in quocunque loco corporis & proprie post mundificationem, sic fit secundum Hebe. præsentica. ℞. gallarum, cerusę añ. p. i. amyli, dragaganti añ. partē f. confice cum adipe gallinæ, quod sufficit. Ad idem. ℞. fursuris, pilorum caudę equinę añ. partes æquales: combure super laminas ferreas, & puluerisa, & confice cum melle sufficienti. Ad idem. ℞. terbeninæ, masticis, hyssop. humidę, mellis añ. partes æquales, & fiat vnguentum, vel extendatur super corium molle, fit cerotum. Item. ℞. gallarum puluerisatarum (vt alcohol) & confice cum melle vel adipe gallinæ vel anatis, & fit vnguentum:

si addideris terebentinam & masticeam, fit cerotum. Item vnguentum sublimè. *℞.* cerusæ litarg. thuris, masticeis, plumbi vlti gummi arab. dragaganti, medullæ cruris vaccæ añ. partes æquales, iusq. ami al. parrem f. confice cum oleo ros. sufficienti, et cera alb. & fit vnguentum: & si addideris aliquid mummiæ, melius fiet. Et sit sit ex causa calida cum ardore plurimo, multiplica iusquiammū & dragagantū, et adde aliqd aq. ros. et aceti, et frica fricatione vltima cū pāno aspero, donec sanguis fluat, et inunge desuper, & proprie post balneum, & videbis mirabile.

Canones. Cura vlcis duabus perficitur intencionibus: prima quidem mundificando: secunda consolidando: quare dicta in capitulo de surditate, & ea, de vlcere in aure, & cap. de fissuris ani, sibiſnuicem suffragantur.

Prognosticatio. Fissura labiorum superiorum est vt plurimum a catarrho, neq. perdurat. Inferiora vero ex contritione, & perdurat. Itē fissura ex catarrho est facilis curationis, ex contritione vero difficilis.

De fœtore oris. Cap. II.

Fœtor oris duobus fit modis in genere, vel vitio stomachi, vel vitio proprio. Si vitio stomachi, hoc est dupliciter: vel em̄ ratione humorū calidorū corruptorū cōtentorū in ore stomachi, vel ratione humorū frigidorū, slegmaticorū marcidorū ibidē. Si vitio proprio, hoc etiā dupliciter: q. vel propter dentē putridū seu corrolum, i cuius cōcauitate continentur humiditates fœtide, vel sit ex gingiuis putridis & fœtentibus. Signa eius, qui sit vitio humorū calidorū in stomacho, sunt q. alleviatur post comestione, & q. eius fœtor est acutus adustus in ieiunio cum eructuatione fumosa. Signa q. sit vitio humorū frigidorū in stoma-

cho, sunt q. non minoratur post cibum, et est cū eructuatione acerosa. Signa eius, qui sit ex dentibus vel gingiuis, sunt manifesta visu & relatione infirmi.

Methodus. Cura eius, qui sit vitio humorū calidorum est, vt digeratur cum syrupo de meliſoro, capitulo de fœtore nasi posito: de quo datur patienti omni die bis, semel in aurora et semel ante coenam cum aqua decoctionis epi. & mellis: & quantitatis syrupi omni vice sit ʒ. i. & f. & aquæ ʒ. 4. & detur vsq. ad decem dies vel circa, & purgetur cum medicinis dictis capitulo de perturbatione sensuum a melancholia. Et vtatur diata dicta illic. Fiat etiā vomitus modo et ordine dictis capitulo de fœtore nasi. Semel in septimana sumat ʒ. semis theriac veteris bonæ cum vino odorifero. Scias, q. masticare om̄i die in ieiunio nucem muscatā mirabiliter prodest in hoc casu, & est expertū, & proprie si super illis bibat aliquid vini granatorū. Idē facit masticatio seminis leuistici vel apij, vel anisi, ita vt inglutiantur mane & sero. Cura eius, qui sit vitio humorū frigidorum in stomacho, est vt digeratur materia cum oxymelle composita vel squillitico, & aqua decoctionis epi. & purgetur cum pillulis fœtidis, vel benedicta laxatiua: vngat sape stomachus cum oleo masticeo, et nardino mixtis & calefactis cum aqua feruente: & nullo modo sit istud oleum tepidum, sed calidum valde: quia tepida resoluunt robur ventris: vt dicit Gale. de ingenio sanitatis. Fiat vomitus sape dictus ea, de fœtore nasi. Sumat semel in septimana ʒ. f. theriacæ bonæ cum vino odorifero: Masticeat om̄i mane ʒ. grana pipereis, aur fruktū nucis muscatæ, et post illud bibat vinū odoriferū: vetus potēs: vt at om̄i mane diatrion pipereon, diagalanga & dianiso. Conferunt præterea omni fœtori pillulæ de aloë & myrrha, similiter et

Tractatus sextus

dianthos. Cura eius, qui fit vitio dentiū, est vt mūdetur omni die dens, & ablutarur cum aceto sæpius in die: & in concauitate eius ponantur mastix & myrrha vel semis granum mulchi: & si possibile fuerit, extrahatur dens omnino. Cura eius, qui fit vitio gingiuarum est, vt mūdetur cum vnguento viridi posito capitulo de sorditate: vel cum puluere subtilissimo cribellato facto ex tartaro vini albi optimi, fricādo ex eo omni die dentes & gingiuas putridas corruptas: & post frictionem abluantur cum vino calido hyeme, et frigido in æstate: post purificationem ponatur super locū corrolum pulvis stypticus, & consolidatiuus: qui sic fit. ℞. mastice coralli rub, thu, dragaganti, litargi. añ. 3. f. terātur, & cribelentur optime, & abluantur quandoq; cū aqua mellis, in qua hylopus & ireos sine decocta, & sic styptica cū ripticis aliterentur.

De multitudine saliuæ & sputi. Cap. III.

Multitudo saliuæ et sputi fiūt ex humiditate plurima generata in stomacho per viam indigestionis, et per vsum ciborum humidorum, qui sursum per mery refudant, & euaporant ad os & radicem linguæ: & accidit vt plurimum pueris gulosis, mulieribus & corporibus flegmaticis per naturā.

Methodus. Cura eius est, vt digeratur materia cum oxymelle cōposito vel squillitico ex aqua decoctionis ciperi, capparis, acori: purgetur cum hirapi, vel benedicta laxatiua, vtrāq; diagalāga, diatriopipireon, diacardamī, rosata nouella mixtis vel p̄se sumptis. Nutriet cibis calidis siccis actuet virtute. Caueat a vaporosis. Fiat sæpe vomitus dictus ca. de foetore nasi, & gargarisma dictū ibidē. Famē sitim & vigilias

toleret proposse: masticeet piper, pyretrū in ieiuno.

Prognosticatio. Hippo. c. particula apho. Trauli a diatriaria maxime capiuntur longinqua.

De elongatione vuluæ. *Vulva* Cap. IIII.

Causa vuluæ est, elongatio & ingrossatio vuluæ, vt perfecte inferiora t̄gat, & epiglottim opilet, & anhelitum impediāt quoquomodo. Fit autem a materia currente a cerebro sanguinea vel flegmatica in modū carathi. Signa casus vuluæ sunt: quia patiens semper sentit quasi bolum carnis in radice oris cum impedimento anhelitus & suffocatione. Si vero fit ex materia sanguinea: tunc cum istis signis apparet tumor, & rubedo loci, & saliuæ dulcis, & repletio venarum faciei cum rubedine, & est quandoq; cum se, licet raro. Si sit a flegmate, apparet cū prædictis multitudo saliuæ, & rauedo oris: & color vuluæ albus, & facies al. vel suppalida & elongatio vuluæ ultra modum.

Methodus. Si sit a sanguine, fiat primo flebotomia cephalicæ in brachio dextro, vel ventosatio in spatulis & in collo: & post illud gargarisma repercussuum diamoren dissolutum cum aqua ros. & aceto, vel aqua decoctionis gallarum, balau. ro. & aceto. Deinde in statu fiat gargarisma, similiter & in augmento resolutiuum & repercussuum cum aceto & melle ro. In fine vero status, & declinatione resolutiuum tantum cū oxymelle composito & aqua calida. Si vero fiat a flegmate, purgetur primo cū pillulis foetidis vel cochis: deinde fiat gargarisma repercussiuum, deinde resolutiuum prædicta, & repercussiuum cum oxymelle composito, & aqua decoctionis balaustrarum vel ro. vltimo resolutiuum tantum cum oxymelle squillitico

eo, vel cum medicina tali. ℞. aluminis iamenti, salis armoniaci, pyretri, sinapis, mynthæ añ. 3. f. oxymellis cōpositū 3. 2. misceant, & addatur aqua decoctionis rosæ, vel halaustix, & fiat gargarisma.

Emperica. Communiter operantes in cura casus vuluæ, ex quacūq; causa sit: primo faciunt flebotomiam cephalicā fortem propter diuersionem: deinde abscindunt vuluam cum filo argēteo, vel ferreo immisso per canulam ligneam: quia hoc est securius, q̃ si fieret cum ferro ignito: deinde faciunt gargarisma rep̃cussiuum ex diamorron, & aqua tepida: donec vulua incisa securetur ab apostemate: & est modus expertus & securus bene.

Prognosticatio. Vuluæ casus si vltimetur, prohibet anhelitum & ingulationem cibi: quare suscitantur patientem.

De grauedine & magnitudine linguæ. Cap. V.

Grauedo linguæ similiter & magnitudo quandoq; est antiqua & naturalis, quare nō curatur: quandoq; est aduentitia: & de istius cura loquimur. Fit autē grauedo linguæ quandoq; cum fe. quandoq; sine feb. Si cum fe. semper fit propter inanitionē lacertorum linguæ a calore febrili. Si fiat sine feb. sic fit propter alteram trium causarum: quia vel propter humiditates stegmaticas imbibentes nervos & lacertos linguæ: vel propter abbreviationem ligamenti sub lingua vbi lingua alligatur parti inferiori: vel fit propter glandulam, id est carunculam parnam ad modū sabæ, quæ nascitur quandoq; sub lingua: quemadmodū in emunctorijs, & impedit eius motum. Magnitudo vero linguæ vel fit propter materiam stegmaticam, vel sanguineā, vel ventosam inflatam linguam, ac etiam

apostemantem. Et cum fuerit sine apostemate, sicut quandoq; morbus per se: quandoq; vero per accidēs paralyf. vel lethargia, & proprie cum stegma est in causa. Signa grauedinis linguæ, cum feb. sunt adustio linguæ, & nigredo, & diminutio loquelæ: & q̃ æger linguam extendere nō potest extra os. Signa eius, cum est propter stegma sunt, impedimentum loquelæ, & proprie in dictionibus, in quibus cadit L vel R. turbatio sensuum, & emissio saliuæ, cum incumbit multa festinantia loquendi. Signa eius, quæ est propter abbreviationem ligamenti, sunt q̃ lingua adhæret parti inferiori, & q̃ non potest extra os emitti, & est sine feb. Signa eius propter glādulam sunt: quia videtur caro dura similis quæ si glandi, quando os ægri aperitur, & lingua eleuatur. Signa magnitudinis linguæ, patent ex se ipsa: quia difficulter loquitur & pigre: neque linguam plicare potest, & emissio eius extra os quasi continua.

Methodus. Cura grauedinis linguæ cum feb. est cura feb. & ablutio linguæ & nuchæ & colli torius assidua cum aqua rosæ, & muscullagine psillij, vel cū aq̃ calida mixta cū ulepe & melle ro. vel cū oleo ro. vel cū oleo viol. & mastichino penidiarū, candi & prunorum & simidum. Cura eius propter stegma est, vt purgetur cum pillulis cochij vel foetidis, præmissa digestionē cum oxymelle composito vel squillitico, & flebotometur cephalica vel vena, quæ sunt sub lingua, si sanguinis diminui appareat: & fiat ventosatio sub mento, si materia sit plurima: præterea fricetur cum sale gemma, vel cum sale armoniaco, aut cū pyrethro, aut pipere, aut castoreo, & aliquādo cū euforbio, qd est fortius p̃dictis: aut cū alumine scisso. Et post fricationem et expulsionē stegmatis, abluat lingua cū aceto et aq̃ fri-

Tractatus sextus.

gida simul mixtis, vt calor naturalis vniatur, & cōfortetur. Vtatur cibus siccis actū & potētia, labore in ieiunio, sitim & famem toletet proposse. Vtatur sinapi & alijs pro condimentis carniū suarum: & fiant omnia dicta cap. de paralyfi propter flegma & de casu vuluæ propter flegma: quia conserunt cum virtute. Cura eius, quæ sit propter abbreviationem ligamenti, vel propter glandulam, nō perficitur sine incisione cum ferro: quare chirurgicis derelinquo. Cura magnitudinis lingue est, cura grauedinis ipsius cū est ex flegmate: ita dicta: verum tamen cum prædictis fiant localia fortiora. Fricetur ergo sepe et fortius lingua cum dente atq; & aceto randiu, donec saliva egrediatur. Masticetur etiā pyretū, & abluatur lingua cum aceto decoctionis castorei, vel piperis, rutæ, ciperi: & gargariser saepe oxymel, compolitū vel squillicum cum aqua decoctionis castorei, piperis, salis armoniaci, hyssopi, stasifagæ, vel vel cum aqua calida, in qua dissoluta sit hierapicra: vel gargariser sinapim tritam & cum melle confectam: & nutriatur sicuti dictum est capitulo de paralyfi.

Emperica. Quidam administrant gargarisma ex aqua frigida pura in cura grauedinis & magnitudinis a flegmate, & proprie in corpore carnosio sanguineo: vt calor naturalis vnitus cōfortetur, & resoluat flegma & vētositates, luxa illud Hippo. s. part. aph. Est autem vbi in terano sine vulnere iuvene bene carnosio, ætate media, frigide aquæ infusio tollit agridudinē. Et huius opinionis est Ras. in diuisionibus ca. de magnitudine linguæ. Verum tamen in hoc duplex cadit timor: primus quidem est, quia apho. tenet in paucioribus: vt dicit Gale. in commēto ibidem: secundus est, quia istæ passionēs raro adueniūt corporib; sanguineis, sed maxime flegma-

ticis siue per naturam, siue per dietam: quapropter vt plurimū sunt accidentia paralyfis facta, vel signa fieda. Melius est ergo vti medicinis dictis i methodo: & insup inungere mādibulā & nuchā totam & occiput cum vnguentis calidis resoluētib; supfluitates, et supcalefacientib; et cōfortantibus neruis & cerebri cū virtute. vt sunt vnguentū marciaton, arrogon, aggripa: et lumere omī die i ieiunio de electuario anacardino, vel diatriā pipereon, diagallāga, vel aurea alexandrina, & similibus: & vigilare super cibum, & abbreviare somnum, quantum est possibile: & laborare, & sudare in balneo circa declinationem morbi: & post euacuationes vniuersales præmissas.

Canones. In cura grauedinis & magnitudinis linguæ ratione flegmatis, & proprie si sint cum paralyfi, non approbamus semētationes, neq; inunctiones cum oleis calidis: quia licet exiccent ratione virtutis & qualitatibus, tamen humectant ratione modi substantiæ: quemadmodum & vinum, licet approbemus confortationem occipiti & neruorum cum vnguentis calidis sypyrice: quæ diximus ca. de paralyfi & et mfricamonibus siccis asperis, abrais prius capillis: quoniā nerui inde oriuntur.

Prognosticatio. Gravis lingua quæ est cum se: acuta vel chronica cum alijs malis signis mortem significat: quia prædicat spasmodū de inanitione & consumptione humiditatum corporis radicalium & nutritium. Itē grauitas quæ est propter paralyfim & lethargiā raro perfecit curatur: sicut neq; paralyfis, & proprie si chronifetur, licet minorari possit. Item patientes grauatatem siue grauedinem linguæ propter humiditates stomachi, vt plurimum incurunt hienteriam vel diatriam longam. Vnde Hippo. sexta part. apho. Triaulia diatria maxime capiuntur longa.

TRACTATUS SE primus primæ sectionis. De dentium passionibus



Dentium passionibus ad phisici curam pertinentes, sunt tres. Prima est dolor, siue apostema: Secunda mobilitas: Tertia corrosio ipsorum.

De dolore dentium. Cap. I.

Dolor dentium, vel est cum apostemate et tumore, vel sine. Si primum, sic fit a fluxu humoris calidi a cerebro, & partibus vicinis ad radicem dentium, alteratis eius complexionem, & destruentis eius compositionem. Si sit sine apostemate, sic fit propter fluxum humoris frigidi, vel propter vermes natos in radice dentium ex humore putrescente corrodescentes ipsos. Signa doloris a causa calida, sunt rubedo loci cum tumore gingivarum: & dolor acutus, & quod tactus aquæ frigidae cōfert. Signa vero doloris a causa frigida, sunt dolor grauatus, & est absque rubedine & tumore, & quod tactus rei calidæ, ut pyretri, vel peperis confert. Signa vermium, sunt corrosio dentium & gingivarum: & quod aliquando insunt vermes in loco.

Methodus. Cura eius, quæ est a causa calida, scilicet sanguine vel cholera, est ut primo fiat flebotomia cephalicæ manus contrariæ: & post hoc flebotomia parris eiusdem: vel scarificatio sub mento, & proprie, si sit a sanguine. Teneatur venter solutus cum clysteri lenitio, vel suppositorio de sale gemma. Deinde teneat in ore continue aquam frigidam, vel aquam rosæ, vel vinum granatorum, aut acetum, aut mixturam ex istis, aut succum portulacæ aut solatri: quod si non sufficit, & dolor sit intensus. ℞. duo grana opij, & vnum iulquiami, & tria grana mandragoræ: bulliantur

in 3. quatuor acetis. & 3. 2. aquæ rosæ per tempus & coletur, & cum hoc abluiatur dens sæpe calido hyeme, frigido æstate. Et si cum dolore sit apostematio gingivarum, aperiantur cum flebotomia, & abluiantur sæpe in die cum aceto: & sale vel vino decoctionis aluminis iamenti: & ponatur emplastrum anodinum exterius super mandibulam ex camomilla, feniculi semine, lini, butyro, et similibus. Cura eius, quæ est a causa frigida est ut purgetur cum pillulis cochis: deinde abluiatur sæpe dens cum aceto, in quo bulliat sit castorei, euforbij, pyretri, opij, myrrhæ, añ. 3. i. terantur, & cribellentur: vel ponatur pyretum, aut allium concussum super dētem. Vel fiat confectio ex pipere, myrrha, castoreo assafoetida, opio, añ. partes æquales, & melle quod sufficit: terantur, & teneantur in ore, & mastricentur: quia plurimum valet in causa frigida ex his vnum quodque. Cura eius, qui fit propter vermes est: ut dicit Mesue, suffumigium cum pillulis factis ex semine iulquiami, & semine porri cum alkitran, id est pice liquida. Sedar enim omnem dolorem, & occidit vermes: similiter & ex semine cepæ & alkitran: similiter ex pyetro, euforbio & assafoetida: similiter & ex myrrha & opio & c.

Emperica. Emplastrum expertum, siue dolor sit a causa calida, siue frigida: quod positum exterius super mandibulam actu calidum, ilico omnem dolorem tollit. ℞. radice maluaufici duo decim numero, coquantur bene in aqua, deinde scindantur per medium, & extrahatur lignum, & mundentur a cortice exteriori, & incidantur frustatim, & persistentur perfecte, donec ad modum maxillæ conuertantur, & misceatur cum eis farina istarum rerum. ℞. farinæ feni græci, seminis lini, anethi, florum camomillæ añ. 3. i. farinæ ordeii 3. quatuor, & incor-

Tractatus sextus

parentur omnia simul, & in fine addantur olei camomillæ, vel de anetho 3. iij. De proprietate enim suorum simplicium sedat omnem dolorem, & maturat omnem materiam, & finaliter ipsam resolvit.

Prognosticatio. Scias, quod dolor dentium factus propter corruptionem, & corruptionem substantiæ in eis, vel propter vermes, non curatur perfecte, neque sine timore recidivæ: nisi eradicetur cum ferro vel medicinis. Et utile consilium est, ut potius eradicetur cum ferro, quia eradicatio cum medicinis inducit dolorem (ut plurimum) perdurantem. Item sollicitandum est in mitigatione doloris cum anodinis: ne forte dolor ultimetur, & frenesim inducat.

De casu & mobilitate dentium. Cap. II.

Mobilitas siue fixationis debilitas accedit dentibus propter mollicationem gingivarum & ligamentorum, quæ sunt in radice dentium. Mollicatio autem fit propter fluxum humiditatum ad gingivas dissolventium eas compositionem, et quandoque marcescentium ipsarum subiectum, siue substantiam, siue submixtionem.

Methodus. Cura eius est, ut digeratur flegma cum oxymelle composito vel squillitico: & purgetur cum pillulis cochis vel hierapicra vicibus pluribus alternatis. Fiat præterea masticatio eradicans flegma ex pipere, sinapi, pyretro, mastice, cymino simul mixtis & cotulis grosso modo. Similiter & gargarismata ex sinapi condita cum melle vel oxymelle squillitico. Similiter et scarificatio sub mento & super collo: post hoc mundentur omni die dentes cum stilo acuto, & abluantur cum vino rubeo pontico actu calido. Deinde ponatur super eos omni die pulvis stypticus de corallo & mastice & olibano puro añ. par

tes æquales tritis & cribellatis perfectes nequaquam masticet cibos duros & solidos.

Emperica. Dicit Hebermes, in tuo de appropriatis, quod expetitus est pulverem istum ad stringendum dentes mobiles, si annexatur radici dentium. *℞. stypticum capilli, be. adustorum 3. iij. aluminis iamenti 3. 10. pyretri, spicæ añ. 3. 2. nucum cypressi adustarum 3. 2. & f. cornu cerui adusti, centaureæ añ. 3. 7. fructus tamarisci 3. iij. myrrhæ, sumach, balaustræ, apij, corticis glandium añ. 3. 2. salis gemmæ affi. 3. 2. & f. terantur & cribellentur omnia. Et de rebus melioribus est illud. *℞. arsenici sublimati. 3. f. thuris albi. 3. 1. fiat ex ipsis pulvis cribellatus: de quo omni fero ponatur super dentes & gingivas, & mane maxime abluantur cum hydromelle calido, vel vino pontico, vel aceto: quia humiditates reumaticas exiecat, vlcus a carne putrida mundificat, & post illud carnem duram curat: quare confert omni passioni dentium & gingivarum, quæ est cum putredine vel mollicatione. Similiter & illud. *℞. ossis sepiæ, coralli albi 3. 1. fiat sicut prius. Similiter. *℞. spumæ maris, masticis añ. 3. 1. fiat sicut prius. Aliter istud cum praesto non est illud. *℞. coralli, aluminis, corticis salicis combusti añ. 3. 2. fiat sicut prius. Quidam addunt cinerem ossis vel ossium vituli, vel capre combustorum. Item gallarum, balaustræ, ros. sumach. iereos, corticum granatorum añ. 3. 2. myrrhæ, aluminis, ana. 3. vnam: fiat ex eis linimentum super gingivas cum aqua rosarum, vel vino pontico albo. Abluatur es cum aceto, in quo decoctæ sint res eadem.*****

Canones. Omnis volens conservare dentes sanos, caveat a masticatione rerum durarum, vel viscosarum, vel calidarum, vel frigidarum: dura namque dislocant, viscosa adherent & putrefaciunt: sed calida resolvunt spiritum vitalem, et laxant ligamen

dentium: sed frigida mortificant calidū naturale, quod in eis est, & nervos debilitāt. Item studeat omni die eos mundificare a sordē & a rebus interiacentibus post cibum cū ligno vel ferro vel sepiā. Item abstergat eos semel in septimana cū tartaro vini albitrīto & cribellato (vt alcohol) fricando eos cū eodem puluere: & post frictionē abluendo cū vino albo clāro, vel vino rubeo styptico. Dicit enim Aristoteles quinto de generatione animalium, cap. de dētib: qd dentes animalium differūt ab omni altero genere ossium in quatuor cōditionibus. Prima, quoniā sensum habent tactus, quo cetera sunt penitus priuata. Secūda, quia nō nascuntur a principio generationis, sed post partum. Tercia, quia pmutantur: quia qui nascuntur a principio molles sunt: quare ipsos natura pmutat in hominib: apud annum decimū vel circa, sed in equis circa quartū solidos procreando. Quarta, quia crescunt omni tempore vitæ animalis secūdū lōgum vsq; ad trigessimū annum, vel circa id.

Prognosticatio. Dentes si ceciderit ante vigesimum annum, renascuntur: postea vero minime.

De corrosione dentium & gingiuarum. Cap. III.

Corrosio dentium & gingiuarum fit ex materia putrefacta marcidā penetrante in substantiam dētis & gingiuarū, quæ alterat eorū cōplexionem & cōpositionē: sicut lutū alterat cōplexionem ligni, & incinerat eius cōpositionem cū cinis, sit terminus putrefactionis vltimatē: vt dicit. 4. Meteororū. Fit etiam corrosio quandoq; propter vermes natos in eis ex materia putrefacta. Sed signa & causam eorū diximus iam capitulo de dolore dentū. Signa corrosiōis dentū ex humore, sunt cōcauatio

ipsorū patiēs ad sensum, & foror: quare cibus in concavitate illa quandoque retinet. Signa autē corrosiōis gingiuarū, sunt spūm sanguinolentum: & cum aspicitur in os, apparent gingiuarū marcidæ, corrosæ, liuidæ, cum sœtore plurimo.

Methodus. Purgetur cum pillulis chrys vel sœtidis, munden-
tur dentes & gingiuarū omni die ter cum aceto squillitico, in quo dissolutum sit allumen iamenum, aut tartarum, subtiliter tritum: vel ponatur super loco corrosio vnguentum viride possum capitulo de surditate. Et post mundificationem, ponatur super locum puluis consolidatiuus & stypticus faciens nasci carnem, & firmare eam. ℞. mastice, thuris, coralli rubei añ ʒ. f. puluerizentur & cribellent. Et potest addi bolus armenicus, sanguis draconis, & sarcocolla. Et abluatur locus quandoq; cum vino decoctionis hyssopi, iureos & mellis.

Emperica. Cōmuniter operantes circa dentem corrosum fecerunt nil aliud faciunt: nisi quia ipsum cū ferro extrahunt, vel ipsum adiungunt cum cauterio: quia sicut dictum est capitulo de dolore dentium: Dens dolorosus, dēs mobilis, dens corrosus & sœtidus curatiōnem perfectam non recipit, nisi per extractionem.

TRACTATUS OCTAVUS primæ sectionis. De passionibus gingiuarum.



Gingiuarū passiones, de quibus adhuc restat loqui, sunt tantum duæ. Prima est fluxus sanguinis. Secunda vltima seu putredo. Nā de sœtore recatum dictum est capitulo de sœtore

Tractatus septimus.

oris: de mollificatione earū dictū est cap. de mobilitate dentiū, de apostemate vero cum de dolore dentiū loquebamur.

De fluxu sanguinis ex gingiuis. Cap. I.

Accidit quibusdam hominibus, vt ex gingiuis eorum fluat sanguis: cum abluunt os fortiter, vel preserint eas digitis, vel cum alia re aspera & sunt cum foetore. Ista passio prouenit ex materia currēte a capite ad gingiuas & dentes, quæ ibidem diu stans imbibit substantiam gingiuarum, & ex omni leui causa effluit saluatiū: verum si anti querur, & putruerit: vlcus seu putredinem causat in gingiuis.

Methodus. Fricentur dentes cum puluere trochiscorū q̄ sic fiūt, p̄missa scarificatione sub mēto & super collo. ℞. arsenici citrini & rubei, calcis, gallarū, aluminis. añ. 3. 2. fiat trochisci cū aceto forti: & cū ipsis vti volueris, teratur vnus ex ipsis subtilissime, & fricetur loc⁹ cū eo: tūc gescat p̄ horā et teneat in ore aquā ro. vel oleū rosaceum: ne forte puluis corrosiuus & abstersiuus inducat adustionē in mery, vel partib⁹ circūiacētib⁹. Postq̄ autem hoc factū fuerit per aliquos dies, donec mundificatæ fuerint, & putrefactio omnino remota sit, ponatur super locū tale incarnariū. ℞. mastice, thuris, coralli rubei. añ. 3. 6. fiat puluis subtilissimus (vt alcohol) qui ponatur super gingiuas: q̄a facit nasci carnem, & indurat eam. Idem facit puluis factus ex olibano, aloe, sarcocolla, sanguine draconis, sumendo ex eis partes æquales &c.

De vlcerebus gingiuarum. Cap. II.

Putredo seu vlcus gingiuarum est terminus corrosionis: quemadmodum corrosio est terminus antiqui fluxus sanguinis ex eisdem: quoniā inter

ista tria hic est ordo. Primo namq̄ gingiuæ mollificātur, & imbibuntur a materia reumatica descēdente a capite per modum catarrhi: Secundo sanguinem emittunt, propter dissolutionem suæ cōpositionis: Tercio corroduntur, & concauantur manifeste, propter humorem vlcera ntem, & denigrātur, & putrescunt, donec cadant.

Methodus. Cura putrefactionis gingiuarū colligit ex dictis in capit. de foetore oris, & capitulo de mobilitate dentiū: & capitulo de exitu sanguinis ex gingiuis.

Prognosticatio. Putrefactio quidem si valde processerit, raro curatur, sed facit hominem edentulum. Item vlcus gingiuarū si fuerit carnosum, mortale, & proprie cum tetigit epiglottim &c.

IN LIBRI PRIMI SE ctionem secundam præfa tiuncula.



PXPLETA CVM dei auxilio sectione prima, quæ fuit de cura membrorum integrantium ventrem animalē, qui protēditur a vertice capitis vsque ad epiglottim seu principium caninæ pulmonis, exclusiue: Volumus nunc aggredi sectionem secundam, quæ erit de cura passionum membrorum constituentium vētrem, qui procedit ab epiglotti vsq̄ ad furculam inferiorem, vbi est os stomachi. Interim vna cum Ras. in libro suo diuisionum gratiam dei implorantes. Deum itaq̄ posco concessorem ad rectificationem sermonum & operis & auxilium, secundum q̄ sibi placet.

TRACTATUS PR mus secundæ sectionis.

Gutturis passiones famosæ sunt tres. Prima est squinãtia. Secunda catarrhus. Tertia raucedo vocis. Cum autẽ dico guttur, intelligo aggregatum ex gula siue carnositate exteriori & canna pulmonis & epiglotti & mery siue esophago, secundum q̃ alligatur, & coextenditur canna pulmonis.

De squinantia.

Cap. I.

Squinãtia est apostema colli, quodcunq; prohibens anhelitum & deglutionem cibi. Et dicitur ab Auiçen. q̃ est decollatio, strangulatio, vel suffocatio. Squinãtiæ tres sunt species. Prima, quãdo epiglottis & musculi eius apostemantur: & est omnino mortalis, propter ablationem anhelitus. Est autẽ epiglottis (vt dicit Auerois, 2. colliger) suprema pars cãnæ pulmonis, solidior & densior alijs eius partibus, habens in medio foramen strictum, vt fistula, in quo formatur vox. Et ideo cum sufflamus fortiter in cannam pulmonis alicuius animalis, egreditur vox, quæ assimilatur voci illius animalis. Et super illud foramen positum est illud conperculum cartalaginosum mobile sursum & deorsum, alligatum versus os, liberum versus cannam pulmonis ad defendendum a rebus, quæ vadunt ad esophagum, ne egrediant ipsum: quia moreretur homo per viam suffocationis: & propter hoc, quando intrat aliquid etiã parum quantitatatis: sicut contingit inglutientibus cibum cum ridet, illud mouet tussim. Secunda est, quãdo pulmonis canna & musculi eius apostemantur, & est etiã mortalis, sed non ita subito sicut prima. Tertia est, quando gula & carnositas gutturis apostemat, & est salubris, sed non apud ignaros. Fit autem quandoq; squinãtia a sanguine, quandoq; a cholera, quãdoq; a flegmate: sed non a melancholia. Signa squinan-

tia in communi, sunt apostematio gutturis, et suffocatio præfocatiua & difficultas transglutiendi cibum, & anhelandi siue æqualiter siue inæqualiter, secundum q̃ apostema magis declinat ad vias anhelitus, & ad vias mery & esophagi. Si autem sit a sanguine, cum prædictis apparet rubedo faciei cum carnositate, dulcedo saliuæ, dolor grauatiuus cum acuitate aliqua, & antecessio ciborum multiplicantium sanguinem. Et est vt plurimum cum fe. Si autem sit a cholera, apparet cum prædictis color citrinus, facies macra, dolor acutus, sitis & inflammatio vehemẽs, & saliuæ amara, & antecessio ciborum cholericorum: & est etiã vt plurimum cum feb. Si autem sit a flegmate, cum prædictis apparet multitudo saliuæ aquosæ, raucedo vocis, dolor grauatiuus sine acuitate, color faciei cum pauca rubedine, & habitudo flegmatica, & antecessio ciborum flegmaticorum: & est vt plurimum sine feb. vel cum feb. lenta. Signa primæ speciei sunt, vt di. Hip. 3. prognosticor: quia nõ appet rubor, neq; tumor fortis exterius in ceruice, nec interius, quando inspicitur in os ægri: verum tamen est ibi dolor acutissimus, & anhelitus difficilis valde: quæ significat apostema latitare in profundo gutturis vbi est epiglottis. Signa secundæ speciei sunt: quia apparet tumor, & rubor interius, sed nõ exterius. Signa tertiæ speciei sunt, quia apparet tumor & rubor exterius in transglutiendo, sed non apparet interius: neq; apparet plurima difficultas anhelandi & transglutiendi.

Methodus. Cura cuiuscunq; triũ specierum squinantia est: vt si sit a sanguine: fiat sico die, vel nocte flebotomia basilicæ i brachio vel in manu, si virtus non sit debilis, & extrahatur sanguis muſtus. P. stea eodem die post sex horas flebotometur vena, quæ sunt sub lingua: neq; tardei, cū sit nec flaria

Tractatus primus

talís flebotomia. Post hoc fiant fricationes, & ligationes extremorum dolorose. Et si fuerit difficultas in anhelitu ponere vétoſam super collum, vbi est prima spondilis cum reiteratione frequentata. Et si venter sit constipatus, fiat clyſtere lentium dictum cap. de freneli. Post flebotomiam gargariset continue vsq; ad tres dies diamoron, vel vinum granatorum, vel succum solatri vel agreſtæ cū aqua balaustiæ, vel succum corticū nucū vindiū cū aqua calida: vel gargariset acetum & aquam calidam vel aquā ros. cū zuccaro quodcunq; præsto sit ad repercutiendum apostema. Et nutriatur succo ordeī vel auenæ, vel sorbeat ius pullorum cōditum cum vino granatorum vel berberis, vel cum aqua decoctionis sumach. Bibat vinum pōticum lymphatum, vel aquā ordeī, vel iulep: & si possibile fuerit, mundificetur cum apozimate purgāte sanguinem, & educente humores acutos magis lubricum faciendo, q̄ attrahendo: ne se, inflammetur: qđ sic fiat. ℞. medullæ cassiæ fistulæ 3. i. manne, ramarind. añ. 3. i. & semis: dissoluantur omnia cum 3. 4. aquæ decoctionis prunorum. Si ergo per hunc modū liberetur vsq; ad quatuor vel quinque dies, bonum est: Si autem, bonum est si erit ventositas in spatulis propter maiorem diuersionem: deinde si materia tota fluxa est, & morbus est in statu, vel in fine augmenti: fiant gargarismata resolutiua bis in die, scilicet ante prandium et ante cenam ex. 3. 1. myrtiæ dissoluta in 3. i. oxymellis compositi, vel cū aqua decoctionis prunorū calida, vel cū oxymelle squillitico & aqua eadem: si autē non resoluitur: fiant hora illa emplastra resolutiua exteriora circa gulam, quæ sic sunt. Recipe farinæ ordeī, fenigræci, lini, ana. 3. i. se. malua visci, floris camomillæ, hyſopi, ireos, & adipis anatis, ana. 3. 2. bulliantur insimul, vsq; ad spissitudinem, in qua cum oleis dictis: & totum ponatur calidum super locum. Et si via esophagi constringatur: pone ventosam magnam super ceruicem, quando deglutiit cibum, quandiu ibi steterit: quare reitera sæpius eius positionem. Cura eius, si sit a cholera, est vt primo clysterisetur, si est possibile cum clyſteri lentius prædicto: postea fiat flebotomia hatilicæ in manu vel in brachio, vel vétoſatio in spatulis. Postea fiant gargarismata repercuſſiua prædicta: deinde in statu & sine augmenti fiat, vt in sanguinea. Et si necesse fuerit: purgentur cū decoctione prædicta: vel cum ista. ℞. manne. 3. 1. reubarbari boni 3. 2. dissoluantur in decoctione prunorum feruenti, & dimittantur sic per horam 1. postea colentur, & detur totum ante diem. Et sit aqua quantitatis. 3. 4. vel 5. ad plus. Utatur diata dicta, vel parum magis declinante ad frigiditatem. Cura eius, si sit ex flegmate, est vt a principio purgetur, si est possibile, cum pillulis cochineæ, vel medicina de turbith, vel clysterisetur ex clyſteri exacuto cum agarico & colloquintida añ. 3. 1. Deinde fiat gargarisma repercuſſiuū: sicut in sanguinea, præter quod non est opus tanta repercuſſione, sed maiori diuersione & euacuatione: vltimo fiant gargarismata acuta & incisiva, & emplastra resolutiua, sicut prius.

Emperica. Communiter operantes faciunt in omni specie squinantia quacunque hora diei etiam super cibum flebotomiam de cephalica fortem, propter diuersionem materiae subitam: nec prohibet illud antecessio flebotomiæ non longo tempore, dummodo virtus constet: quia timor suffocationis subitæ moram non concedit. Et hæc quidem flebotomia, licet non sit regularis in flegmate & cholera ratione qualitaris: est tamen ratione quantita-

tis siue multitudinis: vt patet per Aui-
cennā quarto primi. Neq; semper est for-
te possibile purgare corpus cum medici-
nis, propter impedimentum, quod est in
deglutendo. Post flebotomiam proce-
dunt omnia gargarismata & empla-
stra: sicut in methodo dictum est. Et post
minorationem materiæ datur sæpe dia-
olibanum cum aqua ordeï: quia resoluit
materias omnino, quando non est timor
de attractione vltiori. Tunc nanque
gargariset cum diaomoron & aceto, &
aqua ros. simul mixtis. Item Rasis, Aui-
cenna, Serapion. conueniunt, quod gar-
garismus factus est de stercore canis al-
bi comedētis ossa, vel stercore lupi cum
aqua ros. vel plantaginis sanat omnem
squinantiam. Similiter & emplastrum
vel linimentum factum ex eisdem ster-
coribus exiccatis & cum melle mixtis
& linitis circa collum vndiquaq;. Con-
fert post euacuationem vniuersalem, &
proprie cum materia tota fluxa est, nec
timor fuerit de vltiori attractione: fa-
cere circa gulam emplastra acuta rubifi-
cantiua, vt materia trahatur ad extra ex
sinapi, melle, ficibus siccis, fursure, myr-
tha, thure, ireos & cepa, squillitico, &
proprie in causa flegmatica: quia in hu-
iusmodi non est timor de inflammatio-
ne se. sicut in alijs. Neq; flegma est adeo
faciliter trahibile, sicut cholera, vel san-
guis. Similiter & emplastrum ex mica
panis incorporati cum melle approxi-
māt duabus vel tribus appositionibus,
qd̄ tunc decoquit cū succo apij. Et deinde
magis cū stercore colūbino vel arietino.

Canones. Omnis squinātia aut termi-
natur ad resolutionē, & est
salubris: aut ad saniationem & apertio-
nem, & est timorosa: aut ad permuta-
tionem eius ad alia loca. Et si sint nobi-
lia, erit mortalis: et si ignobilia, salubris.
Præterea quandoq; propter casum vel
percussione in collo, fit dolor, q̄ attrahit

materias, & facit apostema squinantia-
cum: cuius cura est penitus eadem cū il-
la, quæ sit a sanguine p̄ dicta. Caue præ-
rea, ne emplastra rubificantiua per exte-
rius vel gargarismata acuta per inte-
rius administres: nisi materia tota fluxa
sit, vel quasi tota: quia apostema augmen-
tabis. & ægrum suffocabis: obserua igit̄
ordinem in methodo prædictum.

Prognosticatio. Dicit Hippo. prognos-
tici prima species squi-
nantia prima die interficit ægrū, vel ad
plus, infra quartum. Secunda species, &
si mortifera sit, tamen pigrior est: quia
forte interficit infra quinque dies. Tertia
vero species, nisi rubor & tumor ad inte-
riora declinauerint, & materia ad epi-
glottim raptum habuerit, spei salutis nō
omnino resistit, si medicus in cura recte
processerit. Et ex hoc videre potes, quod
tres species squinantia contrario modo
se habet, tribus speciebus hecicæ, in quib-
us tertia species est omnino mortalis.
Item dicit Hippo. ibidem, q̄ si tumor &
apostema in tertia specie rapiatur ad in-
teriora: ita q̄ exterius in gula non appa-
reat omnino, & fiat non in die cretico,
neq; superuenerit apostema creticum su-
per aures vel alibi, neque æger saniem
expuerit, & anhelitus magis ac magis
angustetur: omnia ista mortem vel reci-
diuationem significant futuram: quia
materia raptum habuit ad pulmonem,
vel cor, vel pectus: quare suffocatio-
nem inducet infra septimum diem, si nō
expuatur: requiet igitur & mitigati-
oni doloris hora illa non est credendum:
quia mēdax est, sed tibi prognosticandū
de ægro, et ab ipso fugiendū. Item ibidē
di. Hippo. q̄ bonū est: tumore appere exte-
rius & quanto magis, tātō salubrius erit
Itē si squinātia illa terminet̄ ad sanatio-
nem, & fiat exitura et sanies fluat ad pul-
monē, & forassis expuet̄, & est salubre,
& fortassis suffocabit ægrū infra 7. dies

Tractatus Secundus.

ad plus: & fortassis cortoder panniculos & iustantiam pulmonis, si infra 40. dies a die rupturæ non purgeſ, & inducet phthiſim vel freneliſim propter cerebri compaſſionem. Item ſquintantia terminatur infra 7. diem, & ſi hunc effugerint, ſani ſiunt, quoniam in morbo acuto vincit natura, aut vincitur ſine expectatione ampliori. Item dicunt quidam, q̃ ſigna mortalia ſunt in ſquintantia: ſi apoſtoma euenerit in fe. continua quacūq; die critica vel non critica: q̃a talis criſis eſt ſymptomatica, nō naturalis. Similiter & ſyncop̃. vehemens difficultas anhelitus, diſſinia, oregmon, difficultas tranſglutiendi cibum & potum cū reſectione eius per nares, vox catulina quaſi loqueretur per nares, ſpuma in ore, emiſſio lin-
gug frequens, ſicut in equo fatigato, color niger vel liquidus in lingua, ore, labijs et oculis: nec non frigiditas extremitatum. Item dicit Hippo. 4. par. apho. Si a fe. habito tumore nō exeunte in faucibus, ſuffocatio repente ſuperuenerit: mortale. Item 2. apho. Strangulatum & diſſolutorum nondum mortuorum, non reſerunt, quibus ſpuma fuerit circa os, ſupple vt plurimū: vt dicit commentator. Irē ſalubria atq; ſigna vitalia, ſunt geſ, ſomnus, alleuiatio doloris, bonitas anhelitus, facilitas tranſglutiendi, & priuatio omnium prædictorum. Item ſquintantia cum fe. forti plus eſt timorofa: quia ſunt ibi neceſſitas adaucta, & euentatio cordis diminuta: quare cor extinguetur. Item ſquintantia maxime accidit in vere: vt dicit Hippo. 3. par. apho.

De catarrho. brancho & corripa. Cap. II.

Reuma dicitur omnis fluxus materiz de membro ad membrum in quacumq; parte corporis: & ideo Gale. in tegne tractatu de cauſis cap. de curis apoſtematum ait, dolor eſt ois ex-

acuit reuma. Catarrhus vero dicitur deſcenſus materiz a capite ad partes ſp̃iales & naturales. ſ. peſtus pulmonem & ſtomachum. Corripa autē dicitur deſcenſus materiz a capite ad nares: Et ſi materia iſta acuta vel cholericā fuerit vel de ſlegmate ſalſo mordicante colatoria naſi in radice, contrahetur cerebrum in ſe, & expelleſ illam materiam cum ſono & vehementia, quæ dicitur ſternutatio. Et ex hoc patet, q̃ ſternutatio nō accidit in cerebro, niſi calido natura, vel accidente: vnde Hippo. 7. par. Sternutatio fit in capite caſeſacto cerebro. &c. Branchus dicitur deſcenſus materiz per os ad colatorium palati cum ſcreatu vel raſcatione: verū tamen hæc tria nomina pro ſe inuicem ſæpius ponuntur in ſcientia medicinz. Iſte igitur tres paſſiones quandoq; ſiunt vel a cauſa frigida, vel calida. A calida quidem dupliciter. ſ. eſſectiue & ſubiectiue. Eſſectiue quidem, vt ſi ſtomachus calidus ſit vaporoſus: quare mandabit multas ſuperfluïtates cerebro, quæ frigiditate ſua conuertent in ſlegma. Similiter ſi cerebrum ſit calidū ex natura vel ex mora ſub ſole, vel ſtatione ad ignem, & ambulatione in aere calido humido, vel vento auſtrino et proprie ſuper cibum. Similiter & ex clamore & vociferatione, & inclinatione capitis deorſum: Quapropter q̃ libet eorum attrahit ſuperfluïtates vaporoſas ad ſe: quæ poſtea colliquaræ ſeu congelatæ deſcendunt. Ex quo ſcire potes, q̃ mala ſit cōpaginatio ſtomachi frigidi cum cerebro calido, vel econuerſo, quapropter quod ait Auicē. primo cañ. ſen. 2. & cap. de ſignis cōplexionis peſſimæ: q̃ deterrima cōplexionum eſt, in qua mēbra & proprie principalia ſunt diuerſa: diſcrasiarum & contrariarum cōplexionum. Subiectiue vero vt ſi materia fluens ſit cholera, vel ſlegma ſalſum, **C**A cauſa frigida ſimiliter du-

placiter, effectiue & subiectiue. Effectiue
vbi si stomachus patitur indigestiōem:
propter quod replebitur flegmate, quod
sursum euaporabit: vel si cerebrum sit
frigidum humidum naturaliter, vel ab
extra: vtpote ab aere aut aqua frigida,
neq; bene digerens suum proprium nu-
trimentum: quare colliguntur superflui-
tates. Subiectiue vero, si materia sit fle-
gma aquosum vel viscosum. ¶ Signa
materiæ calidę sunt, ardor & pruritus
& asperitas in locis super quę currit, &
sitis & excoꝛiatio, & rubor faciei & ma-
teriæ descendenti subtilitas, & inflam-
matio, & amaritudo saliuę, vel salsedo-
sine manifesta causa. ¶ Signa materiæ
frigidę sunt eminentia, oculorum cum-
tumore & pallore faciei, & copulatio na-
rium & colatorij post somnum & spissi-
tudo materiæ cum viscositate: vel si sit
subtilis aquosa, insipida: similiter & dif-
ficultas anhelitę, & asma, & diminutio
odoratus.

Methodus. Cura oīm istarū passio-
num si sint a causa cali-
da est, vt mundificet corpus cū pillulis
de reubarbaro, quę sic fiunt. ℞. miro-
balanorum citrinorū absq; nucleis. 3. ꝑ.
reubarbari boni. 3. i. aloes. 3. quinq; sca-
monę. 3. ꝑ. masticis, liquiritię. añ. 3. i. fi-
ant pillulę cū mucillagine psillij, vel se-
minis citoniorū: dentur sero absq; coena
ex eis a. 3. i. vsq; ad duas: vel cū apozī-
mate de reubarbaro, qđ sic fit. ℞. reu-
barbari. 3. 2. incidatur frustatim, & po-
natur in. 3. s. feruentis aquę decoctionis
prunorū, & dimittatur sic per 12. horas.
Deinde coletur, & addantur syripi rosę
vel violę. 3. 2. & detur totum in matutinis
pmissa digestionē materiæ cū syrupo de
meliloto dicto in cap. de fœtore nasi:
vel cū syrupo ro. vel viol. de nenuphar:
dando ex eis oīdi die cū aqua decoctio-
nis iulubarum vel sebesten vel passula-
rum. Post purgationem vaporetur os et

facies cum aqua decoctionis viol. sicca-
rum, ordeī excoꝛicati, florum camomil-
lę, papaueris alb. recipiendo vaporem
calidum in os & nares, vel cū aceto pro-
iecto super lapidem ignitū. Vngantur
nares & labia cū oleo rosę, vel viol. odo-
ret quandoq; viol. siccas, vel ro. cū cā-
phora, vel continue teneat sub lingua,
vel etiā deglutiat pillulas billichias qđ
inspissant catarrhum acutū, & ad scre-
andum præparant, & leniūt asperitatē:
quę sic fiunt. ℞. gūmi arab. dragagan-
ti, amili, succi liquiritię, seminis citonio-
rum, psillij. añ. quantū vis: fiant pillulę
admodum cicerę vel fabę cū mucilla-
gine psillij. Nutriatur ex ordeo farre aue-
na & lentibus. qđ si virtus debilis sit, vel
sit cū fe. comedat pullos alteratos cum
portulaca, cucurbitis, lactucis. Nequāq;
vinum bibat: quia a proprietate causat
istas passiones: cū vinū mentē percutiat:
vt dicit Hip. in de regimine acutorū. Sed
bibat aquā ordeī, vel decoctionē liquiri-
tię & zuccari, vel aquā calidam, in qua
sit syrupus rosę, vel viol. Cura earum est
si sint a causa frigida, vt primo purge-
tur cum pillulis cochlij vel fœtidis, dando
3. i. sero sine coena, præmissa digestionē
cum oxymelle: composito; vel syrupo
desticad. prædicto. post ea fricetur ca-
put rasum cum cepa acuta, aut squillis,
aut panno aspero: & post ponatur su-
per ipsum medicamen rubificationium,
vsq; dum fiat vesicatio & apertio: sic-
cut est emplastrum tale. ℞. stercus co-
lumbinum, sinapi, affodillos: coquant
in aqua & melle, vel in aqua tantum:
pistentur omnia, & ponatur calidum su-
per caput abrasum, & calefactum per
fricationem. Subsumgeur in declina-
tione morbi cum thure, vel masticę,
vel gummi armoniaco, vel ligno alo-
es, aut stōrace, calamento bdellio, vel
myrtha, vel ruta, sed non in principio et
ante euacuationem: quia impediretur

Tractatus Primus.

resolutio materiæ: & aliqd ipsorum deguliat sero, cum itur ad lectum. Fiat etiam masticatio eradicans flegma ex pyretro, pipere longo, cubeb. añ p. i. mastic. 3. p. i. passulaz: quantum volueris, & expuatur simul. Et iniungatur sæpe cum vnguento mærcionis ad solē vel ignem diligenter fricando abralis sæpe capillis. Bibat omni die in ieiuno similiter & sero, cum itur ad lectum, vnam vnam boni vini, in quo drachma vna masticis aut olibani fuerit infusa vel liquefacta. Saccelletur postea caput cum sale, milio, & sinapi calefactis super lapide ignito, vel vaporetur cum aqua decoctionis rosarum, absinthij, meliloti, camomillæ: donec reliquæ omnes resoluantur. Vtatur diacitionem post cibum, sed aurea alexandrina vel pliris ante cibum. Abluatur caput cum lixiuio decoctionis raphani & sticados, postea cum vino decoctionis gallarum, nucis cypressi, & baccarum lauri, vel sulphuris vel balaustiz. Comedat carnes assas vel elixatas cum feniculo. Bibat hydromel cum aqua decoctionis hyssopi, liquiritiz, & melle: odoret nigellam ligatam in panno lineo subtiliter tritā & torrefactam. Costi & nigellæ subfugium confert & expertum est: & sudare in loco calido stomacho ieiuno pro posse, cum est sanus: ita vt caput sit siccum. & pedes aspargantur aqua calida plurima: confert & laborare, sitim & famē tolerare pro posse, coenā subtiliare, & cibos siccos sumere, & somnum tardare super cibum. Si autem hæc omnia non contulerint: vesicetur caput, vbi est commissura recta cum cantharidibus & aperiatur vesicæ cum acu. Et si hoc non sufficit: cauterizetur locus, & permittatur diu apertus, donec cerebrum exiccetur.

Imperica. In causa frigida communiter operantes faciunt tale remedium, præmissa euacuatione vni

uersali: dant sero, cum itur dormitum, 3. vnam. zz. conditi, & post illud immedia te potum aquæ calidæ: quia digestionē stomachi procurat: vapores reprimi, catarrhum maturat: potus vero aquæ frigidæ catarrhum multiplicat: Similiter & potus vini vaporosi, & proprie versus noctem. Item in principio non cōpetit gargarismus: quia materias facit fluere: in medio compertit incisius, in fine vero stypticus. Item in omni catarrho & tussi catarrhali conferunt hæc pillulæ. ℞. myrrhæ puræ. 3. sex. olibani. 3. opij. iusquiani. añ. 3. quatuor. & fiant pillulæ de quibus detur, cum itur dormitum de sero a. 3. f. vsq. ad. 3. vnam: quia omnē fluxum descendentem ad stomachum restringunt, & proprie post purgationē. Item conferunt inspissantia, vt subtile acutum (quod descendit ad guttur) ingrossetur, & non descendat in profundū stomachi vel pectoris, sed adunetur, & expuatur, & ex hoc facientibus: vt dicit Mes. præsentī capitulo. est thus, dragantum, & muscillago psillij, vel seminis citoniorum, vel iuiubæ & lebesten, & syrapi & lobochofactum ex eis. Item flebotomia (vt asserit) in hac agritudine solū est in tribus casibus necessaria. Primus si catarrhus sit calidus, & in corpore calido, cum rubore oculorum & plenitudine venarum: Secundus, si catarrhus descendit ad oculos, & pulmonem, vel mēbra nobilia. Tertius, si accidat catarrhus cum feb. In alijs autem est inutilis.

Canones. Omne reuma descendens a capite deorsum, tribus intentionibus curatur. Prima quidem per confortationem stomachi, ne vapores cibales transmittantur ad cerebrum: & hoc fit per styptica. Secunda per rectificationem capitis & cerebri: ne generatas humiditates in seipsas deorsum mandet: & hoc fit per emplastra & vnguenta resolutiua & rubificatiua. Tertia ve-

ro per confortationem pectoris & pulmonis, ne recipiat a cerebro superfluitates delegatas, sed receptas maturet per noctem, vt in crastino excreationi sint paratæ: quod fit per Joboch's creatium, & per pillulas bichichias, & per electuaria styptica, & per debitum capitis situm in somno: qui est, vt iaceat patiens super altero laterum, capite valde exaltato, & versus faciem reflexo: vt sic oēs superfluitates eius in somno declinent ad os & nares, nec raptum ad cannam pulmonis habeant & esophagum. Ista autem clarius & plenius dicemus infra capite de phthisi, & capite de asmate, tussi & empimate.

Prognosticatio. Sternutatio superueniens in corripa, lethargia, soda, epilepsia, frenesi, apoplexia, arthetica, si sit post digestionem materiæ, bonum: faciliat em, atq; velocitat eius expulsionem. Ante signa vero digestionis, malum: quia demonstrat materiã augmentari, & proprie in pleuresi, peripneumonia, & squinantia. Reuma si descenderit ad stomachum, inducit primo indigestionem, propter cibi fluctuationem, & stomachi infrigidationem. Secundo siertia, propter stomachi molificationem, & retentiu debilitatē: quod si materia sit frigida & acuta, causabit feb. Tertio dysenteriam: propter intestinorum corrolionem. Item si reuma descenderit ad pulmonem vel eius ad cannã, inducit primo tussim chronicam: secundo asma, siue malitiam anhelitus: propter opilationem cannularum in pulmone: tertio suffocationem, si fluxus sit plurimus. Sed si materia sit acuta, inducit corrolionem pulmonis: deinde phthisim, finaliter & mortem. Item catarrhus in senibus raro curatur: quia suffocat ante maturationem propter desectionem excreandi. vnde Hippocrates secunda parti. Branchi & corripa

non maturantur in valde senibus. Sunt autem valde senes, qui sunt in quarta ætate quæ est apud annum septuagesimum. Senes vero absolute: qui in tertia, quæ est apud sexagesimum annum. Item catarrhus cum dolore capitis perdurante, difficulter curatur: quare cerebri debilitatem significat confirmatã. Item in autumnno multiplicatur catarrhus propter inæqualitatem aeris, sed in hyeme propter aeris frigiditatem, in æstate propter colliuationem, vere propter multitudinem humorum. Item reumatici non fiunt splenetici. Item catarrhosi dispositi fiunt ad apoplexiam & epilepsiam, si materia sit frigida: ad phthisim vero, si sit calida nitrosa.

De rauedine vocis.

Cap. III.

Rauedo vocis quandoque est a natura, propter malam complexionem inæqualem epiglottis & canna pulmonis humidam opilantē, vel siccam exasperantem, & ista est incurabilis: quandoque est accidentalis: et de cura istius loquitur. Fit autem tribus modis: vno modo a catarrho frigido rhegmatico viscoso opilante epiglottim in quo formatur vox, & vocalem arteriam totam. Et signa & curatio eius habentur complete ex capitulo de catarrho. & capite de tussi de causa frigida. Adhuc præter illie dicta conferunt lohoch factum ex diaprassij parte vna, & diacalamenti vel diayris partibus duabus, addendo succi liquiritiæ, & mellis despumati, quod sufficit ex quo lambatur mane & sero paulatim inglutendo. Secundo modo fit a siccitate plurima illarum partium exasperante superficiem ipsarum. propter quod aer inæqualiter percutit ad ipsam: Cū asperi-

Tractatus secundus.

cas nihil aliud sit, q̄ inæqualitas secundū
durum corpus, vt dicit Gale. in teg. trac.
de signis. ca. de signis canna pulmonis.
Erista species accidit habitantibus in so
le vel vento sicco, vel corporibus siccis
per naturā. Et signa & cura habetur ple
ne ca. de phthisi. Præterea cōfert Iohoch
ex diaprassij parte 1. diagraganti per 2.
& diapenid. addendo succi liquiritiæ &
zuccari, quod sufficit. Tertio fit a calidi
tate accidentali consumente humidita
tes lubricas, & corrugate vias: sicut cō
tingit febricitantibus, & proprie febril
bus chronicis & ethicis. Et signa & cura
cap. de tussi habentur. Præterea Iohoch
ex parte 6. diapenid. & parte 1. diapaue
ris, & partibus 2. diagraganti, addendo
zuccari violæ, quod sufficit, vel succi li
quiritiæ.

Emperica. Syrupus bonus ad hoc, &
proprie in flegmatica cau
sa. ℞. passularum, pinguium, liquiritiæ,
hylopi, ireos, ficuum pinguium siccarū,
capilli veneris, calamēti sicci añ. 3. s. dra
gaganti, masticis añ. 3. iij. croci. 3. 1. deco
quantur ista in quatuor 3. aloes lib. succi
caulium, vel aque decoctionis eorundē,
vsq; ad consumptionem medietatis, &
colentur. & fiat syrupus cū melle & zuc
cero añ. lib. 1. dentur omni die mane 3. 2.
cum aqua decoctionis ficuum. & vix
passæ. Item Iohoch ad idem. ℞. aque
decoctionis caulium lib. 3. mellis despu
mati lib. 1. decoquatur simul lento igne,
donec aqua consumatur, & mel rema
neat, aut mel solū capiatur, & cum ipso
incorporetur 3. 1. & 6. radicum raphani
crudi atq; mūdati perfecte: ex ipso lam
batur frequēter in ieiuno. Et sunt aliqui,
qui loco raphani, squilla, vel ireos, vel
se. veticæ, vel cepe assum commiscunt:
potens est & expertum. Item Iohoch de
squilla sublime dicemus cap. de tussi, cū
de empericis loquemur. Item electuariū
ad idem. ℞. diaphylopi, diacalamenti,

diayris, diagraganti añ. partem 1. diapa
paueris partes 2. diapened. quantum de
omnibus misceantur simul, & lamba
tur omni sero: repercutit fluorem, & qđ
fluxum est: digerit & expellit: Item ad
idē. ℞. succi liquiritiæ, zuccari albi añ.
partem 1., amydi, diagraganti, gummi
arabici, olibani añ. par. 6. fiat pillula cū
albuminibus ouorum: quorum transglu
tiantur omni sero quatuor vel quinque.

Canones. At si lineat a potu vini ponti
ci, & aceti, & omnium res
asperarum & oligar dulcia: sicut sunt
mel, zuccarum, aquæ decoctionis passu
larum, iuiubarum, lebesten, sicuū lica
rum, dactylorum, & similia, nisi inten
dat ad incisionem rheumatis: tunc con
ferunt acuta: sicut est hyposop & sinapis
condita cum melle,

TRACTATUS SE cundus secundæ sectionis.



PECTORIS & pul
monis passiones sunt se
ptē. Prima tussis: Secun
da asma et dysnia, et ore
gmō siue erysima: Ter
tia pleuresis: Quarta pe
ripneumonia: Quinta empima: Sexta
phthisis: Septima spuit sanguinis. Cum
autē dico pectus & pulmonē, comprehē
do costas, pleuram, thoracē, pulmonē,
mediastinum pectoris & diaphragma. Et
hæc sunt omnia mēbra spiritalia, præ
ter cor & eius capsulam, de quibus dice
tur proximo tractatu. Est autem ipsorū
compago talis in anatomia: quoniam sub
parte concava costarum trāsit pannicu
lus circē quaq; qui pleura dicitur, vt pul
monem defendat & cor ab eorum curi
tie & asperitate. Est namq; cor cum suo
ministro proprio pulmone locatum in
ter cista circumquaq; per ostem: quē ad
modū dominus & rex inter sumos mi

ros: ita vt pulmototum locum occupet ex omni parte, præter quod cor & eius camera (q̄ capsula dicitur) parti sinistræ pulmonis resident alligata. Verum quoniam principē decet esse tutū: diuisit natura pulmonem p̄ medium secundū longum panniculo subtili, qui mediastinū pectoris appellatur: ne forte sanies vel catarrhus partem dextram occupās inficeret & sinistram. Quapropter accidit in empimate & emoptoica passione, vt sanguis & sanies vnius lateris expurgari nō valeant per lateris alterius aperturam. Ordinauit præterea & alium panniculum, diuidentem corpus per medium (velut tympanum) ortum a finibus costarum mēdosarum: qui transit super stomachū, & par, & splenē, & oīa mēbra nutritiua: vt cor ab eorū vaporibus, qui surgunt hora digestionis secundæ, præseruaret: & iste panniculus dicitur diaphragma. Cuius est & aliud iuuamentū secundum Gale. 6. de iuuamentis: vt. s. suo motu sursum & deorsum anhelitum perficeret, & pulmonem adiuuaret: velut a cecidit in foliis fabrorum.

De tussi. Cap. .I.

Tussis est motus fortis pectoris & pulmonis cōpositus ex naturali et voluntario, ad expellendum rem, q̄ infert nocumētū in anhelitu vel organis ipsius. Fit autē propter malam cōplexiōem diuersam sine materia vel cū materia: Et si sine materia, illud est dupliciter: quia vel ista cōplexio est a causa intrinseca, vel extrinseca. Si intrinseca, sic est a caliditate, vel siccitate pulmonis. Si extrinseca, sic est a frigidityte ipsius ratione aeris cōtinentis. Si vero sit cū materia: hoc iterum dupliciter, vel cū apostemate vel sine. Si cum apostemate, sic est a pleuresi, vel peripneumonia. Si sine apostemate: hoc iterum dupliciter, vel illa materia causat tussim cum

sola quantitate, vel quantitate & qualitate simul. Si quantitate sola, vel est humor, & sic est propter catarrhū: vel est sanies & sanguis, & sic est propter empyema. Si quantitate & qualitate simul, sic est ratione phthisis, in phthisi namq̄ est sanies vlcerans pulmonē sua acuitate, opilans sua quantitate: & sic patet, q̄ in genere sunt octo causæ tussis. Prima est caliditas: secunda siccitas: tertia frigiditas: quarta pleuresi: quinta peripneumonia: sexta catarrhus: septima empyema: octaua phthisis. Signa igitur tussis, quæ fit a caliditate pulmonis, sunt vehemētia sitis, quā nō extinguit aqua frigida, sed magis aer frigidus: & magnitudo anhelitus & pulsus atq̄ rubedo faciei. Signa eius, q̄ fit a siccitate pulmonis sunt: quia tussis fit absq̄ spūto, & alleuiatur post sorbitionem penidiarū, a myli, & post somnum, cibū, & balneum aquæ tepidæ: sed fortificatur post sitim, famē, vigilias: & est cū strictione anhelitus, & corporis extenuatione, & pulsū paruo spisso, & quādoq̄ cū fe. acuta. Signa eius quæ fit a frigidityte aeris, sunt nota ex relatione infirmi. Signa eius, quæ fit a pleuresi, sunt dolor lateris pungitiuus, se. continua acuta, & omnia signa pleuresis. Signa eius, quæ fit a peripneumonia, sunt signa peripneumoniæ. scilicet fe. acuta, dolor pectoris grauius, pulsus mollis vndosus. Signa eius, quæ fit propter catarrhum sunt: quia si catarrhus sit de materia frigida flegmatica grossa, apparet exitus flegmatis grossi viscosi, & fortificatur post somnum & quietem. Si vero catarrhus sit de materia calida acuta, vel de flegmate salso subtili: sentitur ardor circa labia, & sitis, q̄ tollit aqua frigida & aer frigidus simul: neque fortificatur post somnum: & antecessio ciborum acutorum: & caput sentitur calidum: & est eius spūrum modicum subtile salsum, & quandoque ce-

Tractatus Secundus.

dit iclui aeris feruentis. Signum aut̃ com-
mane ad omnem catarrhum, quod non
fallit: est cum infirmus senserit quiddā
stillare continue vel paulatim ad os, &
paries gutturis deorsum. Signa eius quæ
fit propter empima, sunt ætecessio catar-
rh, vel pleures vel peripneumonie, post
quæ remanet tussis cum spū saniei &
sa ignis, & dolore pectoris grauatiuo,
& anhelitu stricto. Signa eius, quæ fit
propter phthisim, sunt spū saniei vel
sanguinis cum se. continua lenta pulsū
paruo spisso, collo longo: & quia corpus
continue exicca ē de die in diem: & certis-
simum signum est, si cortices limiles ~~pat-~~
~~herbus~~ subrilibus albis egrediantur cū
spūto, vel pelliculæ ruheæ & rotundæ.

Methodus. Cura eius, quæ fit a cali-
ditate, est vtumat omni
die de syrupo ros. si venter sit bene obe-
diens, vel de syrupo viol. si sit stypticus,
cum aqua calida, vel in aqua decoctio-
nis lactucæ, portulacæ vel prunorum: te-
near in ore candi, & muscillaginem psil-
lij, vel semē citoniorum, fiat lohoch. ℞
diadraganī partes duas, pēid. parrem
vnam, i. syrup. violarum, quod sufficit
ad dissoluendum: habitat æger in aere
frigido, regatur vt febrēns: vngatur pe-
ctus & pīna tota cum populeon dissolu-
to cum oleo viol. & mod. codialteæ. Cu-
ra eius, quæ fit a siccitate, est vt impin-
guetur, & humectetur corpus pro posse:
sicut dicitur in secundo libro de fe. hec-
tica. Quod si cum hac tussi feb. putrida cō-
plicetur: bibat in mane lib. f. aque ordei
& post tres horas cum cubus iste sit dige-
stus, intret balneum tepidum aquæ deco-
ctionis viol. maiuarum, bismaluarum,
& foliorum populi, in quo parum more-
tur neq; sudet, neq; corpus reddatur va-
porabile. Et post illud cibetur succo or-
dei vel farris, & carnibus pullorum, hoc
dorum alteratis cum portulacā, endi-
uia & lactuca. Bibat vinum dulce lym-

phatum cum aqua decoctionis liquiri-
uæ iuiubarum hora somni. Bibat iulep
cum aqua cucurbitæ vel psilij. Teneat
sub lingua pillulas bikikias, quæ sic fi-
unt. ℞. succi ligritiæ, zuccari al. añ. 3. 10
se. ucur. se. citru. se. portulacæ. añ. 3. 5. cō-
ficiantur cum muscillagine psilij, vel
albumine oui. Istæ pillulæ sub lingua tē-
ta, præterquam quod inglutiantur, hu-
meant caput guttur & linguā, & cali-
ditati feb. resistunt. Item alix. ℞. succi li-
quiritiæ, zuccari al. añ. 3. 10. amyli, dra-
gagari, amigdalorum dulcium excor-
ticatarum, añ. 3. 5. fiant pillulæ cum mus-
cillagine psilij vel seminis citoniorum:
& istæ pillulæ multum conferunt in cau-
sa calida. Si vero patiens sit sine fe. putri-
da: tunc loco pusianæ sumat panem cū
lacte dulci recente, capræ vel asinæ pas-
centis ordeum & herbas humidas: quod
si timor fuerit de coagulatione lactis in
stomacho, addatur aliquid zuccari vel
mellis: vt dicit Gale. 7. de ingenio sanita-
tis. vel comedat carnes prædictas altera-
tas cum herbis prædictis: vtatur in cibo
speciebus aromaticis dulcibus, quæ sic
fiunt. ℞. cinamomi electi. 3. f. cardomo-
mi, croci añ. 3. 1. fiat puluis cribellatus,
vngatur pectus vel nucha cum oleo ros
vel viol. mixto cum muscillagine psil-
lij vel camphoræ. Cura eius, quæ fit a fri-
giditate aeris, est cauere ab ipso omni-
no, & fomentare pectus cum pannis ca-
lidis: Cibetur præterea brodijs calidis
carnium bonarum conditis cum cina-
momo, cardamomo, & croco. Bibat hy-
dromel vel vinum calidum lymphatū
secundum medietatem: vtatur diagal-
larga vel diazinzi. sero cum vadit dor-
mitum: post illud bibat aliquid aquæ ca-
lidæ, vel vini calidi lymphati. Post decli-
nationem morbi balneetur in aqua de-
coctionis camemillæ, hyssopi, melilori.
Si autem per ista non curetur: sequitur
quod materia est fluxa: quare purgetur

cum pillulis cochijis, vel medicina de tur
bith. & hanc præterea præ ordinem loca-
lia prædicta. Cura eius, quæ fit propter
pieurelim vel peripneumoniā, est cura
ipsarum. Cura eius, quæ fit propter
catarrhum, est quod si catarrhus sit de
materia frigida: velut accidit senibus et
flegmaticis non patientibus dormire
nocte propter impedimentum tussis. Su-
mat omni mane. 3. 2. syrupi de hylopo
cum aqua decoctionis vrticarum, quæ
sic fit. ℞. hylopi, se. vrticarum, capill.
veneris, se. vel rad. raphani, añ. ficuum
numero. 10. decoquantur in aqua cum
dactylis toridem, & sit syrupus bene co-
ctus cum zuccaro in æstate & in iuveni-
bus, vel cum melle in hyeme & in seni-
bus purgetur postea cum pillulis cochijis
& chierapitra. Si autem flegma sit gros-
sum viscosum, oportet vt post purgati-
onē omni sero cū vadit dormitū, sumat
3. 1. vel 2. cum aqua calida pulueris, quæ
sic fit. ℞. ireos, hylopi, liquiritiæ, cro-
ci, añ. 3. 2. terantur, & cribellentur: vnga-
tur gula & nucha & apud abralis capil-
lis, & pectus totum mane & sero cū vn-
guentis calidis marciaton vel arregon:
& super locū vinctum ponat calidus pā-
nus ad ignem calefactus. Et si per hoc
non restringatur catarrhus: fiant empla-
stra rubificatiua super caput dicta cap.
de catarrho. Vltimo vero fiat cauteriū
in vertice capitis, si nihil horum contu-
lerit: nutriatur bonis carnibus: Bibat vi-
num lymphatum vltra mediū. Sumat
etiam quandoq; quando itur dormitū
post purgationem proprie. 3. f. zz. cendi-
ti vel dragallangæ, vel diacardamomi:
& post bibat aliq; iid vini vel aquæ cali-
dæ. Si autem per ista non curatur: sumat
de confectiōe, quæ sic fit. Recipe succi
liquiritiæ dragmas decem. hylopi, capil.
veneris, ireos, carui, croci, piperis, ari-
stologæ rotundæ, amigdalatum amara

rum, nasturtij. añ. 3. 1. fiat electuarium
cum melle vel zuccaro: detur ex eo ad
modum nucis. Hoc enim educit fle-
gma grossum, et sanit ex pectore, pul-
monie, stomacho, & gutture. Teneat in
ore pillulas bikakias, quæ sic fiunt. ℞.
piperis myrrhæ, carui, amigdalatum
amararum, añ. 3. 2. affricet idē 3. 1. confi-
ciantur cum vino: quia incidunt mate-
rias grossas: vel transglutiat quatuor
vel quinque de his pillulis sero, cum vadit
dormitum. ℞. myrrhæ, storacis liquide
thuris, opij añ. 3. 2. quia remouent tussim
impedientem somnum, & dormire faci-
unt ratione opij, licet mundificet pectus
& pulmonem ex materia frigida, ratio-
ne myrrhæ storacis & thuris. Et conse-
runt etiam contra aerem pestilentialē,
si transglutiantur ex eis omni mane dug
vel tres in ieiunio Si autem patiens non
possit eis vii propter amaritudinem, ad-
datur zuccari, succi liquiritiæ, añ. 3. 2.
vel plus. Si autem catarrhus sit de mate-
ria calida acuta, s. cholera vel flegmate
salso: tunc cura eius est, vt bibat omni ma-
ne. 3. 1. syrupi de papauere, vel ros. &
gargarilet de eo cum aqua decoctionis
ros. ba. austiæ, iuiubarum, sebesten, gra-
norum pini mundatrum, vel de oxy-
zaccaro, vel diamoron & aqua calica.
Teneat sub lingua in ieiunio & ante coe-
nam continue pillulas, quæ sic fiunt. ℞.
amyl, dragaganti, amigdalatum cul-
cium, fabarum excorticatarum, vel len-
tium excorticatarum, papaueris, gum-
mi arab. boli, aime, añ. 3. 2. cor ficiantur
cū muscullagine psillij, vel se. c. tonicæ:
qa oia ista inspissandū materiā acutā di-
gerunt, & habile faciūt ad secretiōē Nu-
triat iucro ordeī, vel faris, vel vili aut
siuimēti, vel carnibus assis pulser aut
castratoz. Potet vino dulci lymphato
cū aq; frigida. Et modū cura: iōis habet
etiā locū in tussi, q̄ ē cū se. & et ā cū apo

Tractatus secundus.

Itemate calido. Si autem per ista non curetur propter acuitatem materiæ & multitudinem fluxus, sumat 3. 2. vel 3. de pillulis, quæ sic fiât, sero cum vadit dormitum. *℞.* thuris, myrrhæ, opij, croci añ. 3. *℥.* liquiritiæ 3. 1. fiant pillulæ, cum rob vini, vel vino debili. Abradaſ caput post ista, & lauetur ex sinapi confecta cum decoctione ficuum, donec rubificet: vngatur caput totum cum oleo ro. & oleo camomillæ mixtis. Et forte necesse est purgare totum corpus cū pillulis de reubarb. positis ea. de catarrho: quæ si omnia non proficiant: fiat vltimo cauterium in anteriori parte capitis, vbi est commissura, & dimittatur apertum longo tempore. Scias præterea, q̃ cauterium multum valet in omni tussi ex catarrho. Similiter & in catarrho descendēte ad stomachū oculos vel pectus. Scias etiā, q̃ ista tussis vt plurimum ducit hominē ad phthisim: & ideo sollicitandum est in eius cura. Item post purgationes & localia prædicta sumat omni die & sero cum vadit dormitum, vnā rad. zinz. & post ipsam comedat 3. 1. zuccari ros. veteris: & post illud bibat aliquid aquæ calidæ: quia digestionem cōfortat ratione zinz. & materiam acutā stypticat, & fluxum prohibet ratione zuccari ro. vel aquæ calidæ. Curam eius, quæ fit propter empima & collectionem saniei. vel sanguinis in pectore: similiter & curam eius, quæ fit a phthisi, dicemus: cū de illis passionibus scribemus.

Emperica. Puluis expertus, qui datur contra tussim humidā, siue sit cum feb. siue sine fe. sic fit. *℞.* capill. veneris, se. vrticæ, ireos, hylopi añ. 3. 1. liquiritiæ 3. 2. cardamomi 3. *℥.* cinamomi electi, 3. 2. cassiæ lignæ, zinz. solij, nucis musca. añ. 3. *℥.* macis, croci añ. 3. *℥.* pipereis longi 3. 2. terātur & cribellentur: detur in aurora 3. 1. vel 2. cum vino dulci, vel aqua decoctionis hylopi, vel liquiritiæ,

vel succo facto ex farina ordeï, vel speltæ, vel frumēti, vel mixtis simul: & condiatur succus cum lacte amigdalorum. Hic nanq̃ puluis materiam humidam digerit, et resoluit, et ipsam leuiter expuere facit. Item cōmune remediū ad omnē tussim ex materia frigida & vêtositate est, vt patiens vtatur mane & sero hac confectiōe. *℞.* pul. cimini 3. *℥.* diatrion pipereon confecti cum melle 3. *℥.* misceatur, & facta purgatiōe vna vel duabus, videbis mirabile. Item communiter operantes in tussi ex catarrho siue calido siue frigido, faciunt cauterium dictum in methodo: vel loco eius causticat collum & spatulas cum cantharidibus incorporatis cum fermento positis firmiter super collum, donec vesicetur, & materia diuertatur, & euacuetur. Item rubificant caput abradis capillis cū emplastro ex sinapi, melle, fimo colūbino, ficibus siccis, raphano, succo opij, anethi, ireos, & similibus. Item lauet caput cum lixiuo facto de cinere quercus vel vitis, in quo decocta sint folia lauri, sticados, hyfopus, maiorana, flores camomillæ, meliloti & similia. Item facelleſ caput cū milio, sale, fursure, torrefactis in sacculo. Item præcipiunt dietā siccā, & proprie apud coenam, & exercitetur in ieiuno, sudent, & sicce balneentur, sed post cibum quiescāt ab his, neq̃ vociferent, neq̃ somnum super cibum ilico accipiant, neq̃ resupinationem frequentent. Pillulæ præterea sublimēs ad omnem catarrhum restringendum, similiter & tussim ex catarrho, quæ infestat de nocte, nec est in hoc eis par. *℞.* opij, amili, gummi arabici succi liquiritiæ añ. 3. 1. dragagati, se. papaueris añ. 3. 2. fiât pillulæ, sicut cicera: dentur ex eis 3. vel 4. sero. Cōueniunt etiam pueris, qui nō possunt dormire propter tussim: veruntamen communiter operantes vtuntur pro electuarijs screatiuis, diapenid, in causa sicca,

diadragaganto in causa calida, diacalamiento in causa humida, diaprassia in causa frigida: mixtis vero ex eis in causa mixta. Item confectio syrupi de liquiritia est secundum hebemef. *℞.* liquiritiæ mund. 3. 2. capill. veneris. 3. 2. hyssopi 3. 5. ponantur in 4. lib. aquæ & dimittantur per noctem & diem: deinde coquantur, postea colentur, & addantur mellis, zucarî, penid. añ. 3. 8. aquæ ros. 3. 6. fiat syrupus bene coctus, & clarificatus, cōfert catarrhîcis, pleureticis, phthîsicis, atque omni ægritudini pectorali cum materia: & proprie in causa calida. Item cōfectio syrupi de hyssopo est secundum eundem *℞.* hyssopi, rad. apij, feniculi, liquiritiæ. añ. 3. 10. ordei mund. 3. 6. se. malux, se. citoniorum, dragaganti añ. 3. 11. capilli veneris 3. 6. iuiube, sebesten añ. numero 10. palsularum, enucleatarum 3. 12. ficuum pinguium, siccarum, dactil. añ. numero. 10. penid. al. lib. 2. fiat syrupus. Ipse enim ex nobilitate suæ compositionis omnem materiam pectoralem digerit, & scretum procurat, & membra nobilia scilicet spiritalia confortat a proprietate, & proprie materiam frigidam grossam digerit. Item cōfectio syrupi de prassio secundum eundem, est hæc & in eisdem passionibus, et proprie in causa frigida viscosa mundificans pectus & pulmonem a sanie: quare confert phthîsicis, empicis, asmaticis, catarrhosis virtute potenti. Moderetur tamen visus eius, ne aperiat ora venarum, & sanguinē screate faciat propter suam acuitatem. *℞.* prassij 3. 2. hyssopi, capill. veneris añ. 3. 6. liquiritiæ, calamenti añ. 3. 1. rad. apij, feniculi añ. 3. 5. se. malux, fenigræci, ieros añ. 3. 11. se. lini, se. citoniorum añ. 3. 2. palsularū enucleatarū 3. 5. ficuum, siccarum pinguiū 15. numero penid. lib. 2. mellis despumati lib. 2. fiat syrupus bene coctus & clarificatus. Et si timeris per seipsum administrare: misce cum aliquo de syrupis præ-

dictis: Est enim vltimi iuuamenti in fortitudine. Item lohoch de squilla extreme fortitudinis in screando: quare confert a smati præfocanti, sic fit secundum hebem, cap. de asmate. autoritate Serap. *℞.* squillæ, assæ, vel cepæ acutæ assatæ 3. 4. rad. lilij celestis 3. 2. hyssopi, prassij añ. 3. 1. myrrhæ, croci añ. 3. 6. terantur, & conficiantur cum melle cocto despumato, donec fiat sicut pasta mollis: ex quo labatur hora post horam aliquid cū vino claro: quoniam educit materias grossas viscosas ex pectore & pulmone.

Canones. Tussis fit frequentius ex catarrho, q̃ a mala cōplexione sine materia: quapropter dicta i p̃sentî capiet dicta in cap. catarrho et dicenda de asmate multū sibi iuuicē suffragantur. Item quādo das pillulas bikikias, vt teneantur sub lingua: non dabis illico super cibum: ne forte faciāt suam humectationem cibum saluatiū in vaporare ad radicem linguæ: & sic non purgarent spiritum. In omni passione pectorali seruandum est, vt a cibis & medicinis frigidis actu vel virtute caueatur proposse, & proprie ab aëre inspirato: & si frigidis quandoq; vti necesse fuerit, non nisi calidis leuibus restringantur: verbi gratia, in tussi propter catarrhum calidum, & sputo sanguinis, atq; phthîsi. Vnde Hippo. 5. parti. apho. Frigida velut nix, aut crystallus sunt pectori inimica, tussis cōmouentia: sanguinem fluere facientia et catarrhos &c.

Prognosticatio. Cauendum est plurimum a tussi propter catarrhum acutum, vt de cholera, & flegmate falso: & sollicitandum in eius cura: quoniam vlcera bit pulmonem, & panniculos eius inuoluentes & distinguētes: & facit phthîsim, & finaliter mortem. Itē sollicitādū in tussis cura ex causa frigida: ne forte rapiatur ad stomachū, & inducat indigestionem, & edemum lientis.

Tractatus secundus.

tertiā. Itē prognosticatio in tussi causata a pleureti, peripneumonia, empimate, vel phthisi est prognosticatio illarū passionum: vt dicitur suis capitulis.

De asmate, disſnia, oregmonē, & orthomia. Cap. II.

Ista quatuor conueniunt in hoc, q̄ significāt malitiā anhelitus propter defectū contingentē ex membris ipsi ritualibus principaliter, vel propter cōpassionem ad cerebrum vel stomachū. Sed differunt: quia dicitur asma, quādo cadit peccatum in expiratione, & est ibi sonus aliquis rancus & tussis. Disſnia vero dicitur: quando peccatum cadit in inspiratione, & est sine sono et cū tussi parua. Oregmon vero dicitur: quādo sonus est plurimus in anhelando. Orthomia dicitur, quando est peccatum in inspiratione, expiratione, & sonitu. Scias tamen, q̄ medicus non curat istam differētiā nominalem: cum res modicum differāt: vt dicitur 4. de accidenti. Fiunt omnes istae passionēs vel ex passione membroꝝ spiritualium, vel ex eorum compassione. Si autē ex passione principali, hæc est duplex: vel q̄a ex mala cōplexione, vel ex mala cōpositione. Si ex mala cōplexione, hæc est duplex: vel cum materia: & sic fiūt ab humiditate pulmonis: vel sine materia, & sic fiunt a caliditate pulmonis vel siccitate. Si ex mala cōpositione, tunc fiūt ab opilatione & obliquatione viarum anhelitus: sicut accidit gibbosis, propter dislocationē spondilium & leprosis, propter sciliosim materierum grossarum melancholicarum in pulmone et gutture. Si vero fuerint ex compassione: tunc fiūt ex catarrho descendente a capite ad pulmonem & peccus calido acuto vel flammatico frigido: sicut dictū est de tussi, & ca. de catarrho. Signa eorum quæ fiunt a caliditate siccitate vel humiditate pulmonis, sunt

signa dicta de tussi a causa calida, humida, vel sicca. Signa vero eorum, quæ fiunt a lepra vel gibbositate, sunt signa aperta. Signa eorū quæ fiunt a catarrho, sunt signa tussis a catarrho, et distinctiua calidi vel frigidi catarrhi sūt dicta illic.

Methodus. Cura alicuius eorum triū trahitur a cura eis, ex quo trahitur signū: quia signa causa & prognosticatio catarrhi, tussis, & asmatis sunt eadem vndiquaq̄, præter asma ex gibbositate & lepra: quia illud est incurabile penitus: cum tale asma certificet tales passionēs fore confirmatas.

Emperica. In cura asmatis a catarrho siue calido siue frigido, sed in calido magis faciunt quidam excellentes flebotomia cephalica: vel si virtus sit debilis, scarificationem in spatulis, quæ licet conferat qualitati, non tamen quantitati: Deinde obseruant corpus laxum omni die cum clystere vel suppositorio, & quandoq̄ cum pilulis cochleis in causa frigida, vel cum pilulis de reubarb. in causa calida. Post euacuationem vero causæ antecedentis maturant coniunctam, atq̄ euacuant per sputum: vt diximus cap. de tussi: & postea dicemus cap. de pleuresi. Deinde confortant pectus & pulmonem dando omni die 3. 2. pulmonis vulpis sicci, vel erici cum aqua mellis: quoniā est mirabile vt dicitur Heberm. auroricate Russi. Vltimo dant rubificatiua & exiccatiua circa caput: sicut sunt vnguēta, epithymara. emplastra, embroca dicta cap. de tussi & catarrho. In declinatione morbi faciunt suffumigium ex thure mastice & myrrha positis super carbones: quia cerebrum & pulmonem exiccant, & confortant, ne viresiores generent superfluitates.

Canones. Scias, q̄ catarrhus fit duobus modis. Vno modo propter indigestionem stomachi vel epatis: quia nutrimentum indigestum & aquosum,

tendit per venas ad membra. Et quia cerebrum est naturaliter frigidum, non potest rectificare illud: quare congregat multas superfluitates, quæ colligatæ fluunt deorsum. Secundo modo propter vapores ascēdentes a cibo ad caput hora primæ digestiōis: & hoc fit vel vitio stomachi frigidi mandantis, vel cerebri calidi attractantis, vel vitioq; modo.

Prognosticatio. Astma similiter & orregmon in se continua, & proprie de stegmate cum alijs signis malis mortē & suffocatio ē significā: qm̄ est necessitas euentationis adaucta, sed euentatio diminuta. Item astma vehemens in pleuresi, peripneumonia et catarrho, & proprie in senibus mortale: quia defectū excreationis portendit. Item prognosticatio catarrhi seruit huic cap.

De pleuresi. Cap. III.

Pleuresis est apostema cadēs in pellicula regente costas versus concavum pectoris, quæ pleura dicitur. Et est qñq; apostema diafragmatis: & tunc est periculosius, propter maximū impedimentū anhelitus. Fit autē ex omni gñe humorū penetrantiū p venas capillares & arterias terminatas ad pleurā: sicut & aliud omne apostema, sed maxime fit ex cholera, vel sanguine cholerico, & stegmate subtili salso: quia nō videt q; aliq; materia possit substantiā mēbri pāniculosi, solidi & densi penetrare: nisi sit calida, acuta, subtilis: vnde Hip. 4. par. aph. Acidū ructuātes nō valde pleureitici sūt. Neq; dicar aliquid, q; pluresim fieri sit possibile ex catarrho. Quia vt ait Gale. in teg. ca. de causis apostematū Nō est possibile aliqd gen⁹ apostematū euenire, nisi a materia superflua sicca corrente per venas & arterias: ex tali tamē catarrho bene pōt fieri empima vel phthisis. Et scias, q; in latere altero vel vitroq; fit dolor ventosus fortis, & qñq; cū se, propter

inflāmatōne spiritūū: sed differt a pleuresi: quia propria signa pleuretis et inleparabilis, sunt dolor lateris pungitius cū tussi, & se. cōtinua acuta, pulsus terrinus siue diuersus cū duritie arteriæ propter vehementiā doloris & oppressionē virtutis vitalis ab apostemate: q; nō sunt cū dolore lateris ventoso. Et est quasi signū infallibile: quia dolor ventosus curatur totaliter per appositionem euaporatorii siue calefactorij super latus: sed pleurisis p hoc augeat: quia fit attractio sine resolutione materiæ: vt di. Hip. 2. de reg. acu. quapropter & Hippo incipit curā pleuresis per calefactoria: quia vel sanāt vel digerunt materiā. Signa pluresis quæ sit a sang. sunt cum prædictis rubedo faciei et totius corporis, repletio venarum, & pulsus magnus, vrina ru. vel grossa, & antecessio ciborum generantiū sang. Et signa magis propria sunt: quia spiritū cūcepit primo apparere: erit valde rubetū, & dolor, cum punctura non valde multa, sed cum gravitate plurima. Si autem sit pleuresis a sang. adusto, apparebit cū oib; prædictis vel plurib; nigredo linguae, & vrina magis clara siue ru, obscura, & tussis sicca, & sitis intensa, & retentio spiritū, & asperitas linguae & gutturis, & nigredo totius corporis, fortitudo se. maior, q; si sit a sang. nō adusto, cū stypticitate vētris. Signa eius, quæ a cho. sunt cū signis cōmuni; prædictis. vrina ru. clara subtilis, vel citrina intensa, & punctura lateris in modū acus cū dolore plurimo. & pulsus durior & minor & spissior & acutior, q; in ea q; de san. Signa ei⁹, q; de sitate subtili siue san. viscoso vel aquoso. (Nā ex puro spate, vel ex pura melancholia non videt posse gñari) iūt cū signis cōib; se. gera magis, et dolor gravatius in latere sine plurima punctura, & spiritum eius tendit ad albedinem, vrina pallida vel subcitrina, vel citrina cū sp.itudine, & pulsus parvus,

Tractatus secundus

quodammodo mollis. Sciendum præterea, q̄ pleures. & peripneumonia quandoq̄ sit in altero latere tantum: quãdoq̄ sit in vtroq̄. Et signa eius, si sit in altero latere, vt pote dextro sunt: vt dicit Hip. 2. progno. quia in eodẽ latere erit maior calor: quapropter si filum humidum ductatur circa corpus, citius exiccabitur in illa parte, q̄ alibi. Similiter & oleum & vnguentum illic linitur. Quod si ægrũ super opposito latere scilicet sinistro iacere præcipias: sentiet grauitatem & tensionem in latere dextro: propter suspensionem materiæ in panniculis lateris eius. Et eodem modo dico de latere sinistro. Si vero pleuresis sit in vtroq̄ latere, erit dolor, calor & tensio æqualis, quocunq̄ latere decubuerit. ¶ Sciẽdum q̄ pleuresis, & omne apostema salubre, imo vniuersaliter om̃is morbus salubris (vt dicitur primo de crisi) habet quatuor tempora principium, augmentum, statum, & declinationem. Distinguuntur autẽ ista tẽpora quatuor, modis duobus. Vno modo penes digestionem materiæ: & quando nondum apparent signa digestionis, saltem digestionis manifestæ, tũc dicitur principium vere: licet quandoq̄ principium vocetur spacium diex̄ trium vel quatuor a principio primo punctuali, in quo primo æger senserit ægritudinem siue læsionem sensibilem in operationibus naturæ: quando vero apparent signa digestionis manifestæ: tunc est augmentum: quando apparent signa digestionis perfectæ manifestæ & completæ, tunc est status: quando apparent signa bonæ & laudabilis euacuationis, tunc est declinatio. Cum autem dico signa digestionis, intelligo signa vrinæ sputi & egestionis, secundum q̄ magis appropriant vni ægritudini q̄ alteri: verbi gratia, sputum certius signat super morbos membrorũ animalium & spiritualium: vrina magis super morbos membro-

rum naturalium deferuentium secundæ digestionis: vt sunt epar, splen, vena, rēnes, & vesica: Egestio magis super morbos membrorum naturalium deferuentium primæ digestionis: vt sunt stoma- chus & intestina. Secundo modo distinguuntur penes difficultatem acciderium conueniẽtium morbis: quia dum primo apparent accidentia, est principium: quando augmentantur, est augmentum: quando sunt i ultimo maioritæ, est status: quando incipiunt deficere præmissa euacuati- one sensibilibi & sufficienti per sudorem, vomitum, egestionem, vrinam vel apo- stema creticum, est vera declinatio. Hæc autem dicimus in cap. præsentis: licet sint communia omni morbo: vt per hanc distinctionem quatuor horarum vniuersali- um in cognitionem pleuresis deueniamus. Vbi sciendum q̄ prædictũ duo modi distinctionis quatuor temporum vniuersaliũ quandoq̄ simul coincidunt: ita vt quãdo est principium digestionis, est principium acciderium: & sic de augmento, statu &c. Quandoq̄ vero non coincidunt, imo omnes horæ acciderium præcesserunt, antequam compleatur principium digestionis: verbi gratia. In omni ægritudine, q̄ est sine apostemate omnino, cũ est principium penes digestionẽ: tunc etiã est principium penes difficultatẽ acciderium: & ideo in istis febribus danda est grossa diæta in principio, & subtilior in augmento, subtilissima in statu, & resumptiua in declinatione. Iuxta illud Hippo. 1. par. aph. Quãdo ægritudo est in statu, tũc tenuissima diæta vtendũ est. In fe. autẽ acuta, quæ est cum apostemate pectoris vel pulmonis: vt in pleu- resi & peripneumonia, ista tẽpora non coincidunt omnino. Nam in eis primo fiunt quatuor horarum accidentia, anteq̄ compleatur principium penes digestionem tam in principio, q̄ in augmento vel statu, & est hoc propter periculũ

suffocationis: quare in pleuresi & peripneumonia est data diæta omnino e conuerso prioribus. Nam in principio digestionis debet dari diæta subtilissima: cum tunc sit maxima difficultas accidentium, & modicissimum sputum & indigestum. Et ideo tunc non datur, nisi potus & hydromel: & quandoque ius pulorum, vsq; ad itatum accidentium. Et cum incipit augmentum penes digestionem, decet grossius diætari, & in statu digestionis adhuc grossius, vsquequo sit hora crisis, quæ est finis talis status, iuxta illud Hippo. 1. regi. acuto. Et quanto plus fuerit sputi, est vberius reficiendum. In hora vero crisis, & in duobus diebus proximis post crisin debet diætari subtilissime, sicut in principio sumpto penes accidentia: ne forte natura occupata per cibum distrahatur a crisi. Iuxta illud Hip. 1. apho. Ea, quorum crisis sit, vel quorum facta est, æqualiter & perfecte nihil apponere, &c. Causa autem omnium dictorum est: quia in pleuresi & peripneumonia, quando materia apostomosa primo fluit ad particulam, vel vel fluxit nup, neq; est digesta: tunc multum opilat vias anhelitus, & ramos canæ sparsos per pulmonem: quare timeat de suffocatione. Verum cum incipit digeri, tunc incipit egredi per sputum: quare tunc materia non reseruatur ad vnicam expulsionem ceticam, sicut in feb. acutis sine apostemate, sed de die in diem aliquid eius euacuatur: & hoc maxime si pleuresi vel peripneumonia terminetur per resolutionem & non per saniationem: vt iam dicetur. & quia tunc de die in diem minoratur & cessat opilatio, & malitia anhelitus, & alia accidentia aueruantur, vsq; ad horam crisis: sitamen crisis est futura post resolutionem & sputum. Illud manet non semper accidit, & proprie cum in pleuresi non sit tanta resolutio per sputum, vt materia

totaliter euacuatur, nec aliquid reseruatur ad horam crisis: sicut fit in pleuresi et peripneumonia valde salubri. Sciendum præterea, qd pleuresis, & pipneumonia & vniuersaliter omne apostema in membro corporis quomq; terminatur altero duorum modorum: qd vel ad salutem, vel ad membri mortificationem: & est aufert operationes illius membri, qd fuerant necessariae ad induendum salutem: tunc sequitur mors: vt patet in pulmone, stomacho & c. Sin autem, potest remanere vita hominis: vt patet in manu, vel in pede. Si vero terminetur ad salutem, hoc est altero duorum modorum: qd vel stat in suo membro, vel pmutatur ad alium locum: & hoc est, cum illud sit ad bonum verbi gratia. Si pleuresis pmutatur post aures & sub ascellis, & c. cum illud sit ad malum & pnicit: vt si pleuresis pmutetur ad pipneumonia, vel frenesim, vel lethargiam. Cum vero steterit apostema, terminatur aliquo trium modorum: scilicet per scissuram, vel per resolutionem, vel per saniationem. Si per resolutionem, hoc duplit, vel insensibile: vt quando materia apostematis euaporat extoto per se vel beneficio medicinarum, vel per sensibile: vt quando materia pleuresis & pipneumonia subtiliatur a calore naturali: & cum sputo de die in diem expurgatur, vel supuenerit fluxus sanguinis narium, vel sudor plurimus ad pectus. & tempus istius terminationis in pleuresi et pipneumonia, est a die ægritudinis vsq; ad diem 14. Si enim per illud tempus nihil lisionis acciderit, & tussis remaneat sicca cum febre, acuta, & dolore lateris: significatur, qd apostema non potest terminari per resolutionem. Iuxta illud Hip. 5. par. apho. Quicumque pleuretici facti non purgantur in 14. diebus, hi in empima trahunt: quod quidem verum est vt in pluribus: qd posset adhuc quodque, licet raro post 17. die terminari per aliquam resolutionum prædictarum: vt patet in commento illius aphoris. Paroxysmos & consistentiam.

Tractatus Primus.

Secundo modo teriatur apostema per sanationem siue collectionem: vt quando materia est grossa, viscosa, frigida, flegmatica: quapropter fit calor naturalis inobediens, & ab ipso digeri & maturari subito non potest, sicut prima: sed indiget tempore multo: quare colligitur in membro & conuertitur in saniem laudabilem, si natura vincit & reseruatur ad vnicam expulsionem, scilicet eruptionem ceticam apostematis: quæ quidem dicitur cõmuni nomine a medicis ruptura. Quod si sit in membris spiritalibus, dicitur empima: sed si sit in concavitate pectoris, dicitur emoptoica passio. Si vero sit apostema ceticum, vt puta post aures, vel in inguinibus, vel sub ascella, vel in alio loco corporis, dicitur exitura. Et iste secundus modus est periculosus valde propter tria. Primo, quia est magis chronicus: & ideo timor est, ne virtus in via deficiat. Secundo, quia materia reseruatur ad vnicam expulsionem: quare timor est de suffocatione. Tercio: quia se, fit intēsiō, & dolor acutior: quare timor est, ne virtus prosteratur. Tempus autē illius terminationis in pleuresi vel peripneumonia, est a. 14. die egritudinis vsq; ad 40. diem vel circa. Iuxta illud Hippo. 5. parti. apho. Quicumq; ex pleureticis empici fiūt, si purgent in. 40. diebus a die qua ruptura fit: solūtur: Si vero non: in phthisim transeunt. Tercio modo teriatur per sclerotisationem. s. quādo materia est frigida, grossa valde, vt melācholica, vel de flegmate gipseo: propter qd natura nō potest ipsam resolvere subito, neq; simul in saniem conuerrere, sed subtiliat parum post parum: & sic tandem resoluitur subtile, & remanet quod grossum est: & tunc illud apostema dicitur duries vel sclerosiis: nisi medicus semper resistat administrādo vicissim mollificatiua & resolutiua hoc modo ne quidquam materiæ lapidifice

tur, sed totum resoluatur. Et iste tertius modus est omnium periculosissimus: vt dicit Hippo. 1. progno. ca. de apostematis duris, quia iste modus est maxime chronicus: & etiam impossibilis resolutionis postq̃ cōfirmatur: vt dicit Auicē. 3. cañ. fē. 14. ca. de apostemate duro epatis. Tempus autē istius terminationis in peripneumonia & pleuresi est incertum. Quando enim videmus post. 40. dies a primo p̃cipio ægritudinis se. diminui, & dolorem mitigari: neq; p̃cessit aliqua euacuatio sensibilis per sudorē, sputum, saniem, apostema ceticum, vrinā egestionem. & virtus debilitatur continue, & anhelitus fit difficilior de die in diem: significatur, qd apostema sclerotisatur. Nam si materia foret resoluta insensibiliter, non remaneret ista accidentia, neq; remaneret aliquid de se. vel de dolore lateris, vel aſmate: cum accedens sequatur morbum, sicut vmbra corp⁹: sicut dicit Gale. in de accidenti. Signa igitur terminationis pleuresis vel peripneumoniæ per resolutionem, siue sputū sunt: vt dicit Hip. 2. prognosticorum. Si sputum sit velox, & eueniat infra primos dies tres, & facilliter egrediatur, & sine labore & tussi plurima, & proprie si sit subrub. ex sang. s. sputo æquali, digesto, albo permixtū, & vniuersaliter oīa signa salutis. Signa vero terminationis eorum per sanationem sunt, vt dicitur ibidem: quia dum incipit calor fe. incendi, & rigor quandoq; aduenire, & pūctura lateris fortificari: tunc ab illa hora sci as saniem generari: & proprie si se. continua sit in die modica, & in nocte multa, & sudor multus, & tussis sicca iſestās ægrum, & concavatio oculorum, & rubor in angulis oculorum, & vngulum corrugatio, & digitorum calefactio, & pustulæ in pedibus quandoq; apparentes, quandoq; disparentes, & prostratio appetitus, & pustulæ paruæ in totō cor-

pore, quæ non minorantur: omnia ista significat empiricum. Iuxta illud Hip. 2. par. apho. Circa generationem tantæ doloris & se. magis accidunt. q̄ facta sunt. Item in peripneumonia & pleurisi si superueniente spūto, vel solutione ventris, vel fluxu san. narū, vñ pharmaco adhibito vel quomodolibet cōpetenti medicamine, scilicet calefactorio vnguento, electuario scretiuo, vel similib: dolor in aliquo non cōperit diminui: significat, q̄ apostema terminabitur per sanationem: vt dicit Hip. 6. parti. apho. ca. de spūto Signa vero eorum per scitotisationem, sunt delitescencia se. falsa, & doloris mitigatio post 40. vel 60. dies a principio apostematis, non præcedente euacuatione sensibili, vel modica existente, si fuerat & remanente tussis sicca, & difficultate anhelitus cum timore suffocationis & similibus. Cum aut̄ distinguo p̄dictos modos terminationis apostematum contra terminationē, quæ est ad mēbri mortificationē, nolo intellige re ipsas esse salubres ex tota sua specie: qm̄ terminatio p̄ sanatiōem est raro salubris, & terminatio per scitotisationē (si confirmetur) est omnino mortalis: sed quia non sunt ex toto genere mortales, ante q̄ cōfirmantur, & proprie si vir tus sit constans, & medicus recte processerit in cura. Ex dictis aut̄ colligi potest quoddam notandum in cura pleures. & peripneumoniæ, vel vñ uersaliter in cura cuiuscūq; apostematis: q̄a primo debet intendere medicus ad iutroductionē primi modi, s. per resolutionē, approximando medicinas resolutiuas & excreciuas per interius & exterius p̄missa euacuatione vel cum febotomia, vel farmacia: vt in methodo dicitur. Et si hæc proficiant, & sputum augmētetur, & dolor & se. minorentur de die in diem, non recedat ab hac via. Si vero ista non proficiat vsq; ad. 14. diē a principio ægritu

dinis vel circa illud, & tussis semp sit sicca & dolor fortis, & se. fortissime. & malicia anhelitus, opus erit statim ut̄ sit ad secundū modū, q̄ est per sanationē q̄d fit administrādo syrpos & emplastra calida maturatiua, & sanie generatiua vsq; ad diē rupturæ q̄ est dies 40. vel circa id. Post illud vero rectificet, et n̄ uñ dificeret, & educat sanie cū lohech & syrpos & electuarijs & gargarismis & electuarijs ripticis scretiuis, q̄ dicitur inferius cā. de empiria. Si vero post 40. dies vel circa id, nō viderit profectū istorū scire debet materiam lapidificatā esse: quare procedat secundū tertium modum administrando ēplastra & vnguenta molificatiua & resolutiua vicissim modo vnum modo aliud, ne aliq̄ reliquæ remaneat materiæ in loco, si est possibile, sed tota materia insensibiliter resoluat: Et intellige q̄ dicta sunt, stāte virtute: q̄a morituri signis prognosticis sunt dimittēdi: vt di. Gal. in cōmē. illi apho. 1. par. Quando in statu est ægritudo.

Methodus. In cura p̄euresis isto modo sit procedendū. Primo nāq; cōsideremus, si vter sit cōstypatus, & fiat clystere lenitū de deco. maluarū bis mal. mercurial. vi. lib. 1. & 6. olei vñ ol. vel olei cōis. 3. iij. mell. 3. i. sal. 3. i. & inijciat̄ tepidū in ieiuno, si virtus sit fortis, vel fiat suppositoriū ex melle & tale in corpatis simul ad ignē lēcū & supponat̄ in ieiuno si virtus sit debilis. Expurgatis aut̄ secūdo vteris naturalib: fiat processus ad euacuationē circa morbos hoc ordine. Nā si materia sit leuis, s. sanguinea, vel ex san. & cho. simul mixtis, q̄d ē vt plurimū, q̄d scies: q̄a dolor ascēdit vsq; ad spatulas: tūc fiat febotomia. Si aut̄ sit grauis, s. flegmatica vel mēlica (q̄d raro cōtingit) scies, q̄a dolor descēdit vsq; ad fureulā, vbi est os stomachi: tūc fiat purgatio, cū. 3. i. cassiæ & 3. i. et. 6. mānx & tamarind. dissolutorū

Inueni. 70
Methodus.

Tractatus secundus

In 3. 4. aquæ feruentis decoctionis prunorum liccorum: coletur, & detur ante diē vel hora maioris quietis. Verum tamen sciendum secundum doctrinam Galeni in commento super 1. regiminis acutior circa principium. Tutius est in omni pleureti facere in principio flebotomiam, quā farmaciā propter tres causas. Prima quia promptior est flebotomia, farmacia namque indiget apparatu & tempore. Secundo licet flebotomia competat in solo sanguine, vel in peccato omnium humorum simul qualitative: tamen competere potest in omni materia quantitatiue: cum flebotomia sit euacuatio vniuersalis sensibilis tollens multitudinem humorum: ut dicit Auicē primo canonē, scē. 4. ca. de flebotomia. Tercio quia securior est, & minus timorosa infirmo: quia cohiberi potest, cum quis vult. Antequam tamen flebotomia, vel farmacia fiat: applicetur calefactoria lateri doloroso: ut præcepit Hipp. quā vel curat, vel digerit. Nam si materia sit ventosa sine apostemate, vel sit humoralis modica cum apostemate, tunc curant: quia retolunt & carminant sine attractione. Si vero materia sit plurima, & corpus repletum, digerunt: quoniam attrahendo materias augmentant dolorē & apostemia. Ex quo cognosceat medicus, quod euacuatio vniuersalis debet præcedere omnia localia remedia. Fiat ergo hora illa flebotomia hoc ordine. Nam si pleuresis sit in principio, & corpus sit plethoricum, fiat primo flebotomia saphenæ pedis eiusdem lateris propter diuersionē materiæ: postea flebotomia basilicæ brachij oppositi lateris. Et non est conueniens, ut flebotometur saphena, vel basilica pedis oppositi lateris: quia diuersio non potest fieri per duos diametros: ut dicit Auicē loco præallegato. Præterea tertio & ultimo fiat flebotomia basilicæ brachij lateris eiusdem, propter eradicationē, in qua tantū san-

guinis extrahatur, donec in alium colorem scilicet nigrum, vel magis intensæ rubedinis permuetur: quod significat eradicationem pertigisse usque ad minorationem causæ coniunctæ: obliuētur tamē virtus & ætas, ne simul cum causā morbi extrahatur & virtus. Si ergo virtus sit debilis, fiat potius secundario illius flebotomia, usque ad 3. dies cum plurima sanguinis educatione hora vna, vel ventosatio in ipatulis cum scarificatione, ad quam immediate sequatur clystere lenituum prædictum. Sicut enim ex anatomia cognoscuntur venæ capillares nutriendes pleuram & costas ad pleurā, ramificantur circa locū furculæ superioris, ubi venæ K. l. s. ascendens bipartit in duas guidez & duas basilicas s. dextrā et sinistrā. Si vero basilica repuri non possit, flebotomē medianā vel cephalicā: quoniam parum refert inter istas tres venas curuaturæ brachij: cum ab eodem trunco venæ K. l. s. oriantur fere circa eundem locum: nisi quod cephalica directius tendit ad caput & ad epar, basilica ad pectus, medianā (quæ est sicut chorda) colligās eas ad iuncū in brachij curuatura, si autem pleura est cōfirmata, et materia tora fluxerit, et morbus iam puerit ad augmentū, antequā sis vocatus ad curam: tunc si corpus non sit valde plethoricum: fiat illico flebotomia basilicæ lateris eiusdem: quā tūc non est locus diuertēdi, sed eradicaudi: & extrahatur sanguis usque ad mutationē coloris: quā si morbo existere in principio, primo fiet flebotomia eradicatoria, augmentaretur apostema propter materiæ attractionem. Similiter si existere in augmento, vel statu, fiet flebotomia diuersiua, traheret materia corrupta super loca sana: propter quod & apostema augmentaretur. Post flebotomias prædictas purgetur aliquo dierum ante diem cum medicina prædicta, & non purgetur cum scamonea, colloquintida, vel alia medici-

na acuta: quoniam per hoc se, incenderetur, & virtus debilitaret. Obseruetur ergo virtus proposse, quoniam ipsa est, quæ curat. Post remedia vniuersalia applicentur localia. Si ergo materia sit san guinea aquosa, fiat calefactorium de sale & milio torrefactis in sacculo super lap, ignito, et lateri doloroso applicetur. Si vero cholericæ acuta, fiat cū spongia, vel vire ligneo habente latus planum, vel cum vase pleno vitreo vel æneo vel terreo aqua calida, panno sicco interposito inter calefactorium & latus: vel te cū dum modernos cū vesica bouis sicca repleta aqua calida, panno interposito. Si vero flegmatica vel melancholica, indigemus fortioribus: vt orobus, fenum græcum, fursur, ana, partes æquales, cō trita & posita in sacculo, & bullita in aceto: deinde bene expressa & calida applicata, vt extendantur super pannum, & aspergantur puluere nasturtij vel carui, vel cymini, vel anethi, vel apij, & ca lesactum super lapide ignito applicetur. Caue tamen de attractione materiæ, & feb. in inflammatione: quoniam est acutū valde incisium subri atrium, & resolutionem materiæ grossæ vel viscosæ. Et in omnibus istis sit cautela, ne applicentur humida, & ne dimittantur in loco, postq̃ infrigidari cœperint: imo tūc cale fiant, & reirerentur & proprie in ieiuno: quoniam frigida & humida prohibent resolutionem. Et vnguatur quandoq; locus dolorosus cū oleo de camomilla vel aneto actu calido, & superponatur hoc emplastrum. ℞. rad. bismalua coctæ perfecte et trita: ʒ. iij. viol. fl. ʒ. camomilla, semi, lini, añ. ʒ. ij. farinæ ordei ʒ. .i. & incorporētur omnia cum oleo camomillino & viol. oleo qd̃ sufficit, & actu calid applicetur: quoniam resoluet leniter cū percussione & mitigatione. Nec permittatur venter ægri aliquo dierum exiccati: imo leniatur cum supposito

vel clysteri: quoniam ventris lenitas plurimum cōfert ad anhelitus bonitatem. Sumat om̃i die in aurora præterq̃ in die solutionis, de syrupo digesto & scariatio, quē ponemus infra ca. de empericis, circa principium. Et vtatur sæpe ante cibum lohoch scariatio ibid. ℞. rad. bruci sparagi, graminis añ. ʒ. .i. end. scariolæ añ. ʒ. .i. capill. veneris, se. order. añ. lib. ʒ. quatuor se. cōmunium frigidorum maiorum & minorum, se. papaueris alb. liquiritiæ mundatorum añ. ʒ. .i. zuccati. lib. .i. fiat ex om̃ibus syrtupus, cuius quantitas post decoctionē perfectā nō sit nisi lib. .i. & ʒ. & si materia esset frigida, aut tempus frigidum, aut sputum difficile, addantur mellis ʒ. .i. rad. ireos & hyssop. & apij añ. ʒ. ʒ. Et potest etiam addi modicum aceti gratia incisionis materiæ, si tussis esset modica, & non timeremus de pectoris structura: quia acetum est omni no pectori inimicum. Oportet igitur ista addere & ita subtrahere iuxta conueniētiā particularium: & sic regatur per medicinas vsq; ad perfectam apostematis resolutionem per sputum. Si autem pleuresis tendat ad sanationem, quod scies: quia prædicta non conferunt, sicut deberent: neq; sputum est facile & exuberans, neq; dolor lateris, neq; feb. minoratur: sed stant æqualiter & intendunt, tunc sollicitandū est circa maturatiua, & saniei generatiua, & doloris sedatiua: sicut est hoc emplastrum. ℞. rad. malua uicif coctarum & contritarum perfecte, orobi, fenigræci, se. lini, nasturtij, se. fenigræci, amigd. dragagari, gummi arab. iuluborum, liquiritiæ mōdatæ: añ. ʒ. .i. conuascentur in aqua, & bulliantur: & fiat emplastrum cum oleo camomillino, vel si zamino, anethino, v. de se. lini. Et si materia sit calida plurimū, fiat vnguentum supra torum pectus ex populeon, & buryro recenti sine sale, vel ex axungia anatina, & oleo viol. & cera alb.

Tractatus secundus.

sufficienti. Et ista olea, emplastra, & vn-
guenta possunt imbibi in lana succida
& pectori applicari actu calida. Fiat er-
go modo vnum, modo aliud, ne natura
fiat consuetudinaria. Et illa hora sumat
omni die in aurora de syrupo maturati-
uo, qui sic fiat. *℞.* ireos, hyssop. lilij, añ. ʒ.
i. ficuum caricarum dactylorum pin-
guum mundatorum a granis suis, iu-
iub liquoriciæ mundatæ, dragaganti, gū-
mi arabici, quatuor se. frigidorum com-
munium añ. ʒ. iij. capill. veneris lib. ʒ. f.
fiant syrups lib. 2. vel circa id. Et ex istis
eisdem cum orobo & fenogrecō, & se.
lini, stercore columbino, & cpoponaco
fiat super latus actu calidū emplastrum
& tunc regatur vsq; ad diem rupturæ:
tunc si fiat ruptura per se, bene erit: qua-
re educatur sanies, & mūdificetur vlcus
cum lohoch, & syrups ripticis sereati-
uis prædictis, ne transeat in phthisim. Et
plura dicemus ea. de empimate. Et vlti-
mo consolidetur, cum stypticis incarna-
tiuis, quæ dicentur ea. de phthisi. Si vero
ruptura per se fieri non potest: fiat per ar-
tem. Mollificetur igitur cubus cum cale-
factorio aliquo prædicto, addendo in eis
sinap. vel hyssopum, prassium, vel aliud
acutum: & commoueatur æger & con-
quassetur si est possibile, donec rumpat-
ur cubus. Et scias, quoniam quando ap-
parebit exitus saniei & sanguinis per
sputum, iuuetur ad mūdificationem,
& apponantur incarnatiua, & plura, si-
cut dictum est: ea. de apostemate slo-
machi. Veruntamen si hac arte aposte-
ma non rumpitur, tunc est timorofum,
quare oportet fieri aperitionem cum ste-
boromo, aut cauterio, vt sanies egredia-
tur, & non subito sed gradatim omni die
parum post parum: ne debilitas & syn-
copis ægro superueniant, & mors, vnde
ait Hippo. «.parti. apho. Quicumq; hy-
dropici & empici vruntur aut incidunt
&c. Locus autem incisionis vel vltionis

est inter costam sextam & septimam la-
teris apostematos: quoniam est ibi finis co-
starum verarū & principium mēdosarū
atq; diafragmatis, quare tota sanies ad
locum declinabit. Si vero pleuresis am-
bo loca occupauerit simul, requiritur in-
cisio lateris vtriusq;. Hæc tamen opera-
tio non fiat nisi forti virtute & corpore
desperato. Si autē morbus prolōgāt vltra
40. vel 50. diē, neq; materia sensibilibiter
euacuatur, sed diminute euacuat, & se.
latenter diminuitur, nec anhelitus facilis
tūc eris certus de lapidificatione aposte-
matis: quare prognosticiis elinquantur: ni-
si forte velles cum protestatione facere
curam blanditiuam, & mortis dilati-
uam cum emplastris mollificatiuis, &
postea resolutiuis vicissim ea appropriā-
do: sicut dicemus cap. de apostemate slo-
machi, & de cura apostematis melācho-
lici & sclerotici. Dicto de cura pleuresis
per medicinas: dicamus consequēter de
cura eius per diætā secundū ordinem
sex rerum non naturalium. Ordo igitur
diætæ duplex est, s. vniuersalis & particu-
laris. vniuersalis sumit a tribus. Primo
a 4. temporibus vniuersalibus. Nam in
principio, & quādo sputū est modicū &
debile, debet modicus cibus administra-
ri. Sed in augmēto & statu plus, si termi-
netur per resolutionē, iuxta illud Hip. in
reg. acuto. Quanto spatii plus fuerit, vbe-
rius reficiendū. Si autē terminaretur p. sa-
niationē, tunc in principio est magis dan-
dū q; in augmento: vt virtus longū mor-
bū valeat tolerare, et in via nō deficiat.
In statu vero, & proprie circa diē ruptu-
ræ, est diætā gradatim subtilianda vsq;
ad subtilissimū, ne natura impediāt in
opatione. Secūdo ab essentia morbi: q;
si pleuresis sit a causa calida subtili, ē mi-
n⁹ dādū: q; a morbo breuis est. Si sit a cau-
sa frigida grossa, magis dandū ē, vt vir-
tus sustētur. Terrio a virtute: q; si for-
tis sit virtus, erit minus dandū & magis

pro vice. Si vero sit debilis, erit magis dandum, et minus pro vice: cum virtus debilis optime sustentetur per cibum, quem tamen non potest simul plurimum elaborare. Ordo vero diætæ particularis sumitur a duobus. Primo ab hora diei: quoniam si possibile sit: detur cibus horis quibus consuevit tempore sanitatis refici, vel saltem hora maioris quietis, siue consuetus sit sumere cibum bis, siue pluries: vt dicit Hippo. 2. regi. acuto. Ita tamē vt detur magis in prædîo, & minus in cœna. Secundo a substantiâ & qualitate ciborum & potuum: quia in causa calida acuta subtili conuenit magis dare frigida actu et potentia: sed in frigida causa viscosa & crassa cōuenit magis dare acuta calida actu & virtute. Potus igitur nutritiuus pleurectici est multiplex: primus est aqua ordeï, quæ pitana colata dicitur dum volumus nutrire & mundificare & infrigidare. Secundus, est hydromel factū ex li. 1. aquæ & 3. 1. mellis: cum volumus fortius incidere & abstergere. Tertius, est vinū alb. debile aquosum, lymphatum ad mediū cum volumus virtutē confortare: hydromel tamen & vinum euectur in principio, et cum causa est calida. Quartus, est iulep, & aqua cum zuccaro: quando volumus infrigidare, & virtus est debilitata. Quintus, est succus malorū granatorum dulcium mixtus cū aqua fontis plurima: quando volumus confortare & humectare. Sextus, est syrupus viol. vel nenuph. vel syrupus ros. vel de papauere cum multitudine iulep permixtus, aut cum aqua ordeï, aut cum aqua pura: quando sitis & ariditas oris & linguæ, & insomnias persequantur. Septimus est ius pulli iuuenis, cum homo est debilitatus & fastidiosus, factum ex pullo paruo cocto in aqua pluuiali cum lactucis et se, frigidis communibus sine sale vsq; ad ossium separationem remota pingue

dine si qua foret. Isto tamen potu vtatur per interualla non continue, et corpus repleatur. Octauus est syrupus iste. 18. aquæ fontis lib. 1. mell. aceti añ. 3. 6. zucar. 3. 2. misceantur: quoniam est potus nobilissimus pro corporibus delicatis: cum volumus infrigidare, & mundificare. Mel em̄ (vt dicit Auicenna, cap. præsentis) non est negligendum in passionibus spiritualibus: quoniam est vehiculum omnium medicinarum ad pectus & pulmonem, & proprie in materia frigida grossa, & tempore frigido: sed in causa calida fit repressiuū cū aceto: sicut iam dictum est. Abstineat etiam omnis pleuriticus a potibus acetosis vel pōticis, & deligat dulces cū acuitate aliqua: quoniam acetosa pontica & styptica sunt sceleratus retentiuā, & vitarum pectoris restrictiuā: nisi fuerint modica, & cum acutis permixta gratia incisionis & penetrationis. Si autem virtus sit debilis, & consuetudo crapulosa: sicut fit nostris temporibus, tunc oportet grossius diætare: quia non sufficeret cibus vltimatus. Vtatur igitur pulmento ordeï, vel farinæ vel auenæ condito cum lacte amigdal. dulcium, vel carne pullorum, hædorum, castratorū cocta & alterata cū lactuca, spinargia, buglossa. Potest etiam vti aqua decoctionis caulium hyssopi cum melle, si materia sit viscosa. Vtatur passulis mundanis a granis interioribus, amigdal. dulcibus, & iuiubis. Panis eius non sit azymus: quoniam opilat, neque multum fermentatus: quia festinat ad rupturam apostematis, & apertionem venarum. Sit ergo medius inter hæc, & sit trium dierum vel duorum ad minus, nisi apostema tardet rupturam. Tunc nanque est bene fermentandus, vt rumpat cubum, & saniem mundificet. Vtatur etiā ouis forbilibus, & quandoq; etiā piscibus paruis, petrosi coctis cū petro, et sale. De fructibus vtat prunis,

Tractatus secundus

ceraſis dulcibus, & ficubus ſiccis ante cibum gratia lenificationis ventris, & pomis coctis & malis granatis dulcibus, vel piris dulcibus aſſis conditis cum zucaro gratia confortationis ſtomachi. Sunt præterea quædam circa methodum attendenda: & ſunt quinque. Primum eſt, quoniam neque ſtebotomia, neque farmacia ſumi debet venter conſtypatum: leniatur igitur prius cum ſuppoſitorio vel clyſteri. Secundum eſt, quod non debet fieri, niſi hora diei magis quieta, & quando eſt minor aſſectio, ne aſſectioſi addatur aſſectio. Tertium eſt, quod cibus non debet offerri hora maxime aſſectioſis, ne natura impediatur, niſi forte aſſectio & debilitas virtutis eſſet propter inanitionem plurimam: quod raro fit. Quartum, quod ſyrupi & potus non ſint multum acetofitatis, niſi materia ſit groſſa, viſcoſa, virtus fortis, & morbus ſit circa declinationem, et tuſſis ac difficultas anhelitus ſint modica. Tunc detur in parua quantitate cum multitudine piſanæ & aquæ puræ. Aliiter namque virtutem deſicerent, & prohiberent ſputum, & ſuffocationem inducerent. Quintum eſt, ut curando morbum & eius cauſam, non negligamus accidētia communia, ſcilicet ſitum & vigilias, dolorem capitis, colliquationem corporis & ſic de alijs: quorum remedia inuenies ſuis capitulis. Sunt præterea quidam, qui curant pleureſim per emplaſtra rubificatiua, & attractiua facta ex ſinapi, fermento, ficubus ſiccis, ſtercore colubino, pice, cepis & ſimilibus calidis acutis, ponendo ea ſuper locum doloroſum poſt vniuerſalem euacuationem ſufficiētem cum ſtebotomia & farmacia: & cum non eſt timor de attractione vltiori ad locum apoſtematis vel ponendo ventos ſuper locum. Sed iſte modus non eſt tutus: quoniam eſt difficile virtutem medicamentorum penetrare thoracem & coſtas: cum ſint membra dura: & eſt ti-

mor de augmentatione apoſtematis. ¶ Sciendum eſt præterea, quod ſi in pleureſi ſputum ſit rubrum, purum ſine permixtione albedinis, tunc in cura eius oportet nos ad duo intendere, ſcilicet ad ſputi educionem cum ſecretiuis leuibus prædictis, & ad venarum rupturæ conſolidationem cum ſtypticis cōglutinatiuis & incarnatiuis, quæ dicuntur cap. de ſputo ſanguinis. Adminiſtrētur igitur viciffim vel mixta ſimul, ſicut dicemus cap. de phthiſi: quoniam tales ad phthiſim parati ſunt, niſi medicus plurimum ſoliciteatur in curis cōtrarijs. Eſt præterea ſciendum, quod licet pleureſis, & vniuerſaliter omne apoſtema fieri poſſit ex omni materia per ſe, vel cōmixta: tamen ſi fiat ex multitudine & abundantia humorum, ſic fit a ſanguine: quoniam ſanguis eſt humor abundantiſſimus, qui eſt ſicut nutrimentum corporis. Alij vero ſicut condimentum. Si vero fiat per viam penetratiōis, ſic fit maxime a cholera: Si per viam reumatis & diſcurſus, ſic fit a flegmate: Si per viam cōgeſtionis vel aſtationis, ſic fit a melancholia: quod tamen raro eſt fieri poſſibile. Fit igitur ſecundum hanc rationem vere ex ſanguine, in æſtate ex cholera, in autumno ex melancholia quia per æſtatem exhalauiſt ſubtile, & remanſit groſſum in humoribus. Si in hyeme, ex flegmate per ſe: licet accidentia liter poſſit fieri ex cholera reſeruata per æſtatem & autumnum, quæ poſtea in hyeme propter antipariſtaſim & copulationem ad interiora repellitur: & ibi non bene tranſpirata putreſcit, & facit apoſtema. Eadem ratione ſit pleureſis in ſenibus ex flegmate, ſed in ſenioribus ex melancholia. In adoleſcentibus ex ſanguine. In iuuenibus ex cholera. Sicut igitur hoc apoſtema eſt periculolum & difficile in ſenibus & flegmaticis propter ſuffocationem et virtutis expulſiug debilitatem: ita eſt periculolum in iuuenibus propter materiæ feruorē & acuita-

re & doloris fortitudinē & sensus bonitatem. Regatur igitur ois pleureticus cū medicinis & potibus prædictis vsq; ad tempus conualescentiæ, quod est tempus qd̄ declinationem veram & perfectā significat: & tunc balneetur, & gradatim reducatur ad suam consuetudinem

Emperica. Communiter practican-tes in cura pleuresis quæ est a sanguine præmittit̄ flebotomiam farmaciæ. Sed in ea quæ est de sanguine adusto, vel cholera, vel flegmate, procedit̄ econuerso. Item pro digestiua ministrat̄ om̄i mane. 3. 2. vel 3. istius syrapi cū duplo eius aquæ calidæ decoctiōis liquirit. viol. & ordeī. ℞. sic̄ siccas pingues 10. numero, passularum pinguium. 3. 10. rad. liquiritiæ, pistatæ. 3. 10. sebesten, iu- iub. 2. 0. numero. añ. bulliantur in tribus lib. aquæ, donec medietas consumatur: coletur, & syrupisetur cum lib. 1. zuccari, confert omni pleuresi. Sed si sit de flegmate, addatur hyssopi, meliloti. añ. 3. f. Item non debet dari aqua ordeī cū syrupo, neq; cū cibo: sed post syrupum vel post cibum per vnā vel duas horas. Itē dant pro potu iulep vel hydromel aquosum, vel aq̄m decoctiōis rad. feniculi, vel liquirit. & zuccari. Quod si pleuresis sit de materia calidissima, scilicet de sanguine adusto, vel cholera: dāt pro potu hora comestionis aquam decoctionis psillij & cucurbitæ, vel aquam decoctionis endiuicæ, psillij, & gummi arabici: & hic foret omnium sublimior, si gustus ipsam non prohiberet. Item si calor fe. sit intensus: inungant spatulas & spinam totam cū populeon & oleo ros. vel viol. vel muscillagine psillij, & oleo de papauere, & oleo de nenuphare. Item si dolor lateris pungitius sit fortis: formetur latus cū spongia infusa in aqua decoctionis florum camomillæ viol. vel anethi. Vel vngant cum vnguento facto ex par. 2. dialtheæ, & olei camomillæ, butyri añ.

partem f. addito cioco modico propter penetrationem. Item secundum dicta in methodo: similiter et emperici regūt oēs pleureticos vsq; ad perfectam resolutionem, vel vsq; ad rupturam, si nō potest terminari per resolutionē. Verum post rupturam apostematis, mundificant pectus & pulmonem a sanie cū rebus dictis ca. de tussi, paragrapho, de empericis secundum naturam & conditionem eius, quod, excreatur: Et plura dicemus ca. de empimate, & ca. de phthisi. quoniam am omnium istorum intentio est mundi- ficandi. Syrupus bonus contra omne vitium pectoris cum materia, sic fit quādo illam digerit, & sputo præparat, & proprie si sit materia frigida grossa. ℞. vngtæ cabalinæ, capill. veneris, hyssopi. añ. m. 1. liquiritiæ, passularum excorticatarum, ordeī mundati & excorticati. añ. 3. 1. ficuum siccarum pinguium, dactylorum, añ. numero. 6. amigdal. dulcium numero. 25. fiat syrupus cum melle, si sit sine fe. vel cum feb. lenta: sed cum zuccaro, si est cum fe. acuta.

Canones. Dabitur cōplures, vtrum re- percussiuā cōpetant in prin- cipio pleures. videtur q̄ sic autoritate Io. hehemef. in suo cap. de pleuresi. vbi p̄cipit ex p̄sse. Item autoritate Auicē. ca. de curatione apostematū in generali: vbi dicit, q̄ in principio debet poni super locum percussiuā tm̄, in declinati- one resolutiuā tm̄, in augumēto & statu mixta ex ijs: ita tamē q̄ in augumēto denē percussiuā, in statu vero resolutiuā nec ab illo canone ponit exceptionē, nisi de apostematibus in emunctorijs, & apostematibus creticis, quæ repercurere non debemus, sed potius prouocare, ponendo emplastra tubificatiua ex sinap. melle, stercore columbino super locū. In oppositū arguitur autoritate Hip. 2. regi. acuto. vbi loquens de cura pleures. et peripneumoniæ per medicinas, non po-

Tractatus secundus

nit in aliqua horarum percussiva: similiter & autoritate Gale. 11. de ingenio sanitatis, ubi loquens de cura apostematum omnium interiorum, quæ sunt cum feb. prohibet in apostematibus pectoris percussiva: quia timor est, ne materia propellatur ad cor, vel aliud membrum nobile: vel si hoc non contingit, nihilominus accidit materię incuneatio, ut per sputum terminari non possit, sed vel per saniationem vel per scirrhosationem. Ad quam dubitationem videtur respondendum, prout ex dictis Mesu, ibidem colligitur quod duplex est principium, scilicet principians & principiatum. Voco autem principium principians: quando materia futura facere apostema, nondum irrepsit in poros membri, sed astat in membris circumiacentibus: sed principium principiatum dico, quando materia iam irrepsit in poros & spongiositates membri, in quo fit apostema. Dicendum igitur, quod in principio principiante debent opponi percussiva: & proprie, si materia sit modica & corpus non plethoricum neque cacochimicum valde: quoniam euacuabitur sic apostema, præter quod materia non repellatur ad cor. Talis namque modo materia non repellitur, sed a cursu prohibetur. In principio autem principiato nullatenus cōpeteret propter causas prædictas: & sic cōcordatur auth. Sed queritur utrum duos: est tutius medico communiter operanti, scilicet uti percussivis vel non uti? Dicendum quod non uti tutius est, propter quatuor: primo quia difficile imo quasi impossibile est medico cognoscere principium principians: secundum, posito quod cognosceret, tamen quia illa hora brevis est, & non possunt medicinæ applicari: tertio, quia raro est quod huiusmodi corpus non sit plethoricum, & materia pauca: quarto: quia raro est ut medicus voce ad ægrum in principio principiare. Dubitat ulterius: quare terminatio pleures per sputum voce apud autho-

res terminatio per resolutionem: cum sit grossa sensibilis, & quis sit modus generationis sputi in pleuresi. Dicendum est, quod materia apostematosa contenta in plura subtilissima fillat, & quasi insensibiliter ad cava cum pectoris: Deinde quando pulmo dilatatur, ingreditur parum post parum orificia prima ramorum tracheæ arteriæ dispersæ per totam substantiam pulmōis: Deinde ab illis propellit regimine naturæ ad largiora, donec in aliqua qualitate cōgregetur in trunco, quod est cava pulmōis: tunc natura sentiens nocumentum anhelitus, propellit illud extra corpus, & tunc dicitur sputum. vñ Gal. in cōmen. illius apho. Quibuscunque inter renes & ventrem & c. fortis naturæ nihil repugnat. Educit enim sanie de medio ossis: & in de creticis. Natura est sapiens, imo sapiētissima, cuius sapiētia non est finis. Quod si obijciat: quare materia tunc non ingreditur orificia venæ arterialis & arteriæ venalis: & sic tamen perveniat ad cor: cum hæc duæ viæ procedant a corde. Prima quidem a dextro ventriculo cordis. Secunda vero a sinistra: & dispersantur per totam substantiam pulmōis. Dicendum quod illæ duæ viæ sunt molles, & clauduntur dum pulmo contrahitur: sed rami cava pulmōis sunt duri & omni tempore aperti. Aliter namque animal suffocaretur. Vel dicendum, quod ad hoc suffragatur natura relegas sputum per vias magis salubres: ut dictum est.

Prognosticatio. Ante quod prognosticare possim, scire oportet, quod signorum pleures, sex sunt genera. Quædam enim significant pleuresim: quædam significant quatuor eius tempora varia: quædam significant distinctionem pleures a passionibus cōsimilibus: quædam significant translationem materię ad aliud membrum: quædam significant longitudinem & brevitatem: quædam significant salutem vel mortem, de quibus dicam per ordinem. Signa pleures, sunt quicquid sunt dolor lateris pugi-

tius, se. continua, tussis, pulsus ferrinus, difficultas anhelitus. Signa vero temporū sumuntur primo de crisi: quia dum nil expuitur, & tussis est sicca, vel indigestū & paucū quod expuitur: tūc dicitur principium. Quādo vero tussis humectatur, & difficultas anhelitus mitigatur, & est in parte digestū quod spuitur: tūc est augmentum. Quādo vero est sputum perfecte digestum, & cum facilitate egreditur: est status. Quādo vero tota materia euacuatur, vel circa id: tūc est vera declinatio. Signa vero distinctiua pleuretis a dolore lateris ventoso, diximus in principio cap. Est etiam apostema in gibbo epatis, simile pleuresi cū se, continua, tussis & punctura lateris dextri: sed differt: quia in apostemate epatis est pulsus vndosus, & dolor sub diafragmate, & in dextera parte tantū, neque ascendit usque ad furculas superiores, & est eius tussis sicca semper et modica: quia solū fit propter compressionem diafragmatis a gibbo epatis non propter materiam in pectore & pulmone, neque dolor est ita acutus, & fit quandoque tumor in hypocondrio dextro, si magnum fuerit apostema sub figura no uaculæ siue lunæ mediæ, & vrina spissa cōfusa. Quod si sit in cōcauo epatis apostema, fiet egestio sicut lotura carnis, propter transmissionem materiæ per membra faucas ad intestina. Signa vero distinctiua inter pleuresim & peripneumoniam sunt: quia in peripneumonia est pulsus vndosus, & dolor non acutus, sed grauius: quia substantia pulmonis non sentit, sed pāniculus eius inuoluens & mediastinus: Similiter & difficultas anhelitus fiet maxime cum cōtinuo timore suffocationis, & dolor declinabit ad partes posteriores inter duas spatulas, vel ad anterius, non autem ad latera, & rubor apparebit in maxillis. Item materia pleuretis quādoque transmittitur ad cor, & tunc fit syncopis, & forte mors:

quandoque ad cerebrum, & tunc fit frenesis, & nigredo linguæ cum ariditate, & vrina remissa, cum prius esset tincta valde, & dolor lateris diminuitur, vel auferitur quandoque ad pulmonem: & tunc dolor non est adeo acutus, sicut prius: sed anhelitus difficilior fit. Vnde Hippocr. 7. parti. apho. In pleuresi de peripneumonia malum. Quandoque ad nervos, et tūc fit spasmus: Quandoque sub ascellas, vel post aurem, vel post aliam particulam exteriorem: & tunc apparet ad sensum tumor & alleuiatio infirmi. Signa vero longitudinis pleuretis sunt, quia diu durat eius principium vniuersale, scilicet sputum indigestum & grossum, viscosum & similia, vel tussis sicca difficilis: quia quando principium est longum, omnia tempora erunt longa: ut dicitur primo de crisi: saluoque virtus sit fortis: quia si esset debilis, & alia mala signa appareret: posset abbreviari ad mortē. Signa vero breuitatis ad salutē sunt signa contraria, & proprie breuitas principij, & cito apparitio digestionis in sputo. scilicet infra primos tres dies, & eius facilis educitio: & vniuersaliter omnia signa salutis sine permutatione cōtrarij. ¶ Signorum prognosticorum quatuor sunt modi. Nā quædam signa ficiant bonū absolute: quædam malū absolute, quædam salutem: quædam mortem. Signa bona absolute: si sputū cito a principio ægritudinis, & infra tres primos dies sit facile, sine multo labore tussiendo, vel screandi, & sit subrubeum sano sputo admixtum a principio, vel statim post: neque perseueret in septimum diem in colore subrubeo sed albescat: Et vniuersaliter omne sputum cum diminutione doloris eueniens est bonum. Signa mala absolute sunt, ut dicit Hippo. secundo prognosticorum, si sputū sit tardum in principio: & si rub. postquam euenit, aut citrinū, purū, cū laboriosa tussis vel albo sputo commixtū: vel si sit rub.

Tractatus secundus.

omnino velut sanguis: quod rupturam venæ significat. Vel si sit viride & spumofum & liuidum. Sputum namq; rubeum, vel subrubeum materiā sanguinis significat. Sputum vero viride, vel citrinum, vel subcitrinum cholicam. Sed album sputum, viscosum, globosum, flegmaticam. Et sputum liuidum vel ni-grum, melancholicam denotat materiā. Materia igitur sanguinea est mala, flegmatica peior, cholerica magis mala, melancholica pessima. Item sternutatio superueniens in principio, & cum materia est adhuc i fluxu, siue sternutatio præcesserit pleuresim, siue coæqua sit, malū est: quia auget apostema. Sternutatio vero superueniens in declinatione, & cum materia tota fluxerit, et tota digesta est, bonum: significat enim virtutis expulsiuæ fortitudinem, & materiæ euacuati-onem. Item omne sputum cum quo dimi-nuitur dolor, & malitia anhelitus, est bo-num. Item sputū subrub. a principio ap-parens & vsq; in 7. diē vel amplius per-seuerans, ita q; dealbatur, neq; sano spu-to permiscetur: malum. Item si medicus recte operetur, neq; ex hoc, æger se me-lius habeat, malum. Item si egestio sit li-uida, frequens & liquida, & vrina subtri-lis aut grossa valde, & gulsus debilis: malum. Item superueniēte sputo, vel so-lutione ventris, vel exuberantia vrinæ, vel flebotomo adhibito, vel quomodo-libet alio competenti medicamine, ve-lut est sudor, vel fluxus sanguinis nariū, vel calefactorium, & similia: dolor late-ris nequaquā minoretur, malum est: quia si-gnificat, q; pleuresis non terminabitur per sputum, sed per saniationem. ¶ Si-gna salutis, sunt cum signis bonis prædi-ctis, constantia virtutis, bonitas pulsus, & anhelitus facilis, excreatio sine pluri-ma tussi, calor naturalis æqualis in toto, membrorum flexibilitas, sitis pauca, & vrina, egestio, & sudor, & somnus bene

se habeant. Hæc enim omnia si vsq; ad septimum diem perseuerauerint: promit-tunt salutem in 14. vel circa. ¶ Signa mortalia sunt cum signis prædictis ma-lis, debilitas virtutis, malitia pulsus & anhelitus, ita vt sit spissus, debilis, anxi-us, dolor continuus, expulsiō laboriosa & pauca cum tussi plurima, sitis intēsa, calor inæqualis, ita q; venter & latera sint calida plurimum, sed frons & extre-ma frigida: similiter vrina, egestio, su-dor, & somnus male sunt se habentia: & sputum foetidum, vel nigrum, grossum, vel viscosum cū ore gromone, vel citrinū, cholicum, purum sine omni albedine. Hæc enim omia si perseuerauerint vsq; ad septimum diem, vel plurima eorum in die 7. aduenerint: mortem signāt in no-na, vel 11. die ad plus in decima quarta. Item si materia pleuresis rapiat ad pul-monem, vel ad cor, vel cerebrum: mortale. Si vero post aures, vel sub ascellis, vel ad alium locum ignobilem, & cum æger alleuiatus fuerit: salubre. Irē si mul-tum expulsiō: deinde cito retinetur, gra-uedine & dolore remanēte, mortale: ga-signat præfocationē a multitudine ma-teriæ. Item, signa salutis pleuresis cū ter-minatur per saniationem sunt, vt dicit Hippo. 2. prognosticorum, quia calor fe-minuitur, vel ex toto recedit in die rupturæ. & extunc redit appetitus cibi, neque sitiunt: & est egestio tēperata, non liqui-da, neq; dura: & sputum & sanies lau-dabilis, scilicet alba, lenis, æqualis: vt hypostas is exiens sine labore omni, vel cum modica tussi. Hi namq; in breui tē-pore sanantur: & qui plurima eorum ha-bent, citius sanātur circa id, secundum quod signa salutis apparent: plura vel pauciora. Signa mortis in talibus sunt, remanētia caloris fe. post diem rupturæ, & q; febris redit quasi furtiue cum aspe-ra siti, & fastidio cibi, & egestionem ha-bent liquidam, & sputum eorum est liui-

dum, vel viride, vel flegmati viscoso permixtum, & spumofum, difficile exiens & cum multa tussi, & laboriosa. In quibus apparent omnia ista signa, perituros non dubitabis. Signa dubia prædictorum sunt: quoniam qui habent quædam eorum, sed non omnia, si morietur: hi salua buntur: vtrique tamẽ exitũ difficilem consequentur.

De peripneumonia. Cap. III.

Peripneumonia est apostema pulmonis & velaminũ eius, quæ sunt duo, scilicet velamen circumuoluẽs pulmonem totum & mediastinum pectoris: quod est velamen diuidẽs pectus & pulmonem per medium secundũ longum, ita vt maior pars pulmonis sit in latere dextro, minor vero in sinistro propter cor, quod sinistra parti extat alligatum. Fit igitur ex omni genere quatuor humorum: quemadmodũ & pleuresis. Verum in hoc differt: quia sicut pleuresis (vt plurimum) fit a causa subtili cholerica: ita peripneumonia (vt plurimũ) fit a materia grossa flegmatica decurrẽte per venas & arterias in substantiam pulmonis. Et non dicat aliquis, qd fiat a rheumate descendente a capite per cannam pulmonis: quia sicut probatum est, ea de pleuresi circa principium, tale rheuma potest causare catarrhum, vel empyema, sed non apostema: licet aliqua accidia apostematis communia, vel propria eum consequantur, quæ sunt fe. continua, asma, tussis, & similia. Fit etiam quicquid peripneumonia ex pleuresi: quando materia stillat paulatim ex pleura in concavitatẽ pectoris: deinde ingreditur ficia venę arterialis, et arteriæ venalis quæ sunt venę sparsæ per totã substantiam pulmonis: & causat ibidẽ apostema, quando putrefcit. Si enim ingrederetur ora ramorum cannæ pulmonis, non causaret peripneumonia: sed esset via terminationis pleuresis per resolutionem, vt di-

ctum est capite de pleuresi. Signa peripneumoniæ in communi sunt, fe. continua, pulsus vndosus, rubedo maxillarũ, tussis multa, anhelitus maximus, cum continuo timore suffocationis, dolor pectoris ponderosus declinans ad ante & retro inter spatulas, ita qd non potest iacere supine, neq; in ventre præ suffocatione: cum dolor pleureticus ad latera declinat. Signa peripneumoniæ a sanguine, sunt cum prædictis habitudo carnosæ rubicunda cum robore fortissimo maxillarum, tussis valida, cum spuro rubeo vel subrubeo, vel spumoso, fe. continua acuta valde, æras iuuentutis, tempus veris, vt plurimum, vrina rubea, clara & grossa: & antecessio potus vini plurimi, & dolor pectoris grauius cum punctura multa: pulsus vndosus & velox, cum mollificatione arteriæ: similiter & apertio venarum grossarum repletarũ per membra corporis omni quacũque. Signa vero peripneumoniæ ex flegmate, sunt cũ prædictis habitudo flegmatica, æras senectutis, antecessio satietatis antiquatæ cum multitudine fluxus catarrhosi, cui successit tussis, difficultas anhelitus cum oregmone, & fe. lenta, sputum albũ spumofum viscosum, vrina grossa & remissa vel karpos, pulsus rarior & mollior prædictis, & grauitas in pectore maior sine dolore pungitiuo plurimo, lingua alba mollis in principio ægritudinis, & sine asperitate languescens. Signa eius, quæ est a causa cholerica, sunt cum signis communibus, sputum subtile citrinum, spumofum, amaritudo oris, pulsus spissior, & vrina citrina valde, subtilis & clara, dolor pungitiuus acutissimus: similiter habitudo, complexio, æras, & tempus cholericum, & asperitas linguæ cum nigredine & fe. continua arsiua. Signa eius, quæ est de causa composita, sunt adunatio signorum prædictorum, Signa eius, quæ fit ex pleuresi,

Tractatus secundus

sunt antecessio signorum pleuresis: quibus succedunt signa ista illis cessantibus in toto vel in parte. Si enim ambo simul apparent, essent pleuresis & peripneumonia simul, necessario propter materię multitudinem exuberantem.

Methodus. Cura peripneumonię de causa calida est, vt primo fiat flebotomia de vena mediana fortis vsq; ad syncopim, vel quandiu virtus sufferat: vel fiat secūdatio flebotomię, si æger consuetus sit. Postea die secunda vel tertia fiat clystere lenitium dictum in frenesi, vel suppositorium, si virtus sit debilis: & hoc cōtinuetur omni die: neq; permittatur venter exiccare quocunque modo in emplastris, vnguentis, electuarijs, cibo & potu, et similibus. Fiat sicut in pleuresi de causa calida: propter quod indigemus fortioribus creatiuis, vt materia cū tussi euacuetur: cū in ea sit maior timor suffocationis, q̄ in illa. Cura eius, quę est a causa frigida, est vt primo purgetur cum pillulis cochijs, vel cū bened. vel cum medicina de turbith dissoluta in syrupo viol. vel in aqua mell. vel in aqua decoctionis liquiritię & hyssopi. Postea die secundo vel tertio fiat flebotomia de vena mediana: in alijs fiat sicut in pleuresi de causa frigida: In causa vero composita fiat composito medicinarum, similiter & dietę.

Emperica. Omnia quę scripta sunt in cap. de alimate, rheumate, tussi, & pleuresi, vtilia ad educendū materias ex pectore & pulmone cum secreta sine tussi, vtilia sunt pręsenti ca. Subdam autem adhuc pręter illa vnum lohoch Mes. positum in suo li. de appropriatis, conferēs vitio pectoris, omni quaq; ʒss. papaueris albi, spodię, se. lini, croci, amidalarum dulcium, ana, ʒ. amyli, dragaganti, gummi arabici, se. citoniorum, se. cucurbitę añ. ʒ. ʒ. se. nasturtij, se. boraginis, amygdalarum amarum, fa-

harum, añ. ʒ. i. & f. penid. ʒ. ʒo. dissoluantur penid. in aqua fontis, & coquantur, & cocti conficiantur cum duabus lib. zuccari albißimi, labatur ex eo frequenter inglutiendo paulatine. Item electuarium ad idem. ʒss. pinearum mundatarum, amygdalarum dulcium añ. ʒ. iij. hyssopi ʒ. f. dragaganti, se. lini, affi, añ. ʒ. f. fenigraci, amyli, succi liquiritię, añ. ʒ. ij. se. communium frigidorum excorticatorum ʒ. i. se. bombacis excorticati, ʒ. ij. terantur & conficiantur cum lib. vna zuccari, & fiat electuarium ad modum diapenid. Item si materia sit frigida, viscosa & se. lenta, confert lohoch de squilla positum ca. de tussi in empericis.

Canones. Omnia scripta in canonibus pleuresis conferunt pręsenti ca. Sed recordare, qđ peripneumonia terminatur altero trium modorum: sicut et pleuresis, scilicet per resolutionem, vel per saniationem, vel per indurationem. Ex quo scire potes: sicut etiam in pleuresi dictum est, qđ si peripneumonia nō terminatur per fluxum sang. narium infra primos 4. dies, vel per sudorem pectoris decurrentem, vel nō purgetur per sputum infra 14. dies a principio: terminabitur per saniationem, & faciet empima: quare pro cura eorum, recurre ad ca. de empimate. Si vero a die 14. vsq; ad 40. non mundificet sanie, phthisim efficit: quare pro cura eorum recurratur ad ca. de phthisi. Recordare pręterea, qđ quando das syrupum digestiū in aurora vel in vesp̄is, nequaquā debes dare aquā ordeī, sed ante vel post per duas vel tres horas. Similiter neq; cū cibo dabis aquā ordeī, sed potum alium, vtpote iulep, vel melliscratum aquosum, cum sitis necessitas, aut sputi siccitas ipsum postula uerit.

Prognosticatio. Omnia dicta in prognosticatione pleuresis conferūt in pręsenti cap. veruntamen

dicamus & alia famosa. Peripneumonia est periculosior pleuresi, propter maius impedimentū quod sit in anhelitu, q̄ in pleuresi. Itē peripneumonia fit vt plurimum ex pleuresi, & raro per se incipiendo: & siue transeat in pleuresim, siue non: semper malū est: quia materiæ multitudinem vel ventositatem significat. Vnde Hippocrates 7. aphorismorum. In pleuresi peripneumonia malū. Item si in die quarta vel septima superuenerit fluxus sanguinis plurimus, vel sudor pectoris exuberans, constante virtute & alieuiatione sequente: salubre. Item peripneumonia aut interficit infra 7. dies, aut transit in phthisim vt plurimū. Item si materia peripneumonix terminetur ad vias vrinales, vel faciat apostema, creticum post aures, vel in inguinibus, vel in alijs partibus corporis, & proprie post signa digestionis in sputo & vrina, et alieuiatione infirmi: significat salutē: sin autem, mortē. Item Hippo. 2. prognosticorū. Si in peripneumonia anhelitus cōspissetur sine manifesta causa: vel plusq̄ a causa peripneumonix conueniens sit, & hypocōdria, & partes inferiores sunt omnino absq̄ dolore & calore: significat apostema creticum futurum post aures: quare materia rapitur ad superiora. Quod si huiusmodi apostema maturet, & saniem laudabilem generet, deinde rumpatur ad exteriora: significat salutem: sin autē, mortale propter læsionē cerebri & timorē frenesis ex dolore forti. Item Hippo. Peripneumonia maxime accidit grandævis, & illis qui sunt in tertā ætate, quæ senectus dicitur: & est circa 40. annum. Hi namq̄ pereunt ex ipsa quando terminatur in eis per saniationē magis q̄ per sputum. Iuuenes vero magis pereunt a pleuresi & alijs apostematibus interioribus tendentibus ad saniationem: cuius causa trahitur ex illo, quia peripneumonia (vt plurimum) est a cau-

sa frigida: pleuresis vero, & alia apostemata a causa calida. Item dicit Hip. 6. apho. A pleuritide habito aut peripneumonia diatriā superueniens: malum, & hoc si sit propter compassionem epatis vel multitudinem materiæ: sed si sit propter euacuationem ceticam, erit bonū. Item si peripneumonia permuretur in subeth vel lethargiā, malū. Item Hippo. 7. part. apho. In peripneumonia, frenesis malum: supple & omnis alienatio mentis, est mala.

¶ De empimate. Cap. V.

Empima dicitur collectio saniei in substātia pulmonis vel ramis tracheæ arteriæ dispersis per totā eius substātiā in multa quantitate: quemadmodum in phthisi sub quantitate modica: similiter & in pectore, & in loco medio inter concauitatem costarum & conuexum pulmonis. Fit autem ista passio aut post catarrhum, quando non purgatur per sputū infra 14. dies a suo principio: aut post pleuresim, vel peripneumoniam: quando non terminatur per resolutionem, sed per saniationem. Signa eius, quando fit post catarrhum, sunt: q̄a patiens sentit in gutture descēsum catarrhi multoties & post illud sequitur tussis cum projectione sputi saniosi multi vel pauci, et difficultas anhelitus quandoq̄ cum oregmone, & accidit vt plurimum pluribus flegmaticis senibus & humidis circa caput & pectoralia: & est vt plurimum cum feb, propter caliditatem saniei inflammantis cor, & propter diminutam euentationem cum necessitate adaucta. Signa eius, quādo fit post pleuresim vel peripneumoniam, sunt antecessio signorum pleuresis aut peripneumonix: & deinde post quatuordecim dies vel circa id, augetur fe. & dolor pungitiuus, & aduenit ægro quandoque

Tractatus Secundus.

rigor & anxietas: & vniuersaliter omnia signa dicta cap. de pleuresi. paragraph. de signis terminationis pleuresis per sanationem. Fit autem quandoque ista passio a casu vel vulnere penetrante in concavitate pectoris quando sanguinis humorosagiae non fit ad extra, sed ad intus, neque statim purgatur per sputum, neque per vulnus: quare convertitur in saniem, vel rem ventosam, vel venenosam: nisi forte illud subito suffocatio antecedat. Vnde Hippo. 6. apho. Si sanguis in ventrem effusus fuerit, necesse est in saniem converti: Et intellige per saniem virus & omnem materiam corruptam.

Methodus. Cura istius passionis fit per emplastra & vnguenta maturatiua & saniei generatiua posita supra pectus: & deinde per lochoch & syrupos recreatiuos, & electuaria, & omnia mundificatiua membra spiritalia a sanie: quorum quidem copiam reperies cap. de tussi, & ca. de catarrho: prout ista passio est a catarrho: sed in cap. de pleuresi, prout fit post pleuresim, vel pipneumoniam. Sed propter dicta illic, addemus adhuc alia. Vngatur ergo pectus totum & spina cum oleo de lilio vel anetho, vel camomillino, vel pnardino, vel mixtis ex ipsis, addendo aliquid butyri, ceræ, & croci. Hoc enim vnguentum mitigat dolorem sui resolutione leui & generat saniem sui caliditate & viscositate: ut dicit Gale. 11. de ingenio sanitatis. Sanies generatur per medicinas calidas assantes, & viscosas opilantes poros, ita ut neque resoluatur subtile, & remaneat grossum, neque calor naturalis euaporet: debet tamen opilatio non esse fortis, ne forte calidum naturale suffocetur: quia tunc non generaretur sanies laudabilis, sed virus, & denigraretur membrum, & forte putresceret, et corrumpere. Vel vngatur cum dialthea, vel cum vnguento marciaton, si materia sit grossa viscosa: & su-

per vnguentum ponatur emplastrum tale maturatiuum calidum, & radices maluaufici cocti & mundati intus & extra. M. 6. florum camomillæ, violæ an. 3. 2. farinæ ordeï. 3. quinq; coquantur perfecte & pistentur, & incorporentur cum oleo camomillæ, & anethino, quod sufficit: vel cum oleo violæ si se sit intensa: & cum in frigidatum fuerit, statim reiteretur. Sed si materia fuerit grossa, & se. lenta, adde in emplastro farinam fenigræci, se. lini, dragaganti, gummi arabici, amigdalorum dulcium. ana. Et si materia sit adhuc grossior: fiat emplastrum ex semine nasturtij, & se. apij, & melle despumato. Utatur continue recreatiuis, scilicet diapenid, diagraganto in causa calida diaphysopop, diayris, diacalameto, diaprasio in materia viscosa frigida, & mixtis in materia mixta dissolutis cum syrupo violæ vel cum melle despumato. Dieta eius consistit in prohibitis & permissis. Prohibita sunt omnia grossa viscosa, ut carnes porcinæ, bouine antiquæ, caseus, pasta tortellæ: Similiter & omnes pisces, nisi petrosi. & cibis ois assis, vel frigus, et omnis cibus acetosus ponticus vel acerbus, & omnia acumina, ut allia, sinapi. cepæ: nisi forte quando sinapi. condito cum melle vteretur lambendo moderate propter sreatum: & omnes ficus præter ficus siccas pingues, iuiubas, dactylos, vvas maturas, & auellanas. Permissa vero sunt omnia sreatiua, apitiua, lenitiua: ut panis furfuraceus bene fermentatus, bene salitus, bene coctus vnius vel duorum dierum: & carnes hœdorum, pullorum, perdicum, auium paruarum, vitelli ouorum sorbilibus, et vinum dulce subtile: & iulep, aut hydromel, aut aqua decoctionis liquiritiæ, hyssopi. Abstineat a somno superfluo pro posse, & proprie diurno, vel ilico post cibum: neque iaceat supine. Utatur in cibo speciebus non acutis, ut est macis, cynamomum, car-

damomum, liquiritia, crocus, et similia. Sumat mane & sero de isto electuario. *℞.* succi liquiritiæ, hyssop. capill. veneris añ. 3. s. cardamomi, piperis, amigdarum amararum, aristologiæ rotundæ, se. vrticæ. añ. 3. 2. & s. Conficiantur cum melle despumato. Hoc enim superfluitates grossas de pectore expellit. Item dragea ad idem. *℞.* liquiritiæ. 22. cynamomi electi, añ. 3. 4. gariofil. 3. 2. anisi, ar. meos, añ. 3. 13. passularum enucleatarum quantum de omnibus: incidantur omnia grosso modo, præter anisum, passulas, & cameos: & misceantur simul.

Emperica. Communiter operâtes primo digerunt materiam antecedentem si corpus est plethoricum, & virtus fortis, cum oxymelle composito vel squillitico, vel melle ros. dâdo quinque diebus cum aqua decoctionis passularum, liquiritiæ, hyssopi. vel cû aliquo syruporum dictorum capitu. de tussi. & capi. de pleuresi respicientium membra spûalia ex proprietate. Post hoc ipsam educunt vicibus gradatius cum pillulis cochijs in causa frigida, vel cum pillulis de reubarba. in causa calida. Remota vero causa antecedente digerunt cõsunctam cum vnguëtis & cerotis dictis ibidem: & sicut est hoc. *℞.* hyssopi humidi. 3. 12. ceræ citring. 3. 10. olei nardini vel camomillæ. 3. 40. medullæ cruris vituli, adipis anatis & gallinæ. añ. 3. 8. myrrhæ, bdelli, muscillaginis, fenigræci, & se. lini. añ. 3. 7. terebentinæ resinæ. añ. 3. 6. muscillagi. se. althæe. 3. 8. redigantur myrrha & bdellium in puluerem subtilem, & cû muscillagine dissoluuntur. Deinde omnia simul incorporentur cum oleo & adipe dissolutis ad ignem in casola, & fiat vnguentum, quod tepidum liniatur super pectus: vel fiat ex eis cerotum, super corium album molle extendatur. Post hæc vero omnia administrant medicinas scretivas gradatim ad fortes ascendo, ne edu-

catur sanies subtilis, & grossa inspisset, donec suffocet, vel phthisim causet. In fine vero rei totius exiccant pectus, plurimè, & cerebrum cum subfumigio ex thure, mastice, myrrha, & similibus. Item electuarium pectorale & magistrale sic fit. *℞.* iuiubæ, sebesten, ana. cētum numero, liquiritiæ mund. 3. 20. decoquantur in 4. lib. aquæ, donec medietas sit consumpta: coletur, & addatur libra 1. penid. & iterum coquatur vsq; ad spissitudinē: Deinde addatur iste pulvis. *℞.* dragaganti, gummi arabi, succi liquiritiæ, amigdarum dulcium, amyli ana. 3. 10. semi. porrula, cucurbi, melo, mund. ana. 3. iij. fiat electuarium. Cõfert passioni pectorali cum materia vel sine materia etiam cum feb. Præterea si nihil physicalium remediorum cõfert: fiat cauterium cum ferro ignito in latere læso inter 6. costam & 7. vbi est finis costarum verarum, & principium mendosarum & diafragmatis: nec trahatur sanies tota simul, sed paulatim: Et si sanies sit in utroq; latere, oportet fieri cauterium in utroq; quia materia nō potest fluere de latere ad lat., pāniculo mediano prohibente: & sit cauterium latum subtile & arcuale vel acuale. Consulo aut quod tales operationes potius relinquuntur.

Canones. Si empiia fuerit a pleuresi vel pipneumonia: cura perfitur duplici intentione, scilicet cum maturatione saniei, & mundificatione eiusdem: Si vero sit a catarrho, tribus indiget intentionibus: quoniam vtraque præd. & confortatione particulæ mandantis, ne transmittat superfluitates, & cõfortatiōe, particulæ recipiētis, ne recipiat, & hoc pstyptica. Prima igit intentio oportet, vt permittatur in ordine: ne fiat error debitæ curationis.

Prognosticatio. EMPiia & hæmorhois raro in senibus maturantur: imo suffocant ante matu-

Tractatus secundus

rationem, propter debilitatē caloris naturalis, & multitudinem materiæ cum frigiditate. Item empima cum oregmone & difficultate anhelitus plurima & sputo modico, mortale. Item empima, si non mundificetur infra .40. dies a die generationis saniei, transit in phthisim, & post in mortem.

De phthisi. Capi. VI.

PHTHISIS est vlcus pulmonis cū consumptione totius corporis a calore febrili heclico, siue calore accidentali occulto, lento. Fit autem ab omni, quod corrodit & vulnerat subtilitatem pulmonis vel velamina eius, quæ sunt decem numero. Primum est catarrhus acutus de cholera, vel flegmate salso, chronicus perdurans. Secundum est squinantia vel apostema vuulæ, quando facit rupturam, & sanies descendit ad pulmōem. Tertium est pleuretis aut peripneumonia: quando terminatur per saniationem, & sanies non purgatur infra .40. dies a die rupturæ. Quartum est retentio menstruum, hæmorrhoidarū, quæ diu in corpore retenta corrumpuntur in pessimas qualitates, & transmittunt fumos venenosos & capniosos ad pectus: hoc tamen raro fit. Quintum est frigiditas aeris inspirati constringentis membra spiritalia: vt accidit piscatoribus & viatoribus. Sextum est caliditas aeris exiccantis & scindentis partes pulmonis: sicut in fabris & aratoribus. Septimum est irregularis atq; diminuta cordis euentatio: sicut accidit habitantibus in montibus metallicis & cauernis. Octauum est tussis assidua chronica, q̄ suo motu forti rumpit velamina pulmonis: sicut accidit senibus dormire nō potentibus ex catarrho: & sicut accidit cantantibus acutius & leuantibus res ponderosas cum contentione anhelitus vehementi.

Nonum est sputum sanguinis, quod si consolidari non potest, conuertitur in saniem, quæ sua nitrositate & caliditate corrodit pulmonem: cum omnis sanies generetur ex humoribus per vñ affationis: vt ignis generatur ex lignis viridibus per viam adustionis: vt dicit Galenus in commento illius aphorismi. secundæ particulæ. Circa generationē saniei &c. Decimum est vomitus laboriosus: quia propter fortem motum stomachi & esophagi, & retentionem anhelitus, & attractionem humorum ad pectoralia rumpuntur venæ debilitate contextæ in pectore & pulmone, & proprie in habentibus membra spiritalia rara & debilitate contexta. Sed ex quacumq; causa veniat phthisis, eadem sunt eius signa, cura, & prognosticatio. Signa phthisis trahuntur ex quinque rebus. Prima est tussis: quoniam in ea fit tussis frequens, & proprie per noctem, cum proiectione sputi saniosi vel sanguinolenti. Secunda ab habitudine corporis: quia fit in ipsa collum gracile, & corpus macrum, quod de die in diem minuitur, & epyglottis eminet. Tertia a calore: quia est cum febre lenta ad tactum primum; sed acuta vehementer. I. quando mandiu ponitur super corpus, & ista febris inflammatur magis solito post sumptionem cibi per vnam vel per duas horas, quando nutritum spargitur supra membra: sicut aqua frigida super calcem viuam: quæ sunt propria signa heclicæ, vt dicit Galenus decimo de ingenio sanitatis. Quarta a pulsu: quoniam fit necessario subtilis, paruus, debilis, strictus. Quinta ab vrina: quia est subtilis non tincta, sed valde oleaginea in superficie. Hæc ergo oia cū fuerit aggregata, phthisim signat pfectā & p̄sentē. Sciendū præterea q̄ vlcus pulmonis vel est recens non confirmatum;

cuius signa sunt: quia nō expuitur sanies pura, sed sanguini permixta: similiter et est modica: quare recipit curationem & perfectam consolidationem: vel est vlcus largum & confirmatum & antiquū: cuius signa sunt: quia sputum est saniosum, purum, & liuidum, foetidum, plurimæ quantitatis: quare recipit curationem non perfectam, sed blanditiuam solum, quæ consistit in prolongatione vitæ: quod quidem fit propter assiduum motum & fortem pulmonis: quare vlcus non potest consolidari: cum ad hoc requiratur quies diuturna. Vnde refert Auicēna. iij. canoñ. fēñ. 10. capi. de phthisi, quod conseruabat quādam veterem mulierem phthisicam quatuordecim annis, & dabat ei zuccarum ros. verustissimum ad manducandum omni die, quantum sumere poterat etiam loco panis & alterius cufuscunq; cibi.

Methodus. Cura phthisis prout fit a catarrho, cōtinet in se omnes cautelas & medicinas viles atq; necessarias pro cura cuiuscunq; phthisis: quare de ipsius cura loquemur principaliter, quemadmodum Hippocrates in libro regi, acutorum, assumit pro exēplo pleuresim: veruntamen intelligit curam omnium ægritudinum acutarum, tam cum apostemate, quā sine apostemate: cum in cura pleuresis concurrant omnia-necessaria in cura cuiuscunq; febris acutæ. Cura ergo istius phthisis in duobus consistit, scilicet diætā & medicinā. Diætā est ordinatio sex rerum non naturalium ad temperamentum, declinando tamen aliquantulum ad frigidū & humidum. Aer igitur sit coopertus ab omni vento, & proprie meridionali & septentrionali. Camera eius subfumi getur in hyeme ligno aloes, vel myrrha sed in æstate storace & iunipero, cū ros. sandal. nenuph. folijs populi, vitium, & salicis: panis sic similagineus non bene

fermentatus: vtatur riso vel farre condito cum butyro: similiter & pulmento facto ex decoctione ordi ex corticati vique ad fracturam granorum, quod deinde coletur, & in colatura amyllum cōdiatur cum lacte vel butyro. Et si debilem habeat stomachum, addatur modicum de puluere cynamomi. Sed caueat a rebus acutis omnino, & proprie a pipere & sinapi: quia sanguinem acuunt, & vlcus faciunt elargari. Vtatur carnis pullorum, hoedorum, perdicum, fassianorum & magis assis quā elixis: nisi debilitas stomachi contradicat. Similiter vtatur bonis piscibus de aqua currenti petrosi preparatis cum anetho & sale, vel piscibus maris, similiter cancris pinguibus, nutritis cum lacte, ablatis primo extremitatibus & ablutis cū lixiuio perfecte. Item vtatur lacte asinino vel caprino cum mica panis, vel cum melle, vel cum zuccaro, vel modico salis: nisi fuerit venter solutus superflue: tunc enim nō ponatur sal, sed proficiantur in eo lapides igniti vique ad consumptionem sui totius: & cum ipso non vtatur diuersitate ciborum dutorum: quia corrumpetur omnino: Et decoquantur interdum carnes leues in lacte: sicut perdicum, caponum, pullorum: veruntamen oportet vt sint sape elixæ, priusquam ponantur in lacte: Et vtatur pultribus ex farina similæ vel auenæ conditis cum lacte: & iterum ex lacte & vitellis ouorum fiat sorbitio delicata: licet autem mulieris lac sit maxime proportionatum corpori nostro, tamen propter abominationem postponunt ipsum. In potu autem vtatur vino dulci & suau: vina autem fortia calida & vaporosa vel styptica & acerbā omnino deuitet: quia fortia corpus exiccant, acerbā sputū prohibent. Misceat autē vinū suū cū aqua pluuiali & zuccaro, cū qua cōuenit, vt coquant etiam sua cibaria

Tractatus Secundus.

vel cum aqua fontis vel fluminis curretis: de oleribus vtatur parum & raro: de fructibus vtatur vuis iuiubis, auellanis, sed piris nequaquam, nisi fortassis post cibum cum zuccaro conditis & assatis. Gaudeat otio, tripudijs, & gaudijs, & solatijs, ac omni quiete: quia omnis motus acuit sanguinem. Similiter clamor & vociferatio quaecumque: dormiat non super cibum, sed quasi facta prima digestionem, & iaceat erectus quasi sedens propter facilitatem anhelandi & expuendi: non in die dormiat nisi somnum nocturnum perdiderit: caueat ab ira, tristitia, & omni passione propolse, a coitu omnino absteineat. Vtatur ista tragea, *℥ss.* passularum enucleatarum partes duas: liquiritiae minutissimae incisae, se, communium frigidorum an. partem vnam. Cura autem per medicinas consistit in tribus, scilicet in remotione causae rheumaticae, & cura vlcis: & remotione accidentium, quae concomitantur. Causa autem rheumatica dupliciter curatur. Primo quidem modo cum prohibitione rerum nocentium, Secundo, cum approximatione iuuuantium. Res nocentes sunt, repletio cibi & potus, & usus vini: quae propter oportet vt non detur nisi parum: et ab aqua seruetur valde, nisi sit aqua mellis vel zuccari. Similiter a vigilia nocturna & somno diurno, & proprie super cibum, aut capite depresso. Similiter a sternutatione cum cruditate materiae: post maturationem vero est optima: & frigiditas aeris nocet & omnis vomitus, et balneari post comestionem cibi: & post ablutionem capitis oportet bene cauere a frigiditate aeris continentis: tamen conuenit quandoque balneari post comestionem, propter extenuationem corporis superfluum: quam postea dicemus. Nocet praeterea motus capitis, sed prodest motus membrorum inferiorum. Res vero iuuantes sunt quatuor. Prima est euacuatio materiae a cerebro. Secunda est di-

riuatio eius ad nates. Tertia adaequatio materiae. Quarta prohibitio fluxus ad pectus. Euacuatio fit cum pillulis cochleis famosis, quas dicemus capitulo de debilitate stomachi, cum de empirico loquemur: verum tamen non conuenit huiusmodi euacuatio propter phthisim, sed propter catarrhum, & proprie praemissa materiae digestionem cum melle rosaceo colato, & syrupo acetoso composito ex oxy melle composito, quodcumque ex eis praestito fuerit. Et oportet, vt potetur hic syrupus septem diebus assiduus in aurora dando. 3. 2. cum aqua decoctionis hyssopi, liquiritiae, cubebae, nucis muscatae, & similia, ducentium virtutem ad caput: Et his diebus calefiat omni mane caput eius cum pannis calidis, vsquequo sentiat penetrare caliditatem ad interiora. Facta autem purgatione, fiat omni septimana semel euacuatio cum clysteri attractiuo ex geralogodio dissoluto cum mellificato, & decoctione rutae, & maiorane, nisi venter esset per se solutus: Diuratur vero materia ad nates & alias partes vicinas cum pillulis diacastorei dissolutis in succo rutae, quae sic fiunt. *℥ss.* castorei, apij, croci, 22. pyrethri, eufor. elaterij, mabalhematicon leucopiperis, nigellae, staphysagriae, epithymi, spicae, ellebori albi. an. 3. 1. confice cum succo bletae, vel caulis in forma piperis: & oportet, vt corpore iacente supino, naribus ligatae vehementer: & post hoc ore aperto & facie euerfa dimittatur flegma egredi omnino. Post illud vero fiat sternutatio omni die in ieiuno cum hoc sternutatorio. *℥ss.* castorei, codisi, cubebae, ro. masticeis parte. 1. piperis longi. par. 5. musci grana. 10. Item super caput ponantur (pilis abralis) rubificatiua, sicut est emplastrum ex sinapi & melle, & stercore columbino, & sale: quod teneatur omni nocte: primo tamen calefaciendo cum pannis calidis, antequam emplastrum apponatur. Cum autem vadit dormitum

fiant fricationes circa brachia & crura: Quod si omnia ista non contulerint: fiat cauterium in commissura cranei. Adæquatio materiei fiat cum odoratiōib⁹, euaporationibus, & inunctiōibus. Odoramenta sic fiunt. ℞. storacis, calamitæ laudani, ana. par. 1. ligni aloes veri, nigellæ cucubæ, myrrhæ. aii. par. quatuor: fiat pomum cum cera & pice sufficiētib⁹ ad conglutinationem. Euaporatiōes fiunt cum milio & sale & stercore columbino facto super caput tempore calido: Si vero talis euaporatio vigilias educeret: fiat solum cum ligno aloes storace, calamita, et cum prædicta medici-
na. Vnctiōes autē fiunt circa extrema & testiculos cū oleo sambucino & oleo de lilio & similib⁹ desiccantib⁹. Et caput epithymetur cum costo, spica, myrrha, & paucō castoreo tritis subtiliter & in oleo ros. dissolutis. Prohibito autem fluxus completur sex rebus. s. gargarisatione, subfumigio, retentis in ore odora-
mentis, deglutitionibus, & ijs quæ lambūtur. Gargarismata fiunt cum vino decoctiōis olibani, aut san. draconis, aut masticeis: aut dragaganti. Fiant etiā formæ sicut auellanæ ex eis, cum qbus fiat subfumigatio ex storace sicca, & olibano, & xiloaloes, & san. draco. simul mixtis. Retenta in ore sunt. ℞. olibani, dragaganti, myrrhæ, croci, spicæ, masticeis, storacis. aii. par. 1. opij tertiam illius partē. Fiant formæ similes lupinis, & teneantur in ore, præterquā q deglutiantur saluæ eorum. Odoramenta sunt. ℞. ligni aloes boni & electi parres. 6. galliæ muscatę p. 3. ambre bonæ. partes. 2. muschi. p. 6. fiat ex eis pomum cum glutino dragaganti, & odoretur. Quæ lambuntur & deglutuntur sunt. ℞. thuris, masticeis. par. 1. myrrhæ, opij, croci. aii. p. illi tertiam. liquiritiæ. p. 1. fiant pillulæ, & administrentur. Et hæc quidem sufficiant de prima parte curæ principalis p. medicinas,

quæ fiunt circa remotiōem causæ catarrhi. Videamus consequenter de secūda, quæ est vlcērum desiccatio & consolidatio: sed quia exiccatio nō potest fieri, nisi sanie mundificata: oportet primo mūdicantia catarrhum & saniem præmittere. Ad saniem autē vel catarrhū de peccatore educendum quatuor fiunt medicina. s. syrupus, electuariū, trochisci, et pillulæ. Syrupus. ℞. liquiritiæ. 3. ʒ. capill. veneris. 3. i. hyssopi siccæ. 3. i. & 6. proijce super illud quatuor lib. aquæ, & dimitte per diē & noctem: deinde coquantur ad medium: Postea proficiatur super illud mel, zuccarum, penid. omnium. aii. 3. 8. aquæ ros. 3. 6. & 6. & cum aqua zuccari, vel cum aqua ficuū administrentur. Electuariū est. ℞. papaueris alb. spodij, se. lini torrefacti, croci, amigdalarū dulciū. aii. 3. 3. amydi, dragaganti, gummi arabi. se. citoniorum, seminis bombacis amigdalarum amararū, fabarum. aii. 3. 1. & 6. penid. 3. 70. dissoluatur penidiæ in aqua fontis, & coquantur, & consiciantur cū eis res prædictæ. Dos. 3. 1. cum aqua mellis. Pillulæ sunt pillulæ bikikię diuersæ addita hyssopo in eis, quas infra dicemus. Ad vlcērum autem consolidatiōnem cum tempus affuerit, quod erit mūdicato ipso a sanie, possunt fieri quatuor remedia. s. sorbitio, mellicratū, cōfectio et suffumigiū. Sorbitio fit ex pultrib⁹ supra dictis. Mellicratum sic fit. ℞. san. draconis, boli armenici, terræ sigillatæ, dragaganti, aii. partem. 1. bulliant cum aqua & melle, & fiat ex eis mellicratū. Dosis, 3. ʒ. cum aqua decoctionis passularum. Cōfectio fit, sicut diacymnū cū athanasia mixtum. Suffumigiū cum traiectorio sic fit. ℞. arsenici, piperis. aii. p. equales. fiant ex eis formæ, sicut auellanæ cum albumine oui. ¶ Restat modo videre de tertia. principali, de remotiōe scilicet accidentium possibilium cōcomitantium hanc egritudinem, & sunt

Tractatus secundus

multa, scilicet feb. consumptio corporis totius, fluxus sanguinis per sputum: fluxus ventris: constriction ventris: difficultas anhelitus: debilitas digestiue et appetitiue. Feb. autem si superueniat & consumptio totius corporis, turatur cum diætâ humida, & cum exhibitione lactis a sinini vel caprini. Modus autem traditur a Galeno septimo de inge. sanitatis: & ab Auicenna tertio canon. decimo capitulo de cura vlceris pectoris, & pulmonis, quam plene scribemus capitulo de feb. hectica, si deus voluerit. Verumtamen prout nunc sufficit, præmittatur balneum aquæ dulcis: deinde cum exierit: detur lac ad porandum vsq; ad 5. vel 6. 3. & vngatur totum pectus & dorsum cum isto vnguento. Recipe populeon par. 2. butyri recentis partem 1. incorporentur simul cum oleo rosæ. Aut vngatur cum aliquo solo ex eis si prælo singula non habeantur: vel fomētetur cum pannis mollibus infusus in lacte recenti, vel cum huiusmodi. Recipe musciclaginis psillij, musciclaginis dragaganti & semi. citoniorum. olei viol. lactis añ. partes æquales: & post balneetur iterum, cum lac videtur esse digestum, quod forte esse poterit transactis tribus vel quatuor horis post assumptionem lactis. Aliquando autem si velles augere creatum, cum lacte, oportet miscere puluerem cancrorum adustorum & hyssopum. Si vero feb. augeatur post exhibitionem lactis: tunc non detur lac, nisi de quo sit extractum butyrum. Fiat præterea epithyma super epar. Recipe tamarindorum, absinth. solatri añ. par. ij. spodij. par. 1. camphoræ, par. f. bulliatur hoc totum in tribus partibus aquæ & in parte 1. aceti & epithymetur epar cum petijs infusus & aliquantulum expressis tepidis: caueat tamen, ne tangat diafragma: quia propter frigiditatem induceret malitiam anhelitus,

vel spumofam vel saniosam. Et aliud epityma fiat super cor. 18. se. ros. buglossæ, boraginis añ. partem vnam, margaritarum partes duas, bulliantur primo semina in 12. partibus aquæ rosæ, & parte vna aceti: & post hoc addantur margaritæ, & in ipso tepido petiæ imbibitæ de sindone vel de scarlato frequenter super cor ponant. Cauendum tamen semper, ne fortassis malitiam anhelitus inducat propter causam dictam: tunc enim remoueat, & fiat inunctio ex croco, & butyro, & detur prædictus syrupus creatiuus: Detur præterea electuarium restaurarium de testudinibus, quod sic fit. 18. liquiritiæ, ros. zuccari añ. vnciam vnam: floris vuæ agrestis, vnciam f. succi liquiritiæ, amydi, portulacæ, seminis lactuæ, seminis scariorum, añ. vnciam f. gariosi. dragmas decem cynamomi dragmam vnam, zz. floracis añ. dragmas duas, croci dragmam vnam penid, vncias duas, seminis melonis, cucur. cucumeris, citruli, añ. vnciam vnam & f. seminis citoniorum. 3. tres, amigdalorum, pinearum, sebesten. añ. 3. vnam seminis maluæ viol. añ. dragmas duas. Conficiantur cum syrupo rosæ & vtatur hoc modo, quo voluerit. Si autem vis ponere testitudinem, decoquat testudo bene, postea pistetur & exprimitur, & ponatur colatura cum rebus prædictis & potetur syrupus rosæ. si venter non sit constipatus sed solutus: sed syrupus viol. si sit constipatus. Item potest fieri vestitus quædam de subtilissimo corio albo continens pectus & dorsum, quæ tota perungatur ex musciclaginibus prædictis, & æger ipsam teneat in dorso post exitum balnei prædicti. Ad tumorem ped. fiat ablutio de nocte, cum vadit dermitum, ex aqua decoctiouis saluæ, & camomillæ. Ad fluxum sanguinis per sputum vel aliam regionem, fiant trochisci huiusmodi. 18. terræ sigillatæ 3. tres: boli

armenicorum ros. rub. añ. 3. decem: carabæ, granorum myrti. añ. 3. 15. coralli, dragaganti, spodij, languinis draconis, lapidis hæmatitis. añ. 3. quinque. gummi arab. succi liquiritiæ. añ. 3. septem. Conficiatur cum portulaca & aqua rosacea: & conficiantur ex eis trochisci 3. vnus: de quibus bibatur vnus cū aqua cisternæ, vel aqua pluuiali. Caue tamen semper, ne per hæc styptica sputum prohibeatur omnino, vel fiat difficultas screandi superflua: imo quando hoc vides, statim redi ad screatiua, ita vt modo ad styptica, modo ad screatiua procedatur: vt sic fiat vlceris vicissim mūdificatio, & sanguinis restrictio perfecta. Ad fluxum vētris, si contingat: fiat pulvis iste restrictiuus. ℞. gummi arabici, spodij, bol. armenici, seminis myrti. añ. 3. vnam: dentur omni die de ipso 5. tres, cum syrupo de papauere, vel syrupo rosaceo, vel rob myrtino, & ponatur in lacte eius zucarum modicum, respectu temporis prioris, quia secessiuus est, hoc est, prouocat secessum. Si autem venter non lenitur, sed est constipatus: tunc multiplica sal in lacte, & leniatur cum syrupo viol. in quo dissoluatur mannæ, aut cassiæ fi. 3. 6. Ad difficultatem anhelitus, fiat inunctio cum butyro, circa pectus, in quo si vis, potes addere aliquod croci propter confortationem cordis: vel vngatur pānus subtilis aut lana cum butyro, & pectori superponatur. Et tunc vratur omnibus medicinis supradictis screatiuis postponendo stypticas. Et vniuersaliter scire debes, qđ quando simul adueniunt duo accidentia contraria, vt fluxus sanguinis, & difficultas anhelitus: tūc oportet intendere fortiori, & quod magis timetur reliquum dimittendo, donec primum mitigetur. Verum si contigerint ambo simul æqualiter augmētari, tunc æger in itinere mortis est: quare prognoſti, relinquitur. Ad debilitatem digesti-

uæ stomachi fiat suffumigatio pannorum cum ligno aloes & masticis & thure combusto super carbones, & supponatur stomacho actu calidum: Et deferat assidue puluinar paruum de plumis super ventrem. Ad confortationem appetitiuæ fiat aliquando epithyma super stomacho ex ros. mastiche, ablynthio, & vino citoniorum bullitis in aqua & modo dico aceti: vel vngatur stomachus ex oleo costino & oleo masticino, & modo co puluere gariofil. mixtis & calefactis perfecte in vase duplici.

Emperica. Licet intentiones in cura phthisis sint diuersę, prout in canonibus dicemus: Præcipue tamen est intēdendum circa catarrhum restringendum cum stypticis, & circa vlceris mundificationem cum screatiuis. Pillulæ bikiKix ad screandum, sic fiant. ℞. succi liquiritiæ, zuccari. añ. dragmas decem amyli, dragaganti, amigdalatum excorticatarum 3. quinque: informentur pillulæ, & teneatur vna sub lingua, & deglutiatur eius salua: quia screare facit. Pillulæ screatiuæ ad catarrhum, sic fiant. ℞. storacis dragaganti, oliban, seminis ros. granorum granatorum, berberis, opij, ana, partes æquales: informentur pillulæ ad modum lupinorum, ex quibus vna vel duæ patienti dentur, & aspergantur cum muscillagine seminis citoniorum in fero, quando æger vadit dormitum, quia catarrhum restringunt. Electuarium præterea sublimē ad consolidationem vlceris pectoris & pulmonis & eius mundificationē sic fit. Recipe succi ligritiæ 3. 10. hyssopi, capilli veneris, siccor. semi. vrticæ ireos, ana, 3. 5. seminis feniculi 3. quatuor, pulueris plantaginis sicca 3. 10. ros. rub. sicca 3. 5. pulueris cancrorum adustorum 3. 15. coralli, spodij, ana, 3. quinque, mellis ros. quod sufficit: conficiatur. & fiat electuarium. Mel autem coletur, teneatur autē

Tractatus secundus.

in ore, vt lambendo descēdat. Confectio trochisci de papauere, qui sunt vtilēs ad mundificandum pectus a sanie. ℞. se. papaueris albi, medullæ, cucurbitæ, & citruli, ana, 3. 8. amyli, dragaganti, gummi arabici, succi liquiritiæ, ana, 3. quinq; thuris, holi armenici, sanguinis drac. ka rabe, ana, 3. duas, myrrhæ, cinamomi, opij, ana, dragmā vnam: siā trochisci cum rob de vino, & sit vnuquisq; dragmarum duarum: sumatur vnus mane & sero cum rob de myrtis. Ex confectio nibus præterea sublimibus ad mundificandum vlcus per screatum, similiter & ad consolidandū atq; caratrum restrin gendum est diagragantum famosum & vlitatum: quoniam est lenitium, hume ctatium, infrigidatium cum stypticitate occulta infixa. Sed ex mundificatiuis delectabilibus & proprie in corpori bus debilibus & delicatis, est diapenid, quemadmodū ex creatiuis fortibus acu tis & proprie cum accidit alma ex spu to retento, diaprassium, diacalametum & diayris, ex quibus lambatur frequen ter. Quod si quādoq; per huiusmodi ele ctuaria sputū superfluxerit, vel sanguis exierit cum sputo: abstinedum est ab eis penitus & intendendum restrictiuis. Suf fumigium subtiliās sputum grossum in pulmone sic fit. ℞. aristologiæ rotundæ, myrrhæ, storacis, thuris añ. 3. vnam, ar senici rubei 3. tres. Fiant pillulæ cum bu tyro vaccino ad modum auellanæ. Et cum tussis fuerit difficilis & sine sputo, ponatur vna super carbonēs, & fumus omnis capiat. In phthisi præterea, cuius vlcus est recēs, ira q; adhuc expuitur: po test fieri si ebomotia diuertēs a principio de vena mediana, vel basilica: si virtus & ætas consenserint, vel ventosatio in natibus, sed non in spatulis: ne forte pec tus anxietur. Similiter & super adiuto ria, super cubitum sine scarificatione. In phthisi similiter, si vēter restringatur: sic

ri potest clystere lenitium dictum capi tulo de frenesi. Et si necesse fuerit: potest laxari cum 3. vna mannæ, vel cū 3. vna medullæ cassiæ fistulæ dissolutæ in aqua decoctionis ordeī vel prunorum: sed nō dētur medicinæ acutæ: quia acuerēt san guinem, & augmentarent vlcus, nisi for te cum duobus prædictis poneretur reubar. 3. f. in substantia, aut 3. ij. in infusio ne: quia licet reubarba. acuat sanguinē per se, verū tamen infrigidat p accidēs, educēdo choleram. Cibus præterea mun dicatorius est sumere sæpe in ieiuno & hora maioris quietis, & proprie si non sit complicatio feb. putridæ, lac recens asinae vel capræ cum zuccaro, in quo sit ali quid thuris, vel san. dra. vel zuccari ros. veteris. Sed cibus nutritiuus & consoli datus conficitur, si ponantur cancri vi ui ex aqua bona capri, vel pisces petrosi parui in lacte recēti caprino, vel in aqua ordeī, donec repleātur. Deinde in eodem lacte coquantur, & comedantur: vel si potetur lac recēs vstulatum cum calibe ignito. Similiter & si pulkes ex farina or dei, vel risi, vel similis, vel amyli confici antur cum eodem. Sed confortatiuis, nu tritiuis, cibus mundicatorius, & consoli datus, est lac capræ pascentis herbas frigidas & bonum serum, cum bibitur recens atq; calidum ex mamillis per se sine addito, & proprie in ieiuno, vel ho ra maioris quietis, si stomachus in ipsa delectetur, neq; se. putrida complice tur. Quoniam in lacte trina substantia repe ritur. Prima serosa frigida et humida de natura aquæ: quare mūdificat, & abster git. Et licet aliqui dicant, q; sit calida & sicca: intelligūt hoc prout eis commisce tur coagulum: sicut accidit in sero, cuius caseus est extractus. Secunda vero buty rosa calida & humida: quapropter in carnat. Tertia caseosa frigida & sicca, quæ cōsolidat perfecte. Ex confectio nibus sublimibus præterea, est zuccarum

rof. purum vel sic mixtum. ℞. zuccari
rof. lib. 1. Karabæ, margaritarum non
perforatarum, ossis de corde cerui, san.
draco. añ. 3. 1. macis, croci, opij. añ. 3. f.
miscantur, & de ipso sumat omni ma-
ne & sero ad modum nucis magnæ: ga-
calorem reprimat, corpus reficit, & vlc-
constringit, & proprie si fuerit vetustum
per annum integrum referuatum. Et vir-
tutis propinquæ & consimilis est dia-
radon abbatis. Sed ad extinctionem ca-
loris fe. & sitis vehemētis, & inflamma-
tionis epatis & stomachi, conferunt tro-
chisci de camphora, qui sic fiunt secundū
Hebemeſ. ℞. fof. rof. 3. 4. spodiij. 3. 2. san-
dalci. 3. 2. & f. croci. 3. 1. succi liquiritiæ. 3.
2. semis, citruli, melonis, cucumeris, cu-
cubitæ, dragaganti, spicæ, añ. 3. 1. ligni
aloes, cardamomi, amyli, caphoræ. añ.
3. 1. zuccari, tabazerih, tereniabin. añ.
3. iij. Confice cum muscillagine psillij &
aqua rosarum. Et si in descriptione au-
gentes spodium ad. 3. 4. & se. portulacæ
ad. 3. 2. vocabunt trochisci de spodio: &
tunc fiunt magis infrigidatiui, & extin-
ctiui. Fiunt autem aliter trochisci huius
modi. ℞. spodij. 3. 4. rof. 3. 7. se. maluæ,
se. portulacæ, cucubitæ, dragaganti, spi-
cæ celticæ, gummi arabici, liquiritiæ, li-
gni aloes, cardamomi. añ. 3. 4. croci. 3. 2.
camphoræ. 3. 2. conficiantur cum muscil-
lagine psillij: & detur vnus sero cum itur
dormitur, cum syrupo rof. & aqua psil-
lij. Contra sanguinis fluxum superfluum
cū sputo, dētur trochisci de Karabæ: qui
sic fiunt. ℞. Karabæ gūmi arabici, iac-
cæ, balausticæ, hypocistid. ana. 3. s. thuris
3. 2. opij. 3. 1. fiant trochisci cum muscilla-
gine psillij: detur 3 vna cum 3 vna acue-
suma. Et descriptio fortior & melior
eorum est hæc. ℞. sanguinis draconis,
thuris, ana. 3. tres & 3. vnum. Karabæ 3
quinq; lapidis hematitis, terræ sigillatæ
añ. 3 quatuor, alumis. 3. 2. & f. balausticæ
3. iij. opij. 3. 1. fiāt trochisci cum succo plā-

taginis, vel portulacæ: & sit quilibet 3.
1. vel 6: detur cum aqua decoctiōis plā-
taginis vel portulacæ.

Canones. Phthisis græce, cōsumptio
est latine: Quapropter oīa
consumptio corpori nostro superueniens
poreſt phthisis nominari. Propter quod
scendum est, qđ phthisis laige sumpta ē
duplex, scilicet naturalis & innaturalis.
Naturalis est illa, quæ accidit senibus &
defectis ex ætate. Innaturalis est duplex
vt dicit Isaac libro suo de fe. quia quæ-
dam est cum fe, quædam est sine feb. Illa
autem quæ est sine feb. est duplex. Nam
quædam est, quæ fit a causa calida: vt
quando aliqui fumi adusti expirant ad
cor, & consumuntur humiditates capſu-
læ cordis prout accidit illi simia: de qua
loquitur Gale. 2. de interioribus. Non em̃
qualibet cordis inflammatio est feb. li-
cet sit econuerso. quædam vero a causa
frigida: vt patet in hectica senectutis:
Hæc enim est mala complexio frigida,
sicca valde, quæ opponitur nutritiōi:
quapropter in ipsa corpus consumitur,
& accidit vt plurimum corporibus me-
lancholicis per naturā. Quæ autem est
cum fe, est duplex: quædam enim fit per
se incipiendo, & est de numero eorum,
quæ raro contingunt: vt dicit Gale. 2. de
crisi. circa finem. Alia vero consequen-
do ægritudines alias, & hoc dupliciter:
quia vel consequitur fe. & ita fit vt plu-
rimum. Nam (vt plurimum) om̃is feb.
putrida, quando prolōgatur, tendit ad
hecticam & arefactionem: quia mēbra
radicalia inflammantur propter diuē-
nam inflāmmationem spirituum & hu-
morum: vel consequitur pleureſim, &
pneumoniā, aut aliq̃ aliā decē causæ
in principio cap. positarum, et sic sum ē
in presenti. Item sciendum, quod in cura
phthisis oportet medicū inspicere ad sex
intētiōes. Quæ prima est, ad mōdifica-
tionē vlcis: a sanie: ga vlcus est vuln-

Tractatus Secundus.

compositum cum sanie: quapropter nō cōsolidatur, nisi prius excicetur: vt dicit Gale, in tegni ca. de cura solutionis continui compositæ: & sic competunt acuta riptica, velut sunt hyfopus, præssum, & squillia: secunda vero ad consolidandū vlcus mūdatur, & sic competunt sicca glutinosa, vt trochisci de karabe. Tertia vero ad prohibendū cōsumptionē corporis, & sic competunt humida nutritiua: vt lac, carnes & similia. Quarta vero ad extinguendum calorem febrilem & sitim, & sic competunt frigida om̃io: velut trochisci de camphora, & vnguentum populeon & similia. Quinta, ad mitigationem doris, & sic cōpetunt anodina, vt camomilla: vel narcotica, vt opium. Sexta est ad restringēdum catarrhū in capite: & sic competunt emplastra rubificatiua super caput: & sic patet, quare autores vtuntur medicinis contrarijs in capitulo phthisis.

Prognosticatio. Phthisis antiqua nō recipit curationē veram sed blandiriuiam & dilatoriam, sicut nec prima species hecticæ. Item quādo sputum phthisici cadit super terram calidam, vel lapidem, vel carbones, & foetet: mortale est. Caue tamen, ne illud sit propter empima: quia & illud foetet. Oportet igit, vt sit foetor grauis, velut corium assūm: quoniam sic accidit propter substantiā pulmonis. vnde Hippo. s. parti apho. Qui a phthisi molestatur, si sputum quodcumq; spuunt, graue foetet super carbones effusum, & capilli de capite fluunt: mortale. Si sputum phthisici ad fundum aquæ ceciderit: significat vlcus confirmatum: nisi acciderit fortassis propter flegma grossum cōmixtum sputo. Distingue ergo inter saniem & flegma. Si vero nater in medio: tunc vlcus tēdit ad confirmationē. Quod si locum supremū obtinuerit vlcus, significat recenter inchoatum cum

bona spe salutis. Item dicit Aul. In multis eribus, pueris, & senibus, & carnosissimè test phthisis lōgo tēpore palliari. Item Hip. s. parti apho. A phthisi habiti diartia supuens, malum. Itē si cōperint capilli cadere, vngues incuruari, appetitus prosterni, anhelitus fieri difficilis, & os foetere, & sputū retineri, vter fluere, crura inflari: propinquus est mori. Itē phthisici plurimū moriūtur in autūno: sicut et hecticici. vñ Hip. 3. parti apho. autumnus phthisicis malus. Et cauendū est medico in cura phthisicorū & hecticorū, quā moriendo loquunt, & loquēdo moriūtur. Itē viris et mulieribus ab anno. 1. s. vsq; ad 35. si phthisis supuenerit, raro curat, & raro occulat, propter caloris innati feruorē: ante vero & post raro fit, & plurimū occulat. vñ Hip. s. parti apho. phthisis fit maxime ætatis a. 18. vsq; ad 35. annū.

De sputo sanguinis & emoptoica passione. Ca. VII.

Sputum sanguinis potest provenire a quatuor locis, scilicet stomacho, pectore, capite & gingiuis. Et si quidem a stomacho & pectore, emoptoica passio nuncupatur. Signa eius, cū euenerit a stomacho, sunt, quia fit cū vomitu, & sentitur grauitas in stomacho, & forte antecessit retentio mēstruorum, & hæmorrhoidarum, vel fuit sanguinis fluxus a toto corpore, qui sine regimine naturæ regurgitat ad epar: deinde per mēsteraicas ad intestina deorsum, vel ad stomachum sursum: sicut accidit membrum habentibus mutilatum: quia tūc virtus sanguificatiua epatis corpori nō proportionat. Signa ei⁹, cū venerit a pectore vel pulmōe, sunt: quia venit cū tussis forti, & sentitur grauitas in pectore: quia si sit a substantiā pulmōis, erit sanguis paucus, & spumofus. vnde Hippo. parti. aphorif. Quicumque sanguinem spumofum expuunt, ipsi ex pulmone fit

eductio. Si autē a ruptura venæ: erit san-
plurimus & lucidus. Signa eius, cum ve-
nit a capite, sunt: quia venit cum rascia-
tione absq; tussi. Signa eius, cū sit a gin-
tione, sunt: quia gingivæ apparent san-
guinolentæ semper, scilicet quando le-
uiter tanguntur: & de istius cura dicem⁹
capitu, de foetore oris.

Methodus. Cura eius, quæ sit a stoma-
cho, est vt primo fiat di-
uersio sanguinis per flebotomiam salua-
tellæ, quæ est in manu inter anularem di-
gitum & auricularem, & per flebotomi-
am saphenæ in pede, in prouocandē mē-
struorum & hæmorrhoidarū, et prohibitio
ne vomitus omnino. Oportet autē, vt fle-
botomia sit frequens, non multa simul,
nisi sanguis exuberans videatur super
totum corpus. Post ista vero ponatur ve-
tosæ siccæ super epas: ligentur extrema
dolorose: primo quidē inferiora, & post
hoc superiora. Aspergatur pedes & ma-
nus ex aqua calida: & eorum cibi sic sty-
pticus conditus cum agresta vel vino
granatorū acetosorū, vel aqua sumach,
vel myrtorum. Bibat vinū tubeū acer-
bum lymphatum cum aqua fluuiiali &
plantaginis. Vtatur diacitonion facto
sine speciebus post cibum, recipiat omni
die vnum trochiscum in aurora, vel an-
te cenam cum syrup rosæ, vela qua myr-
torum, qui sic fit. ℞. boli armenici,
gummi arabici, balauitig, sanguinis dra-
co, thuris, masticis. añ. 3. i. fiant trochisci
cum vino granatorum, vel agresta, vel
aqua plantaginis: quorum quilibet sit. 3.
i. Super stomachum ponatur cerorum
illud. ℞. mummiæ, masticis, thuris, nu-
cis cypressi, boli armenici, sanguinis dra-
co. añ. 3. i. picis naualis, & laudani ceræ
ana. 3. quatuor: dissoluantur omnia ad
ignem in casola, & extendantur super
corium. Balneetur in aqua tepida, frice-
tur sale & sulfure: quoniam materias re-

solvit, & ad circumferentiam attrahit,
simul & sudorem procurat. Cura eius,
prout venit a pectore, est vt primo di-
uerratur materia per flebotomiam ba-
silicæ in manu, & ventosatiōem in na-
tibus non in spatulis, ligentur extrema.
Mundentur postea membra spiritalia
cum electuarijs & Iohoch & syrupis scre-
atiuis dictis capitu, de phthisi: deinde cō-
solidentur cum stypticis ibidem. Diate-
tur sicut phthisicus. Quod si istud spū
perseuerauerit, & cum se. lēta fuerit: fix-
am phthisim significat. Vtā ergo zuc-
cario ros. veteri per se, vel sic. ℞. zucca-
ri ros. partes. 20. Karabæ, boli armenici,
hypocistid, sang. draco. añ. p. 1. opij, ma-
cis, croci, papaueris albi. añ. par. f. teran-
tur, & miscantur. Quod si forte ficare vo-
lueris in stypticado atq; consirigendo,
adde dragaganti, coralli alb. & rub. aca-
tie, gūmi arabi. torrefactis sup priuas,
terræ sigillare, margaritarum & similū.
Conferunt præterea trochisci de Karabæ
dicti capitulo de phthisi: & alios dicem⁹
capitulo de mictu sanguinis, fortiores.
Conferunt etiam linimentum super pect⁹
si fluxus sit ex pectore & pulmone: Simi-
liter & super stomachum, si sit ex stoma-
cho: quod sit eisdem trochiscis dissolutis
in succo plantaginis & portulacæ, et mir-
tilli, & harbæ hircinæ. Ipsa namq; habēt
propriatē restringēdi omnem fluxū.
Teneat in ore continue portulacas, vel
plantaginē recētem. Bibat vinum ru-
beum, stypticum lymphatum cū aqua
mirtillorum, vel extinctiōis calibis. Ca-
ueat a cibis acutis, parum loquatur et
tacite, semper faciat quasi erectus. Sit
semper in loco temperato declinante
versus frigidum. Cura eius, cum venit
a capite, prædictis est facili⁹, in qua
non cadit timor: quoniam vt pluri-
mum illud rectificat natura per se: ve-
rum si superfluat, fiat flebotomia ce-
phalica: Deinde gargariset succū solatri,

Tractatus secundus

vel plantaginis dissolutum cū aqua de-
ctionis sumach, & myrtorum vel oxy-
zacari, vel diamoron propter repercus-
sionem. In declinatione vero cum melle
ros. vel zuccaro ros. & aquis eisdē. Vt
tur stypticis in cibo & potu, vt est panis
azymus, vinum rubeum ponticum, len-
tes excorticatæ, & similia.

Emperica. Syrupus purgans pectus et
pulmonē cum sputo & cō
solidans vlcus, quod est in eis, sic fit. *℞.*
succū portulacæ & plantaginis, consoli-
dæ maioris, vngulæ cabal. succi myrti,
añ. 3. 4. bulliantur in istis succis istæ res.
℞. thuris sang. drac. añ. 3. iij. karabæ. 3.
1. lap. hæmatitis, terræ sigillatæ añ. 3. 10.
aluminis scissi, myrtihæ, balauftiæ añ. 3.
iij. reubarb. 3. ij. Postea etiā addatur istud
℞. hypocistid. 3. 1. & f. ro. rub. 3. vnam,
boli armenici, pulueris de cornu cerui
vsti añ. 3. 1. et f. opij 3. vnam, zuccari lib.
vnam, fiat syrupus bene coctus & clari-
ficatus: detur de ipso omni mane 3. vna,
vel duæ cū duplo aquæ puræ, vel aquæ
plantaginis, vel aquæ dragaganti, & cū
eadē aqua lymphetur vinum suum. Pil-
lulæ sublimes ad sputū sanguinis restrin-
gēdum, sic fiunt. *℞.* boli armenici, gum-
mi arab. dragaganti añ. 3. 1. penid. 3. ij. re-
rantur omnia subtiliter. Et si sanguis ve-
nit de pectore vel pulmone, conficiantur
pillulæ latæ subtiles cum muscillagine
dragaganti infusi per noctem in aqua or-
dei, quas patiens teneat assidue in ore, vt
sic paulatine dissolutæ redundēt ad spiri-
tualia cum salua. Si vero sanguis venit
a stomacho & nutritiuis partibus: confi-
ciantur pillulæ cum muscillagine gūmi
arab. dissoluti in succo plantaginis, &
dentur in potu omni die in ieiuno cū aqua
pluuiali, in qua ferrum candens sit extin-
ctum. Aut detur idē puluis cum ovo for-
bili, aut ex ipso & farina similæ & albu-
minibus ouorum fiant tortellæ, & in ci-
bo ministrētur. Aut clystere fiat ex ipso,

si fuerit vitio intestinorum: quoniam cō-
fert omni fluxui per quācūq; regionem
fuerit. Item puluis restringēs omnem flu-
xum sanguinis ex quocūq; loco siue su-
matur per exterius, siue per interius. *℞.*
Karabæ, boli armenici, balauftiæ, san-
guinis dracon. lacca, añ. part. æquales:
dentur 3. ij. cum aqua infusionis sumach
3. 1. opij recētis sexta pars 3. vnus: valet
sputo sanguinis, fluxui sang. narium, dy-
senterijs, menstruis, hæmorrhoidis, vul-
neribus, quæ sunt cum hæmorrhologia
plurima: quia sanguinem ingrossat, &
ora venarū stypticat. Item trochisci con-
strictiui & consolidatiui sic fiūt. *℞.* gum-
mi arabici, dragagati, se. portulacæ añ.
3. 5. boli armenici, terebentinæ, scariolæ,
terræ sigillatæ añ. 3. 6. hypocistid. acarie,
cornu cerui combusti, balauftiæ, ficuum
siccarum, cupularum glandium, extre-
mitatum ramorum rubi añ. 3. 4. lapidis
hæmatitis lori 3. 4. Karabæ ros. myrtilli
añ. 3. iij. se. papaueris alb. 3. 6. cancrorum
adulstorum 3. 15. coriādi assi 3. ij. fiat pul-
uis cribellatus, cōficiatur cum aqua ros.
vel succo plantaginis. Et adde si vis se,
lini torrefacti, & lentium excorticatæ
añ. 3. 6. Valet sputo sanguinis, dysente-
riæ, lienterijs, diarrijs chronicis, et vniuer-
saliter omni fluxui superfluo per quācū-
que corporis regionē. Detur vnus in au-
roram cum aqua plantaginis vel pluuiali.
Idem operantur trochisci de Karabe Al-
mañ. & dantur eodē modo cap. de phthi-
si. C. de empericis.

Canones. Scias, q̄ cura istarum trium
passionum, scilicet empima-
tis, phthipsis, sputi sanguinis conueniunt,
& differunt. Conueniunt quidem: quia
in qualibet earum oporet medicum ha-
bere duas intētiōes: primam scilicet in-
mundificando saniem & sanguinem p
sputum: secundam in consolidando so-
lutionem continui saniosam quæ vlcus
dicitur: quemadmodum solutio cōtinui

Simplex sine sanie, apud medicos vulgo appellatur. Sed differtur, quia in cura empyematis oportet esse maiorem intentionem in mundificando quàm in consolidando: propterea quod in empyemate nondum est factum vlcus, sed est futurum fieri, si non purgata fuerit sanies tempore certo. Et per empyema intelligo etiam pleuresim & peripneumoniam, quando terminantur per saniationem. In cura vero sputi sanguinis oportet principaliorem esse solitudinem in consolidando quàm in mundificando: eo quod sanguis est humor beniuolus, si non corrumpatur. Verum neque per hoc vlcus neque sanguis negligatur: esse forte dilatetur propter continuum et fortè motum pulmonis in anhelando. Sed in cura phthisis ambæ intentiones sunt æquales: ex eo quod ibi sunt simul sanies & solutio continui, æque principaliter: ut patet per diffinitionē phthisis supradictam. Ex hoc autē cāss. sequitur alius, & est, quod omnes medicinæ istorum trium capitulorum sibi mutuo suffragantur, cum morbi non differant, nisi secundum magis & minus, prius et posterius.

Prognosticatio. Ad sputum sanguinis si non restringatur infra 14. dies vel 20. ad plus, sequitur sputum saniei, & per consequens phthisis. Vnde Hippo. 7. parti. apho. In sanguinis sputo saniei sputum, malum & parum post catarrhi in superiori ventre, id est, pectore in saniem conuertuntur in 20. diebus. Item screatus sanguinis, similiter & vomitus periodice factus, & cū alleuiatione, infirmum liberat a multis malis passionibus, scilicet hydropisi, lepra, phthisi: quemadmodum & menstruorum fluxus, ventris & hæmorrhoidarum, & fluxus sanguinis naturalis ut dicit Auer. 3. colli. quapropter nullatenus restringatur: imo si fuerit difficilis restrictus, propter san. condensationem, prouocetur cum acutis, verbi gratia. Si venit

a stomacho, detur sinapis, piper, & gal-
langa. Similiter & ex cōpositis diatrion
pipereon, diagallāga, diaciminum cum
vino veteri amaro: quoniam sanguinē exco-
quunt. Quod si venit a pectore vel pul-
mone, detur ireos hyssopus & squilla. Ex
cōpositis diacalamentū, diaprassium, et
diatris. Si vero fluxus huiusmodi fuerit sympto-
maticus utpote superfluous, aut inordina-
tus, aut ægri virtutem diminuēs, pro vi-
ribus restringatur, ne foras ad hēcticā vel
phthisim deducat, et foras ad hydro-
pissim propter infrigidationē. Itē Hip. 3.
parti. apho. Mulieri sanguinem vomēt
menstruis superuenientibus solutio fit.

TRACTATUS TER tius secundæ sectionis.



Ordis passiones famo-
sæ sunt quatuor. Prima
est debilitas. Secunda
syncopis. Tertia tre-
mor siue iectigatio.

Quarta dolor & aposte-
ma. Cum autē dico cor, intelligo capsu-
lam cordis, & humiditatem contentam
in ipsa madefacientem cor assidue, ne
propter motum continuum & calorem
exiccetur.

De debilitate cordis.

Cap. I.

Debilitas cordis appellatur, quan-
do corpus deficit sine manifesta
causa in omnibus suis virtutibus
& propriis vitalibus, & marasmatum &
consumitur vel discoloratur: & operati-
ones eius præcipue vitales debiles exi-
sunt, nullo aliorum membrorum læso
sensibiliter. Fit autem ab omni specie ma-
læ complexionis, quæ sunt octo: quatuor
quidē simplices, scilicet calida, frigida,
humida, & sicca: & quatuor compositæ
ex his. Et loquimur nunc de mala com-
plexione sine materia: quæ de ea, quæ est

cum materia loquemur ca. de apostema
te cordis. Signa debilitatis cordis a cali
ditate accidentali, sunt vehementia calo
ris circa pectus: sitis vehemens, quam si
tim magis extinguat frigidus aer q̄ a q̄:
pulsus magnus spissus, nisi virtus sit ni
mis debilitata: tunc enim est parvus pil
sus & frequens & similiter anhelitus &
delititia in vsu rerum frigidatum: & exte
nuatio corporis de die in diem: & dispo
sitis similis syncopis, adeo donec forte su
perueniat eis syncopis: quod quidem est
necesse fieri apud oēm cordis debilitatē,
& tristitia multa, & est vt plurimum cū
fe. occulta. Signa debilitatis eius a frigi
ditate non naturali, sunt pulsus paruus,
rardus & rarus, nisi virtus sit valde debi
lis: tunc fit frequens vt succurrat necessi
tati: & anhelitus similiter, & delectatio
vsus calidior: & timor & tristitia, dimi
nutio lacticie. Signa eius quæ sit a siccita
te aduentitia, sunt corporis habitudo sic
ca, pulsus durus paruus frequens, & con
tinua siccitas linguæ & palati. Signa ei
quæ sit ab humiditate superflua, sunt si
gna apoplexiæ v̄l paralyssis: quia humi
ditas accidentalis quando superfluit in
substantia cordis vel ventriculis eius
vel capsula eius, suffocabit subito calo
rem naturalem immediate: quemadmo
dum & hoc accidit in apoplexiā medi
ate: q̄a mediāte impedimēto anhelitus.

Methodus. Cura debilitatis eius a ca
liditate, est vt detur omni
mane in aurora vnus trochis. de cam
phora dictus capitulo de p̄thisi, cum vi
no granatorum acetosorum vel berbe
ris. Epithymetur pectus cum pannis seri
ceis, vel de bisso infusus in aqua ros. in
qua sit aliquid pul. ro. camphoræ & san
dal. Vtatur diarodon abbatris, diadragā
ti, rosata nouella, electuario restaurati
uo: quod dicemus ca. de fe. hecti. lib. 2. Bi
bat saepe lac acetoso recens in ieiuno.
Fit autē acetosum si statim postq̄ mul

ctum est, extingatur in eo calibz vel sa
pis ignitus, qui consumit eius partes cali
das butyrosas facile inflāmabiles. Dia
retē diata frigida aromatisata. Cura de
bilitatis eius a frigiditate, est vt omī ma
ne sumat dianthos, diamusum, diamar
gariton, pliris arcoticum cum vino bo
no aromatico. Epithymetur pectus cum
oleo nardino, in quo dissolutus sit mu
schus, vel ambra. Diaretur carnibus bo
nis conditis cum speciebus aromaticis,
& proprie croco, mace, spica, gariofil.
cardamomo, folio, & gallanga. Bibat
vinum bonū, sed vsu moderato: ne for
te inducat siccitatem. Sumat de tertio in
tertium in ieiuno 3. i. theriacæ bonæ vete
ris cum vino decoctionis macis & cyna
momi. Cura eius, quæ est a siccitate, est
vt regatur patiens regimine hecticæ. Im
pingue ergo proposse cū brodijs pingui
bus carniū bonarum cōditarum cum
vitellis ouorum alteratis cum cucur. la
ctucis. Bibat sape in ieiuno lac recēs ali
næ vel capræ, in quo sit aliquid zuccari:
ne caseetur in stomacho. Epithymetur
pectus cum oleo viol. & ros. & commi
xtis cum mucillagine feminis lini, feni
græci, maluauisci. Post sumptionem la
ctis per tres horas balneetur in aqua
dulci tepida, in qua modicum moretur:
ne corpus fiat euaporabile: bibat vinū
dulce. Cura eius, quæ est ab humiditate,
est cura apoplexiæ proposse: quia pericu
losa est hæc debilitas propter subitā suf
focationem, quæ timetur.

Emperica. In omni specie debilitatis
cordis, conuenit abstinentia
a coitu omnino & labore, & vti lacticia
& gaudio audiēdo sonos musicæ, & fa
bulas nouas & vtilis & videre amœna,
odorare aromatica: quia cerebrum, cor,
epar cum sint mēbra principalia sibi in
uicem mutuo compatiuntur, & confor
tantur: & vngere pectus cum oleo nardi
no, vel oleo ros. & cera mixtis cū gallia

mul. & suffumigium cū alypta, mul. flo-
race, calamento, ligno aloes, thure, & si-
milibus. Item epithyma confortans cor a
proprietas proprie & se. *℞.* buglossæ,
melissæ, boraginis, sandali albi & rubei
cāphoræ ro. margaritarū, corali añ. bul-
liant oīa præter lapides pretiosas, & cā-
phorā in aqua ro. vel in aqua & modico
aceri boni; donec medietas cōsumatur:
tunc addatur pulvis lapidis & cāphoræ,
& infundant petiæ de sindone vel scarla-
to: & expressæ aliquātulū ponā sup cor.
Item electuariū confortans a propietera
re in oīi causa. *℞.* smaragd. hyacintho-
rū, sapphyrorū, añ. 3. f. auri & argēti pu-
ri foliati, ana. 3. ij. margaritarum perfo-
ratarum & non perforatarum añ. 3. i. &
f. buglossæ, melissæ, florum boraginis,
doronici, zedoarij, been alb. & rub. gari-
ofil. ligni aloes, zinziberis, cynamomi
electi & mundati añ. 3. f. serici contriti
nō combusti (quia melius est combusto)
croci, cubebæ, cardamomi, calami aro-
matici, spicæ, gallægæ, muschi, campho-
ræ, ossis de corde cerui, ambræ. añ. 3. i. co-
rali albi & rubei, sandal. ros. spodiū, bel-
lericorum, terræ sigillatæ, coriandri. añ.
3. ij. & f. omnia terātur subtiliter, & pro
qualibet 3. specierum ponatur zuccari
albissimi lib. 1. & fiat electuarium. Est
nanque continens omnia simplicia cor-
dialia vel plurima, & deauret exterior.
Addatur ergo vel extrahatur ex calidis
vel frigidis, prout ægri desiderium vī ne-
cessitas postulat. Item cōfectio ad idem.
℞. dianthos, diaborraginis, diarrodon
abbatis. añ. vnciam vnam, diamargari-
ton vnciam semi. misceantur simul,
aut quodlibet per se sumatur in fe. aut si
ne fe. ante cibum per horam vnam cum
vino albo. Fit autem diaborrago ex flo-
ribus borraginis & buglossæ: quemad-
modum zuccarum ros. ex floribus ros.
& zuccarum viol. ex violis. Dicit præ-
terea Auērois quito & septimo colli-

get. q̄ ex cibis & medicinis omnibus ni-
hil est, quod æquetur vino in confortatio-
ne cordis: quoniam est penetrans, & cali-
dum, et spiritus gignitiuū, etiam naturæ
amicū a tota specie: propter quod dari
cōuenit in syncope, & se. epidimali & in
oīi debilitate & corporis resolutione: et
si nō aliter saltem refractū et lymphatū.

Canones. Debilitas cordis vt plurimū
fit a mala complexionē fri-
gida vel sicca: quia maxime contrarian-
tur principijs vitæ. Frigiditas autē adue-
nit cordi duobus modis: Vno modo per
se: vt cum ab humoribus frigidis eleuan-
tur fumi & vapores frigidi cor percutien-
tes, velut in hydropisi, vel hec̄tica fene-
ctutis. Secundo modo per accidens: vt
propter consumptionem humidī radica-
lis, quod est proprium pabulū calidi na-
turalis: quare simul euaporant, vt in se-
chronicis, & morte naturali & senio cō-
tingit. Ex isto autē sequitur canon alius,
& est: q̄ omnis modus mortis est duorū
generum, vt ait Aristoteles in libro de lō-
gitudine & breuitate vitæ. Primus est
marcor: & est quando calor cordis con-
sumit suum humidum, in quo conserua-
batur: quare & ipsum per consequēs cor
rumpitur. Secundus dicitur marasmus:
& est quando qualitas contraria vitæ,
scilicet frigiditas, dominatur in comple-
xione cordis. Nam tunc calor naturalis
cordis destruitur, & frigidum domina-
t: & a quibusdam extinctio nuncupatur.
Ad quos quidem modos reducitur omnis
mors, siue sit naturalis, vt in senio: siue
non naturalis, vt ab ægitudine: siue vio-
lenta, vt a casu, percussione, incendio,
vel submersione: vt patet subtiliter spe-
culanti.

Prognosticatio. Omnis mala cōple-
xio siue sit diuersa, si-
ue æqualis, quādo confirmatur in corde:
est incurabilis, et necessario mortalis pro-
pter cordis præexcellentiā super omnia

Tractatus Tertius.

membra, & eius necessitate in vita animalis, sine cuius operatione animal non potest subsistere unico momento. Item lyncopis superueniens, mortale.

¶ De lyncopi & cardiaca passione Cap. .II.

Syncopis est ablatio sensus & motus & quoniam pulsus exteriorum membrorum tempore aliquo, propter cordis lationem: quapropter a philosophis mors temporalis, vel cardiaca passio nuncupatur. Quandoque est morbus, quandoque accidens. Morbus quidem: quando causa continetur in corde: & hoc fit tribus modis. Vno modo propter pulsam resolutionem spirituum: quare depauperatur cor spiritu et calore & deficit: ut patet in laborantibus & sudantibus superflue. Secundo modo propter debilitatem cordis naturalem & frigiditatem. Tercio vero propter fumos venenosos percutientes cor: sicut fit post summum prionem rei venenosae. Est autem triplex venosus: ut ponit Auer. s. colligit. Quoddam est a proprietate & forma specifica: ut napellus, & sputum viperarum: quoddam est a qualitate, & hoc dupliciter: quia vel a frigida mortificante spiritus, ut est opium, susquiamus, mandragora, vel calida adurente & resoluente, ut arsenicum, calx viua, realgar, auripigmentum. Accidens vero dicitur: quando consequitur morbum alium, & hoc dupliciter: quia vel particularem, vel vniuersalem. Et si quidem particularem, hoc est dupliciter: quia vel fit propter comparationem eius ad cerebri: verbi gratia, ut cum accidit propter terrorem, vel timorem, vel aliam actionem animalis subitam spiritus animales & vitales conculcantem in corde & suffocantem, hoc est segregantem siue dispergentem: sicut accidit in gaudio pernicioso. Vel fit lyncopis propter copassione eius ad stomachum, & proprie ad

os eius: verbi gratia, sicut fit, quando materia calida acuta mordicat os stomachi quare lachryatur vehementer: ad quod operatur plurimum acuitas sensus in eo: vel quoniam accidit frequenter hoc modo lyncopis, apud ignares numeram lyncopis inter passiones stomachales. Si vero sequitur morbum vniuersalem: sicut est lyncopis, quae accidit in febre lyncopali in principio paroxysmi: ut in .2. li. dicitur. Signa lyncopis propter debilitatem cordis, vel resolutionem spirituum, sunt pulsi parui debiles naturaliter, vel ex tempore corpus ratum, porosum, quod ex qua libet leui causa deficit & anhelitus paruus rarus. Signa lyncopis propter fumos venenosos, sunt antecessio rei suspectae in cibo potu vel medicina. Et si venenum operatur a proprietate, apparebit seruos sudor & rubor in facie, & venarum tumor, & angustia, & sitis, & sapor oris, & oculorum citrinitas. Si vero a calida qualitate operetur: apparebit incisio, & merdicatione siue corrosio in aliquo loco per stomachum & intestinis. Si vero a qualitate frigida: apparebit suberth, stupor, aliuseth, prigitia in motibus & congelatio. Signa eius, cum fit propter actionem animalem, sunt antecessio timoris subitii, vel terrores, vel gaudij superflui perniciosi. Dicit enim Gale. s. de accidenti, quod ex terrore siue timore subito vel gaudio subito & superfluo potest quod lyncopis incurrere & mortem: propter infirmitatem vero nequaquam: quia paulatim fit, nunquam subito, neque ab ira: quia per ipsam non deficit virtus in summo: cum sit operatio actiua. Signa eius, cum fit propter lationem oris stomachi, sunt mordicatione, & caliditas acuta circa os stomachi, cui statim lyncopis succedit. Signa eius, quae fit propter paroxysmum febris lyncopalis, sunt signa propria illius febris.

Methodus. Cura lyncopis duplex est: quaedam est ante paroxys-

sumum, & hæc perficitur per actum præseruatium: Alia hora paroxysmi per actum curatiuum. Cura igitur præseruatiua est vt si fuerit propter debilitatē cordis fiant illa, quæ sunt dicta in præcedenti ca. Quod si propter raritatem corporis, vel exhalationē spirituum acciderit: condensentur cum aqua frigida vel aere frigido, vel aqua ros. & puluere sanda loz. & camphoræ epithymando pectus faciem & totū corpus feruenter. Comedat carnes bonas conditas cū speciebus aromaticis, & oua sordilia, & iura. Bibat vinū optimū: Euitet laborē, balneū calidū, aerē calidū, & coitū pro posse. Si vero sit propter sumptionē veneni: fiat cura cōmunis cōtra omne venenū assumptum in cibo vel potu, quæ est vt statim cum homo sentire incipit mutatiōes incōsuevas, & angustia, & æstuationē propter assumptiōes alicui rei, q̄ hoc facere nō deberet: repleat aqua tepida, cui sit aliquid olei p̄mixtum & aceti, & prouocet vomitus cū impositione digiti vel pennæ inunctæ oleo, & uomat. Si autē vomit pigritate: coq̄tur raphanus, & anethū in aq̄ & coletur, & addatur sal, mel, baurach: et bibat, et interim conet, vt vomat aliquotiens: Quod si non sufficit: suspēdatur per pedes capite depresso, donec tora materia educatur. Post hoc vero considera, si in inferioribus vētris sentiat æstuationem, & si sic: fiat suppositorium vel clystere, & detur ei theriaca in potu, & successiue purgetur cum pillis cochis vel stomachicis vel hierapicra. Si igitur post omnia ista cessauerint accidentia mala, liberatus est. Sin autem, considera conditionem accidentium remanentium: quia si senserit æger stimulationē, incisionē aut corrosiōem in aliq̄ loco corporis, sunt signa veneni calidi: lac & butyrum & oleum amigdalarum dulcium ad potandum tribue: quoniam sedant maliciam & acuitatem ve-

neni, & proprie butyrum recens: videlicet Raf. in diuisionibus capite de sumptione venenorum. Et dentur electuaria frigida, quæ eius caliditatem opprimat, vt est diapapauer, & diapenid. filonium recens, zucarum ros. vel violarum. Si vero æger senserit feruorem & sudorem & oculi rubere cōperint, & venæ tumere, & angustia, & sitis, & fœtor oris, & oculorum citrinitas apparuerit, quæ significant venenū a proprietate siue forma specificā: detur aqua frigida, & nix, & aqua ros. & aceti, vel trochisci de camphora cū aq̄ simplicis, dicti ca. de phthisi. Tribuatur in potu succus end. cicoræ cū aceto, vt malitia veneni restringatur. Et si in aliq̄ loco corporis sentiat vehementer dolorem, vel inflammationē: si at ei emplastrum ex lenticula succo solatri, vel semperuiuæ, & similibus, & actu frigidum aspersum cū aceto gratia penetrationis, ilico suppone: vel fiat epithyma ex eisdem, & reiteretur, donec locus stupidus fiat: Deinde psillium, & lac vaccinum, de quo extractum sit butyr & succum fructuum frigidorum tribue. Et si a principio signa repletionis apparuerint manifeste, ipsum flebotomia. Si vero strictus sit secundum vētrem, solue cum medicina, Deinde ciba ipsum cum cibis frigidis, vt agresta, vino granarum acerosorum, lactucis, portulaca, vel pedibus porcorum conditis cum eisdem, Detur ei theriaca noua, vel filonium nouum: & epithymetur cor & pectorum cum aqua ros. in qua dissolutus sit puluis sandal. ros. camphoræ, terræ sigillatæ: quoniam sua frigiditate confortant cor, ne venenum ad se trahat: Et similiter oportet, vt epas confortet cum eisdem. Hæc enī omnia destruunt virtutem veneni operantis a proprietate, & maxime: quando in ipso caliditas reperitur. Si vero æger exciderit in subeth, stuporem, congelationem,

Tractatus tertius.

& Caluseth, quæ sunt signa veneni frigidi: ciba ipsum cum alijs & sinapi, & de tur theriaca vetus, & metridatum vetus, & diatrion pipercon, & similia: neque dormire ipsum permittas: Si ita etiam inducas pro posse, & frica corpus eius, et caput, & pectus cum panno calefacto ad ignem: Et quandoque sternutatione inducas cum pipere, vel condisi. Et os stomachi conforta cum vnguentis, oleis & emplastris calidis, & stypticis, donec liberetur. Si igitur post omnia ista, accidentia mala non diminuantur, imo æger continue mutetur ad deterius, & incipiat syncopis superuenire cum frequentissima dissolutione virtutis: significat ægrum necessario moriturum a veneno sumpto, & quod virtus veneni iam peruenerit ad cor: quia omnium accidentium consequentium venena syncopis & defectio virtutis sunt pessima. Hæc est igitur communis & conueniens cura in omni genere venenorum assumptorum per interius. Qui vero desiderat curam propriam vniuscuiusque veneni, requirat in tractatu de venenis libro secundo, vbi de hoc scribimus autoritate Auicennæ, quarto canonis, sen. sexta, si deus voluerit. Cura syncopis propter passionem animales est: vt si timor sit causa, inducat gaudium, & e conuerso: & confortetur cerebrum cum paucis laudani, ambra, muschi, sandal rub. nucis muscata, florum cinamomi, & similium puluerisatorum & confectorum cum laudano vel aqua rosæ, quod continue deferatur in manu & odoretur. Confortetur etiam cor cum theriaca veteri, sumendo sæpe de ipsa ante cibum dragmā vnam cum vino optimo, vel dianthos, vel diamargariton cum muscho, vel sine muscho: pro ut maxime patiens delectetur. Fiat aliquando sternutatio cum isto puluere: quia confortat omnes virtutes cerebri. Ipsi, condisi, piperis longi, castorei, elle-

bori nigri, pyrethri, cubebarum. añ. dragmas quatuor floracis, calamiti dragmas. euforbij, bdellij. añ. dragmā vnā. & muschi, 3. 6. fiat puluis, insuffletur in nares, vel attrahatur per pannum lineum rarum cum auhelitu, stomacho ieiuno. Cura eius, quæ fit vitio stomachi, est vt in principio purgetur stomachus cum pillulis cochleis, si materia sit frigida, vel cum benedicta. Si vero sit calida: cum pillulis de reubarbaro positis capite de reumate, & cararrho: vel electuario de succo ro. laxatio, vel stomachico laxatio. Præterea confortetur cum syrtupis, & electuarijs aromaticis per interius, & oleo masticeino, nardino per exterius, vel trochiscis de mastice factis ex laudano, gariol. zedoario, gallanga, cynamomo baccis lauri, & similibus contritis & incorporatis cum laudano extensis super corio albo mundo. Cura eius, quæ fit ratione paroxysmi feb. est cura illius feb. primo & confortatio cordis cerebri & stomachi cum rebus iam dictis. Cura syncopis iam factæ, quæ fit per actum curatiuum, est vt hora accessionis roretur aqua frigida, vel aqua rosæ, super faciem & pectus: & fricentur cum ea leuiter manus & pedes: & muschus & ambra vel vinum odoriferum insuffletur naribus: excitetur virtus conquassando corpus, & ligentur extrema, & fricentur & calefiat stomachus cum panno suffumigato ex ligno aloes, & constringatur nasus sæpe post insufflationem muschi, vel alterius odoramenti, & cum sentire coeperit: detur ei vinum album clarum odoriferum per se, vel per artem lymphatum parumper.

Emperica. In cura cardiaca passionis non sufficit apponere medicinas cordi, sed in omnibus eius ministris principalibus, scilicet cerebro, epati, testiculis: Similiter & nobilibus, licet non principalibus, vt stomacho &

ſpl. ni. Confortetur autem cor cum electuario de precioſis lapidibus dicto capitulo de debilitate cordis, & diamargariton, & dianthos. Confortetur cerebrum cum odoratione talis pomi. ℞. ſandal. ru. foliorum myrti, ligni aloes, ana, dragmas ſex. ꝛ. cubebe, garioſ. gallig muſcatæ. añ. drag. tres. ambræ, macis, camphoræ. añ. drag. vnam. ſtoracis, calamendi drag. quatuor terantur, & incorporentur cum laudano & aqua roſ. Eſt nanque fere continens omnes medicinas cerebrales atque aromaticas virtutis animalis confortatiuas. Quod ſi cerebrum ſit diſcratiatum in calido, multiplicentur roſæ, & camphora. Si in frigido, multiplicentur cubebæ, garioſil. & ſtorax. Et in iſto pomo quidam addunt folia mentæ, calametum aromaticum, olibanum, nucem muſcatam, myrrham, & proprie ſi cerebrum ſit reumaticum de cauſa frigida: ſed gummi arabici dragagantum, violarum ſicce, folia vel ſemina myrtillorum in cauſa calida. Addendum igitur & ſubtrahendum cognoscitur, prout ægri deſiderium vel neceſſitas poſtulat. Confortetur autem epar cum epithymate iſto. ℞. ſandal. roſ. abſinthij, ſtorum camomillæ, cynamomi, ana. partes æquales: bulliantur omnia in vino albo odorifero, cum aqua roſ. & aceto vini boni: & philtrum inhibitorium & expreſſum parumper calidum ponatur ſuper epar ſtomacho ieiuino. Conſert nanque in cauſis calidis & frigidis. Confortetur autem ſplen cum vnguento tali. ℞. ſcoriæ ferri, ſcolopen drig. tyamarici, añ. M. i. capparis, cyperti, acori, azari, berberis, cynamomi. añ. ʒ. ʒ. bulliatur in lib. duabus olei veteris, & lib. i. aceti ſiſſimi, donec acetum conſumatur. Præterea diſſoluantur iſtæ gummæ in aceto, ℞. ſerapini, galbani, oppoſonaci, bdellij armoniaci. ana. ʒ. iſt fiat vnguentum cum prædicto oleo

& cera ſufficienti, & vnguatur cum oleo ſplen omni mane ſtomacho ieiuino. Confortat eum ſplenē a proprietate, & eius materias ſubtiliat, & opilationē eius remouet. Stomachus etiā confortetur cum panno laneo calido, vel philtro ſuffumigato cum maſtice & thure & xyloaloes poſito ſuper ipſum in ieiuinio frequenter. Similiter et cum cerotis, quæ dicuntur in cauſa de ſtomachi debilitate. Confortentur vero teſticularia cum abſtinentia a coitu omnino & fomentatione ex aqua roſ. & pulueris ſandal. & muſchi & ſimilium.

Canones. Syncopis eſt duplex, ſecundum medicos, quædam reparabilis. ſ. quando aufertur ſpūs animalis a membris totius corporis, qui tranſmittitur a cerebro per neruos propter opilationē neruorum, vel laſionē in cerebro factā: & dicitur lipotomia græce, vel deſectio animi latine. Alia eſt irreparabilis, ſcilicet quando ſimul aufertur cum hoc ſpiritus vitalis a membris, qui tranſmittitur a corde per arterias propter opilationem factam ex ipſis, vel propter debilitatem cordis: Et ad iſtam ſyncopim de neceſſitate ſequitur mors. Ex iſto autem canone ſequitur alius, quod quando Gale. præcipit in. 8. de ingenio ſanitatatis, præcipit in cura ſinocha fieri flebotomia vſque ad ſyncopim: ſimiliter & Au. 4. canon. ſen. primo capi. de feb. ſanguinea: debet hoc intelligi de ſyncopi prima, non ſecunda: quia non licet medico in ſua cura deducere ægrum ad ſyncopim mortalem: cum medicus ſit conſeruator ſanitatatis: vt dicitur nono de ingenio ſanitatatis. Ex quo concipere poſſumus, qualiter concordari poſſunt Galen. loco allegato, & Auerrois ſeptimo colliger, vbi increpat Galenū de tali flebotomia, rationibus diuerſis contra ipſum arguens fortiter, atque neceſſario concludens, quod in cura ſinocha nullatenus competit flebotomia vſque

Tractatus tertius

ad syncopim, neq; secundare flebotomi-
am. Gale. intellexit de prima; Auerrois
de secunda.

Prognosticatio. Syncopis superueni-
ens sæpe & profunde
in corde debili, non præcedente causa pri-
mitiua, vñ est terror, vel gaudium, vñ ca-
sus, vel percussio: neq; causa antecedente
humorali, vt est mordicatio oris sto-
machi a cholera vel flegmate falso vel
melancholia amara vel pontica vel ver-
mibus, mortale: q̃a significat cordis ex-
tremam debilitatem, & spirituum pau-
pertatem. Vnde Hippo. 2. parti. apho.
Quicunq; exoluuntur frequenter & for-
titer sine manifesta causa, repente mori-
untur. Item syncopis fortis superueniens
post assumptionem rei venenosæ per in-
terius vel tactum, vel morsum per exte-
rius, mortale: quia significat virtutē ve-
neni perigisse ad cor, & proprie in cor-
pore pusillanimo, raro, cholerico, & cuius
venæ sunt aptæ, & cor debile p naturā.

De tremore & iestigatione cordis. Cap. III.

Tremor cordis ab antiquis causaaz,
a modernis iestigatio cordis nūcu-
patur, & est: cum cor alto pulsu &
forti mouer, quasi salter, nō præcedente
causa manifesta, scilicet exercitio forti,
vñ æstu, timore vel ira. Fit vt plurimū a
dominio caliditatis accidentalis cum ma-
teria vel sine materia super cor. Fit etiā
quādoq; sed raro propter dominium me-
lancholiæ naturalis conuersæ in materiā
corruptam venenosam. Signa eius, quæ
est de calida causa, sunt pulsus velox spif-
sus, velocitas ad iram, caliditas pecto-
ris, siccitas linguæ & palati cum siti plu-
rima, quā magis extinguit aēr frigidus
q̃ aqua. Signa eius, quæ est, de melanco-
lia, sunt corruptio imaginationis, timor
pusillanimitas, syluestritas morx, & ha-
bitudo corporis macra cum gracilitate

ossium, & mollitie cutis quodammodo
sicut & cum frigiditate.

Methodus. Cura saltus cordis a cau-
sa calida, est vt primo fiat
flebotomia cephalicæ manus sinistræ vñ
medianæ, vel ventosatio in cruribus &
anchis, vel purgetur cum decoctione pur-
gante melancholiā adustam, dicta cap.
de melancholia, vel cū dialenæ. Vtatur
sæpe lacte aceroso, vel trochiscis de cam-
phora dictis ca. de phthisi. Comedat zuc-
carum ros. vetus, in quo sit pul. iste. 18.
terræ sigillatæ, coralli rubei, margarita-
rum nō perforararū, cassis de corde cerui.
añ. 3. iij. 3. 2. croci, macis. añ. 3. 1. teratur,
& misceatur cum lib. 1. zuccari ros. Nu-
triaturn carnibus pullos; vel hœden; cum
agresta vel berberis vel vino granatorū.
Bibat vinum debile lymphatū, mixtū
cū aqua frigida vel aqua ro. Cura eius,
quæ fit a melancholia, est, vt fiant omnia
dicta ca. de perurbatione virtutis natu-
ralis. parag. de melacholia naturali cor-
rupta. Vtatur cianthes, diamuscho; fiant
suffumigationes ex ligno aloes, ros. &
similibus odoriferis. Vtatur ceitu sed ra-
ro, lætetur proposse: prouocentur men-
strua, vel hæmorrhoidæ (si est possibile)
cum flebotomia saphenæ, quæ est intus
in ralo & proprie pedis sinistræ, & cum
appositione sanguisugarum citica anū
vel emplastri rubificatiui facti ex affo-
dilis, sinap. melle crudo, cepis tritis &
incorporatis cū fermento & vitello oui
ponendo calidum super anum, & cū fir-
miter adhaferit, violenter abstrahatur,
& tortis reiteretur, donec aperiantur in
corpore consueto.

Emperica. Omnia dicta in capitulo de
debilitate cordis hic profici-
unt, si propria proprijs fuerint applicata
causis.

Canones. Dicit Ras. in diuisionibus,
q̃ tremor cordis proueniens
ex melancholia fit rarior, est tamen no-

etius magis & timorofior quacunqꝫ species tremoris cordis propter duo. Primo quidem: quia cor magis læditur a frigido q̃ calido: cum calidum sit amicum naturæ. Secundo quidem: quia materia grossa difficulter eradicari potest, & sui præsentia disturbat spiritus vitales i cor de generatos, similiter & animales con temperatos in cerebro: quia fiunt inepti ad operationes suas exercendas, & sequitur morum syluestritas & virtutum diminutio, & denum ablatio perfecta.

Prognosticatio. Tremor in feb. acutis vel in feb. syn copali frequens & fortis: mortale, & proprie si sit cum alijs malis signis, quæ sunt debilitas virtutis, priuatio digestionis, prostratio appetitus, et similia: maxime si supuenerit in die nõ critica: quia symptomaticam crism, & cordis passionē denorat.

De dolore & apostemate & vulnere cordis. Cap. III.

Dolor causatur in corde ex mala complexionione diuersa quacunqꝫ simplici vel composita, antequã confirmetur. Nam si confirmetur & perduret: nõ dolorem, sed mortem subitam inducet: quia tunc cor inciperet debilitari in sua operatione necessaria pro toto corpore, quæ est generatio spiritus vitalis assidua, & eius p arterias in singula mēbra delegatio: sine quo membra & totū corpus vnico momento viuere non possunt: cum iste spiritus sit vehiculum vitæ a corde in corpus totum, in quo solo est anima & vita primo p se et immediate: in alijs autē membris intantū, in quantum sunt adiūcta ipsi cordi, & continuū influxū recipiunt a corde. Propter quod dicebat Aristot. 2. de generatione animalium. Cor est quod primo viuunt, vltimo moritur. Et Auer. 2. colligit ait, q̃ calor cordis transmissus per arterias est sicut

forma & actus: calor vero membrorum est sicut materia & patiens in actu conuersionis & nutritionis. Fit etiam ex solutione continui. Hæc autem solutio fit a materia humoralis, vt contingit in generatione apostematis, vel a causa primitiua: vt contingit in vulnere, casu & percussione: & ex quacunque causa fuerit, est mortale.

Methodus. Cura doloris cordis ex mala cōplexione diuersa est eadem cū cura debilitatis cordis, si propria proprijs applicentur.

Canones. Dicit Ras. in diuisionibus, q̃ ex humiditate sola non fi ent fortasse ægitudines in corde. Nam si dominetur humiditas in dispositione corporis adeo, donec necesse sit, vt cordi dominetur, interficit ipsum velociter, et non expectat curationem, & fit apoplexia vñ paralyf. propter accessionem domini humiditatum super cor: quia cum cor naturaliter sit cōplexionis calidæ & siccæ ilico ab humiditatibus suffocatur, si multum dominantur. Item dicit Arist. de proprietatibus animalium. & Gale. 3. de interioribus: q̃ omnis solutio contrai facta in substantia cordis, est mortalis: siue sit ab humore, siue a sanie, siue a ferro. Sed differt: quia si penetret in ventriculos eius, & proprie sinistrum, interficit ilico propter eius nobilitatem & spiritus exhalationē, qui ibi generatur: cū spiritus vitalis, similiter & calor naturalis sint sedes & vinculum animæ ad cor. Si vero non penetret: interficit infra vnū diem ad plus: quia solutio continui inducit dolorem: dolor attrahit materias, & proprie calidas, quare fit apostema magnum cum fe. proprie acuta, & sequitur mors propter virtutem debilem necessario & propter dolorem prostermentē virtutem & materiam suffocantem spiritus, & necessitatem adauctam cum diminutione euentationis. Secus autem est

Tractatus quartus

de cerebro, in quo solutio continui pene trans ad ventriculos est mortalis, sed nō illico. Solutio vero non penetrans potest quāq; curari, si sit parua. Similiter & apostema, vt pater in frenesi non confirmata, vel lethargia. Epar autē cum sit mēbrum carnosum, potest adhuc melius curari, q̄ cerebrum, si eius solutio sit modica, vel apostema nō confirmatum cum constantia virtutis. Testiculi vero cum ad speciem potius quā ad indiuiduū pertineāt: totaliter possunt remoueri vīta remanēte: quod plurimū contingit

Prognosticatio. Signa mortis in dolore cordis, sunt casus, pulsus post vehementiam diuersitatis in ordine, & magnitudinis in motu ipsius, & citrinitas coloris subito post vehementiam rubedinis eius, & syncopis difficilis, rardæ euasioneis, & sudor frigidus circa frontem.

TRACTATVS QVARTVS tus secundæ sectionis, de passionibus mamillarum.



MAMILLARVM passionēs, de quibus scribemus, sunt duæ: quarū prima exuberantia vel diminutio lactis: secunda vero ingrossatio vel diminutio ipsarū superflua. Nam ipsarum apostemata curantur methodo communi ad omnia apostemata, quæ est vt dicit Auicenna primo canon. secundum. quartum cap. de cura apostematum in generali, vt in principio, & cum materia adhuc est in fluxu: ponantur vnguenta & emplastra repercussiuā: & in augmento aliquid addatur de resolutiuis, & proprie in processu augmenti, cum medicus certus est, quod tota materia fluxit ad locum. Sed in statu ponatur plus de resolutiuis quā repercussiuis. In declinatione vero sola resolutiuā ministrentur. Quod

si hæc apostemata tumore fecerint, & per sanationem terminentur & rupturam, primo quidē mundificentur, postea con-solident: vt diximus cap. de vlcere in aure. Scias præterea, quod repercussiuā & resolutiuā quādo simul applicatur circa locū, vt pote in augmento, vel statu apostematis cuiuscūq; possunt duobus modis applicari: primo vt miscantur & incorporentur simul per decoctionē & contusionē præstam: & sic ponantur super & circa apostema. Natura enim sagax est, & vteretur eis distinctim vtroq; pro sua operatione licet eorum substantiæ sint confusæ: vt docet Auicenna. 4. canon. secundum. primo. cap. de cura fe. quartanæ, vbi præcipit administrare prius cum pipere. Secundus est vt repercussiuā ponantur circa apostemata, scilicet circa pedē & rad. apostematis, vnde materia fluit: sed resolutiuā super ipsum apostema, vt faciunt communiter operantes.

De exuberantia & diminutione lactis. Cap. I.

CONqueruntur mulieres delicatæ de lactis exuberantia in mamillis, cum pro foetus nutritione non sollicitentur, sed nutritrices: conuerso vero pauperculæ & indigentes de mamillarū siccitate conqueruntur. Exuberat lac propter quinque causas. Prima est naturalis complexio humida mamillarum: secunda est multitudo sanguinis in corpore: tertia est raptus mēstrui ad supiora: quarta vsus ciborum lac multiplicantium: quinta frequens fricatio, & succio mamillarum: quare materiæ attrahuntur. Ex quinque vero causis contrarijs prouenit sterilitas mamillarum. Et scias, quod lac quandoq; generatur in mamillis vtroq; calidorum carnosorum, sed illud est raro, et in modica quantitate, quia solum accedit hoc ex necessitate causæ efficientis super quā fun-

dat causa prima. Caret aut sine, quæ mulier non vir præbet embrioni materiam generationis ac alimentum nutritionis: ut dicit Auerrois 2. colligit.

Methodus. Exuberantia lactis quatuor modis restringitur. Primo per diuersionem: quare flebotometur scaphena pedis, quæ est in talo: & prouocentur menstrua, & ponantur ventosæ sine scarificatione super fumen ventris, ubi situatur matrix. Secundo per percussiuam: quare ponant epithymara & emplastra frigida sicca super mamillas & radices earum, quæ sunt. *℞.* fuliginem furni, & in corpora perfecte cum oleo rosæ, vel succo temperiuxæ vel plantaginis & solatri. Ad idem valet farina lentium excorticatarum & fabarum & gallarum & cupullarum glandium & balaustiarum & boliarum. oibus simul mixtis & incorporatis cum agresta & aceto & cum eisdem succis. Tercio per exiccatiua: quare post prædicta ponantur milium, sal & flores camomillæ, & in sacculo calefiant super lapide ignito, & membro applicentur frequenter in ieiunio. Ad idem cõfert emplastrum ex ruta, salvia, menta, absinthio, fursure. añ. coctis, & incorporatis cum oleo nardino, vel camomillino, vel de euforbio. Et potest addi aliquid salis niri vel aluminis, balaustiarum, cupullarum, glandium, rosæ. donec locus stypticetur perfecte. Quarto per dietam siccam. Abstineat igitur a lacte, caseo recens, carnibus bouinis, vino dulci, & oibus multiplicatibus sanguinem. Utatur lenticulis, farre, riso, milio, sinapi. cibis salitis multum agresta, aceto, berberis, granatis, acetosis, laboret proposse, & iudet in ieiunio. Sitim & famem toleret: mamillas premat continue, vestes strictas deferendo, sed nunquam ipsas manibus tractet vel fricat. Ex his prohibetur generatio lactis, & inducit eius in mamillis coagulatio & condensatio: quæ si superfluant, & doloris excessum inducant: fiant primo emplastra

mollicatiua ex fenogracæ, psillio, malua, bis malua, butyro recens. adipe gallinæ, bdellio, oppoponaco, galbano, armoniaco, & similibus. Deinde vicissim fiant emplastra resolutiua ex semine lini, fenogracæ, florum camomillæ, melliloti, fursure oleo camomillæ & similibus: ponendo modo, resolutiuum modo mollicatiuum vel mixta simul: donec tota caseatio fuerit resoluta. Multiplicatur autem ac in mamillis per quatuor modos contrarios. Primo, ut fiat attractio sanguinis menstrui ex matrice, ponendo ventosas siccas super radicem mamillarum frequenter. Secundo per emplastra rubificatiua debilia, quæ sufficiant ad attrahendum sine resolutione, sicut est emplastrum ex pice & gummis calidis, ut est thus, mastix: & ad hoc valet frictio, & suctio cum lenimento & proprie in balneo aquæ dulcis post cibum. Tercio per fomentationes calidas humidæ factas ex lana, vel pano molli laneo, infuso in oleo nardino, vel de lilio, vel violæ, vel in quo dissoluta sint muschus, thus, landanum, et siliæ: vel in vino aromatico decoctionis mentæ, rosæ, violæ, ligni aloes, & similibus. Quarto per dietam sanguificam, ut est usus carniū bonarum, & brodiorum pinguium aromaticorum cum cynamomo, maci, cardamomo inspissatorum cum ouorum vitellæ, & usu lactis recens. & casei noui. Gaudeat otio & quere, & impinguet corpus proposse. Scias, quod sicut in anatomia videtur a matrice procedere duæ venæ ad radicem mamillarum, una ex latere dextro, alia a sinistro, transeuntes per medium ventris siue mirach: & quanto magis recedunt a matrice, sunt grossiores & albiore & eminentiores versus superficiem cutis: sed quanto sunt propinquiore conuexo matricis sunt graciliores & profundiores: cum & matrix profunde situetur in corpore, scilicet inter longanone (quæ equitat) &

Tractatus quartus

vesicam, quæ ipsam equitat. Per has igitur venas rapit sanguis mēstruus a matrice ad mamillas, & ecōuerso, & cū penetrat in substantia mamillarū, q̄ est caro alba, glandulosa, frigida naturaliter, diuiditur in ramos plurimos minimos, vt singulum sanguinis contingatur a singulo carnis alba, vt melius ibi dealbet, et elaboretur: sicut etiam accidit in distributione chyli per substantiam epatis. Ex quibus scire potes tria. Primo, quare mulier habēs mēstrua plurima, caret lacte in mamillis, & ecōuerso: nisi sit robusta & carnosa valde. Secūdo, quare mēstrua restringantur per siccā, i. ventosā in radice mamillarum positā, & lac diminuatur per ventosā in sinu ventris applicatā. Tercio, quare generatur lac in mamillis post septem vel octo menses impregnationis: quia tūc fœtus completus est, & nutrimento mēstruo plurimo amplius non indiget: quare regimine naturæ sursum mittitur, vt in lac conuertatur pro fœtus educatione post partū. Et sic lac generatur in mamillis virginum, hoc est ex necessitate materiæ, non ratione finis. Et si hoc etiam generetur in mamillis virorum, non fit propter delegationem sanguinis per venas nutriētes mamillas, & partes pectorales, & spongiositates siue carnositates carnis glandulosæ mamillarum.

Prognosticatio. Si lac valde superfluat in mamillis, retentione mēstruorum inducit, nisi mulier fuerit sanguinea valde, & venæ matricis largæ. Retentio mēstruorum periculosior est in muliere nō lactante, q̄ lac habente. Rusticæ & laboratrices modicum lac generant, & proprie cholericæ & melancholicæ propter siccitatem complexionis & euacuationum multitudinem. Item dicit Hippoc., parri, apho. Mulieri in vtero habenti si subito, id est infra vnū diem vel duos mamillæ graciles fiāt, &

lacte priuentur & extenuentur, abortiet: quia significat defectum nutrimenti fœtus. Item ibidem: Mulieri in vtero habenti si altera mamillæ gracilis fiat, geminos habenti, alterum abortiet: & si quidem dextra gracilis fiat, masculum. Si vero sinistra, fœmina abortiet: Et hoc intellige vt plurimum: quia etiā foemella quandoq̄ generat in dextris, & masculus in sinistris: si epar matris sit naturaliter frigidum, & splen calidus. Item ibidem. Si mulier, quæ neq̄ p̄gnans est, neq̄ generauit, lac habet in mamillis: huius mēstrua defecerūt. Item ibidē dicitur. Mulieri habenti in vtero, lac ex mamillis multū fluens, fœtū significat debilem. Si vero vbera dura fuerint, sanum significant fœtum.

De ingrossatione & extenuatione mamillarū. Cap. II.

Accidit foemellis quibuscūq̄ humidis slegmaticis, vt ipsarū mamillæ ultra decentiam excrescant: econuerso accidit matris siccis, vt mamillæ habeant diminutas.

Methodus. AD prohibendum ingrossationem mamillarum cōfert ponere super eas emplastrum factū ex cymino contuso & asperso aqua: deinde firmetur cum fascia infusa in aqua & aceto absq̄ dolore, & sic per tres dies dimittatur, & post remoueat, & lococius ponatur emplastrum factum ex cepa, lilio albo contuso & incorporato cū aceto & aqua, & firmetur per tres dies cum fascia: Deinde iterū ponatur primū emplastrū per tres dies, postea vicissim sed tempore longo: quia resoluit humiditates mamillarum, & carnem glandulosā stypticat, & dolorem contēperat. Itē teratur albumen oui, & misceatur cum oleo ros. vel aqua ros. & saepe inungantur cum eo mamillæ sine frictione, & epithymētur cum aqua ros. &

IN PRIMI LIBRI SE
ctionem Tertiam, Præfa
tiuncula.

aceto, in quo sit aliquid camphoræ vel
turiz, imbibendo in istis petiam lineam,
& mamillis applicando frequenter. Vel
bolū arme. vel terra sigillata, sang. dra.
galli cypressi, cupulæ glandium, balau
stiz pulueriscentur, & cum aqua ros. &
acero vel succo plantaginis semperuiug
& solatri, distemperetur, & fiat empla
strum super eas. Et cum remouere volue
ris: laua cum aqua frigida. Ad idem con
fert puluis muscillaginis, quæ colligitur
de lapidibus, in quibus acuntur cultel
li. Item ad hoc conferunt omnia dicta de
restrictione lactis in mamillis. Valet etiā
ad hoc frequens & assidua tractatio ma
millarum cum manibus, & earum fri
catio lenis attractiua, nō dura aspera re
solutiua. Similiter & emplastrum de pi
ce: quod dicemus cap. de ablatione coi
tus, & paruitate virgæ.

Canones. Istæ curæ locum habent tem
pore pueritiæ vel principij
iuuentutis: quia postq̃ mamillæ excreue
rint, & ad statum peruenerint: non pos
sunt minorari & extenuari, quod est: q̃a
membra carniformia fluunt & resiliunt,
spermatica vero fixa sunt: vt patet in
neruis, ossibus, cute, & similibus. Istā igitur
doctrina est magis præseruatiua q̃
curatiua. Item augmentatiua vel diminu
tiua in foemellis mamillarum, sunt au
gmentatiua & diminutiua testiculorum
in masculis: cum sint etiam partes glandu
losæ. Item facilius est mamillas natu
raliter grossas humidas prohibere a sui
magnificatione, q̃ siccas graciles augmē
tare, quod est: quia facilius est humidum
exiccare, q̃ siccum humectare: vt patet
7. de ingenio sanitatis. Et ex hoc sequit̃
manifeste, q̃ omne corpus pingue mace
rari potest, sed non omne macrum potest
impinguari: vtruta si cōplexio natura
lis fuerit valde sicca. Et est finis secūda
sectionis.



CONSEQUENS
est nunc sectionē tertiā
laborē opusum aggre
di, quæ est de cura passi
onum mēbrorum con
stituentium vētrem na
turalem: q̃ est a furcula inferiori, vbi est
os stomachi vsq̃ ad principium coxarū.
Est autem dictus naturalis: quia in ipso
continentur membra opera naturæ exer
centia pro toto corpore, quæ sunt digere
re, attrahere, discernere, retinere, expelle
re, nutrire & generare, quemadmodum
& venter animalis sic dictus est: quia in
ipso perficiuntur opera animalia pro to
to corpore, quæ sunt sentire tam sensu
interiori q̃ exteriori, & moueri motu vo
luntario. Et venter spiritualis a spiritu,
qui primitus ibi generatur, licet in cere
bro & epate aliter contemperetur. Vt igitur
hunc laborem perficere valeam, gra
tiam diuinā quemadmodū in prioribus
humiliter imploro dicēs, cū Io. Hebeim,
in lib. de medicinæ cōsolatione tracta
tu: cap. 1. Auxiliatorem deum igitur po
stulo, ad quem cuncta respirāt, & a quo
gratiæ prodeunt, &c.

TRACTATVS PR
mus tertiz sectionis.

De passionibus stomachi.



Passiones stomachi sunt 12.
Prima quidē debilitas dige
stionis, vel corruptio eius: se
cunda vero debilitas appe
titus, & nausea, & fastidiū:
tertia appetitus canin⁹: quarta bolism⁹:
quinta corrupt⁹ appetitus, vī malitia hy
stimbraz: sexta sitis: septima eructatio:
octaua singultus: nona vomitus vel ani
mi subuersio: decima colica passio: vn-

Tractatus primus

decima dolor & inflatio: duodecima apo-
stema & vlcus. Cū autē dico stomachū,
intelligo & mery & os & pyloron & fun-
dum ipsius.

De actione læsa digestionis stomachi. Cap. I.

Diminutio siue debilitas digestio-
nis appellatur: cū stomachus in di-
gestionem cibi longo tēpore occupa-
tur, & tarde redit fames, imo plus debi-
to perdurat grauitas vētris post cibum
assumptū, & satietas: & talis stomachus
bene digerit cibū parū in quantitate,
& delicatū in qualitate, sed multū cibū
similē sumptū, vel grossum, vlt viscosum,
elaborare nō potest. Corruptio vero di-
gestionis dicitur: cū stomachus nō cōuer-
tit cibum in chylū perfectū, scilicet albū
æquale, temperatū inter liquidū & spis-
sum, sed cōuertit ipsum in chylū fluidū
natūrē suā frigiditate et humiditate, vel
siccū adustū suā caliditate & siccitate.
Fiunt autē diminutio & corruptio diges-
tionis ab eisdem causis, & eadē habent
signa: quare de ipsis vno ca. dicem⁹. Fi-
unt autē istæ passiōes propter aliq̃ octo
speciez malæ complexōis in stomacho,
vel propter malā cōpositionem, q̃ rari-
tas texturæ, vel naturalis debilitas cor-
poris & stomachi nuncupat, vel propter
solutionē cōtinui factam in concauo sto-
machi, vel propter apostema: Sed de cu-
ra illius dicet ca. de vlcere, & apostema-
te in ipso: Vē: qm̃ rectum est iudex sui
& obliqui, vt dicit philosoph⁹ primo de
anima: ideo primo describamus stoma-
chum bonū, scilicet qui temperatus dici
potest vel prope tēperatū, cū vnūquod
que corpus, & vnaquæq; particula cor-
poris capiat ex prima sui generatiōe cō-
plexionē naturālē sibi cōuenientē et pro-
priam, qua degit sanitate sibi optima:
vt dicit Aui. primo cañ. sen. primo. cap.
de cōplexionibus, Signa stomachi boni

sunt: q̃a post cibū assuetū & hora & quā-
tate debita assumptū nō grauitur, neq;
sentit angustias, neq; fit os eius amarū,
nec insipidū, nec acetosum, sed dulce, sa-
pidū, & cū siccitate labiorū aliquali: &
post vnā horā nō sentit amplius ab ore
sapor, vel odor cibi, neq; venit eructua-
tio, neq; singult⁹ nisi forte parū & pau-
cus, si cōsuetudo ei in hoc fuerit, & agili-
tas & leuitas ad operationes, sine somno
lentia & pigritia præter debitū & cōsue-
tū: & cū vadit ad lectū, dormit quiete,
& cōtinue sup latere dextro, vel cōsueto
sine plurima resolutione: Neq; occurrūt
ei fantasmata falsa terribilia, & mane
cū surgit, non sentit dolorē capitis, neq;
rugitus, neq; inflationes vētris, & veni-
unt egestio & vrina bene digesta & hora
cōsuetā vel debita exuentia. Est autē ege-
stio tēperata, q̃ est citrina vel subcitrina
spissa in substātia mellis vel pastæ mol-
lis exiēs tota simul & sine multis trullis,
mediocris quātitatis respectu assumpto-
rum. Vrina vero digesta dicit⁹: q̃ est me-
diocris substantia & quātitatis, coloris
subcitrini vel pallearis, nisi epas sit natu-
raliter frigidū, vel calidū plus tēperato.
In cuius profundo est hypostas alba le-
nis, æq̃lis, cōtinua, pyramidalis, vel sal-
tem nebula natans in medio: licet in cor-
pore vero tēperato nō sit hypostas, neq;
nebula cōmino: quia nō est in eo aliqua-
lis superfluitas humoralis: cum optima
natura tantū appetat, quantū potest di-
gerere: frigida vero sit appetere bona, di-
gerere nō bona. Calida autē, digerere bo-
na: appetere non bona: vt dicit Gale. in
tegni. tracta. de signis. capi. de signis sto-
machi. In quo igitur oia dicta sunt: aut
plurima ipsoz, illius stomachū bonū di-
cimus, siue temperatū. Signa malæ cō-
plexionis frigidæ stomachi, sunt sensibi-
lis frigiditas circa os stomachi, sitis pau-
citas, appetitus intensus vt plurimū nī
si frigiditas fortassis vltimetur, Quoniā

omnis mala complexio, cum fuerit vlti-
mata: tollit actum propriæ virtutis, vt
dicit Galenus in cōmento illius aphoris-
mi secundæ partis. Quibus scilicet iuueni-
bus existentibus ventres sicci &c. Et q̃a
non bene digerit res difficilis digestiōis,
& clauditur a frigidis, iuuatur autem a ca-
lidis: & eructuat acetose: & inest ei leui-
tas ventris, & eius inflatio, & multitudo
ventositas, & longitudo moræ cibi in
stomacho: Et est ei vrina alba vel glau-
ca: pulsus hora digestiōis paruus, debi-
lis, spissus: & inquietudo cum continua
reuolutione de latere super latus tempo-
re, quo cibus digerit debet. Signa malæ
complexionis humidæ stomachi, sunt
multitudo sputi insipidi, & nausea, &
paucitas sitis, & velocitas descensionis
cibi absque plurima alteratiōe facta in
eo: & est vrina vt plurimum karpos, et
pulsus debilis, mollis, Signa malæ com-
plexionis frigidæ & humidæ stomachi,
sunt complexio signorum prædictorū.
Quod si sit cum humorum vitio: sequi-
tur quādoq; vomit⁹ flegmatis acetosi,
vel aquosi insipidi, vel salii, vel vitrei,
secundum quod sunt plures species fle-
gmatis: vt patet primo canon. fen. pri-
ma. capi. de humoribus: Et pondus &
aggravatio cū nausea & fastidio: & do-
lor capitis post cibum magis quam an-
te: Et quandoq; somnia de pluuia vel
de piscibus vel de submersione in aqua
non præcedente manifesta causa. Signa
malæ complexionis calidæ stomachi,
sunt sitis immensa cum prostratiōe ap-
petitus: amaritudo oris cum ariditate la-
biorum: eructuatio fumosa copiosa: ha-
bitudo corporis extenuata, quasi corpo-
ris hectici: & asperitas cutis cū ariditate.
Et quod sentit calor in stomacho: & ma-
le digerit cibos subtilis: & iuuatur a fri-
gidis, nocetur a calidis. Signa malæ cō-
plexionis siccæ stomachi, sunt extenua-

tio mirach: & macilentia corporis totius
cum stomachus sit primus minister siue
coquus nutrimenti communis pro toto
corpore: Et quia sæpe sitit, sed potus (li-
cet paruus) fluctuat in ipso, & nocetur
ab ipso: & paruus ei potus pro vice suf-
ficit: gaudet cibus siccis, si ista complexio
sibi insit per naturam. Signa malæ com-
plexionis calidæ & siccæ stomachi, sunt
composito dictorum signorum: & si fue-
rit cū humoris vitio, adest dolor & adu-
rsio in ventre, & sequitur quandoq; vo-
mitus rei viridis vel citrinæ amaræ sub-
tilis, si sit cholera pura, vel grossæ visco-
sæ, si sit cholera vitellina & aduenit do-
lor capitis ante cibum magis quā post:
& quandoque somniat de ira. & igne,
atque similibus. Et scias, quod non ois
vomit⁹ viridis significat choleram, sed
subtilis, viridis, amarus proprie. Nam
si sit viridis, grossus, viscosus, insipidus,
seu ponticus: flegma crudum significat
generatum post esum fructuum & her-
barum frigidarum, vt accidit pueris &
gulosis. Signa malæ complexionis cali-
dæ & humidæ stomachi, sunt paucitas
appetitus, multitudo saliuæ, & nausea:
priuatio sitis & eructuatio fœtida ace-
tosa: & quoniam in ipso plurima ven-
tositas generatur. Et si sit cum hu-
moris vitio, sit quandoque vomitus sangui-
nis puri vel mixti cum albedine & fe-
bres putridæ eueniunt de facili: & pon-
dus & grauitas ventris: & quandoque
somnia de sanguine vel aqua rubea, &
est dulcedo oris sine causa manifesta.
Signa malæ complexionis siccæ & fri-
gidæ stomachi, sunt incendium & ardor
in ventre ante comestionem, quod sedat
comestio aut minuit: & eructuatio pon-
tica vel styptica, q̃ in dentibus facit fri-
g⁹ vlt⁹ congelationē, q̃si sint pira imatura
assumpta: & dolor stomachi ante come-
stionē proprie. Et si sit cū humoris vitio:

Tractatus primus

Defect oris amaritudo, & splenis durities: & quando occurrunt eis apud somnum fantasmata terribilia de re nigra, utpote de fuligine, de tenebris: & forte advenit vomitus acetosus vel ponticus. Dico autem forte, quia materia cholericæ vel sanguinea in stomacho contenta expellitur ut plurimum per superius, sed melancholica per inferius, flegmatica vero utroque modo: cum sit media inter graue & leue: subtile & grossum: si viscositas non prohibeat. Vnde Hippo, 4. particula aphorismorum. Graciles & facile vomentes purgare superius convenit, timētes hyemem, non tamen hoc fiat hyemē, sed æstate: quando cholera dominatur. Et subdit, Melancholicos vero inferius vehementius eadem ratione contraria apponentes. Si gna debilitatis stomachi propter eius malam compositionem siue raritatem & tēneritatem corporis, oris stomachi, sunt vehementes sensatio stomachi: propter quod de facili leditur a re quacunque: & quia sentit angustiam post cibum, & appetitus modicus in eo est ante cibum: & quia digerit perfecte cibum paruum subtilem vergentem ad calidum & siccum, cibum vero grossum, plurimum, frigidum digerere non potest. Si igitur omnia ista aut plurima apparuerint, præter quod stomachus discrasiat sit aliquo prædictorum modorum, vel læsus alia causa manifestata, ut proprie cum ipsorum adhærentia assidua: tunc vere dicitur corpulentia stomachi naturaliter defecta. Si vero præcesserit vomitus frequens superfluous, aut solutio ventris spontanea, vel cum forti medicina, vel satietas nauseatiua chronica: tunc substantia stomachi per accidens est debilitata, non ex generatione. Veruntamen sciendum est, quod debilitas quandoque fit propter compassionem eius ad epas vel ad splenem vel cerebrum: vel propter læsionem eius a causa extrinseca, scilicet aëre frigido, vel æstuoso, vel

ab aliqua animi passione, vel casu vel percussione, vel ex antecessione morbi chronici: quæ quidem singula medicus habet diligenter perpendere: & si non aliter tamen infirmi relatione. Similiter & complexionem corporis, consuetudinem ciborum & potuum, animi conditionem, regionem, ætatem & qualitatem habitationis consideret, ne decipiatur. Signa debilitatis stomachi propter vlcus in ipso, sunt antecessio signorum apostematis in eodem, post quæ sequitur vomitus aut egestio saniosa, cum apostema maturatum fuerit & eruptum: ut dicemus ibidem. Quod si fuerit vlcus sine apostemate, utpote ex humoribus acutis: sentitur punctura assidua, neque cibum retinetur, donec digeratur perfecte: quapropter egreditur per vomitum vel secessum. Et scias, quod quando materia superflua natus in concavitate stomachi: fit vomitus, sed cum intricatur in villis eius: fit animi subversio vel fastidium.

Methodus. Cura debilitatis siue diminutionis digestionis vel corruptionis eius propter malam complexionem stomachi frigidam, est ut vngatur stomachus omni die bis ante prandium & ante coenam cum oleo masticino, vel nardino, vel de lilio, vel de costo mixtis calefactis perfecte in aqua feruente vel cum vnguento tali. ℞. rutæ, roris mariani. añ. 3. i. baccarum lauri. 3. iij. tere omnia, & coque in lib. 2. olei communis usque ad spissitudinem, vel cum vnguento marciaton ad solem calidum aut ad ignem. Vtatur diagallanga, diatrion pipereon, diacymino, diacameron, diamargariton, electuario ducis in ieiuno: & bibat desuper aliquid boni vini. Exercitetur semper in ieiuno parum, & raro comedat: quia modicus cibum ei sufficit. Sit eius cibus delicatus: ut carnes hœdorum, aut pullorum cõditæ cum speciebus calidis aromaticis, & ova sorbilia, & pulmēta

subtilia, et iura pingua, moderate tamē
vratur in saporibus suis alijs, sinapi, pi
pere. Fructus nō comedit. nisi ficus sic
cas pingues. Balneetur in aquis tinnar
frequēter in ieiuno: super stomachū por
tet continue tale cerotum, ℞. terebenti
næ, resinæ. aī. 3. i. picis naual. 3. 4. serapi
ni, oppoponaci, bdellij. aī. 3. f. ceræ. 3. 4.
nucis muscatæ, spodiij, gariol. squinanti
ros. rub. fol. spicæ, croci. aī. 3. 2. piperis
3. 1. masticeis, thuris, vernicis. aī. 3. f. po
nantur gummī in vino bono, & dissol
uantur, & terenda terantur, & cribellen
tur subtiliter, terebentina vero & pix na
ualis & resina & cera liquefiāt ad ignē:
Deinde addantur gummx dissolutæ in
vino: Et cum omnia liquefacta fuerint:
colentur, & colaturæ incorporentur spe
cies prædictæ: & totum extendatur sup
er corium albū, & tegat cū petia subtl
li alba linea, & stomacho superponatur.
Ad idem. ℞. calami aromatici, gallan
gæ, spicæ, masticeis, coralli ru. cardamo
mi, thuris, vernicis. aī. 3. f. ceræ. 3. 2. resi
næ, lib. f. picis græcæ. 3. 2. olei de spicanar
di, olei masticeis. aī. 3. 2. bdellij, serapini,
oppononaci, armoniaci. aī. 3. f. tereben
tinæ. 3. 4. confice sic, dissoluantur gūmæ
in vino oprimo, & dissoluantur primo
omnia dissoluenda in casola ad ignē, &
colentur & colaturæ addatur puluis spe
cierum prædictarum, & extendatur sup
corium vt prius. Ista cerota confortant
omnem stomachum debilem, præter eū
qui est a causa calida sicca: q̃a calorē na
turalem stomachi augmentant, & eius
corpulentiam inspissant, & corroborāt
vehemēter. Cura debilitatis digestionis
propter malam complexionem humi
dam stomachi, est vt sæpe fiat vomitus,
si sit possibile cum oxymelle & aqua te
pida, vel aqua decoctiois raphani. sina
pis, semi. atriplicis, anethi præmissa sat
erate stomachi ex piscibus, oleribus &
cepis. Purgetur cum hierapicra, Galeñi,

præmissa digestionē materiæ cum oxy
melle composito, vel syrupo acetofo cō
posito. Vratur sæpe in ieiuno trochiscis
de mastice dictis capitulo de spuro san
guinis, cum vino decoctionis ciperi vel
mirtill. Bibat vinum rubeum aromati
cum stypticum, parum tamen bibat: in
alijs fiat, sicut in stomacho frigido. Cu
ra malæ complexionis frigida & humi
dæ stomachi, est compositio medicina
rum prædictarum, non dormiat in die
neq; super cibum, famem & sitim tole
ret, exercitetur in ieiuno, sudet & labo
ret: coitum omnino vitet. Et si sit cū ven
tositatibus & singultu: coquantur carui,
cimini, anisi, apij, rutæ, absinthij, mēta,
spicæ, costi, ana. partes æquales, in vino
forti, vel aqua, vel oleo cōmuni & spon
gia infusa ponatur super stomachum in
ieiuno actu calida, & expressa, cum rei
teratione frequēti. Si vero sit cum humo
ris vitio, quod vt plurimum fit, slegma
digeratur cum oxymellæ squillitico, &
aqua decoctionis ciperi, piperis longi, et
mellis: Purgetur cum pillulis cochij, vñ
cum decoctione mirobalanorum, kebul
lorum, vel emblicorum. Et si purgetur
cum pillulis & apozimate, fiat primo
digestio prædicta cum decoctione. Post
euacuationem, vratur trochiscis prædi
ctis, vel electuario de scorja ferri, quod
dicemus cap. de debilitate splenis. Et si
nō sit aliud, vratur electuarijs prædictis.
Comedit carnes assas hœdorum, vñ pul
lorum, vel perdicum, phasianorum, &
deligat carnes ferinas proposse. Bibat vi
num potētissimum album vel rubeum
sed in parua quātitate: famem & sitim
toleret cum sudore. In vnguentis & em
plastris fiat sicut prius. Et in hoc casu cō
fert plurimum diacitonitem cum melle
& speciebus: vt in empiricis scribemus.
Et dicit Galeñ. 4. de regimine sanitatis:
q̃ pro stomacho frigido vel frigido &
humido inter medicinas calidas piper

Tractatus primus

est sublimius, & primo quidē album, secundo vero longum, tertio nigrum: quia piper est potentissimū in confortatione membrorum, neruorum & inter radices gallāga, zedoaria: quemadmodum inter gummas maltix. Cura malæ complexionis calidæ stomachi, est vt vngatur cum oleo rosato mixto cum pauco aceti, propter penetrationem. Vtatur zuccaro ros. si venter sit laxus: vel zuccaro viol. si sit constypatus. Et cibos frigidus comedit acetosus vel solidos, compactos: vt est caro porcina, & bouina, & multum cibum pro vice capiat, si stomachus sit largus, spaciosus: quoniam de hoc stomacho loquens Galeñ. primo alimentorum. capitulo primo. dicebat, q̄ melius digerit carnem bouinam q̄ pisces patrinus: ex eo q̄ subtilia ī ipso aduruntur, solida vero moderate digerūtur. Vtatur pro condimentis vino granatorum, vel agresta, vel berberis, vel aceto, vel trifol. succo vel acetoso. Bibat aquam frigidam, vel aquam cum vino granatorum, vel aquam decoctionis berberis. Vtatur coitu super cibum, vsu tamen moderato, ne superfluo infrigidetur: & forte lienteriam, vel hydropisim incurrat. Bibat quandoq; in ieiunio oxyzacarum, vel diaprunis, vel syrupum acetosum, vel syrupum rosaceum, vel violaceum cum aqua frigida. Exercetur parum & raro, & dormiat super cibum quandoq; si caput contra non coeperetur. Cura malæ complexionis siccæ stomachi, est vt impingetur corpus pro posse cum balneis aquæ dulcis tepidæ, & cibis sorbilibus: vt sunt oua mollia, & iura condita cum speciebus aromaticis non acutis: vt est cynamomum, macis, crocus, & similia. Bibat quandoque lac capræ vel vaccæ recens & calidum per se, vel cum mica panis de simila, vt melius nutriat, vel cum pauco mellis vel zuccari, ne caesetur in stomacho: &

non comedat cum eo, neq; ilico super cibum illum aliquem alium: quia corrumperetur omnino, cum de facillime corrumpibilibus sit lac, sperma, sanguis: vt ait Galenus septimo de ingenio sanitatis. Vngatur stomachus cum oleo viol. vel de papauere, similiter & pectus, & spina tora. Vtatur sæpe diadraganto, diapenid, diapapauere. Dormiat super cibum, si caput non prohibeat: nullo modo coeat, sed gaudeat otio & solatijs: & proposse continue super stomachum deferat plumaceolum molle, vel pellem ouis nigre vel lupi, vel lanam succidam: vt stomachus defendatur a qualitatibus aeris continentis. Cura malæ complexionis calidæ & siccæ stomachi est compositio medicinarum predictarum: Et si sit cū febre occulta, lenta: stant omnia quæ dicentur libro secundo de febre hectica. Et ad hoc conferunt multum dicta in capitulo de phthisi. Et si sit cum humoris vitio, digeratur cholera cum oxyzacaro vel syrupo acetoso vel violato, vel rosato. Et mundificetur cum pillulis de reubarbaro dictis capitulo de cararho, vel cum decoctione myrobalanorum citrinorum, quæ dicetur in canoñ. vel cum apozimate de reubarbaro: quod sic fit. ℞. aquæ decoctionis prunorum feruentis, ponantur in ea. 3. 2. reubarba. puluerisati, & dimittantur per duodecim horas. Postea coletur, & in colatura ponantur dragmæ duæ syrupi ros. vel violati: & detur totum in matutino: vel cum apozimate purgante humores acutos adustos, quod sic fit. ℞. mānæ 3. ij. ramarind. 3. i. & f. dissoluantur in 3. quinque aquæ decoctionis prunorum: & detur totum ante diem. Et si vis: potes addere medullæ cassiæ fistulæ 3. vnam coletur, & detur sicut prius. Vel purgetur cū electuarijs de succo rosato laxatiuo vel cū diaprunis laxati. 3. 6. Et post purgationes vtatur diaprunis simplici, zuccaro

ros. & violato, diarrodon abbat. Et si
 epur sit inflammatum propter compas-
 sionem, vtatur triasandali. Et si assint
 vigiliae, vel dolor capitis pulsatiuus: vt a-
 tur diapa pauere receti, vel filonio receti.
 Et fiant omnia quæ diximus ca. de vigi-
 lijs superfluis. Vtatur lactucis, portula-
 ci & cucurbitis, vino granatorum, ber-
 beris, agrestæ & aceto cum suis cibis. Bi-
 bat vinum debile lymphatum ad medi-
 etatem. ¶ Cura malæ complexionis
 calidæ & humidæ stomachi, est vt vn-
 gatur stomachus cum oleo masticino
 mixto cū oleo rosaceo, addito modico
 aceti actu calidi perfecte. Vtatur sæpe in
 ieiuno zuccaro rosato nouo, si venter sit
 stypticus: vel veteri, si fuerit obediens,
 omni die ad sellam. Nam in rosis recen-
 tibus sunt quædam partes acuræ secessi-
 uæ, quæ post exiccationem resoluuntur,
 Et eodē modo dico de zuccaro: quia ru-
 beum est secessiuū aliquid: sed tabar
 zeth idem albū est stypticum & tēpera-
 tū. Et bibat post illud aquā decoctionis
 myrtorū, vel berberis, vel vinum grana-
 torū cū aqua frigida. Cibetur carnibus
 assis, & elixis cum feniculo petrosilino
 conditis cum speciebus aromaticis non
 acutis, & ex pulvere earundē speciē, &
 vino granatorū, fiat ei sapor pro cibis in
 hyeme, vel cū aqua ros, in æstate. Bibat
 vinū rubeū, stypticum vel ponticū: vel
 vinū debile lymphatum cū aqua deco-
 ctionis myrtill. Vtatur sæpe trochiscis
 de bolo dictis capitulo de sputo sangui-
 nis, per se cum aqua frigida, vel mixtis
 cū zuccaro rosato: Et si corpus fuerit car-
 nosum multum sanguineum, & antecel-
 sio ciborū & potuum multiplicantium
 sanguinem: fiat flebotomia basilicæ, vel
 medianæ in brachio dextro vel manu
 dextra. Hmōi namq; flebotomia mate-
 rias diuerit primo & euacuat ab epate:
 post illud vero a meseraicis et stomacho
 quodāmodo, & proprie post euacuatio-

nem ventris a fecibus omnino. Si aut sit
 cū humoris vitio, alterius a sanguine, q
 necq; digestionē, neq; euacuationē indi-
 get aliq; cū medicina, sed cū flebotomia
 sola subito facta: vt di. Gal. 10. de inge.
 sani. Oportet, vt digeratur simul flegma
 & cholera cū oxymelle cōposito, v^l mel-
 le ros. vel syrupo acetoso, vel mixtis ex
 ipsis exhibitis cū aq; calida, vel aqua deco-
 ctionis ros. rub. & calamenti. Et pur-
 getur cum pillulis cochrys vel benedicta
 laxatiua, vel medicina de turbith vstra
 ta, vel cum decoctione myrobalarorū
 kebullorum. ¶ Myrobalarorū kebul-
 lorum, citrinorum, emblicorum añ. 3. f.
 terantur & infundantur in 3. 6. aquæ fer-
 uentis per duodecim horas: colentur, &
 dulcoretur colatura cum zuccaro rosato
 vel melle ros. vel syrupo ros: et detur an-
 te diem totū actu calidū, si fortis sit vir-
 tus, vel medietas, si sit debilis. Et fiat vo-
 mitus cū aliquo vomitiuo dicto supius
 post saturitatē. Et non negligatur cura
 istius stomachi: quia frequenter perducit
 ad febrē putridam: quare fiant digestio-
 nes & euacuationes prædictæ frequēter.
 Et dicit Auerrois septimo colliget. quod
 vsus vini granatorum vel agrestæ pluri-
 mum præseruat stomachū a putredine
 humorum sua frigiditate & stypticita-
 te: quoniam caliditas extranea ebulliti-
 onem faciens a centro ad circumferen-
 tiam est causa efficiens putredinis: humi-
 ditas vero non bene regulabilis a calo-
 re naturali, sed effumabilis & euapora-
 bilis est causa putredinis materialis, vt
 dicit philosophus quarto meteororum.
 Cura malæ complexionis frigidæ, &
 siccæ stomachi, est vt inungatur frequen-
 ter cum oleo masticino nardino, & de
 lilio & de costo, vel cum aliquo eo-
 rum calefacto perfecte in aqua feruenti
 addito modico puluere subtili gario-
 fil. propter penetrationem: & conti-
 nue deferat super stomachum cerotum

Tractatus primus.

supradictum, vel lanam succidam, vel filtrū recens molle infusum in oleis prædictis actu calidis. Comedat cibos subtilis, calidos, cōditos cum speciebus aromaticis, sed pro vice parū, & sæpe, verbi g^a, carnes laudabiles, & iura ipsarū inspissata cum vitellis ouorum, & oua forbilia, & pisces petrinos conditos cum eisdem speciebus: Bibat vinum dulce et clarum vel medonem. Et non negligat cura istius stomachi: quia frequenter ducit ad hecticam & marasimum propter indigestionem & arefactionem; quæ duo nutritionem prohibet membrorum: Et quia difficilior est resistere frigiditati, q̃ siccitati: cum sit qualitas passiva: vt dicitur in septimo de ingenio sanitatis: idcirco in cura ipsius multiplicentur humida, non tamen negligantur calida. Bibat ergo lac recens cepræ in ieiunio, vel vacæ, vel ouium per se vel cū modico melle clari: & quandoq; mica panis de similia potest addi propter nutrimentū. Vtatur electuarijs, zinzibere condito, diaphanis, electuario ducis, diapenid, & similibus. Non laboret superflue, neq; sudet, sed balneetur in aqua calida dulci. Gaudeat ocio & quiete, somno & solatio pro posse. Si aut sit cum humoris vitio, digeratur melancholia cum oxymelle composito vel squillitico, & aqua decoctionis ireos, vel hyssopi, vel calamiti, vel ciperi vel capparis: Et confortetur splen, vt bene attrahat melancholiam: Et purgetur cum pillulis foetidis & diaseng: vel cum puluere senæ, thymi, epithymi, & aqua calida, vel cū hieralogodion, vel cum decoctione mirobalanorum indorcolata, & dulcorata cum syrupo rosato vel cum melle rosato: Et caueat a coitu omnino, & proprie super cibum. Vtatur dianthos frequenter, & diamargariton in ieiunio. ¶ Cura diminutæ seu corruptæ digestionis propter debilitatem compositionis stomachi est eadem cum cura

stomachi frigidi sicci, præter quā q̃ non est opus euacuantibus, sed solis alterantibus, & proprie quorum virtus declinet ad stypticiratem cum caliditate, nō ad humiditatem. Vtatur ergo cibis subtilibus temporate vergentibus ad calidū & siccum. Bibat vinum vetus purū parum, & sæpe comedat: euitet cibos grossos & fluidos: vt sunt iura immoderato vsu sumpta: quia fluctuant, & corrugationem stomachi super cibum impediunt tempore digestionis. Neq; bibat multum, quando sumit cibum, imo post completam digestionem primam bibat bonū haustum vini puri vel clareti. Nutriatur carnisbus hœdorum & pullorum & auium paruarum degentium in nemoribus non in aquis. Vtatur ouis forbilibus & pulmentis auenæ, vel similæ, vel farris conditis cum lacte dulci & vitellis ouorum. Vtatur electuarijs calidis supradictis, & specialiter diadraganto, diagaſanga, diaphiris, diacitonice, & electuario ducis cum melle & speciebus in ieiunio. Abstineat omnino a coitu, & proprie super cibū, & somno diurno, & quiete superflua. Nunquamumat cibū nisi prius egeſtis superfluitatibus primæ et secundæ digestionis. Et post hoc habito exercitio incipiente a debili, & tendente ad fortius redeunte ad debile: post hoc quiescat, donec calor naturalis redierit ad interiora corporis, & sputum cœperit subtiliari, quasi sit aquosum, & appetit excitari: tunc comedat satiffaciendo naturæ, non appetitui quoquo modo.

Emperica. Electuaria confortans stomachum digestionem promouens, corſectificans, putrefactionem prohibens, membra calefaciens, renes & vesicam purgans, sanitatis regimini conferens, sic fit. ℞. castorei abluti in aqua ros. & postea exiccati. 3. 6. gariol. 3. 1. masticis, thuris. añ. 3. 2. macis, 3. iij. mentæ hortulanæ. 3. 5. gallangæ. 3. 7.

anisi. 3. 8. feniculi. 3. 9. cynamomi electi et mundati ad pondus omnium, vini odoriferi lib. 1. succi marubij albi lib. 2. mellis despumari, quod sufficit: coquatur mel cum vino & succo prædicto, donec condescatur, & pulueriscentur subtiliter, & cribellentur spēs dictæ, & cum melle conficiantur: Detur ad modū nucis post cibū per vnam horam, & bibat post illud parum vini boni. Pillulæ vtilis pro stomacho & laxatiue conferentes omni stomacho debili cum materia. ℞. masti. añ. reubarba. 3. 5. aloes boni ad pondus oīm pulueriscentur, & distemperentur cum succo fen. Detur .5. ad modū pisarum, ante cibum vel post: quia mundificat stomachum, & epar excellenter a flegmate & cholera. Nam de reubarbaro dicit Auerroes, 5. colliget, quod est medicina benedicta respectu aliorum pharmacorum: Sed de aloe dicit Galen. 7. de ingenio sanitatis, quod est magis conferens stomacho omni alio laxatiuo: quare sicut est amarum ori, ita est delectabile stomacho: idcirco debet lingua extrahi, & medicina inglutiri. Item masticis aut olibani, 3 1. infusa per noctem in vino, donec liquefacta fuerit, & bibita in ieiunio calefacit & exiccat stomachum potenter, & catarrhum descendantem a cerebro restringit, si mane & sero potetur ex eo pluribus diebus. Item cerotum nobile pro stomacho frigido & humido vel debili in substantia. ℞. bdellij, opponaci, serapini, euforhij. añ. 3. 2. trium pig. cynamomi. 22. añ. 3. vnam, anisi. 3. 1. gallangæ, nucis muscatæ, granorum paradisi, gariofil. añ. 3. 6. cardamoni, macis, croci quartam partem. 3. vnus: Confice sic, liquescent gummi in aqua rosa. vel vino odorifero, & ex eis & puluere specierum & cera & pice sufficenter conficiatur emplastrum, & extendatur super corium album molle, & tegatur cum panno lineo albo subtili, & teneatur super stomachū

duabus horis ante cibum, & post remoueat. Item cerotum aliud, quod valet in vomentibus cibum. ℞. laudani. 3. iij. masticis, cynamomi, gariofil. nucis muscatæ, gallangæ, spice. añ. 3. 2. olei masticini & nardi. 3. 1. ceræ. 3. 6. Item illud, ℞. cere alb. abrafæ a sorditie superiori, olei nardi, ana. lib. 6. masticis. 3. 2. aloes, calami aromatici, añ. 3. 2. gariofil. cynamomi añ. 3. iij. fiat cerotum. Item saccellatio ad idem. ℞. myrtilorum, ros. rub. absinthij, mentæ, gariofil. thuris, cynamomi, masticis: fiat puluis subtilissimus ex eis, qui positus in sacculo sericeo vel lineo subtili calefacto super lapide ignito asperso cum vino, stomacho continue applicetur: Et cum fuerit infrigidatū reiteretur, & potest addi calamus aromaticus propter penetrationem. Item epithyma ad idem. ℞. thuris, masticis. añ. 3. 2. boli armenici. 3. 5. dragaganti, gummi arab. añ. 3. 2. succi mentæ. 3. 4. terantur gumme & conficiantur cum succis, & pannus imbibitus in eis ponatur super os stomachi, valet etiam vomentibus. Aliud, ℞. succi mentæ, succi absinthij, vini citoniorum añ. partes æqles. pulueris gariofil. quantum volueris: calefiat totum hoc perfecte ad ignem, & in ipso infundatur filtrū, & stomacho applicetur, reiterando sæpe, cum infrigidatū fuerit: valet vomentibus & eructuantibus acerosè vel fumosè: sed in stomacho calido potest addi vinū granatorum, vel berberis, vel aqua decoctionis myrtilorum. Tragea ad idem. ℞. cynamomi, gallangæ, zinziberis. añ. 3. 1. nucis muscatæ, zedoarij, cubebæ. añ. 3. 6. gariofil. macis. añ. 3. 2. anisi. 3. 1. passulæ: quantum volueris, tucurari, quantum sufficit: terantur oīa grosso modo propter anis. & gariofil. & passū misceantur, vel terantur subtiliter & dimissis passulis, fiat electuarium cum zuccaro. Et si vis facere laxatiuum flegmatis aquosi: pone in qualibet dosi dragmam vnam reubarbari:

Tractatus primus.

Si melancholia, pul. fene, drag. duas & detur ante cibum. Item ad idem electuarium Galeñ. sexto de ingenio sanitatis circa finem: quod valet male digerentibus, vomentibus, hientericis, diarricis: & est mirabile. ℞. succi citoniorum maturorum perfecte mellis optimi. añ. 3. duas aceti. 3. i. & quantur super carbones non super flammam ignis, ne virtus resoluatur: & ponatur zinziberis. 3. vna, piperis albi vel longi. 3. f. puluerisuntur & coquantur vsq; ad spissitudinē mellis. Et si venter sit cholericus, detur ad modū nucus ante cibum per duas vel tres horas. Item syrupus de menta Ioan. hebermef. in suo antidotario. cōfortās stomachū, conferēs vomitui, indigestiōi, hienterix, & omī fluxui vētris, sic fit. ℞. succi citoniorū, aceti. ana. lib. i. a. f. foliorum ros siccarum. 3. 2. & dimittātur sic per diem & noctem & deinde coquantur cum facilitate vique ad medium, & cum lib. 2. zuccari in æstate, & mellis in hyeme: fiat syrupus, & aromatizetur cum galialia mulch. Item pillulæ stomaticæ secundum eundem, stomachum & caput mūdificientes a flegmate & humoribus acutis & mūdificātes massam sanguinis in corpore toto. ℞. turbith electi & mundati. 3. 10. 33. mastice ana. drag. quatuor 10. 3. iij. aloes bonæ ad pōdus oīm: cōfice pillulas cū succo absynthij. Et dosi earū est a. 3i. vsq; ad 3i. & f. Dētur sero sine coena. Item pillulæ aureæ secundum eundem, quæ dicūtur pillulæ de turbith, aut pillulæ aureæ quæ & choleram & flegma sine molestia purgant, stomachum & par confortant, & digestionem procurant. ℞. turbith boni & mundati. 3. 10. aloes. 3. i. & f. mastice, ros. ana. 3. 7. mirobalanorum citrinorum. 3. decem, croci. 3. iij. confice cum succo absynthij vel cum vino albo odorifero, addendo zinz. 3. quatuor. Item pillulæ cochig. euacuant humores grossos flegmaticos a

toto corpore. ℞. pul. hierapicra. 3. 10. colloquintida. 3. quatuor, dyagredij. 3. iij. turbith, sticados. añ. 3. 5. confice cum succo ruthæ vel apij & da. 3. i. vel f. Itē pillulæ foetida ad idem. ℞. pulueris hierapicra. 3. 10. colloquintide, centaureæ, plāraginis. añ. 3. 5. euforhij. 3. 2. & f. castorei, zinziberis, assæ foetida, serapini, oppoponaci, cassiæ, sinapis, piperis. añ. 3. i. dissoluātur serap nū & oppoponacum & assa in succo rutæ vel in aqua ipsius: & cum ipsis fiant pillulæ, ex quibus detur sicut prius.

Canones. Stomachus præter se. vt plurimū nocetur a mala complexione frigida vel humida cum materia, quod est propter hominum gulositatē: Post hanc vero a mala complexione frigida & humida sine materia: post illam a frigida: post q̄ ab humida: post illam a calida & sicca cū materia: post hanc vero a frigida sine materia, & post a frigida & sicca. Sed in se, nocetur maxime a calida vel calida & sicca cū materia. Item stomachus nō minus læditur a mala cōplexione quā a mala compositione, quæ dicitur debilitas contexturæ. Verum in hoc refert: quia mala compositio vt plurimum est a generatione, & raro post agritudines vel inordinatā digestionē: cui cōtrarium est in mala cōplexiōe: Præterea oīs mala cōplexio stomachi si sit ex mala generatione: inuaf a cibo & potu sibi simili in forma & gradu: vt calidus a calido, frigidus a frigido, et sic de alijs. Nocetur autē a contrario in forma vel in gradu, præter stomachum calidū: qui gaudet cibis & potibus calidis: & nil nocetur a frigidis secundum vsum moderatum: vt dicit Galenus in regn. capitulo de signis stomachi. Si vero sit mala complexio aduentitia & accidentalis: nocetur a sibi simili, inuatur autē a contrario vfu moderato. Ratio autē canonis est: quia omnis conseruatio sit

per simile: cura vero per contrarium. Nunc autem omnis complexio stomachi naturalis appetit sui conseruationem, accidentalis vero curationem: cum vnumquodq; ens naturale appetat bene viuere, & illius gratia facit quicquid facit: vt dicitur primo metaphysicæ. Ex hoc causâ, sequitur alius, qd mala complexio stomachi naturalis nullatenus debet subito rectificari, sed gradatim & tempore sanitatis. Nequa q; vero debet alterari tempore alicuius ægritudinis, sed sic tolerari, donec cõualescat: vt dicit Gale nus septimo de ingenio sanitatis: ne forrasse afflictio afflictioni apponatur. Et subdit illud ibidem, quod si stomachus sit naturaliter calidus, & ægrotauerit ægritudine frigida: oportet in eius cura calidiora administrare, quàm in stomacho naturaliter frigido. Similiter & si stomachus sit naturaliter frigidus, & ægrotauerit ægritudine calida: oportet in eius cura frigidiora ministrare, quàm in stomacho naturaliter calido: quod stomacho conuenit propter conseruationem cõplexionis innatæ & propter causam ægritudinis esse fortioiorem, si stomachus calidus infrigidetur, q; si frigidus infrigidetur. Et iste canon eodem modo intelligendus est de epate, corde, cerebro, & splene. Item ad passionem stomachi, & proprie si sit cum materia frigida, sequitur plerumq; disnia, & malitia anhelitus propter pulmonis compassionem & diaphragmatis compressionem. Item omnis cibis difficile masticabilis est difficile digestibilis, sed non econuerso. Possunt enim duo prohibere digestionem, scilicet viscositas: vt patet in cerebro, vel fluxibilitas: vt in iuribus, quæ non impediunt masticationem. Item omnis stomachus debilis confortatur a proprietate per esum stomachorum: vt dicit Auerrois 7. colligitur cum similitudo sit fundamētum proprietatis, & cerebrum per

esum cerebrorum, & epate per epatum, & similia, & proprie si sint ex animalibus laudabilibus & sanis: vt sunt pulli, perdicæ, fassiani, & vniuersaliter oia degentia in nemoribus & pratis & se exercantia. Caue tamē, ne volēdo proficere vni mēbro, oblis alteri: propter qd ait Gale. 11. de ingenio sanitatis. Est autē difficile mū in quacūq; ægritudinē medicinā adinuenire simplicē taliter iuuatiuā: vt nihil in ea reperitur nocuenti: qd quidē accidit propter complicationem dispositionum diuersarum in membris, similiter & morbis, cum eorum accidentibus atq; causis. Oportet autem ob hoc medicinas non postponere, sed ad illas maxime se transferre, quæ plus apud nostram necessitatem contineāt iuuamenti, q̄ nocuenti: quare & sic dicamus de stomacho. Fiar igitur cū electione & vsu moderato: vt elaborari & digeri valeant perfecte. Præterea sciendum, qd digestionēs communes sunt tres. Prima est in stomacho, cuius superfluum est stercore: Secunda in epate, cuius superfluum est vrina, Tertia in venis, cuius superfluum est sudor et hypostasis tēpore sanitatis, 2. po stema & scabies tēpore ægritudinis. Est & quarta, quæ propria dicitur, & est in porositaribus membris: & venis capillaribus, cuius superfluum insensibiliter omī tpe a corporibus nostris euaporat. Et istæ digestionēs habent ordinē essentiālē inter se: vt si prima auferatur seu vt plurimū corruptatur: secunda necessaria corrūpetur: similiter tertia & quarta. Est tamē, cum digestio stomachi diminuta vel corrupta sub modo co excessu vel defectu, corrigi potest per eam, quæ est epatis & venarum, & proprie, si virtus naturalis sit in eis fortis. Itē quando approximās medicinas stomacho per exterius, approxima eas actu calidas. Tepidas vero vel frigidas nequaquam: quoniam tepida resoluunt robur

Tractatus primus

ventris: vt dicitur 7. de ingenio sanitatis: sed frigida inimica sunt stomacho, intestinis, ano, neruis, & omnibus membris neruosis, vt dicitur 6. parti. aphor. Et siue approximes p̄ exterius, siue per interius superadde semper styptica: vt virtutem naturalem & substantiam stomachi confortent. Quæ cum hoc si fuerint aromatica, melius naturæ placent: vt est absynth. gallæga, zedoaria, piper, mastix, thus in causa frigida: Dragaganiū, myrrha, rosæ, plantago, granata in causa calida. Menta, citonia in vtrâq̃. Præterea sciendum, q̃ mora cibi in stomacho debet esse regulariter sexdecim horarū: temporalium in corpore temperato & viuēte temperate in vsu sex rerum non naturalium: ita vt in duobus diebus trina capiatur refectio. Verum quocunq̃ modo res se habuerit, hæc mora requirit spacium decem horarū ad minus: quoniam secundum diuersitatem ciborum in qualitate & quantitate, vel secundum diuersitatem complexionum stomachi & regionū diuersificatur & horæ ita vt hoc calamo scribi non possit, nisi in vniuersali. Ideo dicit Auicē, 3. canoñ. fen. 13, q̃ hoc tēpus est inter horas. 12. & 22. Itē digestionem primam cōditiones decem impediunt. Prima est substantia cibi, vt pote grossities, vel liquiditas. Secūda, quāritas, scilicet magnitudo vel multitudo. Tertia, qualitas, scilicet frigiditas, vel viscositas, vel durities. Quarta, ordo vt si in vētre fluido subtilia præmittantur grossis, & in styptico grossa subtilibus: & in vtroq̃ digestibilia difficilia, digestibilibus facile. Quinta, hora cōstitutionis: vt si sumatur cibus ante famē, vel post plurimam famistoleratiōē. Sexta, malitia regiminis potus superflui inundare facientis cibum. Septima, motus & agitatio super cibum. Octaua, aer cōtinēs. Nona, animi passiones. Decima, sumptio electuaria calidiorum fumoso-

rum post cibum. Item scias q̃ medicina laxatiua meliores pro stomacho, sunt mirobalani: quia cum hoc q̃ soluūt, cōprimendo confortant substantiam stomachi, nisi vēter sit naturaliter stypticus & inobediens. Pro flegmate igitur fiat talis decoctio. 78. mirobalanorum, kebulorum, vel emblicorū, vel bellenicorū, vel omnium. añ. 3. f. terantur gressu modo, & bulliant in .3. s. aquæ cisternæ vel simplicis vel aquæ decoctionis mitillorum, vel acetosæ, donec medium consumatur: postea coletur, & dulcoretur colatura cum melle rosæ vel cum zuccaro rosæ. 3. 2. vel. 3. & detur totum ante diē. Sed pro cholera: 78. mirobalanorum citrinorum eodem modo bullitor. Pro melancholia mirobalanorum indor. Pro materia composita, compone mirobalos. Item scias, q̃ de maxime lædētibz stomachū, cerebrum & renes, est coltus inordinatus. Nam in coitu agitantur & inflammantur spiritus animales, qui plurimum sunt in cerebro circa organa sensuum colligantes ipsum. Item in coitu & proprie super cibum fit calor ad extrema distractio & cibi cōquassatio, ex quibus in frigidatur stomachus. In coitu etiā fit multa sanguinis attractio per vasa spermatice, quæ oriuntur a vena Kili prope renes: quare maxime venæ, & debilitatur eius attractiua. Nullus igitur stomachicus coeat super cibū saltem superfluo vsu, nisi fortassis calidus, vel calidus & humidus, cui conuenit coitus super cibum, vsu tamē moderato. Item dubitat vtrum amplior cibus sit sumendus in prandio, vel in cœnâ? Ad quod respondet Gale. 7. de ingenio sanitatis ca. de cura stomachi sicci: q̃ in cœnâ propter tria. Primo, quia tunc homo magis quiescit, Omnis autē digestio quiete perficitur, vt asserit Auerro. 2. colliget, vbi reddit causam, quare venæ non pulsant sicut arteriæ. Secundo, quia propter frigi-

ditatem noctis, calor naturalis fortificatur. Tertio, quia maior est distantia a coena usque ad prandium, quam a prandio usque ad coenam: ideo cibis melius digeritur apud regulariter viuentes. Scire tamē debes, quod istud fallit in duobus casibus. Primo, si corpus est catarrhosum: tunc enim oportet cibum & potum minorare versus noctem. Secundo, si consuetudo antiqua fuerit in contrarium: tunc enim non erit illi obstaculum, donec gradatim corrigatur.

Prognosticatio. Si quis post cibum ad duas vel tres horas senserit inflationem ventris cum rugitu forti, vel eructationes acetosas, vel fumosas, vel odorem et saporē cibi assumpti retinentes, significat necessario digestionē corruptam vel diminutā, vel ablata, & fortasse lienteriam futuram. Itē licet ois actio læsa stomachi sit mala, quæ est triplex, scilicet ablata, diminuta, & corrupta: peior tamē & sapius cōtingens est corrupta, quia non rectificatur per medicinā, nisi fortassis in principio, & cum est modica. Item mala digestio stomachi est radix omnium morborum. Nam ablatio digestionis & diminutio lienteriam, diarrhiam chronicā, hydropisim & hæcticā inducūt: sed corruptio ad fumosum se, acutas, & apostema calidū, & dysenteriam, & feb. tertianas generat: diminutio vero ad acetosum se, chronicas, lepram, tympanitem, apoplexiā, & epilepsiam multiplicat. Item si quis in conualescentia cuiuscumque se, habuerit signa indigestionis, quæ sunt os insipidum, fumosum vel acetosum, & proprie cum prostratione appetitus, vel corruptione eius: sicut est appetitus carbonum, vel argillæ, significat in ipsa recidivam propter stomachum non bene esse munitum ab humoribus noxiis. Redi igitur ad euacuationes & digestiones illi materię convenientes. Item si quis gulosus

cœperit habere postulas diversorum colorum, scilicet liuidas, nigras, & rubeas: quas ante non habuit, breuitatem vitæ significat: quia materia venenosa est, quæ nec purgari, nec rectificari potest per medicinas crapula prohibentes: quia materia exuberans ab interioribus regurgitat ad exteriora: & cum membra principalia occupauerit, scilicet cerebrū, cor et epas: subitam mortem inducet. Item cum sit quadruplex digestio: ut supra ostendimus: ex qualibet earum cum læsa fuerit: surgunt in corpore propria nocumenta, nisi statim a principio purgationibus convenientibus in fleboromado, vel farma cando sagaciter succurramus. vñ Hip. 2. aphori. Vbi cuncti cibis præter naturam intrat, illic ægritudinem facit, &c.

De nausea, fastidio, & prostratione appetitus. Cap. II.

DE his tribus passionibus dicam vno capitulo: quia ex iisdem fiunt causis, & eadem habent signa & remedia. Dicitur appetitus esse prostratus: cum quis non desiderat cibum oino, vel cum diminutione. Dicitur nausea: quādo cum hoc præsentiam cibi mouet nasum, & abhorret ipsum, etiam si prius fuerat appetitus. Dicitur fastidium: quādo cum hoc nullatenus vel difficile potest cibum inglutire, etiam si ad hoc ellatur: & sic non differūt ista tria, nisi secundum magis & minus: quod intelligo tripliciter. Primo quidē in essentia siue gradu, ut dictum est. Secundo in subiecto, secundūque hæc passio est magis vel minus inserta stomacho. Tertia in causa: quia ex omnibus causis fit prostratio, ex quibus nausea & fastidium, sed non e converso. Fit igitur prostratio siue diminutio appetitus quatuor de causis. Prima est mala complexio calida oris stomachi cum materia vel sine materia, Secunda est mala complexio frigida ipsius,

Tractatus primus

quando vltimatur, siue cum materia siue sine materia: quia tunc tollit actū pro prię virtutis secundum Gall. in 1. aphori. Quibuscunq; iuuenibus & c. ibi dicit, qd omne corpus cōplexionis nimis frigida actiones habet defectas ex necessitate. Nā si frigiditas esset moderata, potius augeret appetitum. Tertia est lēgio duorum neruorum magnorum venientium a cerebro anteriori ad os stomachi ad dandum ei sensum famis & sitis pro toto. Quarta est, quia epar non multum at trahit de chylo per meseraicas veniētes a concauo epatis ad intestinum ieiunum et duodenum. Fit autem nausea propter duas causas tantum. Prima est, materia flegmatica natans circa os stomachi & ipsum mollificās. Secunda est, debilitas retentiue virtutis stomachi propter causam humoralem flegmaticam, vel primitiuam: vt est ventris fluxus spontaneus sine artificialis superfluous, vel vomitus frequēs. Fit autem fastidium propter vnā causam, quę est materia grossa flegmatica inuiscata villis oris stomachi, & infiltrata. Signa prostrationis appetitus a causa calida, sunt sitis & eructuatio foetida, fumosa, & sensibilis calor circa os stomachi, amaritudo oris, siccitas linguę & citrinitas cum adustione: & quia iuuatur a frigidis, nocetur a calidis: & est quandoq; cum feb. Quod si sit cum humoris vitio, sit forte vomitus amarus, viridis vel citrinus. Signa eius, quę sit a causa frigida, sunt sensibilis frigiditas circa os stomachi, & eructuatio insipida, aquosa vel viscosa acerosa, & lenitas ventris: iuuant calida, nocent frigida: & quia mucillago alba viscosa apparet super linguam: & si est cū feb. erit feb. lenta flegmatica sine siti. Quod si cum humoris vitio: sit forte vomitus flegmatis viscosi, aquosi vel vitrei, multitudo saliuę et sputi. Signa eius quę sit propter lēSIONEM nerui sunt: quia

post vsum ciborum acutorum, vt sinapis & piperis non sentit æger mordicationē circa os stomachi, vel parum sentit: & quod non accidit ei nausea, neque vomitus, nec sentit frigiditatem, neque caliditatē circa os stomachi. Signa eius, quę sit propter debilitatem epatis, sunt egestio alba, liquida, chylosa, & quandoq; viridis propter choleram commixtam: & quia corpus continue extenuatur, & egestio est maior, vel æqualis cibo assumpto, & fluida substantiæ, & sunt cum ea signa frigiditatis epatis vel opilationis in ipso. Signa nausę quocunq; modo fiat, sunt abominatio cibi, & reiectio ipsius cum cacochymia, & conturbatio faciei & oculorum, cum cibo presentatur: & si cogat ad eius sumptionē, forte aduenit ei vomitus. Signa fastidij, sunt signa nausę: sed in nausea maior est difficultas in retinēdo q̄ in inglutiendo, sed in fastidio est e converso.

Methodus. Cura prostrationis appetitus a causa calida, est vt vtatur oxyzacaro vel syrupo ro. ante cibum cum aqua frigida, vel vino granatorum, vel berberis, vel agresta vel aceto cum cibo. Bibat vinū ponticum lymphatum: vtatur somno & quiete post cibū & ante. Sumat sæpe zucarum rosę vel diaprunis, si vēter sit obediens: si stypticus, syrupum viol. vel zucarę viol. Veruntamen superfluous vsus syrup. viol. prosternit appetitum. Si vero cum humoris vitio sit: digeratur, & euacuetur cholera, & fiat vomitus, si sit possibile: sicut diximus ca. de debilitate digestionis, scilicet de causa calida cū materia: & fiat cerorum huiusmodi super os stomachi, ℞. masticis 3. iij. cerę 3. f. olei rutacei 3. ij. dissoluantur simul, & extendantur super corio al. molli & aspergatur cū aceto, & ponat super os stomachi: & pōt addi myrrha: quia valde excitat appetitum, et penetrare facit. Cura prostratio-

nis appetitus a causa frigida, est vt in omni die in ieiunio & sero cum vadit dormitū, vtatur diarrion, pipercon, diagalāga, diazz, diacitonitē cū melle & spe ciebus. Comedat carnes pullos, vel aui um paruaz assas proprie vel elixas cū speciebus calidis acutis; vtatur pro sa po re sinapi condito cum melle vel alijs & cepis. Bibat vinū purum optimū: exerci tetur semper in ieiunio, nec dormiat in die. Et si sit cum humoris vitio, digerat flegma, & euacuetur sicut diximus ca. de digestionis debilitate, parag. de causa frigida cū materia. Et post purgationes fiat cerotū super os stomachi, quod est. ℞. myrrhæ, bdellij, masticis añ. 3. ij. terā tur subtiliter, & misceantur in calola cū 3. ij. olei masticini vel nardi. & 3. f. ceræ, & extendatur super corio alb. molli, & aspergatur cum aceto acutissimo, cum infrigidatum fuerit, & ponatur super os stomachi. Et balneetur in aquis calidis stypticis, sicut sunt aquæ tinaz, vel aq̃ decoctionis absynthij calamenti, origa ni, & proprie in ieiunio. Cura prostratio nis appetitus propter læsionem nerui ve nientis a cerebro, est vt cerebrum confor setur cum electuarijs aromaticis, vt est dianthos cum muscho, diamusculum, d amargariton, diapliris, arcoticum. Et abluatur caput cum lixiuio vel aqua de coctionis absynthij, meliloti, florum ca momillæ, ros. & ciperi: odoret continue pomum cōfectum ex myrrha, laudano & muscho. Comedat res assas boni chy mi: vinum rubeum stypticum lymphat um bibat. Deferat super stomachū ce rotum iam dictū in causa frigida: suffu migeat quādoq; cū storace sicca, vel thu re si est sine materia. Cura prostrationis eo, q̃ epar non trahit rem plurimā, est vt fiant omnia aperientia epar, & cibū pe netrare facientia: vt porus vini al. subti lis potentissimi de quo modicū detur in ieiunio: & balneū ante cibū cū fricatio-

ne leni, & exercitium. Similiter Cōmīa, quæ calefaciūt epar, & apenūt eius opi lationem: vt oxymel compositum, vel diacalamētum, vel diatriūpipercon, vel decoctio hęc. ℞. reubarb. ameos, amio mi, ciperi, añ. 3. f. pistentur, & bulliantur in lib. ij. aquæ, donec ad vnam redeant & coletur, & colaturæ addantur. 3. qua tuor zuccari, bulliantur iterum aliquan tulum, & iterū coletur. Detur de isto cōmī mane. 3. i. cū vino alb. & subtili: q̃a ape rit opilationes epatis & splenis, & con fortat eorum virtutem attractiuam, vel cū cōmixtura ista, si epar sit calid. q̃ con fert ictericis & epaticis de causa calida cū opilatione. ℞. triseræ, sarranicæ, 3. f. reubar. puluerisati, 3. i. vel ij. incorporen tur simul cū syrupo viol. vel acetoso, q̃d sufficit: detur calidū ante diē: q̃a purgat cholera, & deopilat epar calid. vel fiat sic. ℞. oxymellis squillitici, quantū vo lueris: da cū aqua decoctionis endiuiz, lactucæ, absynthij, citonij, spodij, squi nanti omni mane ante diē, & sic de syru po. 3. vna. & aquæ 3. duæ. Et si volueris: acuatur de tertio in tertiu cū 3. i. reubar ba. puluerisati. Istud enim aperit epar, et infrigidat perfecte: vel cum mixtura ta li in causa frigida. ℞. triseræ magnæ, 3. f. distēperetur cū vino calido, vel aqua decoctiois anisi, masticis, feniculi. Et ad hoc etiam valet diacucurma, quam dice mus ca. de hydropisi data cū oxymelle vel melle ros. In causa autem communi misceantur prædicta tā syrups g electua ria: sicut est ista mixtura. ℞. trisandal, ro satæ nouellæ, diarro d. abbatis, ana. 3. f. misceantur. Super epar fiat emplastrum aperitiuum, quod sic fit. ℞. triūm san dalarum rub. vnciam vnam. capparis, acori, ciperi, ros. rub. ana. 3. f. olei masti cis, olei ro. añ. 3. ij. acet. 3. f. farinæ orde i, quod sufficit ad inspissandum puluerisa ta & cribellata misceat siml. & fiat em plastrū actu calidū super epar. Sumat sepe

Tractatus primus

in ieiunio de rheriaca veteri cū vino calido. Fiat etia post euacuationes epithyma super epar. 1℞. end. plantaginis, absynth. rubeæ tinctorum, ros. sandal. spodi, quinanti, berberis, capparitis, añ. partes æquales: bulliant oīa in aceto squillitico et aceto citoniorū, in q̄ infundat filtrū recens, vel pannus lineus triplicatus, et ponatur super epar actū calidū in ieiunio: quia confortat substantiam epatis, & resoluit eius opilationes in omni causa. Vtatur cibis subtilibus nutritiuis conditis cum speciebus calidis acutis, si caliditas epatis non prohibeat. Bibat vinum album forte, vel vinum album lymphatum cum aqua decoctionis seminum communium frigidorum vel calidorum, secundum q̄ oportet. Cura nausæ vel fastidij propter materiam frigidam, est vt digeratur, & euacuetur flegma grossum cum medicinis dictis ea, de debilitate digestionis, parag. de causa frigida cū materia. Et fiat vomitus proposse: & vtratur in ieiunio post euacuationes electuarijs dictis cū vino calido, & proprie diaga, gallanga, diacitonitē cum melle & speciebus. Super stomachum ponatur cerotum, quod sic fit. 1℞. mastice, thuris, vernicis, boli armenici añ. ʒ. i. terātur & misceantur cum aceto acutissimo, penetratiuo & inscissiuo: bulliant, donec totum spissum fiat, & tunc extēdatur super corium molle satis. Cura nausæ propter debilitatem corporis stomachi & eius retētiæ, est eadem cum illa, quæ dicta est in capitulo de cura malæ digestionis, parag. de debilitate substantiæ stomachi. Parū et sepe comedat cibos calidos vergentes ad siccitatem aromaticos cōditos cū speciebus calidis non acutis. Bibat vinū rubeum dulce stypticum, sed parum pro vice. Vtatur sepe diacitonitē cum melle & speciebus ante cibum, sed sine speciebus cum zuccaro rosato post cibum: Et in saporibus suis vtratur vino malorū

granatorum, vel berberis vel aceto: vt prouocent appetitum stimulando os stomachi sua ponticitate.

Emperica. Scias, q̄ sicut experimētiū sas quatuor prostrationis appetitus prædictas, sunt adhuc tres aliæ: prima est venarum totius corporis repletio, vt in gulosiis & otiosis. Et cura eius est, flebotomia basilicæ, & minoratio cibi et potus, & motus & exercitium in ieiunio. Secunda est densitas pororū cutis, propter quā parum resoluitur a corporibus eorum. Et signa eius sunt durities cutis corporis, & longitudo tolerantia famis sine multa læsione. Et cura eius est balneū aquæ decoctionis florum camomillæ, fursuris haurach, cum leni diuturna fricatione, & sudore multo ante cibū & exercitiū & labor in ieiunio: similiter & vsus ciborum subtilium facile resoluibilium: vt iura, olera, & pulmenta de farina auenæ vel ordeī. Tertia est opilatio venæ procedentis a splene ad os stomachi deferentis melancholiam guttatim, fluentem, & appetitum excitantem pro toto. Et signa eius sunt: quia non sentit famem, quātumcunq; cibum desideret. Et est in eo priuatio omnium aliarum causarum inducētium prostrationem appetitus: & si comedat bene digerit: licet non famescat. Et cura eius est confortatio splenis, & depilatio eius: vt dicetur suo cap. & assiduatio ciborum acetosorum stypticorum, & melancholiam generantium: vt lētes, faba, agresta, acetum, sumach, pedes porcellorum cocti cum aceto & sale & speciebus actu frigidis. Et quandoq; vsus calidorum acutorum: vt sunt cepg, allia, sinapis, porri, piper. Quia melancholia non naturalis fit quādoq; per aduersionem, quādoq; per congelationē: Sed melancholia naturalis solum fit per cibos grossos chymos generātes sine excessu vel defectu caliditatis digestiua:

quare est sicut fex massæ sanguineæ: vt dicitur primo canoñ. fēñ. prima cap. nutritiēs masticatione. Et vniuersaliter oia, quæ excitant appetitum cum mordificatione pauca sunt conuenientia: vt carnes assæ conditæ cum aceto & succo tri folij, vñ berberis, vel vino granatorum. Et ad omnem prostrationem appetitus cum feb. vel sine feb. cōfert cibus factus ex extremitatibus porcellorū & caltratorum, vel vitulorum decoctis perfecte in aqua plurima & modico aceti, addita menta & raphano & petroselino faciendo ex ipsis gallatiçiū, de quo dentur duo boli vel tres actu frigidi ante cibum. Similiter & sapor factus ex succo acetosæ vel trifolij conditus cum aceto & puluere cynamomi, inspissatus cum vitello oui assi, addito succo porri, vel petroseli. si feb. vel dolor capitis, vel tussis id concedat. Similiter & succus granatorum, & proprie acetosorum cōditus cum puluere cynamomi sumptus ante cibū cū mica panis. Similiter & succus piri sapi di parumper acetosi, de quo parum comedat ante cibum oēm aut ipsum mordeat cum inglutitione saluæ. Similiter coctanum assum & infrigidatum in vino pontico vel succo berberis vñ succo granatorum. Item emplastrū ad idem. ℞. thuris masticis añ. 3. ij. boli armenici. 3. i. dragaganti 3. ij. succi mentæ 3. iij. confice cum pane assato, & pone super os stomachi. Item in cibo addatur menta, & in potu succus mētx. Item inungatur os stomachi cū oleo masticis & ros. & mirrillis actu calidis. Epithyma ad idē. ℞. citonia, mentam, grana myrti: coquantur in aqua ros. & aceto perfecte, & petiæ lineæ imbibantur in illo actu calido, & ponantur sæpe in ieiunio super os stomachi. Et si sit cū causa calida, adde ro. & plantaginem, pira pontica, & mala matiana. Sacculus ad idē. Ponantur mēta, absynchiū ros. saluia, & plantago in

sacculo lineo subrili, & fricentur in vino & aceto vehementer, & calidum ponatur super os stomachi in ieiunio reiterando frequēter, cū infrigidatū fuerit: et si fuerit cū plurima frigiditate, possunt addi balaustræ, cortices granatorum, cupulg, glandium: quare sit tunc confers in vomitu. Item spongia infusa in vino forti decoctionis anisi, carui, masticis actu calido confert ad prostrationem appetitus vomitum, & indigestionem. Et in cap. de debilitate digestionis, parag. de empiricis, descripsimus syropus, emplastra, electuaria, et cerota sublimia ad prostrationē appetitus quoquo modo. Confert præterea ponere emplastra, ventosam sine scarificatione super os stomachi siue vehemēti attractione: quia retentiū stomachi confortat, & proprie cum aliæ medicinæ nō conferunt omnino, & præmissa euacuatione vniuersali et proprie nisi sit timor attractionis, vel apostematris in loco. Cerotū ad idem sublime. ℞. laudani 3. 2. resinæ 3. 1. myrrhæ, masticis, thuris añ. 3. 2. cynamomi, ciperi, folij, calami aromatici, foliorū myrtæ añ. 3. iij. ros. rub. 3. 2. ceræ 3. 6. olei masticis 3. 1. terantur terenda, & misceantur cum laudano oleo, & gummis dissolutis in vino rubeo styptico, & incorporētur perfecte ad ignem, & excedantur super corium, & tegantur cum panno lineo subrili, & ponātur super os stomachi. Item confert lymphare vinum cum aqua styptica: sicut est aqua pluvialis, vel aqua decoctionis mirrillorum, plantaginis & ros.

Canones. Multos casū. scripsimus ca. de debilitate digestionis conferentes præsentī cap. quia omnis mala digestio, cū antiquatur & perdurat, perducit ad prostrationem appetitus et nauseam: vt patet in cachesia, plethoria, & discrasia, & cacochymia. Item omnis prostratio appetitus subito veniens, & cito recedens est (vt plurimum) a causa

Tractatus primus.

calida, sed morosa, perdurans a frigida. Item quæ est a causa frigida, est ut plurimum cum materia, id quæ a causa calida est, ut plurimum sine materia: frequenter namque in stomacho generatur materia propter diætā grossiorem, et crapulā quæ propter caliditatem, nisi sit cum febribus.

Prognosticatio. Prostratio appetitus ex lésione nervi a cerebro venientis difficile curatur: ut dicit Rasis in divisionibus, nisi in principio, & ante confirmationem. Similiter & si proveniat ab opilatione venarum procedentis a splene, nisi forte in principio, & cum adhuc est dispositio sine confirmatione. Item prostratio appetitus a causa frigida, periculosa est magis quam a calida: quia causam fortiorē significat atque magis perdurantem. Item si in ægritudine aliqua appetitus fuerit prostratus, & subito post hoc æger plurimum cibum sumperit sine animi subversione, vel nausea, omnino non præcedente rationabili alleviatione, quæ sit per sudorem exuberantem, vel vomitum, vel egestionem mortalem: quia cerebrum læsionē & virtutis sensitiue mortificationē demonstrat. Unde Hippocrates 2. part. aphor. Quicumque dolentes aliquid corporis plurimum, dolorem non sentiunt, ipse mens ægrotat. Sic namque videmus freneticos gulosos. Item prostratio appetitus remanens post crislum, recidivam et convalescentiam non veram significat. Redi igitur ad digestionem & evacuationem illi materię convenientes. Item prostratio appetitus in omni ægritudine & proprie chronica, mortem significat: quia virtus non potest longam pugnam tolerare sine cibo. Unde Hippocrates 2. part. aphor. In omni ægritudine confortari metus, & bene se habere ad oblationes, bonum: contrarium vero, malum. Item si quis convalescens ab ægritudine multum cibum cum appetitu sumat in principio convalescentię, & corpus per hoc non resumatur: recidivam significat, & indigestionem, et stomachum frigidum cum materia ace-

tosa, sed si in principio convalescentia habuerit appetitum modicum, & in processu gradatim augmentum, veram salutem promittit. Item Hippocrates ibidem, plerumque omnes male habentes secundum principia quidem, &c. Item melius est ægrum refici paucis & aliquantu- lum parvo cibo cum appetitu & delectatione, quam plurimo & optimo sine appetitu. Unde Hippocrates ibidem, pars deterior cibi & potus &c. Et in 3. regi. acutorum. Mala namque diætā cibi vel potus, quam si bene sit &c. quod dum stomachus delectatur in cibo, corrugatur super cibum, & velut a micus super amicum. Et ibidem ait Galenus in commento: quod si cibum abhorruerit distendit, & dilatata velut fugiens: quare surgit vomitus, fastidium ventris, & regitus: quæ quidem indigestionem significant malignam.

De appetitu canino. Cap. III.

Cum quis appetit cibum ultra modum præter quod saturatur post comestionem, nisi forte brevitatem pore, dicitur habere appetitum caninum, a canibus dictum, qui nunquam satiuntur, donec cibum vomere cogantur. Fit autem quinquemodis: aut propter multitudinem melancholice profluentis a splene ad os stomachi: aut a mala complexionem stomachi frigida cum materia, aut sine materia, proprie tamen sine materia, & hoc quando non fuerit ultimatata: aut propter raritatem corporis: aut propter exercitium & laborem resolutionem: aut propter consumptionem humidarum nutrimentalium totius corporis: sicut fit post ægritudines chronicas, vel solutionem ventris, vel famem diurnam. Signa eius propter melancholiam, sunt quod cum multitudine comestionis est multitudo egestionis: & hæc egestio (ut plurimum) liuida est vel plumbea: & si non habuerit omni die egestionem copiosam, ilico gravatur: et quia fit mordicatio, vehementer in stomacho ante cibum, ita quod non toleret quin comedat. Et eius cura est difficilis

lis: quia (vt plurimū) hæc causa est a generatione: curatur tamen, secundū q̄ est possibile, digerēdo melancholiā, & aperiendo vias splenis cū oxymelle cōposito, & aqua decoctiōis prunorū, senæ, epithymi per dies sex. Postea purgetur cum aliqua medicina dicta capitulo de perturbatione virtutum sensitiuarum, parag. de melancholia ex melancholia naturalī, & proprie cum pillulis: et fiat vomitus si sit possibile. Et si habitudo sit carnosa, fletobometer basilica lateris si noster in brachio vel in manu: aliter vero nequaq̄. Et comedat cibos pingues vntuosos forbiles, & proprie carnes porcinas recentes & brodia ex eis. Similiter & maluam, attriplicem, & siclam coctas & conditas cum lardo vel buryro, similiter ex amylo. Bibat vinum dulce subtile & sape in principio cibi: ga prosternt appetitum. Vnde Hippocrates secundo partic. aphorismorum: Potus indigentiam soluit, Mensure cibum secundum indigentiam, non secundum appetitum. Ponat nanque ventosas super splenem propter diuersionem. Euitet cibos generantes melancholiam, vt est vinū rubeum, caro salita dura bouina vel ferina, agrestis, acetum, acetosa, lentes, & similia. Signa eius propter frigiditatem stomachi sunt, q̄ egestio est maior vel æqualis cibo, liquida, flegmatica, & singultus & eructuatio, rugitus, & sitis modica, & sensibilis frigiditas oris stomachi: & q̄ iuuatur a cibis calidis, nocetur a frigidis. Et si sit cū materia, est multitudo saliuæ & spuri, & desiderat cibos assos, siccos, duos, licet eos digerere non possit: Et sit quandoq̄ nausea & vomitus flegmaticus si materia sit multa, & excreuerit: & tūc prosterntur appetitus. Et eius cura est dicta cap. de digestionis debilitate, parag. de causa frigida. Et oportet, vt cōfortetur stomachus, & velociter curatio, priusq̄ accidit bolissimus.

Signa eius propter raritatem corporis, sunt q̄ egestio est modica, licet comestio sit plurima, & est (vt plurimum) sicca, adusta: & mollities cutis corporis cū subtilitate, & multitudo sudoris tēpere ægritudinis: & quia cito læditur ab aëre frigido vel calido & balneo in ieiunio. Et cura eius est, vt habitet in aëre frigido, & balneetur in aqua frigida in æstate frequenter: & vnguatur corpus cum aqua ros. vel oleo ros. cum cera inspissato. Utatur cibis grossis actu humidis, vt penetrare possint: vt sunt carnes vaccinae, castratinæ arietinæ, assæ vel elixæ conditæ cum agresta vel vino granatorum vel sumach. Et quandoque utatur cibis viscosis, si non timeatur opilatio epatis & miseraicarum, vt est caseus recens, extrema porcellorum, panis de simila vel azymus, & pulmenta de farina frumenti condita cum lacte vtilato. Bibat vinū rubeum, grossum, dulce. Signa eius propter laborem resoluentem, sunt antecessio laboris & exercitiij. Et si non detur ei cibus post famem vehemētem, aduenit ei syncop. Et cura eius est otium & quies omnino, & vsus iurium carniū bonarū conditarū cum speciebus aromaticis nō acutis. Et oportet, vt prohibeatur somno oīno ante cibum, similiter & a balneo: qm̄ hic somnus faciem citrinat, quēadmodū balneū virtutē debilitat, et corpus inanit. Post hæc fiāt oīa dicta de raritate. Detur cibus sape et par, donec corpus resumatur. & bibat vinū rubeū, vel claretum, vel medonē. Utatur cibis boni chymi: vt sunt carnes pullos, hœdorum, & auium paruarū syluestrium non aquaticarū, & oua forbilia recētia, similiter & iura aromatica, vt bona massa sanguinis regeneretur: deuitet fructus, et olera, & oīa facile putrefaciētia.

Prognosticatio. Appetitus canin⁹ in cōualecētib⁹ cōualecētia vera & cū bonitate hystimbre,

Tractatus primus

confortationem virtutis & refumptionē corporum significat. Sed in conualescentibus conualescentia nō vera, stomachū frigidum cum materia v'l sine materia, & recidiuam significat. Redi igitur ad digestionem & euacuationes flegmatis acetosi et calefactionem stomachi. Item appetitus caninus in corporibus crapulosis, ad indigestionem, lienteriam, & hydropisim, & colicam finaliter perducit. Item dicit Hip. 1. parti. apho. Si ex agitudine cibum quis accipiens non conualefcit, &c. Si vero cibum non accipienti hoc acciderit: significat quoniā corpus euacuatione indiget. Item idē: Ex agitudine bene reficiente nihil addere corpus, malum: quoniam virtutis nutritiue defectum cum appetitu symptomatico stomachi demonstrat.

De bolismo. Cap. III.

Bolismus est fames siue inanitio membrorum cum fastidio & prostratione appetitus, propterea q̄ stomachus & membra sunt in contraria in dispositione: quapropter manifestū est, q̄ bolismus, & appetitus caninus passionēs sunt contrariæ omnino. Fit autem tribus de causis. Prima est nauseatiua satietas stomachi chronica cum indigestione: propter quod repletur stomachus superfluitatibus crudis flegmaticis, nō potentibus nutrire corpus neque rectificare ab epate: quare inaniantur membra & venter sicut accidit bibulis & gulosis habentibus corpus extenuatum, & ventrē inflatum cum subtilitate mirach. Secunda est frigiditas ambitus totius corporis constringens materias a venis & membris ad stomachum & intestina: siue hæc frigiditas sit a causa extrinseca, vt accidit ambulātibus in aëre frigido: siue intrinseca, vt patet in se. flegmaticis & hydropis: & huiusmodi quidem bolismū quādoq̄ antecedit appetitus caninus, si

frigiditas nō fuerit vltimata. Tertia est caliditas vltimata circa ambitum corporis colliquans materias & fluere faciens ad epar, & miseraicas, & ad stomachum, & intestina: sicut accidit in fe. acutis & itinerantibus in sole calido. Signa bolismi in communi sunt inanitio venarum, & extenuatio corporis cū prostratione appetitus sine causa manifesta: & debilitas virtutis, ita q̄ quandoq̄ fit syn copis tempore calido ante cibum. Si aut sit propter crapulam, patet ex narratione infirmi. Si propter causam frigidam: præcesserunt, vel sunt feb. chronicæ, vel itineratio per niuem, & fit quandoq̄ vomitus viscosus, insipidus vel acetosus: et multitudo sputi & saliuæ & muscillaginis albæ in principio super linguam, & color corporis pallidus albus, v'l liuidus. Et vrina alba grossa, & egestio liquida acetosa alba vel dura. Si vter sit constipatus cum rugitu venteris & tensione, pulsus rarus, mollis, paruus debilis: nisi fuerit post longum processum sine fe. & inanitione membrorum: quoniam tunc fit spissus durus. Et sequitur plerumq̄ nervorum induratio propter frigiditatem infiltratam. Si vero fit propter causam calidam: antecessit iter in aëre calido, vel fe. acuta, & fit sitis & amaritudo linguæ cum siccitate labiorum, & adustione sine nigredine super lingua, & vomitus rei citrinæ vel viridis, amaræ, subtilis. Il quidam non viscosæ, & sensatio caliditatis circa os stomachi. Et quia iuuatur a frigidis, nocetur a calidis: & eructatio fumosa, sicca, foetida: vrina citrina, subtilis, pulsus spissus durus a principio. Egestio dura citrina vel nigra, nisi venter sit obediens: tunc fit liquida, citrina: sicut vitellum oui.

Methodus. Cura bolismi propter gulositatem diuturnā, est abstinentia, & minoratio cibi & potus, & motus & exercitium in ieiunio, non tamen

superflue: ne membra resoluantur. Fiat igitur a principio digestio & euacuatio flegmatis & humorum crudorum cum medicinis dictis cap. de indigestione, parag. de causa frigida. Et diætetur diætâ subtili in substantiâ & quantitate, vergente ad calidum penetratiuum. Parum & sæpe comedat, donec stomachus confortetur. Fiant vngueta & cerora dicta illic. Cura bolismi a causa frigida, est eadem cum ista. Quod si sit cum feb. curetur febris cum digestionē et euacuatione præcedente. Et si iuncturæ cœperint sentire lassitudinem & debilitatem: vngantur leniter valde cum oleo calido ro. sine frictione, ne materiæ attrahantur super membrum debile non potēs earum cursui resistere: & fortassis hecticā inducāt: in fine vero confortentur cum vnguento martiaton ac agrippa & adipe castorei vel canis vel vulpis ad solem calidū aut ignem frequēter liniendo. Cura bolismi a causa calida, est eadem cum cura indigestionis a causa calida materiali: quā supra diximus ca. de indigestione. Et habet in aëre frigido: gaudeat orio & somno proposse: roretur facies & totū corpus cum aqua ros. & ex oleo ros. & fiat vnguentum super dorsum & pectus. Bibat sæpe in ieiunio oxyzacarum vel syrumpum ros. vel viol. cum aqua frigida. Vtatur pro sapore vino granatorum vberberis, vel aceto, vel agresta: quem ad modum in causa frigida conuenit vti sinapi & melle & vino acuto veteri puro. Balneetur post euacuationes in aqua decoctionis ro. endiuæ, lactuæ, mirill. Et post balneum vngatur. cum populeon, & cum aqua ros. & oleo ro. mixtis cum aceto. Bibat aquam frigidam vel vinū album ponticum lymphatum pro medietate. Et si sit cū feb. curet vř dicemus.

Emperica. Scias, q̄ in cura omnis bolismi, nihil melius est, q̄ habere omni die vētrem laxum per se vel

per artem cum suppositoerio vel clysteri lenitio, vel medicina leni: quia purgando causam, curat bolismum, & confortare membra cum vnguentis & balneis stypticis, & electuarijs confortatiuis, & odoramentis aromaticis, & otio & gaudio proposse. Sed nihil deterius est, q̄ coitus & multitudo repletionis ciborum diuersorum et comestio lactis: quia lac cū in ventre non mundo receptum fuerit, illico corrumpitur: in cholerico quidem ad fumosum, in flegmatico vero ad acetosum: quapropter fortificat bolismū. Ars autem retinēdi omni die ventrem lubricum cum clysteri lenitio in feb. est hæc. ℞. malua, bis malua, añ. M. i. furfuris p. i. bletæ, centaureæ añ. M. f. bulliant in aqua perfecte & cum lib. i. & f. illius aquæ colatæ, & 3. iij. olei violæ 3. i. mel lis, vel cassiæ fistulæ vel tamarind. & 3. i. salis simul mixtis & iterum bullitis & colatis: fiat clystere, quod iniiciatur ante cibum, cum repidum factum fuerit. Et si sit cum febre acuta, adde lactuc. viol. foliorum papaueris dimittendo centauream. Et si sit cum multitudine flegmatis in ventre, adde hermodactylos, cologuintid. agaricum in decoctione, vel hierapicra vel benedictæ in colatura. Et si sit cū multitudine cholæræ, adde zuccar. viol. vel syrupū viol. vel diaprunis simplicis vel cōpositi laxatiui in colatura. Sed si sit cum multitudine melancholiæ, adde sene, thymi, epithymi, esulæ in decoctione, vel hieralogodion, vel diasene in colatura. Sed si sit cū multitudine ventositatis adde ruthæ, tartari, polypodij, anisi, vel carui, cymini in decoctione, vř olei rutacei in colatura: sumēdo de quolibet eorum prout conueniens fuerit. Ars tenendi ventrem solutum omni die cum suppositoerio est, vř fiat suppositoeriu cū sapone vel lardo inunctū ex oleo vel butyro calido, & aspersum sale modico: vel fiat suppositorium fortius ex agari-

Tractatus primus

eo colloquintid. elull. añ. par. i. salis gemme vel salis communis par. f. mellis, qđ sufficit ad temperādum, postq̃ bene puluerisata fuerint: vel fiat suppositorium ex sale gēma, & imponatur ante cibū: vel ex farina siliginis vel fursuris & sale communi contemperādo cum melle, quod sufficit. Et si addideris fel bouinū per se vel cum melle, melius erit. Ars vero retinendi ventrem solutum omni die sine periculo per medicinas leuiter soluētes, similiter & per cibos laxatiuos, diceſca, de stypticitate ventris, parag. de empericis: si deus voluerit.

Canones. Sciendum, qđ medicinx & cibi laxatiui non debet omni die frequērari, sed cum necesse fuerit: ne natura fiat assuetudinaria, & expulsua somnolēta. Item cibum laxatiuum semper dare conuenit a principio comestionis, cum volumus vt laxet, & stypticū post cibum: quia naturam primi cibi sapit tota diæratio: vt dicit Gale. 2. alimētorum cap. de pomis.

Prognosticatio. Bolismus si perdurauerit, necessario perducit ad hecicā vel hydropisim, & proprie tympanitem, propter stomachi debilitatem. Item bolismus in ægritudinibus chronicis: vt est feb. quartana, vel quotidiana, vñ hydropisis, mortalis, propter defectum virtutis in via longa.

De corruptione appetitus.

Cap. V.

Corruptio appetitus dicitur a phisicis hystimbre: & est cum quis appetit res malas nullo modo conuenientes nutritioni corporis humani, velut sunt carbones, & argilla. Fit autē propter repletionem stomachi ex malis humoribus diuersis, quorum quilibet inducit stomachum ad appetitum rei contrariæ humori in qualitate et sapore gratia curationis: vt sunt proprie humores

grossi, frigidi, melancholici, vel flegmatici, fluidi, acetosi. Ista autem repletio stomachi fit propter gulositatem & indigestionem stomachi: quare fit congestio diuersarum materierum in stomacho: vt in pueris, & hominibꝫ gulosis. Fit quandoqꝫ propter regurgitationem mēstruorum vel hæmorrhoidarum ad stomachum. Quandoqꝫ propter opilationem epatis & splenis: quare melancholia nō purgatur, sed redit ad stomachū. Quandoqꝫ propter frigiditatem in ambitu corporis totius constringentem materias a venis ad stomachum, siue hæc frigiditas sit ab extra: sicut accidit infrigiditas in aere, siue ab intra: vt contingit hydropicis. Quandoqꝫ propter caliditatem colliquantem materias, & fluere facientē ad stomachum: vt contingit balnearis, vel exercitantibus in sole calido, vel febricitantibus se. acura. Quandoqꝫ propter corruptionem omnium humorū corporis ad genꝫ melancholicū vel flegma vitreum. Signa communia patēt ad sensum, scilicet quia æger desiderat terram & carbones, & alia huiusmodi. Signa autē propria sunt: quia vel antecessit gulositas diuturna, vel retētio mēstruorū, vel hæmorrhoidarū: vel sentitur grauitas & tensio in hypocondrio vtroqꝫ, & proprie sinistro, vbi est situatus splen, vñ passionēs frigidæ vel calidæ, vel ægritudines chronicæ præcesserunt.

Methodus. Cura istius ægritudinis ex quacunque causa fiat, est vna & eadē: quia non respicitur causa antecedens sed coniūcta, præterq̃ in muliere prægnāte, in qua oportet habere considerationem ad fœtum, & dare medicinas leuiiores. Si igitur sit prægnās, fiat (si est possibile) vomitus leuis cū oxymelle et aqua calida, pmissa saturitate ciborū, & proprie de cepis & allijs & sinap. in modica tñ quantitate respectu aliorū vomētium. Post vomitū vñ diacriticū

tum speciebus, vel diagaſſaga. Non purgetur cū medicina laxatiua: q̄a leuis nō ſufficit ad euacuationē humorū groſſorum frigidoꝝ: ſed eam fortem nō debet medicus miniſtrare, ne fiat abortus. Nā ille appetitus corruptus non aduenit mulieribus prægnantibus, niſi primo, ſecundo & tertio menſe: vt dicit Gaſſ. li. de accidēti ca. de cauſa famis & ſitis, quia illis mēſibus fœtus indiget modico nutrimentō: & ideo multa menſtrua ſuperfluunt in v̄tre mulieris, cum poſt primum vel ſecundum mēſem incipiāt retineri menſtrua: vt dicitur ibidem. Sic prægnantem mulierē purgare non conuenit ante principium quarti menſis: nec poſt ſextū mēſem: & adhuc illis tribus menſibus leui conuenit v̄tri purgatione. Vnde Hippo. 4. parti. apho. Prægnantes purgare ſi cōuenit, a quarto vſq; ad ſeptimum menſem conuenit: minus vero has, minora vero & ſeniora vereri oportet. Comedat carnes gallinæ & cerebella hœdi, vel arietis aſſi. Bibat vinum odoriferum clarum: vngat os ſtomachi cum oleo maſtichino & nardino mixtis addito modico aceti calefacto in vaſe duplici. Et ſic regatur vſq; ad quartum menſem: quia tunc ceſſabit iſte appetitus, ex eo q̄ vna pars materiæ euacuata eſt per vomitū, alia pars tranſiit ad fœtum, & tertia pars per abſtinentiam (quam patiuntur) eſt ad beniuolum reducta: vt dicit ibidē. Et non negligatur regimen prægnantis: quia eſt maxima pars ſanitat̄is & debilitat̄is fœtus. Cura eius in non prægnante, eſt vt ſi ſit puer: cohibeatur a ſua gulaſitate, & minoretur cibus ſine tamen plurima abſtinentia, quæ ledit ipſos q̄diu creſcūt, & calor naturalis in eo eſt fortis. Si autem ſit adultus, fiat primo vomitū propoſſe duobus diebus cōtinuis modo & ordine, quo diximus ca. de fœtore naſi. Poſt vomitū v̄tri diacironitē calido nō laxatiuo: vel iſto electuario. ℞. zuc

cari ro. vel roſatæ nouellæ 3. ſ. limaturæ acuum ablutæ cū vino & aceto 3. ſ. miſceantur, & detur ad modū nucis emni mane cum modico vini optimi: q̄a exiecat ſtomachum & confortat ſplenem. Si autē non poteſt vomere, digeratur materia cū oxymelle cōpoſito vel liquillitico & aqua calida decoctiōis cardamomi, vſq; gallangæ vel ciperi. Et purget cū pilulis cochijs et foetidis, vel cū decoctiōne myrobalanorum emblicorū & indoū. Nutriatur bonis carnibus & vino: mitiget̄ur appetitus gradatim cum conuſſione cſſium pullorum & columborum vel perdicum aſſatorum, vel cum carne ſalira ſicca condita cum ameos, ſpodio, cardamomo, & nuce muſcata: quia a proprietate remouent talem appetitum.

Prognosticatio. Appetitus ſtomachi eſt via ad cibationē, cibatio vero ad digeſtionē, digeſtio vero ad nutritiōnē: quare non tardetur eius rectificatio: ne forte mēbra nutrita nutrimento corrupto et peſſimo leprā vel fe. quartanas, vel apoſtemata cancroſa, vſq; paſſiones ſpleneticas, vel epaticas incurrāt: qualitas namq; ibi remanet in membrō, & proprie ſymbola: vt dicit Gaſſ. 7. de accidēti. Et Ariſt. lib. de generatione, quod patet exemplo, quia vermes remanent virides per æſtatem quando nutriuntur gramine & frondibus, & flaveſcunt autumno & hyeme. Similiter & fructus alterāt̄ur in ſapore propter plantarum vel arborum translationem.

De ſiti. Ca. VI.

Sitis eſt diſpoſitio calida oris ſtomachi faciens appetere frigidum cum humiditate, quæ admodum fames eſt diſpoſitio frigida ſicca partis eiufdē faciens appetere humidum cum caliditate: vt ait philoſophus ſecundo de anima. Quapropter Galenus quarto de

Tractatus primus

accidenti cap. de causa famis & sitis, dicit q̄ fames fit: cū os stomachi sentit pro toto cōsumptionē suā humiditatis subtilificāz propter cōtinuam suctionem epatis & membrorum. Sitis vero fit, cū os stomachi sentit pro se, vel pro toto cōsumptionem suā humiditatis madefactūz & circumfluidāz propter aduersionē vel arefactionem. Fit igitur aut a causa primitiua, aut a causa cōiuncta. Si a causa primitiua, fit quinq; modis. Primo quidem a comestione cibi saliti plurimi, vel calidi vehementer sicci. Secundo a potu vini acuti vetustissimi, vel aquā salis vel nitrosā, vel sulphureā. Post cuius sumptionem aliqui non cessant bibere, donec solutione ventris & mordicatione moriantur: vt dicit Galeñ. ibidem exemplificās de nautis maris, & de febri citantibus aquam frigidā potantibus aliter q̄ oportet. verbi gratia: In febre acutissima, qualis est synocha, vel causton, si bibant ex ipsa parum post cibum: tunc enim magis & magis inflamman-
tur: quia haustus vnus & maximus, & totus simul competeret eis, qui ipsos refocillaret, & proprie post signa digestionis, & cum est sine apostemate, & cum desiderio vehemēti aquā frigide: de quo tamen latius lib. 1. & cap. de apostemate stomachi & intestinorum et splenis. Tercio vero propter moram plurimam sub sole calido, vel balneo æstuoso. Quarto propter solutionem ventris superfluam per se vel per artem, vñ propter fluxum superflū mēstruoz vel hæmorrhoidaz. Quinto propter sumptionē medicinz calidā siccā laxatiuz vel nō laxatiuz. ¶ Si vero fiat a causa coniuñcta: fit sex modis. Primo quidē propter indigestionē et crapulam: quia cum natura tentat digerere & dissoluere cibum indigestibilem vel potum superfluentē (vt accidit ebriosi) tunc calefit resistēdo, & igitur, & suos fumos transmittit ad os stomachi,

Secūdo modo propter vapores flegmatis vel salii vel viscosi, vel comestione piscium, quos natura desiderat abluere, ne corrodant. Tercio modo propter superfluitatem vrinā, vt contingit in diabete. Quarto modo fit propter opilationes epatis & viarum, quare ebullitio fit & calor, vt patet in hydropicis. Hydropici enim sitiunt etiam propter secundā causam iam dictā, scilicet propter flegma aquosum salsum contentum in vētre: quia male cibos digerūt, & in flegma salsum conuertūt, & proprie scabiosi & pruriginosi. Quinto propter caliditatem & siccitatem intestinorum: quare continue sugūt a stomacho. Sexto propter caliditatem & siccitatem stomachi cū materia vel sine materia, sicut contingit in feb. & proprie de cholera: vt est tertiana continua, vel interpolata: similiter & de sanguine, vt est synochus & synocha. ¶ Signa sitis vehemētis propter causam primitiuam, patent ex relatione patientis. Signa sitis propter crapulam & indigestionem, sunt nauſeatiua fatietas cum eructuatione fumosa foetida: quoniam si foret acetosa, sitim toleret omnino: similiter et dolor capitis, obumbratio oculorū, & somnus stupidus cū prauis imaginationibus, vrina alba subtilis cruda, nisi fortassis epas inflammaretur: quoniam fit citrina subtilis sine hypostasi: & hora digestionis inspissatur anhelitus & commouetur inflatio & rugitus in ventre, et fortassis subsequitur feb. ephemera maligna. Signa eius propter humores falsos & viscosos, vel efum piscium, sunt grauitas post comestionem & angustia cū reuolutione de latere in latus, & eructatio falsa & fumosa, & fortificatio sitis hora digestionis: & si bibat aliqd, sedatē sitis longo tempore: & post hoc iterum redit, & sputum salsum plurimum viscosum ampullosum: & potus dulcis ipsam augmentat: sed potus aquā frigī

de mixta cum aceto manifeste alleuiat, & odor vehemens cum pūctura sentitur in ore stomachi. Signa sitis propter diaheren, sunt maxima exuberantia vrinæ albæ, subtilis, aquosæ sine hypostasi: quia sicut potus assumitur, ita ilico per meleraicas & epar & venam Kilim ad renes attrahit propter caliditatem ipsorum & siccitatem, antequam digeratur, & debilitas circa locum renum, & extenuatio corporis de die in diem. Signa sitis propter opilationem epatis & splenis sunt dēssio & durities in hypocondrio altero vel in utroque, & egestio alba, sicut egestio canis, proprie si epar sit opilatū & lasso ex tactu hypochondrij opilati. vrina signata subtilis, cum perseverat opilatio: vel grossa, cum incipit vel deficit opilatio: facies citrina, & eructuatio amara foetida, & inflatio stomachi post coctionem. Signa sitis propter caliditatem & siccitatem intestinorum, sunt ventris stipricitas, & egestio sicca, adusta, nigra: sicut fabæ capræ: dolor circa vmbilicum, alleuiatio post potum plurimū & egestio vrit lacertos ani. Signa sitis propter caliditatem & siccitatem stomachi sine materia, sunt amaritudo oris cū siccitate labiorum & adustione & nigredine lingue statim a principio, & eructuatio fumosa, & prostratio appetitus omnino, proprie si sit in feb. hectica vel feb. ephimera apparet vera præter eā, quæ fit ex nauseatiua facie. Si autem sit cū materia, cū prædictis signis quandoque vomitus rei subtilis amaræ citrinæ, vel viridis sine omni viscositate vel pauca valde: & fit proprie in feb. putrida de cholera, vel sanguine, vel flegmate salso, vel feb. ephimera de nauseatiua latetate: quoniam cibus corrumpitur in fumosum.

Methodus. Cura sitis vehementis propter causam primitiuam, est eadem & vna in omnibus prædictis

secundum abstinentiam a calidibus, & alterationem stomachi cū contrarijs, vt est potus aquæ duleis frigida, vel cū aceto modicum permixta. Et vsus olei frigidorum vt lactu, cucur. peponum & similia et saporum frigidorum, vt vini granatorum, berberis, vel agrestis, vel fructuum frigidorum, vt prunorum recentium vel siccorum infusorum in aqua frigida, vel ceasarorum & persicorum: similiter & syruporum frigidorum, vt est syrupus rosæ, vel violæ, vel oxyzacarū bibitū cū aqua frigida vel aqua decoctionis lactucarum endiuia, vel seminum frigidorum, vt est diaprunis, zuccari rosæ, violæ, rosatæ nouellæ, diarrodo abbatis, tria sandal. Cura sitis propter solutionem ventris superfluam, vel fluxum mēstruorum chronicum, vel cursum hæmorrhoidarum perdurantem, est cura fluxuum eorundem: quoniam accidens curatur cura sui morbi: vt dicit Galenus 12. de ingenio sanitatis. cum accidens sequatur morbum, sicut morbus suam causam coniunctam, & sicut vmbra corpus: vt dicitur in 3. de accidenti. Quod si fluxus ventris fuerit propter sumptionem medicinæ effreniter laxantis, restringatur venter, & frangatur virtus medicinæ pro posse modo & ordine quem dicemus ca. de fluxu ventris. Cura sitis propter indigestionem & crapulam, est vt toleret sitim pro posse, nisi fortasse vinum vetus sumperit post indigestionem: Et vtatur electuarijs calidis: vt est diagallāga, diacyminum, & similia. Quod si cibus sit in stomacho, neque corruptus sit: quod scies, quia eructuatio non est foetida vel non valde: tunc inducatur somnus pro posse, vt cibū digerat. Quod si dormire non potest: ambulet assidue per diem integrā, vel quantum potest: Postea dormiat, & tegat stomachum cū calido plumaceolo molli: donec cibi digestio compleatur. Si vero cibus sit corruptus in stomacho, fiat vo-

Tractatus primus

mius pro posse: vt diximus capi. de fœ-
tore nasi. Si vero cibus descendit ad in-
testina, quod scies: quia superiora ven-
tris sunt alleuiata, & grauitas remanet
circa vmbilicum: tunc euacuetur cū me-
dicina benedicta laxatiua vel electua-
rio de succo ros. laxatiuo, dādo ex eis. 3.
f. cum aqua calida in aurora: vel bibat
plurimum aquæ calidæ salitæ: quia ven-
trem stimulat, & secessum procurat: &
yngatur stomachus cum oleo mastici-
no addito modico aceti actu calido: Et
vtatur oleis calidis prædictis, & intenda-
tur causæ, & negligatur accidens: quoni-
am illico sedabitur post euacuationes suf-
ficiētes. ¶ Cura sitis propter humores
viscosos, vel falsos, vel esum pisciū cor-
ruptorum, est vt sumat syrupum aceto-
sum, vel oxymel compositum, vel squil-
liticum cum aqua calida, vel aqua deco-
ctiōis berberis, cicoreæ, lactucæ vel ace-
tosæ ante cibum: Postea purgetur cū pil-
lulis cochis, vel bened. Comedat cibos
digestibiles conditos cum aceto vel agre-
sta vel sinapi. Bibat vinum album cali-
dum subtile, præterquam in materia sal-
sa: quoniā in illa competit vinum aquo-
sum, vel lymphatum ad medietatem,
& abstinentia ab acutis: vt sunt allia, si-
napis, sal, piper, & prædicta electuaria.
Cura sitis propter diabetem, est cura dia-
betis, & non negligatur: quia perducit
ad hecticam. Bibat ergo syrupum ros.
vel violarum cum aqua frigida: vtatur
prunis, ficibus, oleribus frigidis, vt lubri-
ficent ventrem, & stringant vrinam: vn-
gat renes cum populeon & oleo ros. & ce-
ra vel oleo viol. & aliquātulo aceti, vel
syrupo solatri, vel semperuiuæ; vel plan-
raginis & aceti. Bibat vinum rubeū pō-
ticum permixtum cum aqua plurima,
vel aqua decoctionis myrti. vel planta-
ginis vel ros. Vtatur cibus nutritiuus faci-
le digestibilibus, vt sunt carnes auiū par-
uarum syluestrium, vel pullorum, & iuri

bus eorum. Cura sitis propter opilationē
epatis & splenis, est vt vtatur cibus por-
tus & medicinis deopilatiuis & aperien-
tibus venas: vt sunt diuretica calida fa-
mosa, verbigratia, syrupus acerosus cō-
positus, & oxymel cōpositum vel squil-
liticum: & vinum album purum potēs,
& aqua se. cōmunium & calidorum in
aqua decoctionis reub. end. ciperi, cap-
paris, & electuaria calida prædicta. Et
purgetur cum pillulis cochis, nisi forte
epar sit inflammatum: tunc enim cum
diureticis calidis oportet addere diureti-
ca frigida: sicut se. communia frigida, et
cum electuarijs prædictis triasandalum
miscatur. Sed emplastra & epithyma-
ta deopilatiua epatis & splenis scripsi-
mus ca. de syncopi. parag. de empericis:
& emplastrum bonū ad splenem scripsi-
mus. parag. de turbatione virtutū sensi-
tiuarum de empericis: Et plura scribe-
mus ca. de opilatione epatis & splenis: et
suspendatur æger cū biadijs, donec cau-
sa sitis fuerit remota: quia tūc desinet siti-
re. Quod si sit cum se. vel hydropiti, cure-
tur vt dicitur, Cura sitis propter calidita-
tem & siccitatem intestinorum, est vt sæ-
pe clysterizetur cum clysteri leni frigido
humido lubricatiuo: vt hic. 18. malug.
viol. bis malug. lactu. bletæ. añ. coquant
perfecte in aqua, coletur, & de lib. 2. cola-
turæ, & olei viol. 3. 4. & syrupi viol. 3. 6. fi-
at clystere cum sola aqua repida decocti-
one ordeī prunorum, vel cucurbitæ. cor-
ticis papaueris, psillij, nenupha. vel dis-
soluatur in eo aliquid camphore, vel ad-
dat aliquid syru. viol. vel olei viol. & fre-
quenter inijciatur in ieiuno. Et plura dice-
mus ca. de stypti. ventris: semper in prin-
cipio cibi vtatur aliquibus lubricati-
uis, vt sunt pruna recentia, ius caulium,
vel lentium, cerasa, olus confectum ex si-
cla & malua conditum cum oleo vel bu-
tyro: & panis furaceus conditus cum
butyro recenti: Sed in fine cibi suma 1 sty

39.
Cof
h
ber
y

ptica: vt sunt caseus antiquus, assa pira, & cotonea: panis de simila vel azymus. Cura sitis propter malam complexionē calidam & siccam stomachi cum materia vel sine materia, est illa quam diximus in ca. de indigestione. Parag. de causa calida, Et si sit cum fe. curetur feb. vt dicitur.

Emperica. Medici distinxerunt sitim veram & non veram, appellantes veram, quæ est passio oris stomachi: & de hac locuti sumus hucusq; & ista magis extinguitur aqua frigida vel aceto. Sitim autem non verā appellantes caliditatem & siccitatē pulmonis & gutturis propter cauma & adustionem spiritualium membrorum: sicut accidit in fe. & hæc magis tollitur aere frigido qui est in superficie aquæ currentis, vel gargarismate facto ex aqua & aceto, vel epithymate pectoris ex aqua ros. & succo end. in quibus dissoluta sint camphora & pul. sandal. quam cum potu li quoris cuiuscumq;. Quapropter si quis bibat in hac siti, donec extingatur: sentiet porum fluctuare in stomacho prius quam sedetur sitis: quapropter grauabitur stomachus & in frigidabitur propter errorem. Item ad quancumq; sitim confert ponere super linguā frusta lara subtilia pomi acetosi, vel citri in frigidata in aqua frigida, frequenter reiterando, quādo calefacta fuerint, cum inglutitione salia: similiter & pruna sicca imbibita in aqua frigida, donec ingrossescant: vel tādū retenta super linguā, donec liquefiant. Similiter penid. & zuccarū ros. vel viol. atq; diaprunis. Itē grana psillij vel se. citoniorum excoctata ligentur in sacculolneo albo molli ad figuram digiti auricularis, & infundantur in aqua frigida, donec muscillagines per poros emerint, & ponantur super linguā, donec sacculus exiccetur: tunc reiterentur. Item confert ad illud non modicum inspiratio

acris in frigidati cum oratione aquæ si gida per cameram infirmi, vel cum aq ros. Similiter & euēratio faciei cum stibello. Item pillulæ bikikiæ descriptionē diuersarum ad hoc conferunt, dictæ cap. de phthisi. Similiter pillulæ de camphora, & de spodio posite ibidem. Itē trochisci sic fiunt. 1. se. portulacæ, dragagāti. añ. 3. 3. se. 4. frigidorum excoctatorū se. lactucæ. añ. 3. 2. sandalorum, camphoræ, gummi arabici. añ. 3. 1. terantur & cribellentur & distēperentur cum aqua ros. muscillaginis psillij: & formētur trochisci parui, sicut cicera figuræ laræ subtilis, & teneantur continue sub lingua, donec paulatim inglutiantur: valent enim maxime in fe. arsiuis & siticulosis. Item portul. recens, vel semen eius in frigidatū in aqua frigida teneatur in ore.

Canones. Scias, quod post exhibitio-nem medicinæ laxatiuæ cuiuscumq;, quæ soluit attrahēdo, plura bona considerari possunt ex siti. Nam secundum Mes. in lib. suo de consolatione medicinarum solutiuarum capi. de siti, triplex est sitis: quarum quidem prima dicitur superoccupans. i. cito festinans: sicut fit cū exhibetur farmacia stomacho cho-lerico per naturam & siticuloso. In illo enim sit sitis, antequam medicina suffici-enter operetur: quapropter tali siti nō est credēdū. Secūda vero suboccupās. i. valde tardans: sicut fit cum exhibetur medi-cina stomacho naturaliter humido fle-gmatico. Talis enim non sitit post per-fectam purgationem, sed tunc solum, quādo superfluit purgatio: & isti siti etiā non est credendum: imo virtus medicinæ frā-genda est & venter restrigendus ne deiciatur per resolutionē. Tertia est succedens i. rationabiliter & proprie eueniens: scilicet quando post purgationes aduenit sitis propter mundificationem bonam sto-machi, & consumptionem humidī roridi quod est circa os ipsius beneficio bonæ

Tractatus primus

purgationis: & huic sititamen est creden-
dum. Sunt quædam corpora, quæ sitim
plerumque patiuntur ante purgationē, sed
non post, & si debite purgentur: velut ac-
cidit cum purgatur cholera, vel flegma
falsum. Signa igitur distinctiua specierū
sitis prædictæ sunt: quia si post paruam
purgationem medicina non proportio-
natam sitis superuenit: est superoccupās
& mendosa: quare nō stringatur venter:
sed præcipiatur ægro vt vigilet & moue-
atur gradatim, & ieiunet gratia ulterio-
ris laxatiōis. Vnde Hippo. 4. parti apho.
Quicumque in farmacijs non sitiunt, & cū
purgantur, non quiescant, donec sistant.
Ibidem: Cum volueris magis ducere elle-
borum, moue corpus: cum vero stare, so-
mnū fac, & noli mouere. Sed si post plu-
rimam euacuationem & dosim exceden-
tem sitis superuerit, ipsam non expe-
cta, sed ægrum prius restringe (vt dice-
mus cap. de fluxu ventris omnium mor-
dorum) & somnum & quietem præcipe:
& cibum & potum tribue, ne virtus pro-
sternatur. Sed si post euacuationem medi-
ocrem, & dosim proportionalem super-
uenerit illico sitis, ventrem cohibe, si ipse
non restringatur. Signa autem euacua-
tionis superfluctis etentissima sunt duo. Pri-
mum quidem est ægri debilitas plurima
præter rationem cū multitudine vel ma-
gnitudine ascellationum. Vnde Hippo.
primo aphorif. In perturbationibus ven-
tris, & c. Secundum mutatio humoris
purgandi in alium diuersum: vt si inten-
disti purgare choleram, & post eius edu-
ctionem exierit flegma vel melancholia:
vel plus adhuc sanguinis, iā excessit pur-
gatio: similiter de alijs humoribus: qua-
propter dicit Mes. in suo lib. de consolati-
ōe medicinarū solutiuarū: quod medici-
na solutiua qualibet cum effrenatur: edu-
cit primo humorem sibi proprium, quē
respicit: vt puta choleram: post si virtus
eius superfluit, educit humorem facilem

& facillime mobilem post illum, vt puta
flegma. Deinde si magis superfluxerit:
educit humores grossos vt melancholia:
am: Demum si maxime superfluxerit,
educit sanguinem. Et licet sanguis sit fa-
cilis mobilis quam flegma vel melan-
cholia: veruntamen natura retinet in se
pro thesauro. Et ex hoc patet, quam pe-
riculosa sit solutio cum medicina raliter
effrenata, vt per ipsam sanguinis educa-
tur: quia significat maximā humorum
inanitionem, & virtutis retentiuæ dese-
ctionem. Et ideo dicit Gale. 5. de simpli-
cibus, quod licet habeamus medicinas
educentes choleram, flegma, vel melan-
cholia, putum tamen sanguinem ne-
quaquā: quia ad hoc sufficit flebotomia:
cum sit minus periculosa quam pharma-
cia: quia cohiberi potest illico, cum quis
vult: & quidam qui reperit eam scilicet
medicinam euacuantem sanguinem, illico
fuit a rege morti condemnatus.

Dubitarur. De siti, vitrum potus debe-
at dari solum cū cibo, vel
ante cibum, vel post? Et iterum an aliter
tempore ægitudinis quā sanitatis? Vi-
detur quod post per Auicē. 1. canō. fen.
3. capitulo de regimine eius, quod come-
ditur & bibitur per totum, & tercio canō.
fen. 14. capi. de cura hydropisis aschiti,
vbi docet nos prohibere ægrū a potu per
duas vel 3. horas post cibum ratione for-
ti: quia potus propter suam subtilitatem
facit cibum crudum exire stomachum:
quapropter veniens ad epar non conuer-
titur in sanguinē, nisi forte aquosum au-
gmentantem morbum. Quod si venās
opilauerit & putruerit, se. efficiet cum hy-
dropisi mortalem. Item Galen. 7. de inge-
nio docet nos, in cura malæ complexio-
nis sicca stomachi, potum omnem pro-
posse denegare, vsq; ad perfectam dige-
stionē cibi in stomacho. Tunc nanq; da-
bitur, vt chylum transire faciat per mise-
raicas angustas ad epar. Nam propriū

officium potus eſt, chylum traducere per vias anguſtas. In oppoſitum arguit, quod facit bonam mixtionem in ſtomacho, debet dari ſimul cum cibo: ſed pot⁹ eſt huiusmodi. Item communiter omnes homines quando comedunt & bibunt: ſed fama quā omnes ſamant, non omni no deperditur: vi dicitur 7. ethicorū) Reſpondendum quoniam potus eſt triplex: quidam permixtius, alius extinctius, alius delatius, qui differunt in quatuor inſubſtantia, quantitate, numero, & hora ſumendi. Nā potus permixtius oportet vt ſit vinum purum vetus confortās digeſtiuum, ſed paruus quantitate: vt cibum non vndare faciat, & frequens numero: vt fiat bona commixtio per totū. Quapropter conuenit, vt apud comestio nem aſſidue per vices plurimas iniſtratur. Sed potus delatius oportet, vt ſit vinum lymphatum: quia melius penetra- bit: aqua namq; ſubtiliat ſubſtantiam vini, ſed vinum calefacit qualitate aque hęc duo penetrationi conueniunt: Oportet etiam, vt ſit plurimus ſumptus vna vice: quoniam chylum liquidum perdu- cet: oportet etiam vt miniſtretur, non ni ſi completa digeſtione prima: cuius non eſt vnum certum tempus in omnibus ho- minibus, ſed in quibuſdam duab⁹ horis: vt in calidis & exercitibus: in alijs qua- tuor: vel ſex ſecundum complexionem ſtomachi & ciborum in quali & quāto. Potus extinctiu⁹ oportet, vt ſit aqua pu- ra frigida, vel cum aceto modico permi- xta, quia fiet ſic magis extinctiua: opor- tet etiam vt ſit modicus quantitate, ne poſt ipſum ſtomachus lædatur: quapro- pter conuenit vt potius traſciatur ſugen- do quam ingurgitando: ne forte cibi di- geſtio interrumpatur. Et potus quidē hu- iusmodi non habet certū tempus ſumpti- onis, imo cum neceſſe fuerit, potetur & apud digeſtionem & in ieiuno: vt acidit in feb. Sed queritur an potus delatius ſu-

mi debeat, cum adhuc cibus eſt in ſtoma- cho: vel poſtq̄ descendit ad in teſtina: vi- detur quod quando eſt in ſtomacho: ga- alias non poteſt exire pilorum propter ei- us ſpiſſitudinem, & viā ſtructuram. Sed econtra videtur q̄ poſtquā descendit ad in teſtina: quia tunc primo cibus attra- hitur per miſeraicas ad epar. Dicendum q̄ debet dari, quādo chylus eſt adhuc in ſtomacho: quia reddit totum chylum li- quidum, & toti commiſcebit perfecte. Quod ſi quis obiecerit: quōiam talis po- tus tranſit indigeſtus ad epar cum chylo perfecte digeſto. Dicendum q̄ vinū mo- dica indiget digeſtione: quia calidum eſt & ſubtile: & ideo ſufficit ſibi pro digeſti- one hora illa pro qua commiſcetur chy- lo in ſtomacho, & hora qua ad in teſtina descendit, & hora qua tranſit per miſe- ricas. Sic enim venit digeſtum ad epar. Et ex his ſoluuntur rationes vtriuſq; partis præter hoc quod oportet adijci, q̄ ſubſtā- tia potus cuiuſcumq; non ſemper eſt vi- num, vel aqua ſed ſolum tempore ſani- tatis. Nam tempore ægritudinis requiri- tur alia & alia ſubſtātia pot⁹, prout eſtē- ditur ex capitulo ægritudinis, cuius eſt po- tus: ſiue ſit permixtius, ſiue delatius, ſi- ue extinctius.

Prognofſticatio. Sitis ſupueniēs poſt euacuationem con- gruenter ſarmaciz cum conſtantia vir- tutis & lenitate corporis, perfectam dige- ſtionem ſignificat, & proprie ſi color ege- ſtionis mutatur ab humore purgādo ad alium vicinum: vt dicit Meſ. in i lb. ſuo de medicinarum conſolatione. Item ſu- perfluam ſitim tollerare in ſe, quibuſcū- que, & proprie acutis arſiuis, eſt produ- cere ægrum ad arefactionem & maraſmū: quod & verum credimus in hydropiſi al- chire, de q̄ minime videſ: vt patet p̄ Aui- cen, loco præallegato. Detur ergo potus in ſubſtantia, qui conueniat ægritudini, ſi- militer & modo & qualitate conueniēte

Tractatus primus

sub canone iam præscripto. Vnde Gale. 8. de ingenio sanitatis cap. de se. ephimera ex nauseatiua satietate dicit. Sicim tolerare in feb. est martyrium sine iuamēto: licet in hoc sæpius errent communiter operantes. Item sitis intensa superueniēs post potum superfluum, vel comestione sine causa manifesta certificat indigestionem vel digestionis corruptiōem. Item sitis nocte superueniens post crapulam vel ebrietatem meli9 rectificatur somno quam potu extinctiuo. vnde Hippo. 4. aphorif. Quibuscumq; bibere desideriu nocte, &c.

De eructuatione Ca. VII.

ERuctuatio siue ructus est expulsio ventositatis superius a stomacho inflantis & extendentis ipsum: quēadmodum & trulla dicitur expulsio ventositatis per inferius ab intestinis. Sed cū ventositatis causa non sit alia, q̄ caliditas diminuta, quæ frigiditas potest appellari: vt ait Gale. 6. de accidenti: oportet vt eructuatio complexionem frigidā stomachi testetur. Hæc igitur ventositas aut multiplicatur in ieiunio: quare fit a mala complexiōe diuersa frigidi stomachi cum flegmatica materia viscosa, vlt̄ aquosa, in quā agit calor naturalis: Et signa eius, sunt multitudo sputi & saliuæ insipidæ & viscosæ, & inflatio vētris cū rugitus ante cibum, & q̄ hora digestionis accidit commotio fortis in ventre, & vrinā videtur al. grossa: & patiens iuuatur a calidis, nocetur a frigidis. Aut multiplicatur post comestionem, & proprie superfluum quantitate, vel frigidam qualitate: quare fit a mala complexione frigida sine materia, quod tunc accidit propter caloris naturalis diminutiōem agentis in cibum potentis quidem eleuare vētositates ab ipso, sed non carminare. Et signa eius sunt: quia nulla sentitur grauitas, aut modica in stomacho ante cibum

sed post ipsum: & tunc fit rugitus & inflatio, cui succedunt omnia signa stomachi frigidi sine materia: quæ diximus capit. de indigestione. Fit & quandoq; propter sumptionem cibi ventosi naturaliter: vt fabæ, rapæ, fructus crudi: sed tunc nō significat super dispositionem continentis, sed contenti.

Methodus. Cura eructuationis frequētatē ante cibum, est cura malæ complexionis frigidæ cum materia flegmatica, dicta capitulo eodem cū digestionibus, euacuationibus, vnguentis, electuarijs, & cerotis. Præter illa autē fiat tragea ex mastice, thure, cymino, passulis, añ. 3. i. quā masticet in ieiunio cum inglutione. Fiat etiam tragea ex semine carui, anisi, feniculi, petro, cardamomi añ. partes æquales, quam masticet omni die post euacuationes. Vtatur post euacuationes diatriopiper, diacyminum, diazz, dīaniso, & omnibus electuarijs calidis in ieiunio, bibendo post ipsa aliquid vini veteris puri potentissimi. Balneetur in aquis frigidis stypticis: vt sunt aquæ tinnarum, & aquæ decoctionis absynthij, mentæ, rutæ, pullegij aluminis & fursuris, & proprie post euacuationes. Cura eius, quæ fit post cibum, est eadem cum ista, præter quod non est opus euacuationibus, sed alterationibus in ieiunio: nec multiplicet cibum in quanto continuo vel discreto: & vitet legumina omnia, proprie fabas, cicera & pisa. Nō vtatur fructibus, nisi forte caricis ante cibum, & piris assis vel cotoneis post cibū cum tragea prædicta, addendo zuccas propter delectationem: exercitetur semp in ieiunio, necumat cibum, nisi pri9 verus accesserit appetitus: tunc satisfaciat naturæ non appetitui quoquo modo: quia stomachus frigidus est in appetēdo bonū in digerēdo nō bon9: vt dī. Gal. in regni.

Canones. Scias, q̄ multitudo ventositatum in stomacho impe-

dit corrugationem ipsius super cibū, sed cum digestio sit alteratio naturalis, & alteratio naturalis nō proficitur, nisi agēs & patiens secundum extremam se contingant: ideo necessarium impeditur digestio prima: vt colligitur ex 7. phisicor. circa principiū, & 6. de accidenti. Item sicut dicit Gale, ibidem: ventositas non multiplicatur in stomacho calido neq; in frigido vehementer: quia calidum excellens dissipat & carminat eas, postq̃ eleuatæ sunt: Sed frigidum excellens non sufficit ad eleuationem earum: sicut ibidem exponit de ventis, qui nec multiplicantur in canicularibus, nec in medio hyemis, sed magis in vere & autumno.

Prognosticatio. Dicit Rasis in diuisionib; q̃ eructuatio multiplicata superflue corrumpit digestionem: sed diminuta in corpore consue- to inducit inflationem. Item eructuatio per se significat indigestionem: sed si sit foetida, significat cibi & humoris corruptionem ad calidum, si sit fumosa, capniosa, adusta: sed ad frigidum, si sit acetosa, insipida, vel saporem cibi sumpti retinēs, & proprie post 2. vlt; horas, a cibi sumptione. Itē excessiue ructuantes ante cibum, dispositi sunt ad colicam: sed eructuantes post cibum, ad hydropisim proprie tympaniten. Item dicit Hippo. 7. aphoris. In diuturna lienteria oxyremia id est, eructuatio acetosa supueniēs, est signum salutis: quia principium primæ digestionis, & retentivæ confortationem, & fluxus diuersionem significat. Sapor namq; acetosus semper fit a calido diminuto, nequaquā autem a frigido per se. Sypticus autem & ponticus licet dicantur ab Aristoteli, fieri a calido, hoc intelligit initialiter: verum in hoc refert dicere: quia quandoq; fit sapor a calido initiatē, vt in fluctibus nodum maturis. Quandoq; a calido exhalante & terminato: vt in aceto vini secundum Galen. 4. de simpli

cibus. & Auicena, 2. cañ. ca. de cognitione medicinarū p̃ ratiocinationē. Et intellige q̃ si a principio fuisset, nihil aliud ista oxyremia supueniēs significaret q̃ aduētū lienteriae futuræ, vel fortificationē plentis propter indigestionem cibi & chyli liquiditatem. Item ex hoc sequitur, q̃ eructuantes frequenter super cibum, proni sunt ad lienteriam & diarriam prolixā. Itē eructuatio in corpore sano semel vel bis facta ante cibum vel post, & proprie in corpore consueto, vel super repletionē bonitatem significat virtutis expulsiuæ: quia non creditur fore possibile, vt natura aliquem cibum digerat taliter, vt ex ipso nulle penitus superfluitates generentur: cum omne patiens naturale resistat aliquantulum agenti.

De singultu. Ca. VIII.

SINGULTUS est dispositio stomachi similis spasmō: adeo, q̃ si stomachus esset membrum musculosum, singultus esset spasmus: vt dicit Galenus 4. de accidenti. Fit autem quatuor de causis: Aut propter rem mordicātem os stomachi sua caliditate acura, sicut fit post comestionem piperis vel sinapis sumpto vino, vt in villos penetret. Similiter & post vomitum cholicum, velut in feb. quartana. Aut propter repletionem stomachi a cibis vel humoribus, a quib; eleuatur vtiōsitas grossa extēdēs ipsum velut post nauseatiam satietatem cibus vel potus, & proprie in infatibus & flegmaticis natura. Aut propter inanitionem, quam stomachus cupit propellere: vt post fluxum ventris plurimū, vel fluxum menstruorum vel hæmorrhoidarū, vel vomitum, vel egritudines chronicas cum quibus fuit multitudo sudoris vel fluxus sanguinis narium, vel euacuatio insensibilis cum habitudine extenuatā: aut propter apostema epatis, cui compa-

Tractatus primus

Cura stomachi. Nam si apostemare i stomachus in feb. forte debilitaretur virtus, ut talem motum facere non possit: & huiusmodi singulus est cum fe, acuta & nausea & colore plurimo in hypochondrio dextro, ubi situm est epas.

Methodus. Cura singultus propter rem mordicantem, est ut si sit cibum bibat aquam calidam, vel lac amigdalorum dulcium: & comedat butyrum recens cum buccella panis, & non bibat aquam tepidam: quia vomitiua est: sicut calida est absterfiva & sedativa: & frigida styptica, opilativa. Quod si sit humor cholericus, vel melancholicus, fiat vomitus pro posse cum syrupo acetoso oxymelle & aqua tepida vel cum aqua decoctionis anethi, raphani, & atriplicis, premissa repletionem ciborum: Et post vomitum confortetur stomachus cum oxycaccaro, vel syrupo rosaceo: & comedat pulmentum factum ex farina ord. vel similia conditum cum butyro vel ex amylo condito cum lacte amigdalorum & zuccaro, vel ex penid. eodem modo. Bibat aquam ordeacea vel iulep: Et si videatur necesse, digeratur cholera, vel melancholia, & euacuetur cum medicinis notis. Cura eius, qui est propter repletionem & grossam ventositatem, est ut saepe fiat vomitus iam dictus. Quod si sit difficile: digeratur flegma cum oxymelle composito, vel squillitico, & euacuetur cum pillulis cochleis vel hierapicra. Post euacuationes utatur masticationibus & trageis dictis capitulo de eructatione: Similiter & pulvere, qui sic fit cum vino calido potendi. ℞. fol. sismabrij, sicci, rutæ siccae, calamenti, añ. m. f. ameos zinz. carui, anisi, cymini, añ. 3. duas. masticis, olibani, añ. 3. f. terantur omnia, vel quaedam ipsorum subtiliter, & cribellentur, & fiat ex eis tragea si grosso modo terantur, addendo zuccarum vel passulas: vel fiat electuarium cum melle. Vta

tur diacimino, diatrion pipereon, diagalanga. Comedat cibos calidos siccos conditos cum speciebus acutis: bibat vinum vetus purum amarum. Exercitetur, & iudet ieiuno stomacho. In fine vero conuenit ut balneetur in aquis tinarum, vel aqua decoctionis rutæ, absynthij, carui, cymini, in qua etiam mentastrium & salvia fuerint bullita. Saccelletur postea cum fursure milio & sale, aut cum lateribus ignitis, & post hoc aceto acutissimo conspersis. Cura eius, qui est propter inanitionem, est restrictio euacuationum, & impinguatio corporis pro posse, & confortatio virtutis cum lacte recenti dulci, & sorbitione pulmentorum dictorum, & iurium carniū bonarum, & vino rubeo dulci, si feb. vinum non prohibeat, aut fluxus ventris lac: quare lymphetur vinum tunc, & lac vsuletur: similiter cum ouis forbilibus, & carnibus recentibus & proprie ex auibus paruis syluestribus: quoniam am facile digeruntur: Et ad illud confert balneum decoctionis aquæ psillij, maluarum bismaluarum, foliorum populi & salicis sine mora longa. Cura eius, qui est propter apostema epatis, videbitur in apostema teepatis.

Emperica. Ad singultum ex re calida mordicæ nihil melius est, quam potus aquæ calidæ, in qua dissolutum sit butyrum, vel oleum, aut lac amigdalarum. Si sit ex ventositate grossa, confert potus vini veteris, in quo bullitus sit pulvis olibani, carui, cymini & baccarum lauri: Similiter fomentatio cum spogia, vel pannolneo molli infuso in eodem actu calido, post parum expresso, & saepe super stomachum refricato, cum infrigidatur: Similiter & suctio vehemens cum ventosa magna ignita, & proprie post vomitum vel purgationem: Similiter aliud. ℞. thurthæ recentis, thuris, masticis, cymini, añ. partes equales: coquantur in aqua perfecte: & detur. 3. i. ieiuno stoma

cho: quia carminat ventositates.

Canones. Singultus aut sit ex sola qualitate, & sic est primus modus: aut ex materia, & hoc dupliciter: quia illud vel accidit propter eius presentiam: & hoc dupliciter: quia vel vitio stomachi: & sic est secundus modus, vel vitio epatis, vel alterius membri circumstantis, & sic est tertius modus: vel accidit propter eius absentiam, & sic est quartus modus, & similes modos diximus ea, de spasmis.

Prognosticatio. Singultus de inanitione, ut plurimum est mortalis, neque curam recipit, nisi forte a principio cum euacuatio nondum ultimatur, & magis in pueris quam in senibus vel adultis. Vnde Hipp. 4. par. apho. Spasmus aut singultus post multam inanitionem, malum. Item singultus de repletionem, aduenit subito cum forti motu, & assiduo conamine vomendi: Sed singultus de inanitione, aduenit gradatim, & post plurimam humorum & corporis consumptionem, & virtutis defectum: quapropter est cum debili motu sine conamine vomendi. Hoc autem pro tanto scire conuenit, ut in quibuscumque se singultum cum acciderit, discernamus an sit de repletionem vel inanitione, & ex hoc futura predicamus. Item si in se, continua aduenit singultus in die critica, & proprie signis digestionis perfecte apparentibus, & virtute constante & quam precepsit indicatio in die indicativa sibi propria cum singultu & vomitu diminuto, significat crislum completam per vomitum bonam & fidam. Si vero non precepsit digestio, sed euacuatio plurima per sudorem, vel fluxus qualescumque, & virtus sit debilis: significat crislum synthomaticeam & mortalem propter spasmum de inanitione venientem super corpus, quem primo sentit os stomachi pro toto. Item si post vomitum singultus non desinat,

aut minoretur: est malum. Significat autem fieri propter apostemationem epatis, vel inanitionem. Item dicit Hippo. 7. part. aphorif. In ileos singultus, malum. Item in vulnere ex casu vel percussione singultus, malum: quia significat interiorum vnicam stomachi fore laesam, quae consolidari non potest propter humiditatem fluidam & chylosam: & iterum propterea, quod membrum est nervosum, cui comparitur cerebrum: quare fortassis sequitur spasmus vniuersalis, sicut in punctura nervi. Item si post singultum superuenit spasmus, aut alternatio, mortale. Item si seniori purgato superuenit singultus, malum: quia inanitionem significat superfluam cum debilitate virtutis. Item singultus de repletionem, curas multoties per sternutationem fortiter inductam: quia materiam deorsum pellit. Vnde Hippo. 4. particula aphorif. A singultu habito sternutatio superueniens soluit ægritudinem. Item 4. parti. Sanguine multo fluente siue per superius siue per inferius, siue per vulnus, spasmus innatus, aut singultus: malum.

De vomitu & animi subuersione. Cap. IX.

VOMITUS est motus fortis stomachi, quo materia expellitur per superius, quemadmodum egestio inferius. Sed animi subuersio est, quando mouens mouet, & mobile non mouetur cum effectu: ut ait Auicē. signans quod animi subuersio est conatus vomendi continuus sine complemento: & sic patet, quod non differunt in causa neque in cura, sed solo gradu. ¶ Funt istæ passionem quatuor de causis. Prima earum est aggregatio rei calidæ, acutæ, subtilis in stomacho mordicatis os eius, siue sit cibus, ut allia, sinap. & piper: siue sit humor, ut pote cholera rubea, vel flegma salsum, quemadmodum apparet in fe. tertiana. ¶ Se-

Tractatus primus

da vero repletio stomachi a cibo peccante in quāto grauāre, vel i quali fluctuāte hora digestiōis. ¶ Tertia est collectio crudorū humorū in stomacho propter indigestionē & crapulā diuturnā debilitantē eis virtutē. ¶ Quarta vero mādatio, siue decursus materierū ab epate & venis totis corpis ad intestina et stomachū. Sicut em bono motu epas & venae trahūt materias a stomacho: ita malo motu regurgitare faciūt ad ipsū: vt dicit Gal. 2. prognostica. de egestiōe. ¶ Signa primæ causæ sunt antecessio ciborum acutorū: vel si sit ab humoris vitio: tūc illud quod eijcitur, apparet citrinum, vel viride, subtile, liquidum, amarum: vel album, fluidū, salsum sine plurima viscositate, vel croceum, spissum: sicut vitellum oui: & forte est cum fe. & hora paroxysmi: & est vrina citrina subtilis vehementer, & sitis intensa cum prostratione appetitus. ¶ Signa secundæ causæ sunt antecessio nauſeatiūæ satietatis in stomacho ex cibo vel potu vel vtroq; & post ipsam patiens sentit inudationem & agitationē in ipso. ¶ Signa tertiæ causæ, sunt antecessio signorum indigestionis, & debilitatis stomachi tempore longo, post quod superuenit vomitus humoralis, vel comixtus ex humore & cibo assumpto: immo si fortificetur hæc passio, non retinetur cibus omnino, vel paucus, & tēpore non longo: Et licet humor cōgestus in stomacho sit proprie nec flegma, nec cholera, nec melancholia: quia illa solummodo habent generari in epate, vbi generatur & sanguis: cum idem sit locus generationis rei, & superfluitatū eiusdem: vt dicit Auer. 3. sic colligit. ca. de passionibus stomachi: veruntamen est aliquid simile valde flegmati, vel cholerae, vel melancholiae, secundū q; i stomacho materia remanet cruda, v' inflāma q; ad eius subtile, & adurū, vel cōgelat q; ad elū grossū: sicut et i epate cōtingit, Si igit sit flegma,

fit eius substantia alba viscosa sine multa siti, & aliquādo fit viridis v' viscosa: cū antecesserit sumptio fructuū & olē crudorū: quare fit eius sapor nō amarus, sed insipidus, vel acetosus: et vrina grossa al. & pulsus paruus mollis. Si vero sit cholera, fit eius substantia citrina, vel viridia amara valde, liquida sine viscositate, & quandoq; grossa, sicut vitellum oui: & sitis vehemens cum prostratione appetitus et vrina ignita, subtilis, et pulsus spissus, durus. Si vero sit melancholia: fit eius substantia nigra vel plūbea, liuida, diuersa, in qua videtur residentia grossa admodum fecis vini rub. cuius sapor est pōticus, permixtus cum acetoso, vel amaro, vel salso, secundum q; est ex congelatione vel adustione: & vrina subtilis, radiosa, glauca, vel subruffa. Si autem sit sanguis: tunc non potest fieri nixi per rupturam venæ: quare consentitur dolor in stomacho, epate, vel splene: et illud quod egreditur, fit sanguis niger fluidus subtilis, si sit vlcus recens. Quod si sit fistulosum: fit grossus filitrosus velut frustū carnis simul cum sanguine fluido permixtū: quemadmodum in dysenteria sanguis exit per inferius cum mixtura carnis albæ viscosæ v' rasura pergameni propter vlcus intestinorum. ¶ Signa quartæ causæ, sunt dolor in hypochondrio dextro sursum vsq; ad spatulas, si sit ab epate, vel in sinistro, si sit a splene, vel inanitio venarum totius corporis & membrorum: si materia propellatur ab ambitu corporis totius: & forte senserit æger rugitum in membro, a quo materia fluit, & fortassis antecessit retentio menstruorum vel hæmorrhoidarum, aut forte antecessit debilitas epatis chronica: quare non generauit bonum sanguinem potentem nutrire membra, & ideo ipsum membra despicunt & repellūt: & tunc fit color corporis pallidus, sedus, citrinus habitudo extenuata propter inanitionem, Nam si

sanguis ille staret fixus in membris & venis, induceret cacheciam & hypofarchā: si vero descenderet ex mēbris ad intestina, induceret fluxum ventris sicut loturā carnis. Et certissimum signū huius quartii est, vt vomitus sit maior re q̄ sumpta est in cibo & potu, cū debilitate virtutis & inanitione corpis gradatiua. ¶ Vtrū autem materia delegata sit flegma, vel cholera, vel melancholia, vel sanguis: cognoscitur ex sensatione, & signis p̄dictis.

Methodus. Cura vomitus propter primā causam, est vt patiens abstineat a rebus acutis oibus, & vtatur frigidis: vt est lactuca, portulaca, cucurbita, vinum granatorū, vel berberis, zucarū ros, vel viol. rosata nouella. Quod si sit ab humore: prouocetur vomitus cū syrupo acetoso cōposito, et aqua tepida vel aqua decoctionis seminis atriplicis vel anethi, p̄missa saturitate stomachi ex oleribus humidis, vt pore lactucis, bleitis, malua, & similibus conditis cū butyro & cepis: vel mundificetur cholera cū decoctione reubarbari, & myrob. citrinorum: sicut dictum est ca. de indigestione: Vngatur stomachus cū oleo ros. & myrto: emplastretr cū emplastro, quod, 1℥. mirtilloꝝ corticis granatoꝝ, acatiz. añ. 3. 2. terantur, & cum albuminibus ouoꝝ misceantur. cum 3. 4. farinā ordeī, & 3. 2. olei ros, & aceti, quod sufficit ad emplastrū faciendū, & firmetur super os stomachi cum fascia. Quod si volueris fortificare: adde gumi arabici, dragaganti, boli armenici, & iteꝝ si magis terræ sigillatæ, balaustiz, cupularū glandium, corticum quercus & rub. & si sentit puncturā in stomacho, bibat oxyzaccarū, vel syrupum ros, vel viol. cū aqua frigida. ¶ Cura vomitus propter causam secundā, est minoratio cibi & potus, & exercitiū in ieiuno, & vti cibis calidis siccis aromatiz: vt est caro pullorū, & auiū parua: ū syluestriū, vel hœdorū assa super prunas

condita cum sinap. similiter et iura ipsorum condita cum pipere & gallanga. Bibat vinum vetus purum: famē & sitim toleret proposse. Et siāt omnia dicta ca. de indigestione, de stomacho frigido vel humido per naturam. ¶ Cura vomitus propter tertiam causam, est vt excitet stomachus cū vomitu factio ex oxymelle composito vel squillitico, & aqua tepida, vel aqua decoctionis raphani & seminis atriplicis & anethi, p̄missa saturitate ex cibis factis ex leguminibus coctis & conditis cum butyro & sale & allijs & cepis: sicut diximus cap. de foetore nasi. Purgetur cum benedicta laxatiua, vel decoctione myrobalarum, quam diximus cap. de indigestione, Parag. de canone. Post euacuationes vtatur diagallanga, vel diacitonitem, vel zucarū ros, vel rosata nouella: prout materia calida vel frigida requirit. Et si materia sit sanguis: fiant omnia quæ dicuntur ca. de vlcere in stomacho: & proprie confortetur stomachus, & consolidetur vlcus proposse cū trochiscis de bolo dictis cap. de sputo sanguinis. Parag. de methodo, dando ex ipsis sapius aliquid omni die cum aqua decoctionis mitillorum, vel berberis, vel citoniorum: Et diuertatur sang. cum flebotomia basilicæ vel saphenæ in manu dextra, & ligatione extremorum dolorosa & caueat omnino a cibis sanguinem acutum generantibus, vt sunt piper, allia & sinap. Vtatur pulmento factio ex farina similæ vel auenæ vel milio vel riso vel amylo vel farre condito cum butyro modico vel lacte amigdalorum. Bibat vinū rubeum dulce vel stypticum lymphatum cum aqua decoctionis mitillorum & plantaginis: Vtatur carnis pullorum assis vel fraxis cum butyro. ¶ Cura vomitus propter quartam causam, quæ omnī est periculosissima, est vt si materia sit sang. et euacuatō non sit vltima: fiat flebero

Tractatus primus

mia iā dicta. Et si sit alius humor a sanguine, purgetur cum medicina propria sapius iam dicta. Si vero debilitas et inania corporis vehementer præcesserint & ultimata sint, anteq̃ sis vocatus, non quidem euacua: quia vt dicit Hippocr. 2. part. aphorif. Vbi indigentia, nō oportet laborare, sed intende solis alterantibus, & confortatiuis, restrictiuis, diuersiuis. Fiat igitur emplastrum super epat quod sit tale. ℞. sandalorum, ro. rub. ciperi, mirtilorum, calami aromatici, añ. 3. f. spicæ 3. i. cera 3. f. olei masticiis 3. i. olei ros. 3. iiii. liquefiat cera cum oleis ad ignem: deinde remoueatur ab igne, & incorporetur puluis aliarum rerum perfecte, & extēdatur super petiā, & aspergatur forti aceto, & firmetur super epat cum fascia omni hora. Confortat enim epat sua stypticitate, sed sanguinē reprimat sua frigiditate. Et plura medicamina diximus capitulo de syncopi. Similiter & alia dicemus parag. de debilitate epatis, & eius opilatione. ¶ Super splenem ponatur & illud emplastrum confortatiuum eius, & deopilatiuum eius: quod est. ℞. ciperi, capparis, acori, azari, nucis cypressi, calamēti aromatici añ. 3. duas armoniaci 2. cera 3. 2. olei nardi, in 3. quatuor: Confice sic: dissoluatur armoniacum in aceto forti, & cum solum fuerit, ponatur ad ignem in calola cum aceto eodem, & cum coeperit dissolui, addatur cera & oleum: & cum bene dissoluta fuerint omnia, addantur succi, & incorporentur res prædictæ pulueri satꝫ eis in vase mūdo vitreato. Quod si non suffecerint prædicti liquores, addatur ex oleo, donec sufficere videatur. Et si non habeantur succi, sumatur pro eis vinum decoctionis herbarum earundem, & extendatur super corium album molle vel petiā, & firmetur cū fascia super splenem omni hora, & proprie ante cibum. Et alia emplastra diximus ca-

pitulo de melancholia, capit. de empericis, & capit. de syncopi. parag. de empericis. Et plura dicemus de debilitate splenis & eius opilatione. ¶ Super stomachum ponatur tale emplastrum, quod confortat ipsum, ne superfluitates recipiat: quod est. ℞. masticiis, thuris, boli armenici, terræ sigillatæ. añ. 3. f. sandal. añ. & ru. calami aromatici, ciperi, mirtili: añ. 3. i. piperis longi, gallangæ, sanguinis draconis, croci, añ. 3. 2. terantur, & cribelentur, & incorporētur cum 3. 6. olei masticiis, & 1. 3. i. cera, dissolutis ad ignem: & non incorporentur, dum sunt supra ignem: quia virtus eorum resoluere: sed postquam remota sunt ab igne, post dissolutionem perfectam in calola. Nutriatur carnibus assis bonis: Bibat vinū rubrum stypticum mixtum cum aqua pluuiali, vel aqua decoctionis mirtilorum. Ligentur quādoq̃ extrema & proprie adiutoria dolorose, & aspergantur manus & pedes sapius ex aqua calida proiecta super ipsa: quoniam est res conferens in diuertendo, & fricetur circumferentia corporis in balneo aquæ dulcis, in qua non moretur, vel in aqua dulci, vel in aqua decoctionis ros. calamēti, absynthij, mirtilorum florum chamomillæ, surfuris, vt aperiantur pori ad attrahendum nutrimentum, & stypticentur ad retinendum. Vtatur sæpius ante cibum, similiter & post diacitonitē cum melle & speciebus conditis & piris assis, vel coconeis, si inflatio non sit in ventre plurima. Et fiant omnia dicta capit. de indigestione. parag. de stomacho debili substantia. Et vngatur cum oleo ros. masticino & nardino simul mixtis, addito pulvere gariofil. & modico aceti calefactis perfecte in aqua feruente mediantē vase duplici, & proprie ante cibū. Et ponatur emplastrum prædictū super illud vnguentū, et confert. Et denē trochisci de carabe tribus vicibus quolibet die.

verbi gratia: semel in aurora, & semel ante prandium, & semel ante coenam, cū aqua decoctionis mintill. vel vino rubeo styptico cōficiātur: detur vnus in ieiunio cum aqua frigida. Item electuarius ad idem, qd appellatur diamenta. ℞. succi mentæ lib. i. vini granatorum quartā partē lib. i. zuccari. lib. 2. vel aliter. ℞. mentæ, succi granatorum. añ. 3. 2. mastice ros. rub. gall. añ. 3. 2. zuccari lib. 2. fiat electuarius. Item fomentum ad idem. ℞. thuris 3. i. cymini. 3. i. & f. baccharum lauri quātum de omnibus: terantur, & cum succo mentæ incorporentur, & stomacho superponatur. Item emplastrum ad idem. ℞. rosarum, cymini, mentæ, absinthij, saluæ, rutæ, sanguinis drac. boli armenici, bdellij, galbani, mastice, thuris, corticis granatorum, plantaginis balluistæ, añ. terantur, & bulliantur in aceto forti vel vino rubeo, & cum eodē conficiantur & actū calida sæpius firmetur super stomachum cum fascia in ieiunio & cum infrigidatur, statim reiteretur. Itē puluis de cornu cerui poratus cum liquore quocumq; confert in omni fluxu, siue per superi9, siue per inferi9 procedat. Itē si vomitus fiat propter congestionem diuersorum humorum in stomacho, purge tur cum hoc puluere: quoniam est educēs omne genus humorum cū facilitate. ℞. turbiti albi & electi, agarici, añ. 3. 2. reubarbari optimi, zinz. añ. 3. i. senæ quantum de omnibus. Dosis ei9 a 3. 2. vsq; ad 4. Item epithyma expertissimū est istud ℞. succi absynthij. 3. 4. cynamomi, gariolif. macis, cubebæ, mastice, sumach, acatiæ, mintill. corallorū. ligni aloes. añ. 3. 2. pulueriscentur subtilissime, & cum succis misceantur. addendo aliquid aceti citroniorū & calefiāt perfecte sup carbones ignitos: deinde spongia vel filtrum infundatur in ipsa: & post hoc modicum expri matur, donec fiat toridum: & ilico super stomachum firmetur, quāto calidius sufferre possit sæpius in ieiunio: & reiteretur

Emperica. Emplastrum contra vomitū. ℞. thuris, mastice, añ. 3. f. confice cum albumine oui, & pone super os stomachi, vel panem assum incorporatum cum succo mētē viridis, vel aq decoctionis eius & absynthij, & calidū firma super locum. Item ad vomitū prægnantium confert lac vaccinum vstulatum sumptum in potu. Similiter & pulmentum ex riso, vel milio, vel farina similæ conditum cum eodem. Et aliud ad idem optimū. ℞. vitellum oui assi, mel lis coclear vñ, mastice puluerisati subtiliter. 3. i. misceātur in simul in testa oui, & coquantur sub cinere calido continue agitando cum spatula, & sumatur pro cibo in ieiuno per triduum: valet proprie cibum vomentibus præmissa euacuatiōne cum vomitu vel solutione ventris. Item ad idem trochif. ℞. se. apij, anisi, absynthij. añ. 3. 2. myrrhæ, ameos, añ. 3. 2. terantur perfecte, & cum aqua pluuiali

frigida, vel aqua decoct. mentæ & plantaginis, vel cum vino rubeo styptico cōficiātur: detur vnus in ieiunio cum aqua frigida. Item electuarius ad idem, qd appellatur diamenta. ℞. succi mentæ lib. i. vini granatorum quartā partē lib. i. zuccari. lib. 2. vel aliter. ℞. mentæ, succi granatorum. añ. 3. 2. mastice ros. rub. gall. añ. 3. 2. zuccari lib. 2. fiat electuarius. Item fomentum ad idem. ℞. thuris 3. i. cymini. 3. i. & f. baccharum lauri quātum de omnibus: terantur, & cum succo mentæ incorporentur, & stomacho superponatur. Item emplastrum ad idem. ℞. rosarum, cymini, mentæ, absinthij, saluæ, rutæ, sanguinis drac. boli armenici, bdellij, galbani, mastice, thuris, corticis granatorum, plantaginis balluistæ, añ. terantur, & bulliantur in aceto forti vel vino rubeo, & cum eodē conficiantur & actū calida sæpius firmetur super stomachum cum fascia in ieiunio & cum infrigidatur, statim reiteretur. Itē puluis de cornu cerui poratus cum liquore quocumq; confert in omni fluxu, siue per superi9, siue per inferi9 procedat. Itē si vomitus fiat propter congestionem diuersorum humorum in stomacho, purge tur cum hoc puluere: quoniam est educēs omne genus humorum cū facilitate. ℞. turbiti albi & electi, agarici, añ. 3. 2. reubarbari optimi, zinz. añ. 3. i. senæ quantum de omnibus. Dosis ei9 a 3. 2. vsq; ad 4. Item epithyma expertissimū est istud ℞. succi absynthij. 3. 4. cynamomi, gariolif. macis, cubebæ, mastice, sumach, acatiæ, mintill. corallorū. ligni aloes. añ. 3. 2. pulueriscentur subtilissime, & cum succis misceantur. addendo aliquid aceti citroniorū & calefiāt perfecte sup carbones ignitos: deinde spongia vel filtrum infundatur in ipsa: & post hoc modicum expri matur, donec fiat toridum: & ilico super stomachum firmetur, quāto calidius sufferre possit sæpius in ieiunio: & reiteretur

illud subito, cum tepitum factum fuerit: Et si non habeatur succi prædicti: fiat cū aqua distillationis rerū in alenbico, vel cum aqua decoctionis earūdem, vel cū vino rubeo potenti. Item, Recipe micā panis de simila, vel de siligine, cū extrahitur a fornace & actu calidam in succo mentæ, & aceto extingue: Deinde similiter incorpora, & ex ipsis fac emplastrum vel accipe de succo mentæ tanto magis vt post dissolutionē panis fiat ex eis epithyma, in quo filtrum, vel lana succida, vel pannus laneus mollis duplicatus imbibatur, & actu calidus aliquantulū expressus firmetur sup os stomachi frequenter reiterando. Item capi, de indigestiōe, parag, de empericis, plura scripsimus cōferentia vomitui & indigestioni.

Canones. Omnis medicina administra-
ta stomacho per exterius vlt
interius, oportet vt sit actu calida: quia
sicut autoritate Galen. declarauimus
cap. de diminutione digestiōis stomachi
repida exteriora resoluunt virtutē ipsius
sed tepida interiora sunt nauseantia, frigi-
da vero exteriora sunt mortificatiua
caloris, sed interiora sunt opilatiua: verū
tamen in vomitu magis competerēt fri-
gida quam tepida: quia omne actu frigi-
dum est difficile vomituum, & proprie
si sit grossum stypticum: vt pira, citonia
mespila, sorbæ, risum & similia. ¶ Sci-
endum præterea, quod isti duo colores in
vomitu qui sunt citrinus & viridis, cho-
leram & flegma consequuntur. ¶ Di-
stinctiua autem certa sunt ista: quia si sit
a cholera, fiet humor exiens subtilis sub-
stantiæ, & amarissimi saporis cū siti plu-
rima & prostratione appetitus & calore
corporis & vrina citrina & antecessiōe
exercitij & cibi acuti & potus vini puri
veteris: qđ si complexio corporis sit cali-
da, minus dubitabis. Si vero sit a flegma
te sit grossæ substantiæ viscosæ quoquo
modo: similiter & saporis insipidi aquosi

vel acerosi, sine siti plurima, vel calore:
nisi fuerit huiusmodi vomitus chronicus
malignus, nec non antecessio ciborū cru-
dorum, vel exoleribus vel fructibus in-
digestis. ¶ Sciendum præterea, quod vo-
mitus quādecq vomitu curatur, scilicet
propter eradicationem materiæ, & pro-
prie si fiat faciliter, & sine nocumento ca-
pitis & pectoris omnino: verū tamen nō
est in ipso fides plurima, neq; frequente-
tur: quia faceret stomachum lacunā. Fi-
at ergo tantum semel in principio men-
sis, & proprie duobus diebus super se: ita
vt reliquæ prioris diei euacuentur in se-
cunda die. Postea fiant euacuationes p
inferius: Deinde vero diuersiones cum li-
gationibus & fricationibus: Et vltimo
confortationes stomachi cum stypticis p
interius & exterius prædictis. Vt autem
completius ad cognitionē vomitus per-
ducamur, conueniens videtur saporum
differentiās discutere, & ipsorum causas
propriās pertractare. ¶ Dicamus igit
quod teste Galen., 4. de medicinis simpli-
cibus: similiter & Auic., 2. canon., tracta-
tu primo capi, de cognitione medicinarū
per ratiocinationē: Sapores in rebus omni-
bus siue fuerint naturales, siue non natu-
rales, sunt trium generum: quidam sunt
calidi, quidam sunt frigidi, quidam sunt
temperati. Sapores autem frigidi, quatu-
or sunt modorum: quorum quidem pri-
mus est ponticus, propter naturam terre
am grossam indigestam: velut sapor fru-
ctuum postquam nuper floruerint. Secun-
dus vero stypticus siue austerus, propter
materiam terreā commixtā cū aq̃a
secundum principium digestiōis: vt est
sapor fructuum semifactorum. Tertius
acetosus: & iste est duplex, vnus qui præ-
cedit digestiōem: vt sapor fructuum nō-
dum perfecte maturorum: Alius, qui se-
quit: vt sapor acetum ex vino benofacti:
quia sit propter exhalationē calidi natura-
lis. Quartus est insipidus, siue aquosus: vt sa-

por prunorū, & persicorū, & cerasorū. Et sicut ordinantur ipsos sapes in loco, ita differunt in gradu, Sapes aut calidi sunt tres: Primus est acutus siue acris propter materiam igneam, & est omnium calidissimus: ut est sapor piperis, & sinapis. Secundus est amarus, propter partes terreas subriles adustas: ut sapor myrrhæ: & iste non est nutritivus neque purus neque commixtus. Tertius est salis propter partes terreas grossas adustas: ut sapor salis.

¶ Sapes autem temperati vel qualiter temperati cum modica vergentia ad calidum sunt duo. Primus vinctuosus siue oleagineus, propter partes aereas perfecte digestas: ut sapor adipis, olei, vel butyri. Secundus dulcis, propter partes aqueas perfecte digestas & cum igneis commixtas: quapropter est vere temperatus ut plurimum aut propinquus imperato: ut sapor zuccari, vel lactis. Et ideo fit omnium maxime nutritivus. Et sicut dictum est de saporibus: ita intelligendum est de odoribus, cum odores non habeant nomina propria, sed accommodata a saporibus nobis magis notis. Sunt præterea species saporum mixtorum plurimæ: nec calamo narabiles: quemadmodum & medij colores: nequaquam tam esse possunt infiniti: ut ait Arist. in lib. de sensu & sensato. ¶ In vomitu præterea purgatio videtur fieri convenientissima cum mirobali quia solunt comprimendo: quapropter confortant stomachum & intestina: ne post evacuationem iterum superfluitates recipiant ab epate vel venis. Cavendum est autem a medicinis acutis in corpore facile vomenti: velut sunt diagridium, scamonea: quia vomitum augmentant, sed interdatur leuissimum, velut sunt turbitum, manna, tamarindi.

Prognosticatio. Vomitus semel vel bis omni mense factus cum alleviatione infirmi, & proprie in corpore consueto vel gulosio, fortitudinem expulsiuum stomachi significat, & eius sanitatem: Et idcirco dicit Aulic. primo casu,

fen. 4. ca. de vomitu: quod convenit in regimine sanitatis omni corpori faciliter vomenti prouocare vomitum semel omni mense duobus diebus continue sese sequentibus cum medicina vomitiua conveniente humori, qui peccat, salvis duabus conditionibus. Prima quidem, ne ordo seruetur sed secundum periodum: quoniam naturam faceret consuetudinariam super illam horam expectandam: quapropter convenit, ut quicquid fiat in principio mensis, quicquid vero in medio, vel fine. ¶ Secunda, ne se violenter patiens ad vomitum complendum: quia faceret stomachum lacunam, & receptaculum omnium superfluitatum corporis: & demum forte ruperet venam in pulmone, & induceret phthisim, & forte faceret materias fumare ad caput & oculos, & induceret sodam chronicam aut cæcitatem. Artem autem & modum vomendi, similiter & medicinas vomicas unicuique materię congruentes, scripsimus ca. de fœtore nasi. Item in vomitu singultus superueniens fortis cum rubore oculorum, mortale: quoniam apostema stomachi, vel cerebri significat. Vnde Hip. 7. par. aphor. In vomitu singultus & oculi rubei, malum. Item vomitus san. cum fe. acuta, mortale: quia apostema magnū significat apertum ante maturationem. Vnde Hip. 7. part. aphor. Quicquid san. vomit sine fe. salutare est: curare vero oportet cum stypticis & infrigidantibus: si vero cum fe. perniciosum. Item vomitus per duras inducit indigestionem: Indigestio vero defectus nutritionis, & per consequens marasmus, & fe. hecticā, & proprie si sit a causa quarta: quæ mors sequitur gradatim, sicut apparet in feb. hecticā vel phthisi. Et plures horum sentiunt alleviationem, cum stringitur vomitus. Deinde recidivum quod propter cautēdum est in ipsorum prognosticatione. Item ut dicit Hip. 5. par. aphor. Spasmus & singultus post multam inanitionem, malum: siue sit inanitio per vomitum vel per secessum: per vomitum vel fluxum menstruum, vel hæmorrhoidarum, vel vulnerationem cum ense. Item ibidem, mulieri

Ua vomenti mēstruis superueniētibus solutio fit, supple vel hæmorrhoidibus, si corpus sit cōsuetum. Item vomitus flegmaticus in principio paroxysmi fe. inter polare de flegmate, vel hora crisis in fe. continua præmissis signis digestionis, & stante virtute tollit ægritudinem. Eodē autem modo dicēdum de vomitu chol. in feb. tertiana continua vel interpolata & de vomitu melancholico in feb. quarana. In feb. autem san. non concomitatur vomit⁹ sanguinis: quia vt dicit Hip. 4. part. aphorif. Sanguis sursum quidem qualiscumq; fuerit, malum: deorsum vero si niger extiterit, bonum, i. minus malum. In feb. compositis cōpositus debet esse vomitus. Item dicit Hipp. 2. prognosticorum: quod in omni cura feb. laudabilis est vomitus, in quo flegma & chol. perfecte sint insil. cōmixta, & non est viscosus. Sed quanto humores sunt minus commixti, & solummodo iuxta positi, tanto est suspectior, & proprie cum alijs malis signis: quæ sunt virtus debilis, signum indigestionis, dies non cretrea velut est octaua, vel mala in cretendo, velut est dies sexta. Item in eodem si in feb. acuta fiat vomit⁹ sicut succus porri, aut viridis, aut plūbeus, aut niger: malus est, si autē omnibus his infectus sit, est mortu⁹ vicinus: & ibidem. Fœtor horribilis si fuerit in ipso, vehementer est malū: quoniam putredinem significat & corruptionem maximam humorum.

De cholerica passione.

Caput X.

Cholerica passio dicitur: cum quis eadem hora cogitur eicere superfluitates cibales, vel humores superius per vomitum, & inferius per feces cum dolore & torsione stomachi & intestinorum. Fit autē propter duas causas: Prima est antiqua & perseverans corruptio cibi in stomacho & intestinis, &

proprie fructuum, olerum & piscium & aliorum frigidorum viscosorum. Et signa eius, sunt antecessio satietatis nauseatiua per dies plurimos, & multitudo ventositatis in ventre cum rugitu & inflatone: Et q; incipit dolor circa vmbilicū primo cum punctura eius: deinde aduenit solutio ventris plurima aut sine vomitu & hoc est minus malum: aut cum vomitu, & hoc est magis malū: & quod emittitur est cibus nondum digestus vel semi digestus, vel flegma viscosum, & forte est, sicut lotura carnis: si concauum epatis compatiatur. Secunda vero causa est effusio cholerae rubrae plurimæ ad stomachum & intestina simul mordacitas ea: & est deterior eorum, & magis cōtingēs propter quod est passio cholerica nuncupata. Et signa eius sunt nausea vehemens valde, & sitis assidua cum adustione corporis & anxietate plurima: Et si bibita aquam frigidā, sedatur nausea, donec calescat in stomacho, deinde vomit ipsam: & quandoq; est solutio ventris cum ea, & tūc est periculosior: & quandoq; superfluit adeo, donec faciat agro superuenire syncopim et cadat pull⁹: et quod emittitur, est subtile citrinum, amarū, & quādoq; grossum, sicut vitellum oui: & fortassis antecessit vsus piperis, allij, sinapis & aliorum acutorum: & fortassis est vena subtilis ignita propter choleram, & forte subalbida, propter raptum cholerae ad stomachum & intestina.

Methodus. Cura eius quæ sit a causa frigida, est vt hora paroxysmi, & quādo sentit puncturas & torsionem in ventre: bibat sapius sub multa quantitate aquam valde calidam, in qua bullita sint cyminum, gallanga, piper long. & similia carminatiua ventositatū: Et inducatur post hoc somnus pro posse, sicut diximus cap. de vigilijs. quia sistit vomitum & ascillationem & oēm motum, quod est principium in cura hu-

ius passionis. Comedat micam panis de simila assam super prunas, & post hoc imbibitur in vino veteri potenti, & bibat ex eodem super allia, sinapi & galanga. Fiat præterea calefactorium super ventrem ex lapide ignito asperso aceto acutissimo & pannis calidis lineis inuoluto, vel ex sale & milio torrefactis in sacculo. Quod si post hæc omnia senserit dolorem in capite propter vaporem vltimo miti: dormiat iterum pro posse, & linatur frons & tempora cum aqua rosæ, & acetoi: & cum euigelaueit ingrediatur balneum resolutiuum aquæ decoctionis florum camomillæ, anethi, absynthij rosæ, meliloti, rutæ, calamentri, & similia, in quo prolonget famem. Ante horam vero paroxysmi similiter & post, vtatur diacimino, vel theriaca veteri cum vino calido decoctionis piperis lōgi, gallangæ, cynamomi: Et deuit cibos frigidos viscosos: sitim & famem toleret pro posse, & confortet stomachum emplastris & vnguentis, sicut diximus cap. de indigestione. parag. de stomacho frigido cum materia, Et si euacuatio supfluerit, nequam purgetur cum medicina, sed solū confortetur cum calidis stypticis intus et extra. Si vero non superfluxerit: purgetur cum benedicta laxatiua, vel cum decoctione mirrobalanorum kebullorum dicta ibidem: quia euacuant confortando stomachum & intestina: & post euacuationem sumat omni die in aurora vñ ex trochiscis de bdellio, q̄s in cap. de apostematibus epatis dicimus cum vino rubro, vel aqua decoctionis myrtillorum, piperis, cymini, gallangæ, masticis, & thuris: quia stomachum potenter exiccant. Similiter & diacitoniten cum melle & speciebus cōfectum. Bibat vinum verum purum. Comedat carnes pullorum vel auium syluestrium paruarum assas vel elixas cum feniculo & petro. parum, & sæpe comedat & exercitetur sapius in ieiunio, & sic paulatim redeat ad consueta.

¶ Cura ei9 q̄ fit a causa calida, est vt hora paroxysmi & in principio cum incipit vomitus cum cellatione vel sine, bibat aquā calidā in plurima q̄ntitate, & vomat cum ea plurimū illi9 cholera cum facilitate. Si autē superfluat vomitus vel cellatio adeo vt virt9 cadat: tūc liga vehementer vtraq; crura ad interiora, & coxas, & pone super stomachū & totū ventrem lapides frigidos, vel glaciē vel niuē, vel pannos infusos in aqua frigida vel aqua rosæ, & aceto, aut in succo solatri, nenupharis atq; semperuiug: donec perfecte infrigidetur, & stupefiat, & effundatur super manus & pedes & faciē totā aq̄ rosæ, vel aqua frigida, & fricetur volē manuū & plantarū pedū cum aceto & sale vehementer, & da ei in potū vna vice post aliam succū granatorū acetosorū propie vlt agrestā vel acetū p se vel mixtū cū aqua frigida, si ipsum per se sumere non potest: Quod si ipsa euomat: reitera frequenter. Et si nō sufficit: fortifica cum spodio et bolo armenico, & rosæ, siccis, puluerizando omnia subtiliter & cum p̄dictorū liquorum aliq̄ miscendo, vel cum aqua decoctionis malorū acetosorū & citoniorū, vel in potu dādo vice post vicē q̄ciēs euomat ea, vel puluerē mirtil. terre sigillatę. san. dracon. corticū granatorū in potu tribue cum succo berberis & aqua frigida, q̄ sunt extrema in stypticādo & reprimēdo choleram: Et da ei q̄nq; si virtus cōstet, aut p̄dictos potus abhorreat: aquā purā frigidā, vel lac acetosum plurimū: Et cum ipsam euomit: reitera multotiens, donec videas vomitū alienari parūper. Tunc nanq; cōforta virtutem dādo in cibo ius pullorū tritorū subtiliter cōditū cum succo citoniorū aut vino pontico inspissatū cum mica panis assi super prunas. Et si euomat illud reitera donec retineat oīno: & tūc da in cibo pulles vel p̄dices vel aues paruas assas & cōtritas i vino citoniorū

Tractatus primus

vel granatorū vel agresta vel berberis vel vino rubeo pōtico mixto cū aqua de coctionis mirrillæ & plani aginis. Et quādo prædicti pulli assantur: possunt poni in ventribus eorū grana myrti vel granatorum vel sumach, vel grana berberis cōtrita: & iterū cum cibū sumpserit: da ei in potu vinū vt virtus confortetur, & somnus prouocetur. Sit tamen vinum stypticū non acutū: & post hoc cooperiatur vndiq; & dormiat pro posse: qā vomitus & fluxus sedantur cū somno: Et si post somnū sentit se alleuiatū, potest poni in balneo aquæ tepidæ decoctionis rosæ chamomillæ. Et post balneū vngatur stomachus, & totus venter cum oleo mastichino & oleo rosæ addito modico aceti, propter penetrationē: & sic reducat gradatim ad cōsueta. Ante horā vero paroxyismi similiter & post, præseruetur patiens cū in frigidatione epatis, ne plurimā cholera generet: & cū vomitu leui facto ex aqua tepida pura, vel cū syrupo acetoso mixta: vel purgetur cū reubarbaro vel cum mirobalanis citrinis: sicut diximus ca. de indigestione stomachi canoū.

¶ **U**tatur cibis assis cōditis cum succis prædictis frigidis: & post cibū sumat citronium assum, vel pīrum, vel mespila, vel sorba. Bibat potus stypticos prædictos. Abstineat a potibus & cibis calidis acutis, & a coitu omnino.

Emperica. Apud cōmuniter operantes differunt passio cholerica, & venter cholericus: quia passio cholerica dicitur (vt vidimus) cum quis simul cogitur ad euacuandū & egerendū hora vna: sed venter cholericus est venter solubilis & laxus propter multam cholera transmissam per naturā a cisti fellis ad duodenum intestinū cum tinctura plurima, & liquiditate fecum, velut accidit corporibus, quibus talis porus est valde largus: quare propinqua sunt ad dysenteria vel diarria malignā. Similiter & ecōtra,

in quibus porus procedens a cisti fellis ad profundum stomachi est amplior, prout sunt ad vomitū citrinū amari: velut accidit in auibz rapacibus, in quibus plurima cholera mandatur ad stomachū propter digestionē fortificandā, modica vero ad intestina: quapropter & illicus habet albū. Cholera nāq; rubea delegatur a cisti fellis ad hæc duo loca per duos poros liue vias, ad stomachū quidē propter calefactionem, ad intestina propter mordicationē & stimulationem: vt feces ex se expellant & secessum procurent. Et idcirco icterici feces habet albas viscosas, & sunt vt plurimū cōstipati. Similiter & cōes, qm porus ad intestina veniens est strictior eo, qui venit ad stomachum: qm amplior cholera requiritur in corpore humano ad secedendū, q̄ ad digerendū: cū non vescamur cibis grossis solidis crudis, velut bestię, & proprie viuentes de rapina: verū si venter sit naturaliter solubilis propter flegma, vel propter humiditatē naturālē intestinorū: tūc proprie appellatur venter lubricus: & cisti prout sunt ad lienteria, nisi bonitate regiminis præseruentur.

Canones. Passio cholerica est media participatione inter vomitū spontaneū, & fluxū vētris spontaneū. In vomitu nāq; indigemus sola stomachi confortatione. In fluxu vero ventris sola intestinorū cōfirmatione. In præsentī vero passione vtracq; simul indigemus, magis tamē stomachi q̄ intestinorū, propter hoc, q̄ stomachus est membrum nobile: & propter vomitū magis esse motū laboriosum, q̄ secessum. Dicta igitur cap. de vomitu, & dicenda ca. de fluxu vētris præsentī doctrinæ suffragantur. Ita vt q̄ dicetur de fluxu ventris flegmatico, passioni cholericæ q̄ sit a causa frigida, sed quæ dicentur de fluxu dysenterico vel epatico vel felleo, causæ calidæ copulentur.

Prognosticatio. Passio cholerica, & proprie q̄ fit a causa calida, numeratur inter ægritudines paucitas. Et ideo infra septē dies necessario vel beneficio medici & naturæ curatur, vel interficit: q̄a natura debilitata est, et magnū morbū lōgo tēpore nequit tolerare, imo facit vehemētem motū cōtra ipsum, & vel vincit, vel vincitur in tali crisi: vt dicit Gal. in cōmētō illius apho. 4. par. Qui apprehendūtur a terano. Itē si quis euomat sterco simul cū secessu v̄ sine secessu, mortale: q̄a apostema magnū calidū in intestinis significat. Et licet talis passio sit similis passiōi cholericæ, nō tamē est illa sed potius est passio intestinalis, & ileos q̄ dñe miserere nūcupat. Et de ipsa dice. ca. de apatib⁹ intestinorū.

De dolore & inflatione stomachi. Cap. XII.

DOLOR stomachi fit propter duas causas. Prima est apostema & vlcus, de qbus dicitur sequēti capī. Secunda est ventositas inflans & extendens tunicas duas stomachi scilicet interiōrē neruosam, & exteriorē carnosam. Est autē interior neruosa, vt sentiat famē & cibi qualitatē, vt in ipso voluptuetur, & super ipsum corrugetur, atq; retineat, si sit cōueniens: vel ab ipso dilatetur, & ipsum reiciat per superius & inferius, si sit discōueniēs. Est autē exterior carnosā, vt sua caliditate naturali cibū digerat pro toto: quia facilius est, s. quando sensibile est excellens alterare per medium, q̄ sensu tact⁹ sentire: vt patet in ymbraculo posito inter manū & ignem. Itē igitur dolor vētosus aut cōmouetur magis ante cibum, & tunc fit a mala cōplexione frigida stomachi cum materia flegmatica viscosa, a qua calor stomachi diminutus eleuat vētositates, vel cōmouet magis post cibum: & tunc fit a mala cōplexione stomachi frigida sine materia:

sive calor naturalis diminutus sit in se: siue sit oppressus multitudine ciborum & proprie frigidorū viscosorū inflationorū: vt sunt olera, fruct⁹, & legumina. Et iste dolor, q̄ cōmouetur post cibū: quandoq; puenit ad tantā malitiā, vt nō sedetur nisi cū vomitu: idcirco est vehemēti⁹ stomachi dolor: p̄ter eos, qui fiunt ab apostemate vel vlcere in ipso.

Methodus. Signa doloris stomachi a mala complexiōe frigida cū materia sunt: quia magis infestat ante cibum, quādo flegma natat in stomacho puro: Et quia fit quandoq; vomitus cholericus vel flegmaticus, vel eructatio acetosa, cum qua alleviatur dolor, & prostratio appetitus: & est sine siti & caliditate, sed cum sputo & saliuā plurima & nausea & fastidio & rugitu ventris plurimo, quando premitur stomachus, vel splen, vel venter cum manibus: quia ista sunt tria mēbra naturaliter frigida, ventosa. Et ille rugitus quandoq; augetur ante cibum, & post digestiōem cibi quandoq; sed proprie in latere sinistro. Et cura eius est vomitus cum oxymelle cōposito vel squillitico, vel aqua decoctionis raphani, attriplicis & anethi p̄missa repletionē ex cibis, alijs & leguminibus. Vel purgetur cum pillulis cochis, vel benedicta laxatiua, vel medicina de turbib⁹ p̄missa digestiōe flegmatis cum syrups dictis capitulo de indigestiōe. parag. de cura stomachi frigidi humidi cum materia. Vtatur diagallan ga, diatrion pipereon, & diacimino. Comedat allia, sed non cepas neq; porros: quia licet sint calida, sunt tamen humida: quapropter & ventosa. Nutriatur earibus bonis & proprie assis, vel elixis cū fœniculo, carui, et petro silino cōditis cū speciebus calidis acutis: vt sunt piper triū generum, & grana paradisi. Bibat vinum vetus purum amarum: viuet legumina, & somnum super cibū, exerci-

Tractatus primus

tetur in ieiunio. Vngatur et emplastretur stomachus: vt dictū est illic: vitet olera, & fructus crudos inflatiuos. Post euacuationes prouocet eructuationes cum masticatione thuris, cymini, masticeis, carui, anisi, & similium inglutiedo saliuam in ieiunio: & stet hora illa erectus, & post illud ambulet gradatim. Signa doloris stomachi a mala complexione frigida sine materia sunt: quia commouetur magis post & super cibum, q̄ ante & proprie super repletionem plurimam, vel sumptionem ciborum crudorum: quare tunc corumpitur cibus in stomacho: Et fiunt eructuationes foetidæ fumosæ vel acetosæ cum trullis plurimis foetidis, & angustia corporis: immo forte non commouetur super cibum paucum, & proprie calidum subtilem. Et cura eius est, vt comedat sæpe & parum cibos subtiles boni chymi: vt sunt oua sorbilla, & carnes hœdorum, & pullorum cum iuribus eorum conditis ex pipere zinzii, & gallanga: prouocet eructuationes & trullas cum masticationibus et electuarijs prædictis: Et si supue niat vomitus, fiât omnia quæ dicta sunt cap. de vomitu. Parag. de vomitu stomachi propter secundam causam vel terciã. & Parag. de empericis, & proprie cum vsu electuorum & trochiscorum exiccantium & calefacientium stomachum: vt sunt trochis. de myrrha & diatrion piperone: Et vitella ouorum assa confecta cum puluere cardamomi vel coriandri torrefacti, & melle despumato dando ea omni die ante cibum. Et potest fieri cauterium in vertice capitis propter exhalationem vaporum malorum & confortationem nervorum duorum anteriorum descenditium ad os stomachi, vt dicit Rasis in diuisionibus, capitulo præsentis. Sed nos id credimus alienum.

Emperica. Ad omnem dolorem ventris vel stomachi vêtosum, confert ponere ventosam siccam magnā

super locum cum suctione vehemēti hora paroxysmi: quia vêtositates vehemēter dissipat. Dicitur autem ventosa sicca quæ ponitur super membrum cum igne seu stupa ignita sine scarificatione. Item lapis molaris vel lapis coctus ignitus & aceto forti asperlus positus super locum mediantibus pannis calidis confert vehementer. Item embroca ad idem. *℞.* nigellæ, baccarū lauri, rutæ, absynthij, centaureæ aii. M. vnū, anisi, carui, cymini, aii. ʒ. i. coquantur in vino forti diligenter cooperto vase: Deinde infundatur spongia in isto liquore actu calido, et aliquantulum expressa ponatur super locum, frequenter reiterando, postq̄ infrigidatum fuerit. Et si vis fortificare: adde semen sinapis, nasturtij & anethi: vel pone oleū commune, & fac vnguentum: & postq̄ eadē res bene coctæ fuerint in ipso colando & addendo cerā quod sufficit, atq; liniendo ad ignem, vel furnum calidum diligenter. Ad idē confert oleum de castoreo vel lilio vel anetho, vel de ruta calefactum in aqua feruente. Item emplastrū ad idē expertissimum diuidatur panis per medium quādo extrahitur a clibano, & perfundatur mica tota oleo cōmuni & melle, simul calefactis ad ignem, & sic applicetur ventri quanto calidius fieri poterit: & cum infrigidatum fuerit, reiteretur cum alio pane: vel infundatur idem panis in succo mentæ & rutæ, & actu calidus applicetur. Item *℞.* vnum vitellum oui & oleum camomillæ vel lilij tantundem, & conuassentur adinuicem perfecte, & incorporetur eis parum de mica similæ torrefactæ. Vltimo addatur seapij quantum volueris, & extendatur super petia, & calefiat perfecte super lapide ignito, & stomacho & toti ventri applicetur firmādo cū fasciā, & reiterando frequenter, quando infrigidatum fuerit. Est enim vltimo anōdinum. Item tragea ad idem, quā vti cōuenit ante cibum bi

bendo de super modicum vini potentis. *℞.* carui, anisi, ameos, patro. apij, marathri, sileris montani, herthonica, cymini, calamenti, pullegij, hyfopi, spica nardi, piperis, z. z. salis gemmæ, ruta, centrigalli eufraf. olib. masticis, cererach, mirobalanorum omnium generum, sed plus de citrinis, añ. 3. i. cynamomi squinanti, añ. 3. i. maioranæ, folij, balsamitæ, ozymi, cardamomi, gall. liquiritig, añ. 3. 2. zuccari, quod sufficit: teratur omnia grosso modo, & fiat tragea: vel terantur subtiliter, & fiat pulvis: vel conficiantur cum mele & zuccaro, & fiat electuarium. Item vsus frequens diacimini, vel dianisi, & atrion pipe. confert & proprie in ieiunio.

Canones. Scias, quæstæ quatuor passiones eructuatio, singultus, dolor inflarius, & colica ventosa ex eadē causâ procedunt, scilicet frigiditate partikulæ mediatæ, & ventositatē grossâ immediate: Sed differunt forma & substantia: quia eructuatio est: quando illa ventositas expellitur cum sono per superius, sicut cū trulla per inferius. Singultus vero dicitur, quando eadem ventositas conatur egredi per superius: licet non possit fieri propter eius inuiscationem in villis stomachi. Colica vero dicitur, quando eadē ventositas stat fixa in concauo intestinorum extendens ea vehemēter. Dolor vero dicitur: quando fit ista extensio in stomacho & intestinis simul, aut altero eorum. Et ex hoc sciri potest: quod scripta in quolibet istorum capitulorum sibi ipsi cū suffragantur.

Prognosticatio. Dolor stomachi si perdurauerit, digestiuam & retentiuam debilitat, & per consequens colicam, vel lenteriam, vel hydropisim inducit. Quod si confirmetur: marasmū gradatim constituet, propter defectum nutritionis: Sed cum vltimatur, virtutē profernit: cum de maxime prosterneat virtutem sit dolor: vt

dicit Auic. i. canoñ. señ. 2. cap. de dolore. Item dolor inflarius stomachi & intestinorum diu perseverans in fluxu ventris spontaneo neque artificio mitigatus hydropsim, tympaniten præmonstrat affuturā. Vnde Hip. 4. parti. apho. Quibuscūque fuerint torsiones & circa vmbilicum dolores & lumbos, & dolor non soluitur, neque farmacijs, neque aliter: in hydropem sicca perficitur.

De apostemate & vlcere stomachi. Cap. XII.

Quoniam vlcus est (vt plurimū) terminus apostematis in stomacho. Ideo de ipsis eodē dicemus cap. Fit igitur apostema in stomacho sicut in alio quocūque membro, per decursum materiæ ad particulam debilem per venas & arterias. Et hæc materia vel est calida, vtpote cholera, vel san. vel est frigida, vtpote flegma, vel melancholia: vel est composita ex ijs quoquomodo. Istud autem apostema, vel est in ore stomachi, vel in spaciositate eius. Item illud apostema vel terminatur per resolutionem, vel per sanationem, vel per inductionem. Et vlcus quidem stomachi aut fit propter antecessionem apostematis terminati per sanationem & rupturam: aut propter materias acutas corrosiuas in stomacho contentas, sicut est cholera, vel flegma salsum: Et signa & curam omnium istorum per ordinem dicemus.

Methodus. Signa apostematis stomachi in communi sunt tria.

Primum est fe. continua: Secundum dolor in regione ipsius: Tertium est: quia forte apparet tumor & eminentia in loco. Signa terminationis apostematis per resolutionem sunt, quia de die in diem detumescit locus cum mitigatione doloris & febris gradatua: & quandoque fit hoc sine euacuatione sensibili materiæ per vrinā, secessum, vel vomitum cum addi-

Tractatus primus

tionem signorum salutis. Signa terminati
onis per saniationem, quæ collectio siue
alias dubellati ab autoribus nūcupatur,
sunt: quia post dies aliquot intenditur do
lor & fe. et proprie in nocte: Et ab illa ho
ra superueniunt quandoq; rigores pun
giui, neq; minoratur tumor beneficio ad
hibito, nec apparet euacuatio sensibilis.
Cum igitur apparent huiusmodi signa
apostematis communia prædicta, simi
liter & propria: scias, qd ab illa hora ma
teria apostematis conuertitur in saniem:
sed cum sedatur post hoc tota fe. remanē
tibus tumore et dolore aliquali, scias tūc
saniem generatam. Vnde Hip. 2. partic.
apho. Circa generationes saniei & c. Sed
cū visa fuerint sanies & sanguis per vo
mitum, vel secessum, scias tunc dubella
ti fore apertum: & tunc dicitur ruptura
vel vlcus. Signa terminatiōis apostema
tis per indurationē, quæ sclerosi appellat:
sunt, delitescētia feb. falsa, & doloris mi
tigatio post 40. vel 50. vel 60. dies a prin
cipio apostematis non præuente euacu
tione sensibili vel modica existente, cum
remanētia tumoris & grauedinis in lo
co & duritie: quæ forte tactui non cedit.
Et scias quod ista terminatio (vt pluri
mum) sequitur apostemata stomachi ca
lida & raro frigida: cum sclerosi ha
beat fieri non nisi per resolutionem sub
tilem & remanētiā grossi, quod solū
potest fieri a caliditate forti. Et de istis ter
minationibus apostematū, & hora men
surante quamlibet ipsarum plurima scri
psimus cap. de pleuresi. Signa apostema
tis distinctiua, an sit in ore stomachi, an
in spaciositate ipsius sunt: qd si sit in ore,
maior apparebit eminentia, siue tumor
in parte exteriori & proprie circa furcu
lam. Si vero in spaciositate ipsius, nō ap
parebit eminentia propter profunditatē
eius sub mirach, nisi valde magnum fue
rit apostema: tūc forte apparebit aliqua
lis tumor, & proprie inter furculā & ym

bilicum. Si aut apostema fuerit in parte
posteriori stomachi: sentit dolor inter spa
tulas vtrasq; aut sub collo. Si vero i par
te inferiori: tunc super ymbilicum fiet do
lor magis. Et post qd expediti sumus de si
gnis generalibus apostematis in roma
cho, debemus venire ad propria vnicuiq;
Signa apostematis calidi de cholera, cū
prædictis sunt dolor acutissimus pungiti
uus cū fe. continua acutā, appetitus pro
strario, & vomitus, & sitis, & forte debi
litas digestiua & retentiua adeo, vt fiat
lienteria. Et cura eius est, vt fiat a princi
pio flebotomia basilicæ dextræ in bra
chio, vel manu propter diuersitatem ma
teriæ fluentis: Et post flebotomiam fiat
vomitum leuis, si est possibile cum aqua
repida, vel cum syrupo acetoso & aqua
decoctionis anethi, viol. se. attriplicis. Po
stea fiat remedium locale percussiuum
sicut est vnguētum cum oleo ros. & mo
dico aceti, vel emplastrum ex sandal.
ros. farina ordei incorporatis cum oleo
ros. & aceto. Sumat in aurora syrupum
de citronis cū aqua decoctionis sumach,
vel mirtilorum, citoniorum, vel berbe
ris: mollificetur quādoq; venter leuiter,
si non fuerit omni die bene obediēs cum
3. iij. aqua decoctionis lactucarum, viol.
end. prunorum, in qua dissolutæ sint. 3. 2.
medullæ cassiæ f. colatæ: & detur ante
diem. Sed non dentur medicinae fortes,
vel quæ transcendant manrām & terna
rind, quia se. inflammarent, & apostema
augmentaret: Et sit contentus hora illa
pro cibo aqua ordei, vel pulmento ordei
& auenæ, vel farris condito cum succo
granatorum, vel iure pullorum alterato
cum lactucis, portulaca, end. cucurbitis,
& similibus vel cū agresta. Bibat iulep,
id est aquam zuccari, vel vinum grana
torum mixtū cū aqua decoctionis lactu
carum, & end. vel prunorum, & sic rega
tur cum diæta & medicinis vsq; ad finē
principij, donec locus securetur ab apo

fiemate, vel eius additione. In augmento vero et cum materia fluxa fuerit: cibetur sicut prius: Sed in medicinis addantur resolutiua leuia, sicut est emplastrum ex farina ordei, farina foenic. se. lini. rad. maluaufci cocta & mundana cum oleo chamomillæ (quod sufficit) & vitellis ouorum. Et fiant quandoq; clysteria lenitiua ante cibum, si venter nō obediērit. In statu procedatur eodem modo, nisi q; postponantur resolutiua pura: & sic regatur vsq; ad declinationem vniuersalem. Et cum venerit declinatio & coeperit se diminui, similiter & dolor: fortificetur emplastrum resolutiuum prædictū cum se. anethi, vel se. nasturcij. Et in fine confortetur stomachus cum trochiscis, qui sic fiunt, ℞. ros. ru. 3. 4. spicæ masticis, lig. aloes, cynamomi, calf. lig. añ. 3. 1. 6. informentur trochisci cum vino odorifero: quorum vnusquisq; sit, 3. 2. & vnus detur ante diem cum vino debili: & sic regatur cum medicinis & diæta gradatim ingrossata vsq; ad sanitatem perfectā. Si autem prolongatur apostema prædictum, neq; resoluī potest, immo tēdit ad collectionem, intende postq; hoc cognoueris, ad generationē saniei cum emplastro maturatiuo, quod sic fiat, ℞. farinæ foenicræ, semi. lini, anethi, ros. chamomillæ, añ. 3. 1. o℞. chamomillæ, vl de semine lini 3. 4. adip. anseris, anathis, gallinæ, añ. vnciam vnā, maluaufci cocti & mundati a ligno intrinseco & benepistati lib. vnam, incorporentur omnia simul: & si requireret inspissationem, inspissetur cū farina frumenti, vel siliginis. Addantur in fine vnciæ quatuor mellis: & ponantur actu calida super apostema, reiterando frequenter, quando infrigidatum fuerit. Et si vis ipsum magis acuire, adde se. nasturcij, dragagan. gummi arabici, amygdal. amararū: quoniam omnis materia calida styptica viscosa poros opilans taliter, vt sufficiat ad aggregandū

calorem naturalem particulæ, præter q; inducit prohibitionem omnimodam trāspirationis & euentationis eiusdem, & per consequens putrefactionē, est saniei generatiua, vt ait Gale. quarto de ingenio sanitatis, & ab ipsa materia maturatiua nuncupat. Et deuiet interea homo ci bos frigid. stypticos: quia ingrossant materiam & maturationem prohibent: sed sumat cibos temperatos vergentes ad calidū, si feb. illud concedat, vt sunt carnes hœdorum vel pullorum & oua forbilia, vel pulres ex farina frumenti vel auenæ condita cum butyro & sale, vel lacte amygdalarum: Et sic regatur vsq; ad horam rupturæ: tunc faciat medicus rupturam per artem, si nō venerit per se, & mundificetur vlcus a sanie, & post cōsolidetur pro posse, sicut dicemus infra de cura vlcerum. Si autem nihil prædictorum contulerit, immo apostema de die in diē indurat cū delitescētia se. & remanētia tumoris, quæ significant sclerosim: tunc intende ad mollificatiua resolutiua vicissim: vt dice. infra, parag. de cura apostematis melanch. Signa apostematis calidi de sanguine sunt cum prædictis omnia signa apostematis de cholera, præter q; dolor in isto est magis grauatiuus, q̄ acutus: & pulsus est in vtroq; velox spissus, tamē in cholerico durus, & in sanguineo mollis: Et in vtroq; est vomitus & sitis, sed maior in cholerico. Et si quidem humor apostomans super epar dominetur: tunc in apostemate cholerico fit vrina subtilis, ruffa, vel citrina: sed in sanguineo rubea, grossa, clara: sed in flegmatico subalbida, grossa, viscosa: In melancholico glauca, subtilis: veruntamen si epar se bene habuerit, aut modo contrario varietur: potest apparere vrina rubea grossa, vel ruffa subtilis, vel temperata vel quodolibet aliter se habēs: cū vrina tantū iudicet sup epar & venas, quē admodū vomitus et secessus sup stomachū

Tractatus primus

& intestina. Et cura eius est eadem cum cura apostematis de cholera, præter quod magis opus est flebotomia & minus far macia, neque adeo frigidis cibis & medicinis insistent. cum sang. sit humor benivolus, & naturæ amicus. Signa apostematis flegmatici in stomacho (& o si parū id acci sit) sunt cum prædictis se. cōtinua lenta, multitudo sputi cū casu appetitus, & eminētia magna particulæ absque duritie in tactu, & dolor levis cū gravitate, & pulsus parvus mollis. Et cura eius est ut a principio purgetur cū infusione aloes dulcorata cum zuccaro vel melle: quia aloë a proprietate euacuat flegma, & confortat stomachum, licet sit amarum: vel cum medicina de turbith, vel cū benedicta: sed nequaquam prouocet vomitus, quia attrahit materias, & addit ad apostema. Et si habitudo sit carnosa, flebotomia fiat post hoc basilicæ dextræ, quæ licet non conferat ratione qualitatis, tamē ratione quantitatis: cum flebotomia euacuet multitudinem: ut di. Auic. Fiant etiā clysteria primo quidē leuia ex aqua decoctionis camomillæ, bleræ, maluæ, et melle, oleo & sale: ut dictum est ca. de bolismo. Parag. de empericis. Secundo vero acuantur de tertio in tertium cum pulpa colloquintidæ, vel hierapicra, vel benedicta: ut dictum est ibid. Et non ponatur tūc repercussiva super apostemata: quia incruderent, & ingrossarent materiā, & sclerosim facerēt: sed ponatur resolutiva super locum apostematis: quia cum materia sit frigida viscosa, non erit tantus timor de attractione, vel feb. inflammatio: sicut in apostemate calido prædicto: et proprie præmissa euacuatione vniuersali. Emplastrum autem bonum resolutivum est illud. ℞. se. lini, foenigræ, farinæ lupinorum, aii. per æquales, aloes quartā par. incorporentur cū adipe anseris, anatis & gallinæ, & extēsum super petram opnatur actu calidum super stomachū

frequēter. Et non sis præceptus in principio ad resolutiva fortia: quoniam resolverēt quod subtile est, & dimitterēt quod grossum. Procede ergo gradatim cum isto. Deinde post dies aliquot, quando materia subtiliata est aliquatulum, aliud fiat acutius quod est. ℞. radicum maluaufci cocturum perfecte, & mundatarum & optime contusarum lib. i. musciclaginis, maluaufci, se. lini, farinæ foenig. floræ camomil. aii. 3. 2. aloes. 3. 6. farinæ lupinorum. 3. iij. terebintinæ. 3. 4. olei masticis. 3. 2. farinæ ordeī, quod sufficit, & adde parum fursuris propter abstersionem pororum: ponatur calidum super locum: quia maturat et resoluit materias duras: quapropter confert plurimum in apostemate melancholico. Nutriatur pulmentis factis ex farina ordeī vel auenæ, vel aqua cicerum & pisorum, vel carnibus pullo rum & perdicum elixis vel assis conditis cum cynamomo, cardamomo & croco, & iuribus earum alteratis cum petros. Bibat hydromel, & zuccarum, vel vinū album debile lymphatum ad medium. Diminuat cibum & potum pro posse, si virtus toleret: & subueniatur prostrationi appetitus, sicut diximus suo capitulo. Si autem tale apostema prolongetur & ad sanationē tendat: fiat sicut prius scriptissimus cap. de cura apostematis cholerici: similiter & si tendat ad sclerosim, & hoc est ut plurimum in illo apostemate. Raro enim sanatur, & adhuc rarius resoluitur propter materiæ grossiciem & frigiditatem. Signa apostematis melancholici, sed raro fit per se incipiendo, sed ut plurimum consequendo aliquod apostematum prædictorum, & proprie calidum adustum, sunt cum prædictis, se. cōtinua lēta, pulsus parvus subtilis striculus, dolor grauatiuus sine acuitate, duricies loci cum eminentia, fetor cras, & imaginationes corruptæ in somno. Et si fiat cōsequendo, antecessit apostema calidum

vel frigidum cum signis prædictis proprijs. & post dies aliquot superuenit deli-
tescentia feb. flegmaticæ falsa & doloris
mitigatio non præcedente sensibili eua-
cuatione, vel modica cū remanentia tu-
moris & eminentiæ duræ, quæ tactui nō
cedit. Et cura ei⁹ est, licet raro curari pos-
sit, nisi forte in principio cum emplastris
& vnguentis resolutiuis & mollificatiuis
simul, vel alternatim adhibitis. Vnguē-
tum bonum sic fit. ℞. olei nardini, olei
masticini, butyri recent. añ. 3. f. miscea-
tur & dissoluat in eis aloes, 3. vna: & vn-
gatur cū eo locus durus omni die bis an-
te cibum, postq̃ calefactum fuerit in aq̃
feruenti: & super vnguentū ponatur em-
plastrum dictum in apostemate flegma-
tico: vel illud quod fortius est. ℞. adip.
anaris, anseris & gallinæ. añ. 3. i. stora-
cis liquid. bdellij, myrrhæ, spicæ, masti-
cis, ciperi, squinati. añ. 3. f. amygd. ama-
rum excorticatarum, 3. vnam, se. caulium
3. f. dissoluantur gummx in vino, & oīa
alia teratur, & misceatur simul, fiat em-
plastrum: & in sine addantur adipēs, &
incorporentur perfecte, & actu calidum
stomacho applicetur vel emplastrum de
alijs, quoniam est conferens ad omnem
duriciem & apostemationē stomachi &
viscerum & hydropisim, cum incipit fie-
ri: quoniam grossas ventositates carmi-
nat, grossos humores crudos colliquat:
quod sic fit. ℞. alij. mund. spi. ana. 3. iij.
& f. terebentine 3. 4. storacis, aloes, boni,
bdellij, añ. 3. iij. axungia porci recentis,
adipis anseris añ. 3. 4. mast. olei añ. 3. i. eu-
forbij. 3. i. ceræ citrinæ 3. 12. olei nardini,
& vini odoriferi clari, qđ sufficit. In po-
ribus & cibis regatur, v t in apostemate
flegmatico. Et si necesse fuerit: purgetur
quandoq; cū aqua decoctionis senæ epi-
thymi & ellebori nigri colata & dulcora-
ta cum zuccaro. Dico autem si necesse
fuerit: quia in isto apostemate nō potest
euacuari causa coniuncta propter eius

duriciem, siue fiat per se incipiendo, siue
consequēdo: sed solum causa antecēdēs,
& proprie, si fiat per se incipiendo: quia
tunc significatur melancholiā domina-
ri in corpore toto. Quando vero fit con-
sequendo, non requiritur vltior: euacu-
atio cum farmacijs, sed solum lenifica-
tio ventris omni die cum clysteri lubrifi-
catiuo, addito modico senæ vel epithy-
mo in decoctiōe, vel hieralogodion, vel
diasenæ in colatura. Signa vlcēis stoma-
chi in communi, sunt dolor acutus in sto-
macho, & ille dolor augetur post assump-
tionem ciborum acetosorum, vel acu-
torum mordicantium, imo forte stoma-
chus cibum nō retinet, nisi paucum & le-
uem & breui tempore: & tunc expellit
ipsum per superius vel inferius: & appa-
ret in eo quod expellit sanies, & sanguis,
& eructatio egreditur foetida: & post di-
gestionem alleviatur grauitas & dolor
in stomacho secūdum plurimum. Si autē
sit vlcus propter antecessiōem aposte-
matis, quod terminatum est per collecti-
onem & rupturam: tunc cum prædictis
antecessit signum apostematis commu-
ne, & proprie signum talis terminatiōis
& omnino sensibilis saniei per vomitum
& secessum, cum diminutione doloris &
feb. & doloris grauatini: & remanentia
doloris acuti mordicantis. Si autē sit vl-
cus propter materias acutas de chol. vel
de flegmate falso in stomacho contētas,
præterq̃ quod faciant apostema, tunc cū
prædictis apparet dolor acutus in stoma-
cho sine tumore omnino & se, nisi fortas-
sis dolor sua acuitate inflammer spiritus
& humores. Et si sit vlcus in posteriori
parte stomachi: sentit ager dolorem sub
collo, aut inter vtraque spatulas. Si ve-
in anteriori parte, sentit dolorem super
vmbilicum. Et cura vlcēis quocumq;
fiat, est eadē, scilicet mūdificando ipsum
a sanie cum ripticis absterfuius. Et postea
consolidando cum stypticis cicatrizati-

Tractatus primus

Sumat igitur in aurora & ante cenā pro mundificando in æstate & quando feb. est fortis. 3. 4. vel. 6. decoctionis zuccari rub. vel aqua decoctionis liquiritiæ & gūmi arabici, vel aquæ casei. Si autē feb. non sit fortis, & tempus sit hyemis, dentur eisdem horis. 3. totidem aquæ mellis, vel aquæ decoctionis hyssopi, mellis, & squinanti, vel mellis ros. colati cum aq. calida. Deinde post hoc ad duas horas & ante comestionem, sumat pro consoli datio medicamen, quod sic fit. ℞. thuris, san. dracon. añ. 3. 4. balauſtig, Karabe añ. 3. 2. boli. ar. 3. iij. fi. pul. cribellatus, de quo sumat bis in die hora prædicta. 3. iij. & f. cum syrupo de citonijs, vel succo ci toniorū, vel aqua deco. myrtill. sumach, portul. & post illud ad duas horas detur cibus, & non postponatur continue post assumptionem medicaminis consolida tiui super stomachum, quod sic fit. ℞. boli armenici, myrtill. aloes, masticeis, añ. terantur, & incorporentur cum. 3. 6. resi næ vel laudani, vel picis naualis. Si autē sit propter dubellati: tunc præter iam di cta est sollicitandum de expulsiōe saniei generatæ in apostemate, & ordinatione rupturæ: quia in hoc est timor non modi cus. Cum ergo certificatus es saniem iā esse perfecte maturatam, quod scies: q̃a sedatur dolor, & feb. post apostema ma gnum sensu perceptum velociter, vtpu ta infra vnum vel 2. dies & remansit tu mor & inflatio, præterquam quod appa ruerit aliqua euacuatio sensibilis saniei vel san. tunc fac rupturam, dando in po tu lac dulce & aquam calidam vna vi ce post aliam, donec tumor mollificetur: demum prematur de super, & moueatur. Si ergo commouetur tumor, & egressio sit saniei & san. & detumescent apostema: tunc scias, q̃ iam diruptū est apostema: quod si non sufficit: necesse videtur, vt tribuas aliquid ex sinapi conditū cum melle super maicam panis: quoniam ve-

locirat rupturā. Et post illud da ei in po tu aquam mellis vna vice post aliā, vt educat saniem. Deinde cum sanies & san guis egredi visa sunt, procede ad mundi ficatiua & consolidatiua ordine prædi cto. Et in fine sumat sape dragagantū, in quo sit pul. sumach, & myrtillorū, bo li ar. masticeis, sang. dra. vel sumat zuc carum ros. vetus cum eisdem puluerib. vel trochiscis de Karabe: quos in cap. de mictu sang. dicemus. Cibetur bonis car nibus conditis cū succo citoniorū vel su mach vel myrtillorum, & lentes excorr. comedat, vel risum, vel fab. fractas, vel oua sorbilia. Bibat vinum clarum hypri cum lymphatum parumper. Quod si fe. sit intensa, bibat aquam decoctionis ci toniorum, vel piorum, vel sumach, vel myrtillorum & similiū. Et in pulmen tis suis de frumento vel auena confectis ponat adipem ouium capratū loco olei & butyri. Deuitet hora illa omnes cibos acutos aut acetosos: quia mordicant & vlceris prohibent consolidationem. Vi tet etiam potus actu frigidus pro posse: quia frigidum est vlceribus inimicū: vt dicit Hip. 4. part. aphor. similiter & actu calidos sub excessu. Sint ergo temperati cum declinatione aliquali ad frigidum.

Emperica. Emplastrum expertum ad omnem duriciem materias grossas mundificans in ipso stomacho, epate, splene, & in om̃ibus visceribus est emplastrum de meliloto: quod sic fit se cundum Hebemef. ℞. meliloti. 3. 6. flo rum chamomillæ, scenigraci, granorum lauri, radic. alyæ, absynthij añ. 3. iij. se. apij, cardamomi, hireos, ciperi, spicæ, cas siæ, ameos, añ. 3. 2. & f. san. luc. 3. iij. armo niaci. 3. 10. storacis. 3. 4. bdellij tantundē, terebentina: 3. 1. & f. ficuum siccatū pin guium. 12. numero, sepi caprini, resina: añ. 3. 2. & f. cera. 3. 6. olei san. luc. olei de spica, quod sufficit ad infundendum in fundenda, conterantur, & emplastreantur:

Item emplastrum magistrale atq; expertum ad omnem duriciem stomachi, & mirach ventris, siue sit cum apostemate siue sine apostemate, & proprie præmissa euacuatione vniuersali cum flebotomia, vel farmacia, prout materia requirit: sic fit. ℞. meliloti, scenigræci, florū chamomillæ, althææ, absynth. baccarū lauri, sicle maluarum. añ. 3. i. armoniaci, bdellij, galbani, oppoponaci, laudani añ. 3. 2. masticis, thu. añ. 3. i. adipis anatis, anseris, gallinæ. añ. 3. 6. Cōfice sic. dissoluantur gummæ cum aqua decoctionis. 20. ficuum pinguium siccarum cū vino & melle, & decoquantur herbæ & baccæ lauri in aqua perfecte, & pistetur, & incorporentur cum gummis: & in fine addatur adipēs, & si necesse fuerit ad incorporationem omnium meliorem, addatur aliquid de liquore prædicto modo in quo dissolutæ sint gummæ, & fiat emplastrum extensum super petiam lineam mundam, & applicetur particulæ in ieiunio actu calidum, frequenter reiterando, postq; in frigidatū fuerit: & si haberi non possint omnia, ponantur quædam: quia resoluit & mollificat sclerosim ex propriete suorum simplicium, prout est possibile in omni materia.

Canones. Certificatum est apud Rasin in diuisionibus cap. præfenti, quod in stomacho fieri apostema calidum est vt multum: frigidum vero perparum: quod est, quia stomachus est membrum neruofum solidū, & proprie quantum ad eius tunicam interiorem: quare nō videtur, quod vlla materia possit fieri, & penetrare in eius substantiam & corpulentiam, nisi acuta calida subtilis: sicut est in pleuresi. Licet autē cholera calidior & subtilior sit sanguine: quia tamen modica est in nostro corpore respectu sanguinis: ideo hoc apostema calidū magis fit ex cholera & sanguine simul mixtis: et post illud ex cholera pura, post

illud ex sanguine: cū sit humor benignus. Item certificatū est apud ipsum hoc apostema calidum magis fieri & causari in ore stomachi, quam in spaciositate eius: & nisi fiatim a principio subuenient fuerit cum percussiuīs & resolutiuīs, permuatatur ad saniationem vel indurationem. Itē certificatū est apud eundē apostema frigidum ex flegmate rarius fieri in stomacho, quam ex melancholia: quā vt plurimum est flegma congregatum in concauo stomachi, prarum vero in eius spaciositate grossicie prohibente. Licet autem melancholia grossior sit flegmate, veruntamen est terminus humorū quorumcumq; congelatorum aut adustorum: quare potest apostema melancholicum sæpius accidere, quam flegmaticum: Et illud apostema melancholicum dum acciderit, sit magis consequens apostema calidum, cuius subtile resolutū est per adustionem, quam aliud apostema frigidum condensatum. Et iterum rarius adhuc fit per se incipiendo: quia melancholia modica est in corpore nostro, similiter & grossa difficile penetrans vel putrescens. Ex quibus omnibus plurimum tuatur medicus in cognitiōe causæ apostematis, necnon in directione suæ curæ: cū causæ pfecta cognitio sit morbi semicuratō: vt dicit Gale. 2. de fe. ad Glaucō. Itē in cura sclerosi cuiuscūq; oportet tres habere intentiones: Primā quidē ad mollificandū: & hoc pficitur cū muscillaginē, scenigræci, se. lini, se. althææ & cum adipibus anatis, anseris, & gallinæ, & cū solijs & radicibus althææ, & cū gūmis acutis, q̄ sunt bdelliū, armoniacū, oppoponacū, storax, ligda, & cū butyro recens. & oleo cōi. Secūda vero ad resoluendū illud, qd est p̄mollitū: q̄ gdem pficit cū farina scenigræci, se. lini, florib; chamomille, meliloti, absynthij, bacca lauri, anetho, nasturtio, & gūmis p̄dictis. Tertiā ad constutandum substantiam praticulæ, ne virtus

Tractatus primus

ipsius a medicinis calidis resoluatur, & proprie cum sit mēbrum nobile necessarium pro toto: & hæc perficitur per styptica calida, vt sunt mastix, thus, absynthis, & calamētum. Ista autem tres intentiones apud omnes communiter operantes duobus fiunt modis: aut vicissim altera post alteram ordine iam dicto. Aut omnes commixtæ simul in vno & eodem emplastro: & primus quidē est operosior, secundus vero securior.

Prognosticatio. Omne apostema in stomacho periculosum est ex tota sua specie, propter stomachum esse membrum nobile & necessarium pro toto: quare eius mortificatione et suæ operationis destructio, sit necessario causa destructionis membrorum principaliū: & per consequens corporis totius, cuius corruptio mors appellat. Item apostema stomachi si terminetur per resolutionem, & cum constantia virtutis & bonitate appetitus: minus periculosum est. Si vero tendat ad collectionem, vt plurimum subito interficit propter feb. intensiorem & doloris fortitudinem, & proprie circa diem rupturæ. Si vero tēdat ad sclerosim, nequaquā curatur, nisi fortassis in principio, & anteq̃ confirmetur induratio: quare necessario perducit ægrū ad hecticam, et sic gradatim ad mortē propter ablationem digestionis & nutritionis. Item in apostematibus stomachi vomitus perseverans vel singultus superueniēs, mortale. Item apostema stomachi quāto profundius fuerit sub mirach, tanto suspectius: quanto vero eminētius ad corpus, tāto salubrius: quia significat mirach esse apostematum potius, q̃ stomachum: Vnde Hippo. 6. parti. apho. Dolores & tumores secundum ventrem existentes, superiores quidem, id est exteriores leuiiores &c. Item vlcus stomachi vel vulnus, si fuerit penetrans per ambas tunicas stomachi, mortale: Si vero non pe-

netret, quandoq̃ curatur, & proprie, si nō penetret tunicam nervosam: Verum qualitercunq̃ res se habuerit: fiet corrosiuium, si perdurauerit: quapropter efficiet lienteriam, & corporis consumptionem gradatuiam, & demum dysenteria perniciosa. Vnde Hippo. ibidem. Vesicam incisam, aut cerebrum, aut cor, aut diaphragma, aut epar, aut renes, aut intestinorum aliquod gracilium, aut ventrem, id est stomachum: mortale.

TRACTATUS SECVNDUS tertiae sectionis.



Patis passiones famosæ sunt sex. Prima debilitas siue eius mala complexio diuersa. Secunda opilatio & ducies: Tertia cachexia: Quarta hydropsis: Quinta icteritia citrina vel nigra: Sexta apostema vel vlcus atque exitura.

De debilitate epatis.

Caput I.



Debilitas epatis nominatur a medicis actio læsa operationis ipsius, quæ est segregare, id est partē succosam chyli per meseraicas attrahere, & in massam sanguinis mutare, quæ cōponitur ex sanguine puro, flegmate, cholea & melancholia. Et hæc massa est alimētum commune corporis totius: ita vt sanguis sit proprie alimentum, alij vero tres humores sint sicut eius condimentum, aliter & aliter in alijs & in alijs mēbris nutriendis contemperatum: prout eorum vnumquodq̃ sibi proprium desiderat nutrimentum. Hæc autem debilitas operationis non fit nisi a debilitate proprii instrumenti, quod est complexio, compositio, & vnitas siue continuitas. Virtus namq̃ neq̃ fortificatur, neq̃ de-

bilisat per se. Propter quod dicebat Ha-
ly in commento regni. fortitudo virtutis
sequitur temperamētum complexionis:
& Aristot. 1. de anima. Si senex acciperet
oculum iuuenis, videret vtiq; vt iuuenis.
Frigitur aut a mala complexione, aut
a mala compositione, quæ raritas textu-
ræ nuncupatur, aut a solutione suæ con-
tinuitatis. Et si a mala complexione, aut
a calida, aut a frigida: & vtraq; earū vel
est cum materia vel sine materia. Et ma-
teriam quidem diximus malam comple-
xionem humidam: Carentiam vero ma-
teriæ, vocamus siccitatē. Et signa quidē
oim, similiter & curā dicemus, præterq;
illius, quæ sit ex solutione continui: quo-
niam spectat ad chirurgicū, nisi fortasse
acciderit ex apostemate vel vlcere, de
quibus proprio dicemus ea. Signa debili-
tatis epatis propter raritatem substantiæ
eius, sunt prostratio appetitus, extenua-
tio corporis, & egestio similis loturæ car-
nis sine dolore: quoniam substantia epa-
tis non sentit, sicut neq; pulmonis, neque
splenis, neq; renum. Signa malæ comple-
xionis epatis calidæ, sunt citrinitas faciei,
& proprie in albugine oculorum, & sic-
citas oris cum amaritudine & vehemen-
tia sitis & siccitate vētris plurima. Quod
si sit cum materia, sit quādoq; vomitus
rei citrinæ subtilis amaræ: & sit vrina ci-
trina, vel rubea subtilis si in epate fuerit
opilatio: sed grossa, si in ipso nō sit opila-
tio, aut declinatio opilationis. Signa ma-
læ cōplexionis frigidæ, sunt pallor faciei
squalidus cum fluiditate: similiter & gra-
uitas totius corporis, & pigritia & so-
mnoletia corporis, & tensio hypochon-
drii dextræ: & vrina alba subtilis vř glau-
ca vel palea. Quod si sit cum materia,
sit vrina lactea grossa vel karopos, nisi
opilatio prohibeat, & fortassis egestio
chylosa propter diminutā attractionē:
& forte sequitur tumor & inflatio ma-
nuum & pedū, si perdauerit hæc dispo-

sitio, & demum cachexia. Et scias q; ege-
stio est significans cum virtute super con-
cauum epatis, quod vltima dicitur: vrina
vero super gibbū siue conuexum ipsius,
& venas corporis totius.

Methodus. Cura debilitatis epatis
propter raritatē suā sub-
stantiæ, est vt emplastretrur cū rebus cali-
dis stypticis: sicut sunt ciperi, mastix, spi-
ca, nux cypressi, absinthium, calamen-
tum, gallia muscata, & similia. Vtatur
electuarijs calidis stypticis: sicut dictum
est, diacironiten cum speciebus: Et sicut
est hoc medicamen. ℞. masticis, ameo-
se, apij, ciperi, squinanti. añ. aut. ʒ. i. thuris
aut. ʒ. i. spicæ, aut. ʒ. i. terantur, & cribellentur
omnia, & dentur ex eo ʒ. iij. in aurora
cum vino claro odorifero, aut aqua deco-
ctionis seminum calidorum, vel radi, &
communium. Vngatur epas cū oleo ma-
sticino, oleo de absinthio. añ. partem. i.
olei ro. p. ʒ. i. actu calido in ieiuno. Sumat
cum cibo suo grana granatorum pulue-
risata subtiliter cum cynamomo. Cura
debilitatis epatis propter malā comple-
xionē calidā ipsius, est vt alteretur epas
cum emplastro quod est. ℞. sandal. al. et
rub. ros. rub. camphoræ. añ. ʒ. i. terantur
omnia subtilissime, & misceantur cum
aqua ros. & modico aceti, vel cum suc-
co solatri & temperuiuæ, et modico ace-
ti, & in ipso actu calido infundatur filtrū
carens calce, vel pannus lineus: & ponat-
ur super epas reiterando frequenter in ie-
iuno, quando tepescit ex parte: vel cū po-
puleon mixtum cum oleo ro. vel viol. &
proprie in se. Sumat in aurora syrupum
acetosum, vel oxyzacarum, vel syrupū
ros. vel viol. cum aqua decoctionis endi-
uiæ, solatri, lactucæ, cucurbitæ, cicoreæ,
& vinum granatorum vel berberis cū
eisdem aquis. Cum cibo suo vtatur sapo-
re facto ex succo acetosæ, trifolij, berbe-
ris, granator, & lacte amygdalarū dul-
cium. Comedat pulmēta ex farina orde-
i

vel auenæ, & colera facta ex lactucis, portulacis, cucurbitis & similibus, & carnes laudabiles alteraras cum eisdem. Comedat in principio cibi. pruna, cerasa, persica & similia, sed in fine pira, vel poma, vel citonia assa. Quod si sit cū materia, purgetur cho. cū decoc. quæ est hæc. ℞. reubarbari. 3. 2. vel 3. 1. & f. terantur, & infundant super ipsum. 3. 4. aquæ feruentis decoctionis prunorum vel tamarindorum, vel violæ. & detur totum ante diē. Et hoc fiat sæpius vice post vicē. Et post purgationē sumat zuccarum rosæ. si venter sit obediens: vel violæ. si sit stypticus: vel triasandal. vel diaprunis simplex: vel sumat de trifera saracenicā cū aqua tepida, vel trochis. de berberis, qui sic fiunt. ℞. succi berberis. 3. 10. seminis endiuæ, seminis cucurbitæ, seminis portulacæ, ana. 3. iij. rosæ. 3. 2. reubarbari. 3. 1. spicæ. 3. f. informantur trochisci pondere aut. 1. ex quibus detur vnus in aurora cū syrupo acetoso, vel vino granatorum: quia infrigidat & confortat epar, ne cholera multiplicet. Cura malæ complexionis frigide epatis est, vt alteretur epar cum emplastris. ℞. ciperi, masticis, spicæ, calami aromatici, squinanti, croci, myrrha, añ. 3. f. dissoluantur myrrha & mastic in vino, & misceantur cum rebus alijs, & fiat emplastrum actū calidū super epar, reiterando sæpius, quando tepidum factum fuerit: vel vngatur cum marciaton ad solem vel ignem ante cibum, & balneetur in aquis tinnarū, vel aqua decoctionis absynthij, calamenti, & omnium calidorum cum stypticitate aromatizante. Sumat in aurora oxymel compositum vel squilliticum cum aqua calida decoctionis feminum diureticorū calidorum. Vtatur diamargariton, diagallanga, dianiso, theriaca veteri, & omnibz calidis aromaticis. Comedat carnes laudabiles coctas cum petro. se. vel anethi vel feniculi conditas cū speciebus

calidis: & iura earum inspissata cum vitellis ouorum. Bibat vinum vetus clarū per se, vel mixtum cum aqua decoctionis endiuæ vel cicoreæ. Et si sit cum materia vel opilatione: purgetur sæpe cum pillulis cochlij vel hierapicra: et post purgationem sumat omni die mane vnum ex trochis. de reubarb. ad depilandum, & confortandum epar frigidum, qui sic fit. ℞. reubarbarum, baccarum lauri, ana. 3. iij. spicæ, seminis apij, ameos, mastic, squinanti, granatorum iuniperi, amygdalarum amara, costi amari, rubæ tinctorum, succi eupatorii, azari, aristologiæ rotundæ, gentianæ. añ. 3. 1. & f. fiāt trochisci ponderis aut. 1. & dentur cum decoctione radicum, quæ sic fit. ℞. corticis radicis apij & feniculi. añ. 3. 10. rosæ. rub. spicæ, florum squinanti, vel herbæ eius, ameos. añ. 3. 4. pistentur & coquantur cum lib. 1. aquæ decoctionis, donec ad tertiam partem redeat: coletur, & reseruetur. Vtatur pro sapore sinapi conditum melle, & speciebus: & fiant omnia quæ dicuntur ea, de cachexia.

Emperica. Reperiuntur simplicia, quæ conferunt omni epati debili tam calido, q̄ frigido a proprietate: prout Auicenna de endiuia. 2. canōn. testatur: licet a complexione propria magis conferat epati calido. Itē pu. epatis adip. id est lupi dicitur conferre, si duo aut. sumantur ex ipso cum vino dulci in aurora, vel aqua endiuæ, vel aqua frigida pura, si sit cum se. Et Ras. dicit q̄ expertus est sæpius in omni debilitate. Item passulæ pingues impinguant omne epar a proprietate, si comedantur omni die cum suis interioribus per se, vel cum granis granatorum contritis diligēter mastigando: verum cum epar sit membrum principale vehementer influens super totum, sit & membrum rarum, pongiosum, quod facile nocetur in sua substantia atq; operatione: necessarium videtur, vt medicus

diuersa simplicia tam nocentia q̄ con-
frentia nullatenus ignoret. Sunt autem du-
orum generum: quoniā aut per interius,
aut per exterius exhibētur: & nos quidē
ipsoꝝ plurima nominibus proprijs exa-
remus: Sed lector ad reliqua similiter se
conuertat. Ex confertibus igit̄ interius,
sunt pineæ, pistacia, auellana, vix bene
maturæ, ordeum, serum caprinū, anthe-
ra, mala granata & proprie acetosa cū
suis interioribus, myrtilli, cinamomum,
spica, scariola, lactuca: capillinum ve-
neris, sumach, acetosa, xiloaloes, zucca-
rum, ambra, cassia lignea, reubarbarū,
gariofil. omnes myrobalani: Sed ex con-
ferētibus per exterius, sunt absynthium,
plantago, squinatium, spodium, sandal.
mastix, eupatorium, costus, cicorea, ne-
nufar, saluia, ros. solatrum, semperuiua.
Quæ vero nocēt per interius sunt dulcia
viscosa: sicut est mel, vinum turbidum,
ficus tortelæ: quoniam opilant eius vias,
cum propter eorum dulcedinem pluri-
mam attrahantur, antequā digerantur:
quapropter dixerunt iam plurimi, q̄ dul-
cia opilant epar. Sed deopilat vias pecto-
ris & pulmonis, licet sint posteriores. Si-
militer & potus plurimus post cibū vel
coitus vel exercitium vel balneum: quo-
niam infrigidat & opilat: similiter vsus
fructuum superfluous aut olerum: quoniā
sunt aquosa: vt cerasa, pruna, persica:
quapropter generāt sanguinem grossum
opilantem. Sed nocētia per exterius, sunt
omnia calida resolutiua: velut sunt ane-
thum, apium, armoniacum, oppopona-
cum, nisi cum stypticis regulentur: simili-
ter coitus, balneum tinnar, labor fortis
excessiuus: similiter et frigida mortifica-
tiua: nisi cū calidis aromaticis refrenēt.

Canones. Certificatum est apud medi-
cos, q̄ epar magis nocetur a
mala cōplexiōe frigida q̄ calida: propte-
rea, quia calidū est vitæ principiu, & di-
gestionis principale instrumentū: Certifi-

catum est etiā apud medicos, q̄ magis
nocetur a mala complexione sicca q̄ hu-
mida: quia ipsum est fons humiditatis su-
per corpus totum: sicut cor est fons cali-
ditatis, prout origo venarum & arteria-
rum attestatur.

Prognosticatio. Mala cōplexio epa-
tis sicca calida, si per
durauerit, ad hecticam perducit: sed cali-
da, humida ad fe. putridas malignas: Fri-
gida vero sicca ad marasimum: Frigida
vero humida ad cachexiam & hydropi-
sim hypofarcam. Dicit præterea Auer.
7. colliget. q̄ in fe. de cholera, vel sangui-
ne epar est diligenter obseruandum cum
frigidis stypticis, ne fortasse euaporetur
eius caliditas naturalis, aut eius substā-
tia per adustionem ne arefiat: quem ad-
modum in fe. flegmaticis stomachus est
diligenter confortandus cum calidis sty-
pticis, ne mole flegmaris opprimatur. Si-
militer & in fe. melancholicis splen cum
subtilibus acutis. Item sollicitudinem est
in rectificatione epatis, cerebrū atq̄ cor-
dis omni studio proposse: quoniam hæc
tria principalia tres in corpus influūt pfe-
ctiones, sine quibus omnibus vita nullate-
nus existit: quæ sunt calefactio, motus vo-
luntarius atq̄ nutritio. Sicut nāq̄ cor ge-
nerat oēs spiritus, et ipsos per arterias ad
singula mēbra delegat: ita cerebrū ipsos
contēperat, & per neruos ad motus ani-
males adaptat: Similiter & epar oēs hu-
mores procreat, & per venas cum ipsis
vniuersum corpus irrigat.

De opilatione & duritie epa- tis, & recisione. Cap. II.

Opilatio siue durities epatis habet
originem a materia humoralitētio ve-
ro a materia v̄tosa. Hæc est igit̄
eaz̄ differētia. Cōueniūt aut̄: q̄a i vtraq̄
earū est dolor grauatiuus v̄l extēsiuus in
hypochondrio dextro, q̄nq̄ cū f. q̄nq̄ sine
f. Et putant stulti medici, q̄ sit apa, fis

Tractatus secundus

autem opilatio aut a materia humoralī calida adusta ingrossata, aut a materia viscosa flegmatica. Signa propria a causa calida opilationis, sunt vrina rubra subtilis valde, stypticitas ventris, dolor acutus pungitius, sitis vehemens, pruritus corporis, citrinitas coloris, & habitudo extenuata, pulsus velox spissus, & forte erit cum ardore vrinæ in virga, & est vt plurimum cum feb. Signa propria opilationis a causa frigida, sunt vrina alba aquosa subtilis valde, nisi forte opilatio omni die dissoluatur, vel materia sit plurima: tunc erit alba grossa, lenitas ventris, dolor grauius, diminutio digestiōis primæ & secundæ cum prostratiōe appetitus & siti modica, habitudo corporis squallida mollis & frigida, color corporis albus vel plumbeus: & forte apparebit tumor & inflatio pedū tempore noctis, & vomitus flegmaris, & multitudo sputi & aliorum, pulsus rarus parvus & mollis: & est vt plurimum sine fe. Si vero fe. superuenerit: diminuet materiam, & tunc signa erūt remissiora. Signa rētionis epatis sunt extensio hypochondij dextri cū dolore, qui fortificatur hora digestiōis cibi, & minoratur tempore famis, & sedatur per cōpressionem vehementem super ipsum cōr manibus: & est rugitus fortis circa locū epatis & vrina alba grossa ampullosa valde: Et si sit cū feb. debilitabuntur oīa ista signa: & apparebūt signa cōmunia feb. quæ sunt pulsus frequens velox spissus, similiter & anhelitus cū quadam debilitatiōe.

Methodus. Cura opilationis a causa calida adusta est, vt si sit sine feb. sumat omni mane syrupum acetosum compositum cum aqua decoctionis endiuicæ & lactucarum. Purgetur post digestiōem cum decoctione reubarbari, senæ, epithymi, squinanti, colatæ & dulcorata cum zuccaro. Vel purgetur cum syrupo prædicto acuatō cum 3. 2. reub. vel

cū 3. f. diagridij electi. Vt autem in ieiunio triasandal. diaprunis, vel trisera: quandoque purgetur acuatō cum 3. f. aut. 3. 2. reubarb. electi puluerizati subtilissime dulcorata cum syrupo violæ dando totū ante diem. Comedat herbā feri petro. borraginis, & carnes hædorum vel pullos coctas cum iisdem: & iura earum condita cum speciebus calidis non acutis: sicut est cynamomum, cardamomum, gariofil. crocus, & similia. Vtatur pro sapore tali succo. 18. foliorum petro. mētræ, acetosæ, añ. M. i. pistentur, & colentur, & colatura inspissetur cū duobus vitellis ouorum assorum, & cum mica panis fursuracei, & speciebus prædictis cum modico aceti fortissimi. Et si vis, quod iste sapor magis deopilet: pone vitellos crudos, & adde plus aceti, ita vt bulliat aliquantulum totum simul ad ignē: gastrum stomachum & epar confortat, & aperit opilationes. Bibat vinum album subtile lymphatum cum aqua decoctionis ciperi, scariolæ, vel cicoræ, vel endiuicæ. Vngatur epar omni die ante cibum leniter fricando cum oleo nardino calido, in quo sit aliquid aceti, & ponatur desuper post hoc filtrum, vel pannus leneus calidus mollis. Si autem sit cum feb. fiat flebotomia basilicæ vel saluæ in manu dextra, & digeratur materia cum syrupo acetoso simplici, & aqua decoctionis endiuicæ, vel seminis eius, & purgetur cum medicinis prædictis: nisi quod debet poni zuccarum loco mellis. Cura opilationis a causa frigida flegmatica grossa, est vt detur omni mane ante diem & ante cenam oxymel cōpositum vel squilliticum cum aqua decoctionis radicū quinq; communium, vel cum vino albo claro, vel cum aqua decoctionis ciperi, capparidis, seminis scariolæ, fizeleos, & endiuicæ. Purgetur cum benedicta laxatiua, vel cum pillulis coctiis, vel cū oxymelle prædicto acuatō cum 3. 2. agariis

& 3. p. zinz. Et quidā acunt ipsū cū reubarbaro electo, quoniam confert omni debilitati epatis. Vtatur sēpius in ieiunio diatrionpipereon, filantropos, ne freccarticon cum vino veteri calido, similiter & diacastoreo & diacurcuma, qđ dicemus ca. de hydropisī. Nutriatur cum diatra supradicta, prāter qđ vinū sit purum, & in sapore suo ponatur allium, sinapi, raphanus & similia. Sumat quandoq; 3. f. theriacē veteris in aurora cum vino eodem. Vngatur epar cum oleo supradicto, vel cum vnguento marciaton ad ignem vel solem calidum in ieiunio, & proprie post purgationes aliquas. Sumat omni die in aurora vnū ex trochiscis de lacca: quoniam exopilant epar & splenem, & vrinam prouocant: neq; est eis simile in hoc: qui sic fiunt secundum Hebernes. ℞. lacce mūdatę, succi liquiritię, succi absynthij, succi eupatorii, succi berberis, reubar. boni, aristologi lōgg rosti, azari, amygdalarū amararū rub. ii. f. anisi, se. apij, squinati, scolopēdrię cāmarsi, aij. 3. i. fi. troc. 3. i. cum succo endiuie & vino albo. Et vocāt etiam trochi. de eupatorio, vel trochisci absynthij. Et sunt vtilis in hoc: vt patet per eundē in suo antid. Cura tensionis epatis est, vt vtatur sēpe in ieiunio carminantibus vētositate grossā: sicut est diaciminū, dianisum, diatrionpipereon, & similia cū vino puro veteri: Et faccellerur epar cum milio & sale torrefactis in sacco: Emplastretur cum absynthio, sceniculo, earui, cymino, aniso, fizeleos, & similibus: Et fomentetur cum vino decoctiōis pulueris baccarum lauri, cymini & fursuris, infundendo in eo pannos lineos, & applicādo lateri dextro actu calidos expressos aliquantulum cum reiteratione frequenti ante cibum: Vel inūgatur oleo de lilio vel anetho actu calido. Comedat carnes laudabiles coctas cum petro, sceniculo, anisi, vel seminibus eorum: Bi-

bat vinum vetus purum, nisi sit cum se. Tunc lymphetur parump cum aqua de coctionis ameos, anisi, amomi, vel feniculi: cū aquā in potu: & vtatur alio & sinap. pro posse. Et regat vter cōtinue cū panis calidis, vel pellib; pilosis.

Emperica. Ad omnē opilationē epatis & dolorem & apostema eius & ad antiquas ægritudines in ipso, & hydropisim & icteritiā conferunt trochisci de reubar. qui sic fiūt. ℞. reubar. boni. 3. 10. succi eupatorii. 3. 10. ros. 3. iij. spicę, anisi, ruberę tinctorum, se. apij. absynthij, azari. 3. i. amygdalarum amararum, 3. iij. fiant trochisci aurei. i. Respi ciunt nanq; omne epar a proprietate. In omni prāterea opilatione epatis aut meseraicarum confert postponere cibos viscosos, sicut sunt pulres ex simila vel riso & proprie conditi cum lacte, & extremi tates animalium, & panis azym; et frizaturę & tortellę & caleus: Similiter & omnia dulcia grossa: sicut sunt mel, fic9, ceruilla, vinum rubeum, similiter & oīa pontica & styrica sicut pira, citonia, mala maciana. Comēdat igitur res in quibus est absterisio cū incisioe sicut sunt iura carniū cocta cum petro. & aqua pisorum vel fabarum, & panis fursureus bene fermentatus, bene salitus, & bene coctus duorum vel 3. dierum ad minus. In omni vero tensione epatis conuenit dimittere cibos inflatiuos & ventosos: sicut sunt omnia legumina, & olera, & rapę, & fructus, & proprie crudi, & vti exercitio & balneo ante cibum: & vnguentum bonum ad duriciem epatis difficilē postq; timei hydropis, sic fit. ℞. armoniaci, xyloaloes, baccarū lauri, baurach. aij. cerę & olei quod sufficit. Item ad omnem emfraxim epatis vel splenis cōfert vinum vetus clarum bibitiū actu calidū in ieiunio, postq; in eo fuerit bullitum apium, fizeleos, & cortex median9 sambuci: similiter & emplastrum factū

Tractatus secundus

ex eisdem, & sunt qui purgant materias cum eodem vino acuat cum reub. Et fomentum ad idem. *℞.* sandal. ros. spo dij, squinanti, eupatoriij, absynthij, rutæ, rub. tinctorum omnium. ana. bulliantur in aqua ros. & aqua endi. & aqua absyn thij. & modico aceti. vel si præsto non fu erint tales aquæ, bulliantur prædicta in aqua ros. & vino al. & aceto forti. Et in fundantur in eo peritæ, & calidæ firmen tur super epar sapius in ieiunio: est namq; bonum & expertum.

Canones.

In cura ois opilationis epa tis aut membrorum aliorū cōueniūt sola calida acuta incisīua: quo niam sola huiusmodi materias grossas subtiliant, & vias elargant: Est tamen, cum per accidens oportet addere frigi da: vitupura si sit a causa calida, vel si pa tiens sit cum feb. Est etiam, cum oportet addere styptica: vitupura si membrum sit debilis texturæ. Syrupus autem nobilis aggregans intentiones prædictas sic fit *℞.* radicum quinq; cōmunium, tama riscī, scolopēdriæ, camedreos, camepite os, capill. veneris, epaticæ, endiuizæ, absynthij, rabeæ tinctorum. añ. m. s. corti cis medianæ sambuci, & salicis, & frax ini, florum sambuci (si sit tempus æsta tis) anisi, foeniculi, carui, fizeleos, cuscuta ris, ameos, squināti, ciperi, acori, cappa ris, berberis. añ. 3. 4. spodiij 3. ij. ros. sand. se. communium frigidorum. añ. 3. i. viol. 3. 6. zuccari lib. 2. aceti squillitici parum per: fiat syrupus, & aromatizetur cū cy namomi, gariofil. zz. piperis long. ana. 3. 2. Item in opilatione zimæ epatis, vel meseraicarum conuenit euacuare mate rias per secessum, & hoc fit cum farma cis prædictis: Sed in opilatione partis gib bosæ conuenit euacuare materiam per vrinam, & hoc fit cum vino albo subtili & aqua decoctionis radicum quinq; cō munium, vel seminum communū frigi dorum vel calidorū, prout oportet. Itē

tamen canonem duo impediūt. Primū est læsio intestinorum, vt in dysenteria, vel lienteria: quare tunc omnis materia euacuanda est per vrinam. Secundū est grossicis materia opilantis: quare tunc omnis materia euacuanda est cum far macis per secessum. Medicinæ præterea deopilatiuæ epatis debent dari in substa tia subtilissima: & ideo si sunt liquores, colentur: Si vero pul. cribellentur, vt al cohols: qd si cito transierint ad epar, ope rabuntur: sin autem, in via resoluetur ea rum virtus. Et ars quidem deopilatiua epatis est plurimi iuqamēti in causa icte ritizæ, & causa hydropisis, si debite conue niens cōuenienti copuletur: neq; sit præ ceptus in euacuādo medicus, ne forte ma terias agitet neq; in vrinam prouocādo, ne fortassis subtile educatur, & grossum lapidificetur.

Prognosticatio. In omī opilatione duri cie, & tensione epatis vel splenis fluxus vētris, vel eructuatio ventositatum plurimarū per anū, vel ex huberantia vrinæ supueniens tollit ægri tudinem. Vnde Hippo. 4. part. aphorif. Quibus hypochondria suspēsa, &c. Itē in opilatione epatis vel splenis sine apo stēmate feb. superueniens soluit ægritudi nem. Vnde Hippo. 6. par. apho. Quibus cumq; dolor sit circa hypochondria, & c. Purgetur ergo feb. per artem cū vsu ele ctua. calidorum apitiuorum, & proprie cum anacardino. Item opilatio epatis cum duricie plurima in ictericis, est mor tale: quia significat apostēma scleroticū in ipso. Vnde Hippo. 6. part. apho. Icteri cis si epar fiat durum, mortale: Item opi latio epatis cum fuerit antiquata, diffi cile, lapidificatane quæ resoluitur: vt di cit Auic. qre sit hydropisis, & proprie as cites perneans. Item opilatio epatis vel splenis dum adhuc percipitur ex dolore pungitiuo, facilliter curatur: quoniam co gnoscitur adhuc fore recens: Dū vero nō

hæpfitur omnino, vel paræ, est mala, difficilis, antiquata, confirmata: quare nõ curatur. Item sollicitandũ est statim a principio in cura opilationis epatis: quia est mater oim ægritudinũ in mēbris naturalibz: scilicet hydropifis, icteritiæ, fluxus vētris, apatis & fe. putridę malignę.

¶ De cachexia. Ca. III.

EST autē cachexia habitudo corporis squallida cum foetitate coloris in toto, & nihil est aliud q̃ hydropifis inchoara: & fit ab omni mala cōplexione diuersa epatis cū materie vel sine materia, vt plurimũ tamen cū materia vias & epar occupat. ¶ Signa cachexię in cōi sunt, habitudo faciei, manũ et pedũ tumida inflata, q̃ quq; delitescit, & postea iterũ redit: & color mixtus ex albo et cierino, & minoratio vrinæ & sudoris, & inflatio mirach & testiculorũ, & pruritus cū ardore sicco adusto in cute & iuncturis, & instantia vigiliarum cū debilitati one virtutis assidua, q̃ quādoq; facit ad venire syncopim: Et in quibusdā est appetitus fortis: quando natura remanet in suo ordine secundũ euacuaciones & resolutiones: In quibusdā est appetitus prostratus cū siti assidua: quādo retinentur superfluitates oēs intra corpus. Et si accidit ei vulnus vel vlcus difficile cōsolidatur. Signa vero eius propria, si sit a mala cōplexione epatis calida, sunt cū prædictis sitis vehemens cū prostratione appetitus omnino, & caliditas mēbrorum exteriorũ ad tactum medici, & proprie in plantis manũ & pedũ: siccitas ventris plurima, oris & linguæ absq; grauitate, rubedo vrinæ cū spissitudine & velocitate pulsus: & est vt plurimũ cū feb. Quod si sit cū materia, fiet vrina subtilis radio sa propter opilationem: & forte dolor aliquis in hypochondrio dextro sub costis. ¶ Signa eius propria si sit a mala

complexione epatis frigida cum prædictis, sunt solutio ventris, mollicies corporis, & corruptio coloris cum tumore faciei, & proprie palpebrarum: & paruus appetitus & digestiōis: & est vt plurimũ sine feb. & vrina alba vel karop. vel lactea grossa. Et si sit cum materia: sit vel na subtilis aquosa fulgida propter opilationem cum dolore grauius.

Methodus. Cura cachexię est cura debilitatis epatis supradicta suo capit. siue sit a causa calida siue frigida, siue cum materia vel sine materia prout ibi dictum est sufficienter, si propria proprijs applicetur.

Emperica. In cachexia ex quacũq; causa fiat, & in omni debilitate epatis, confert a proprietate sumere omni die in aurora. 3. 2. epatis lupi indomiti, sani, ætatis perfectæ: si epar exicetur ad solem vel ignem, & teratur & cribelletur subtilissime: & detur cum. 3. 3. vini clari dulcis, si sit sine fe. vel cum aqua end. vel se. eius vel aqua frigida solum, si sit cum fe. Potest autem hic pul. longo tempore conseruari, si cum iplo modicũ salis aut myrrhæ: aut pul. absynthij. misceatur. Sic namq; lardum & sanguinem & carnes obseruamus per annũ & oēm rem putrescentem facile. Item conferunt passulæ pingues bene masticatæ cum suis granis interioribz: & possunt addigra na granatorum acetosorum vel musorum in causa calida: vel cynamomum & spica in causa frigida: sed zucarum in vtracq; ipsa namque a proprietate confortant complexionem naturalem epatis & eius substantiam impinguant: quia propter conuenit vt masticentur omnia subtilissime: vt cito penetrent ad ipsum.

Canones. In cura cachexię oportet intendere ad duo: scilicet epatis alterationē, & depilationē: Alteratio autē trahit ex ca. debilitatis epatis: sed

Tractatus secundus

deopilatio ex ca. opilationis & rēſionis: deopilatio igitur cauſam nociuam euacuat: ſed alteratio ſubſtantiam & complexionem epariſ naturalē reſtificat & confortat.

Prognosticatio. Cachexia de cauſa calida ſi ſit cum duritie epariſ, prædicat icteritiā & hydropiſim tympaniten: Sed cachexia de cauſa frigida, eſt vt plurimum præſaga hydropiſiſ hypofarchæ. Item ſolicitandum eſt in cura cachexiæ: quoniā ſi cōfirmetur, cum in hydropen tranſierit, difficile vel impoſſibile eſt ipſum curare, & proprie ſi ſit de cauſa calida: quemadmodum dicetur de aſchite & tympanite.

De hydropiſi. Cap. III.

HYdropiſiſ eſt morbus materialis cauſatus ex re frigida plurima ingrediēte & inſtante mēbra manifeſte omnia, aut loca partium, in quibus regimur ciborum et humorum ſit: Et ſit tribus de cauſis, ſcilicet primitiua, antecedente, & coniuſta. Cauſa quidē primitiua eſt potus aquæ frigidæ plurimæ ſlico poſt exercitium, aut coitū, aut balneum, aut æſtū ſol, aut in ieunio: propter quod inſrigidātur membra naturalia, nū cito rapitur ad ipſa: & proprie ad ſtomachum et epar. Cauſa vero antecedens eſt mala complexio & mala compoſitio ſiue opilatio eorundem: propter quod neq; humores debite generantur in eis: neq; ſuperfluitates eorū debite euacuantur. Cauſa autem coniuſta, eſt aqua & ventofitas occupans membra omnia aut ſolum nutritiua. Habet autem tres ſpecies, ſcilicet tympaniten, aſchitē, & hypofarchā: vt ait Galeñ. de accidenti et morb. Tympaniten quidem accidit ex generatione aquæ paucæ & ventofitatis plurimæ in ventre naturali collectæ inter mirach & ſiphac: & quandoq; inter ſiphac & inteſtina. Eſt autem ſiphac panniculus neruo

ſus ſolidus continens inter ſe zirbum & ſtomachum & epar & ſplenem & inteſtina. Mirach vero dicitur pars ventris exterior compoſita ex cute pinguedine & octo muſculis ventris, duobus quidē longitudinalibus, & duobus latitudinalibus, & quatuor tranſuerſalibus procedēs a furcula inferiori vſq; ad ſummum ventris: vt patet in anatomia. Et incipit hæc ſpecies a vitio ſtomachi, & terminatur ad vitium epariſ. Aſchites vero ſit ex aggregatione aquæ plurimæ & ventofitatis paucæ, & incipit a vitio epariſ & terminatur ad vitium ſtomachi. Hypofarcha ſit ex multiplicatione ſang. frigidi ſubtilis aquoſi per membra corporis totius mollificantis & inſtantis corpus totum, & incipit a vitio membrorum exteriorum, & terminatur ad vitium epariſ. Et hanc ſpeciem quidam modernorum, & proprii medici de ſalerno per duas diſtinxerunt, vnā quidem in qua aqua dominatur ſuper ventum, & ipſam nuncupāt leucocſtantiā: aliam vero, in qua ventus ſuper aquam dominatur: & hanc hypofarcham nominauerunt: quemadmodum aſchites diſtinguitur a tympanite. Sed nos illud cōſutamus Gal. doctrinam imitantes, qui talē ſpeciem nequa q̄ ſubdiuiſit: cum ſit nominalis hæc diuiſio. & nō realis, quæ curam faciat diſſerere: Verum ſi tibi ſapuerit 4. habere ſpecies, nihil aliud facias, q̄ curam hypofarchæ attēdas circa duas ſpecies, quam dicemus: nūc quidē attēdas ad ea q̄ euacuāt aquā, nunc ad ea q̄ ventū carmināt: quemadmodum nec refert inter aſchiten & tympaniten cura quā dicemus: verum tamen licet tympaniten fiat proprie propter vitium digeſtionis primæ, q̄ eſt in ſtomacho: & hypofarcha vitio digeſtionis tertiæ, quæ eſt in venis, & in membris totius corporis: impoſſibile tamē eſt aliquam ſpeciem hydropiſiſ accidere: niſi prius inductio vitio ſuper cōplexione & cōpoſitione epa-

is, quod est sedes digestionis secundæ. Ex quo patet, q̃ impossibile est aliquam hydropis speciem curare sine rectificatione epatis quoquomodo: immo & conueniens est rectificare splenem, & renes, et vesicā: quia non sufficit in eius cura euacuare causam, et alterare dispositionem: sed & vias expulsionis superfluitatū oīm debilitas aperire & confortare: vt sanitas perfecte inducatur sine timore recidivationis. Signa hydropisis inseparabilia, sunt tumor et inflatio pedum & ventris, similiter & dolor in latere dextro & sinistro, & minoratio sudoris et vrinæ, & fœditas coloris declinans ad citrinitatē vel plumbeitatem, & inflatio oculorum, & sitis assidua cum prostratione appetitus. Hæc igitur signa omnē speciem hydropisis assequuntur: vt ait Hip. 2. prognosti.

Methodus. Tympanites fit ex mala complexionē frigida epatis & stomachi prohibere cibum trāsmutari in chylum benignum aut sanguinē: quare conuertitur in rem ventosam, quæ dum non expellitur per eructuationem vel trullas opilatione viarū prohibente vel virtute expulsiua et sequestratiua superfluitarū debili existēte, colligitur inter mirach & siphac ventus: & fit hoc vt in paucioribus. Fit etiam a mala cōplexione calida epatis cum materia aut sine materia debilitante eius virtutes naturales: quoniam fortitudo virtutum sequitur temperamētum complexionis naturalis: quapropter accidit vt febricitantes cibum male digerant, licet forti participant caliditate. Quod si sit cum materia, vel est opilans tantum, & prohibens degenerationē cho. rubæ per vias debitas: aut est apostemās & indurās: & hoc est, vt in plurib. Signa propria tympanites, sunt cum signis communibus prædictis egressio vmbilici plurima, & tensio mirach in modum tympani, & arefactio membrorum cum asperitate & siccitate: &

cum percutitur vēter, facit sonum fortē, velut tympanum, aut vt inflatus non velut vter aqua plenus, & cum reprimatur, est durus vehemēter, & resistit, & patiens est appetens eructuationem & trullas, & alleuiatur per exitum earum, & non instantur pedes adeo, sicut in alijs: & est cōpulsus longus velox propter necessitatem adactā sine grauitate plurima, quæ fit in alijs speciebus. Et si sit a causa frigida, apparebit cum prædictis vrina non multum tincta: sed habē ampullas, magnas, grossas. Si vero sit a causa calida, apparebit cū prædictis vrina multū tincta subtili, & pulsus frequens cum se. continua conclusa. Cura tympanitis, quando est cū caliditate epatis vel apostemate & se, est composita ex cura apostematis, quæ dicitur suo ca. & cura hydropisis, quæ est vt purgetur sepe ante cibum cum clysteri quod sic fit. ℞. anisi, fenicul. carui, cymini, florum chamomillæ, meliloti, semi. endiuix, cicoræ, lactucæ, feminis portulacæ, ciperi, tribulorū, ana. m. i. pistentur, & bulliāt in aqua, & lib. i. illius aquæ colatæ addantur vñciæ tres zuccari vel mellis, & ʒ. tres, olei de chamomilla, vel de lilio, vel de ruta, vel de anetho: & ʒ. iij. salis communis, et omnia ista reducantur ad ignem, & bulliantur aliquantulum, & colentur, & tepid. inijciatur. Hoc enim de proprietate alterat caliditatē, & resoluit ventositatē cum humiditate, & vrinam prouocat si ne calefactiōe. Purgetur semel in hebdomada cū pillulis de reubar. quæ sic fiunt. ℞. reubarba ʒ. 2. carui, ameos, amomi, añ. ʒ. i. colloquintide, turbich scamoneæ. añ. ʒ. ʒ. conficiātur cum succo eupatoriij: detur ex eis sero cum itur dormitum sine coena a ʒ. i. vsq; ad ʒ. 2. q̃a de proprietate confortant epat & stomachum & carmināt ventositatem, & expellunt humiditatem. Super epat ponatur emplastrū frigidum stypticum factum ex sandalis,

Tractatus secundus

ros, farina ordeli, ciperi tritis, & cribellatis, & incorporatis cum succo plantaginis & aqua ros. & modico aceti. Super stomachum & intestina ponatur emplastrum factum ex milio, fursure, sale torrefacti in sacculo, & actu calidum frequenter applicetur. Fiant masticationes saepe ante cibum prouocantes eructationes ex thure & cymino & mastice & carui & similibus. Inungat totus venter quandoque ad solem calidum vel ad ignem cum aceto squillitico, praemissa fricatione leni cum panno calido aperiente poros. Supponatur quandoque suppositoria, quae extrahat ventositates per inferius: sicut sunt ista. *℞.* foliorum rutae, cymini, baurach, salis gemmae. *añ.* partes aequales: terantur & conficiantur cum melle. Nutriantur cibis digestibilibus: vt sunt caro pulorum & hedorum vel castratorum vel auium motanatum, & proprie assa vel elixa cum feñ. petro, condita cum sapore facto ex agresta, vel vino granatorum vel berberis, vel aceto vel succo acetosae & puluere cynamomi, cardamomi & croci. Et non comedat inflatiua omnino: sicut sunt legumina, fructus arborum, olera, rapa, & similia: nisi forte olus factum ex herba feñ. & petro. Comedat etiam iura carniū condita cum vitellis ouorum, & ova forbilia. Vtatur cibis siccis vel assis vt plurimum, praeterquam in die purgationis: Tunc vtatur humidis & calidis, vt venter celerius soluat. Bibat vinum album, aromaticum, lymphatum cum aqua decoctionis seminis, feñ. vel ameos, vel amomi. Parum comedat & bibat: viter somnum superfluum proposse, & proprie diurnum. Sumat post purgationes aliqua electuaria aperitiua alteratiua & confortatiua: sicut est haec mixtura. *℞.* dialacca, diacymini, dianisi, diacardamomi, diagallang. *añ.* parte 1. diarodon abbatis. rosatae nouellae, triasandali. *añ.* partem 5. vel sic. *℞.*

diacucurmae, trifferae, sarraceniace. *añ.* partem vnā, triasandali, zuccari, ros. *añ.* part. 5. Cura tympani, quando est sine caliditate epatis vel fe, est, vt soluat frequenter in ieiunio cum clysteri, quod sic fit. *℞.* ameos, amomi, cymini, sivezeos, fe, feñ. end. *añ.* 3. f. chamomilla, melilecti, eupatorii, cicoreae, centaureae, rutae, maluarum, lactucarum. *añ.* m. 1. polypod. 3. 1. colloquintida, aga. *añ.* 3. f. pistentur, & bulliantur in aqua perfecte, & colentur, & ex lib. 1. illius colaturae & 3. iij. mellis. & 3. 2. olei de anetho, vel de ruta, vel de chamomilla, vel de lilio: & 3. f. salis communis: fiat clystere, quia de proprietate humiditates euacuat, & ventositates potenter resoluit. Purgat semel in hebdomada cum pillulis, quae sic fiunt. *℞.* hermodactilorum, turbiti, cymini. *añ.* 3. f. agarici, colloquintida, scamoneae. *añ.* 3. f. miscantur cum succo eupatorii, vel cicoreae. Detur ex eis, quando itur dormitum sine coena a. 3. 1. vsque ad. 3. 2. Et scias, quod frequens vsus chamedeos, & origani, & sivezeos sanat omnem tympaniten a proprietate. Super epar ponatur emplastrum confortatiuum & aperitiuum, quod sic fit. *℞.* sandali, al. citrini et rub. ros. ru. *añ.* 3. seminis masticis, myrrhae, nucis ciperis. *añ.* 3. iij. olei masticis vsnard. 3. 2. aquae ros. aceti ana. 3. seminis succi absynth. succi plantaginis, succi eupatorii. *añ.* 3. quatuor: terenda terantur, & incorporentur omnia cum oleis & succis, & addatur farina lupinorum (quod cantabrum dicitur) quod sufficit ad inspissandum. Super stomachum et intestina ponatur emplastrum supradictum, alias quod fit ex seminibus ameos, carui, feñ. dauci, amomi, mixtis cum milio, & in sacculo calefactum super lapide ignito. Vtatur post purgationes aliquas diacimino, diacurma, dianiso, diagallanga, diacardamomo, & electuarijs calidis carminantibus ventositates grossas cum virtute. In vngu-

ris, suppositorijs, masticationibus & diæta, fiat vt superius, præter q̃ vinum eius sit clarum, vetus, purum, potens sine omni permixtione aquæ: & species conidentes eius cibos sint magis acutæ: adde igitur prædictis cuminum, carui, seminis feniculi, anisi, piperis longi, piperis nigri & zinz. Et in fine balneetur in aqua tinnarum calida frequenter ante cibum: & sic regatur a principio curæ vsque ad perfectam sanitatem gradatim. Et si per hæc nondum fuerit bene curatus, redeundum est ad principium, & per ordinem denuo procedendum, iuxta illud Hippocratis secunda partic. aphorismorum: Omnia secundum rationem facienti & non secundum rationem euenienti, non oportet transire ad aliud, manente eo quod visum est a principio. Et iuxta illud Auic. r. cañ. feñ. 4. ca. noli recedere a bono, licet in eo tardauerit iuuamentū, &c.

Methodus. Aschites quidem causatur & accidit a mala complexionē epatis frigida, & hoc vt in paucioribus, debilitante virtutem digestiuam & segregatiuam: quare non generatur sanguis laudabilis, sed crudus aquosus, qui non est aptus nutrire membra, nec expellitur superfluum per vrinam et secessum opilatione viarum prohibente, vel virtute expulsiua & sequestratiua superflui a non superfluo debili existente, colligitur inter siphac & intestina & forte redundat inter siphac & mirach inflans ea vehementer: aut fit a mala complexionē epatis calida vehementer, & hoc vt in pluribus, resolvente & debilitante calid. epatis naturale, quod est proprium organum digestionis in eo: quia digestio non est aliteratio absolute. Sic enim maior & fortior fieret a calido maiori. si igneo febrili: sed est alteratio determinata modo gradu, atq; ordine naturali. Et siue fiat a mala complexionē calida siue frigida, aut est sine materia, & hoc raro: aut cum materia, & hoc est vt plurimum. Et si sit

cum materia, aut est opilans tantum, & duriciem inducens, aut est cum hoc apostemās, & siue sit opilās siue apostemās, & prohibens sequestrationem superfluitatum ab humoribus benignis, & earum euacuationem ad extra corpus: Et fit vt plurimum ab opilationē epatis chronica & indurata, quæ sclerosi appellatur: sicut & icteritia citrina: quæ propter sclerotici sunt (vt plurimum) icterici propter opilationem pori fellei & totius spongiositatis epatis & venarū. Signa propria aschitis, sunt cum signis cōmunibus superdictis, inflatio & grauitas vētris plurima, quæ dum percutitur, facit sonū rauri: sicut aqua cōquassata, vel sicut vter semiplenus aqua: & quando voluitur æger de latere super latus, sentit sonum & morum aquæ fluctuantis. Et sunt in quibusdam in testiculis & virga & cruribus inflatiōes fortes & immensæ: sed superiora remanent gracilia extenuata, et est in cute mēbrorum tumidorum tensio sicut corij imbibiti per noctem in aqua, q̃ dum p̃muntur: reddunt foueam, q̃ nō illico repletur, sicut in tympanite, sed gradatim: & adest vehementia sitis assidua, quasi post sumptionē aq̃ salis, cū prostratiōe appetit⁹: & pulsus coris est paru⁹ frequens, declinans quādoq; ad molliciē ex lenitate humiditatis multiplicatæ. Et si sit a causa frigida, sit lenitas vētris, & apparebit vrina nō valde tincta subtilis tñ propter opilationē. Et si sit a causa calida vel cū apostemate sit vētris stypticitas plurima, & apparebit vrina valde tincta subtilis cū se. cō-lusa: verūamen vt plurimum in omni aschite sit vrina tincta: q̃a natura nō facit aliquā sequestrationem in superfluitatibus cholicis & melancholicis: quæ remanent superfluitates cū vrina & tingit ipsam vehementer: & ideo antecedit (vt plurimū) oēm aschitē icteritia citrina vel nigra. Cura autem aschitis, quādo est a caliditate epatis aut apate & feb. quorū cōplect intentionibus,

Tractatus secundus

Quarum prima est cura apostematis, prout dicitur infra suo cap. Secunda vero alteratio malæ complexionis epatis, & eius cōfortatio cum frigidis stypticis. Tertia est deopilatio viarū epatis cū diureticis aperitiuis. Quarta est euacuatio aquæ citrinæ, siue causæ coniunctæ alchirris per secessum & vrinam cum medicinis laxatiuis & vrinariis, de quibus singillatim per ordinem dicamus. Purgetur igitur omni septimana semel vel bis secundum tenorem virtutis vel medicina euacuante solum per secessum, vel euacuante per secessum simul vrinā vel modo cum vna modo cum alia, ne natura fiat consuetudinalia, & vt viæ epatis omnes copiosius & sufficientius expurgentur. Pillulæ de reubar, alleuiātes optime in hoc casu, quæ soluunt ventrem cū prouocatione vrinæ, sic fiūt. ℞. reubar. electi. 3. 2. turbith, agarici, colloquintid. 22. añ. 3. 1. fe. end. lactucæ, cicoreæ, se. apij. añ. 3. 6. formentur pillulæ cum succo lactucæ, end. vel cicoreæ. Et si vis magis acuerē: adde scamoneæ 3. 6. ro. ru. 3. vñ. Dosis earum est in sero cum stur dormitū a. 3. 1. vsq; ad 3. 2. Item pillulæ de mezereon Ioannis Mes. ℞. foliorum mezereon præparatorū, vel seminis eius præparati. 3. 4. myroball. citrinorum. 3. 4. kebullorum. 3. iij. confice cū tamarind. vel manna dissolutis in aqua end. Si pillulas recipere non possit, licet melius operentur: recipiat decoctiōis seminis end. lactucæ, scariolæ, prunorum, sem. apij. 3. 4: & cum feruet, fundatur super 3. 2. reubarb. & 3. 6. turbith, & dimittantur sic vsq; ad horas septem, tunc coletur, & detur ante diem cū 3. 2. syrupi acetosi. Et si corpus fuerit robustum: detur totum simul cum colatura, vt purgetur cum electuario de mezereon: quod ponit Mesue in suo de consolatione medicinarum solutiuarum capitulo de mezereon, et est optimū prædictorum. Educit enim vehemēter aquā

hydropicorum per secessum. ℞. foliorū, vel se. mezereon præparatorū per x. carnis citoniorum elixor in aceto, vini & zuc. ap. añ. par. 70. tereniabin. per. 40. olei mezereon per 12. aquæ casei, in qua infusus sit agaricus per noctem. p. 30. dissoluantur zuc. & manna in aqua prædicti casei, & misceantur cum carne citoniorum, & coquantur cum facilitate ad ignē lentum vsq; ad mellis spissitudinem, & inuoluatur mezereon cum oleo iam dicto, & misceatur cum eis: Cuius dosis sit a. 3. 2. vsq; ad iij. dando in media nocte. Et scias, qd mezereon modicum sustinet de decoctione & cōtritione, immo per ea perdit virtutē: præparatur autem sic mezereon. Recipiuntur folia eius, vel semina, terantur, & infundantur in aceto per diem, & exiccentur in vmbra. Medicamen euacuans per vrinā est syrupus diureticus, qui sic fit. ℞. radicum quinq; cōmuniū. añ. M. 1. linguae ceruinæ, aut scolopend. capilli veneris, epaticæ, end. acetose. añ. M. 1. sandal. ros. cuscute, berberis, capparis. añ. 3. iij. sem. communium frigidorum. 3. 2. viol. 3. 6. vini citoniorum lib. 6. syrupizetur cum lib. 1. zuccari: & quādo volumus ipsum fortificare in prouocando vrinā, addimus puluerem cantaridatum ablatis capitibus & alis, quæ sunt partes venenosæ: quia tunc fortius tendet ad renes & vesicam, propter proprietatem, quam habent cantarid. ad vesicam. Et quando volumus, vt idem syrupus purget simul per secessum & vrinam, addimus 3. 1. reubarbari, 3. 2. mezereon: vt supra dictum est: Et tunc dicitur syrupus diureticus reubarberatus: Et si præsto non sit aliud, detur syrupus acetosus compositus cum aqua decoctionis cicoreæ, acetose, berberis, ciperi, capparis, end. & sit aqua dupla ad syrupum. Sunt præterea quedam medicinæ debiles purgantes per secessum, quæ conueniunt viruti debili, vel corpori delicato: sicut est

serum siue aqua casei: in qua sit pulueris reubarba. 3. i. dādo in aurora, vel in quo sint infusæ. 3. 2. reubarbari per noctem: vel. 3. 5. myrobalanorum citrinorum: Et si timeres supercalefactiōem epatis propter pharmacum, adde in aqua casei aliquid aquæ ros. Confert præterea clystere, quod sic fit. ℞. senæ, lib. i. & 6. meze reon præpara (vt dictum est). 3. i. myrobalanorum citrinorum. 3. i. bulliantur quous. p. redeant ad lib. i. iniiciatur tepidum in ieiunio: & quandoq; loco meze reon ponitur euforbij. Conferunt etiam suppositoria de melle, vel de sale gēme, vel de lardo salito, vel de penidijs, quādo timemus mordicationem ani. Hæc ergo sufficiant de medicinis euacuantibus per secessum vel vrinam. Post purgationes autem, & postq; coniuncta causa incipit manifeste diminui, siat emplastrum super epar & stomachum: nam ante hoc tempus non faciat iuuamentum, sed nocumentum. Epithema siue emplastrum confortans & alterans, fit ex sanda. alb. rub. & citrinis, ro. rub. end. berberis, solatro, plantagine bullitis in aceto vini vel citoniorum & aqua ros. vel in succo solatri, eupatorii, absynthij & modico acetii, faciendo ex eis epithema super epar in quo petiæ infusæ actu frigida supponantur frequenter ante cibum, vel faciendo ex eis emplastrum pistando & incorporando omnia simul cum succis prædictis, postq; bene cocta sunt inspissando cum farina ordeï sufficienti. Emplastrum aliud, quod ponitur super ventrem & stomachum, resoluit aquam hydropicorū insensibiliter. ℞. stercoris columbini, eaprimi, bouini. añ. lib. 2. bulliantur in vino albo veteri potentissimo & modico acetii. Deinde expressa in sacculo ponantur actu calida super ventrem frequenter in ieiunio, vel sic. ℞. stercora prædicta, & parum ezulæ & calamenti, & cōgregentur cum vrina caprarum recenti, & po-

nantur super ventrem. Præterea sunt medicini, q; stercora prædicta cū sunt calida recentia, firmant super ventrem cum fascijs latis frequenter ante cibum: similiter & corpus totum sepeliunt præter caput in stercoribus eisdem aut in arena calefacta. Et iterum aliud sic. ℞. boli armenici, farinæ ordeï, milij, fursuris, haurach, vel loco eius salis communis, cinerum quercus, fimi caprini, & vaccini. añ. & incorporentur omnia cum aceto & cū aqua: quia resoluit, infrigid. & confortat. Vnguatur etiam totus venter cum vnguento agrippa per se vel mixto cū marciaton, fricando cum ipso ventrem totū ad ignem vel solem calidum frequenter. Et fomentetur venter totus sapius cum lapidibus ignitis aspersis aceto vini acutissimo: quia illud est plurimum resolutiuum partium subtilium calidarum, recipiendo hunc fumum postq; totum corpus fuerit bene coopertum, vt fumus totus ascendat cum caliditate. Et balneetur quandoq; in stupha calida sicca sine aspersione aquæ omnino: aut sudet in stupha calida, in qua posita sint saluia, ruta, sauina, pullegium, iuniperus, ebulus, sambucus. & omnia acuta, postq; fuerint bullita diligenter, & posita in stupha obturata, vsu tamen moderato, ne species resoluantur, & feb. augmentetur. Item fiat talis euaporatio: fiat asser perforat9 in figura sellæ capiens totum ventrē, & iaceat æger super ipso ventre dimisso p. foramen, & recipiat vaporem calidum aquæ decoctionis radicū ebulli, sambuci, ezulæ, euforbij, end. vrticæ, calamēti mezereon id est laureolæ: & regatur corpus vndiq; & vapor directē vētrem tangat. Vel possunt istæ res assari in cacabo sine aqua omnino & recipiat patiens suffumigium eodem modo, & melius erit quia magis exiccabit, Vtatur etiam post purgationes aliquas, electuarijs calidis apertius epatis & con-

Tractatus secundus

fortatius simul : sicut est hæc mixtura :
℞. diagallagæ, diacimini, diarrodō ab-
batis, tria sandal. ana. dentur cum vino
citiorum, vel aqua decoctionis berbe-
ris, dissoluēdo ea in illo liquore ad modū
lohoch, vel syrupi, vt cito penetret ad
epar. Vel sicut est hæc mixtura. ℞. dia-
curcumæ maioris vel minoris zuccari
ros. veteris, añ. detur cum vino albo cla-
ro lymphato cum aqua decoctionis cico-
rex, acetosæ, endiuix, lactuce, berberis, ci-
peri, capparis vsq; ad medietatem : vel
sicut est hæc mixtura. ℞. diagallangæ,
tria sandal. & trochif. de berberis sic fitur.
℞. berberis aut succi eius. 3. 10. se. endi-
uix, cucurbitæ, se. portulacæ. añ. 3. iij. ro.
3. 2. reubar. 3. 1. spicæ. 3. f. informetur cro-
ci, quorum quilibet sit aut. 1. Et potest
addi spodiij, camphoræ, amyli, dragagā-
ri, xilooloes. añ. 3. f. conficiantur cum ta-
marindis dissolutis in aqua endiuix: quia
calorem & sitim reprimunt, & aquam
citrinam educunt per vrinā, & epar con-
fortant atq; exopilāt. Diacurcumæ ma-
ior sic fit. ℞. curcumæ, croci. añ. 3. 4. spi-
cæ, maioranæ, valerianæ, reubarb. añ. 3.
6. anis. dauci, asar, se. apij, petrosil. añ. 3.
4. cassiæ lig. costi, squinanti, cynamomi,
rubæ tinctoræ, myrrhæ, succi, absynthij,
calami aromatici, eupatorii, polij, scolo-
pendræ. añ. 3. 2. dragagāri 3. 1. olei bals.
3. 1. si haberi potest. Terantur omnia, &
inuoluantur in balsamo, & conficiantur
cū melle despumato, & fiat electuariū.
Aperit enim opilationes antiquas & dif-
ficiles epatis & splenis, icteritiam vrinæq;
sanat, vrinam prouocat: Et si vis, vt ap-
proprietur vitio splenis, addatur in quali-
bet lib. eius 3. 2. limaturæ acutū lotæ cum
aceto, v℞ scoria ferri, & sic est de gñe ele-
ctu. ferratoræ. Diacurcumæ minor sic fit.
℞. curcumæ 3. 1. & f. spicæ, myrrhæ, co-
sti, squināri, cassiæ ligni, cynamomi, cro-
ci. añ. 3. 1. balsami, grana 2. si haberi po-
test, vel loco eius carpobalsæ, calami ato-

marici. añ. 3. 1. mellis despumati quantū
suffic. ad conf. electuariū. Valer ad eadē
sicut maior, sed est minoris cōparationis
& maioris delectationis in sumendo. Itē
inungat epar qñdorū vnguēto qđ sic fit.
℞. populeon, & misce cum succo endi,
absynthij, & aceto squillitico añ. 3. iij. &
vino citoniorū, vel berberis, vel granato
rū acetosorū: quia infrigidant & confort-
rāt. Item abluat crura mane & sero cum
vino albo veteri, in quo bullierint flores
chamomillæ, saluia, mentastrū, folia lau-
ri, ruta et similia. Præterea sit torū studiū
medici assidue circa rectificatiōē epatis
& splenis, ne forte regenerēt causam
antecedētem: quia nihil proderet abijce-
re causam coniunctā. Hoc aut fit ex me-
dicinis exopilantibus epar & splenē, &
alterantibus eorū malā cōplexionē: sicut
electuaria prædicta, & sicut est syrupus
diureticus positus ca. de opilatione, & du-
ritie epatis. c. de cañ. quia potenter deopi-
lat, alterat & confortat epar atq; splenē
calidum induratum, si detur ex eo omni
mane post euacuationes vniuersales ali-
quas supradictas cum aqua decoctionis
endiuix, lactuc. Si aut hæc ægritudo esset
cum fluxu vētris, & solutione superflua:
non detur aliquā medicina soluēs per se-
cessum, sed solum restringatur cum me-
dicina, quæ sic fit. ℞. spodiij, cerusæ, gal-
læ, balaustrarum, sumach, se. tamariscī,
& acetosæ. añ. 3. 1. ciperi, squināri, spicæ,
reubarb. laccæ, corticis capparis. añ. 3. f.
se. endiuix, 3. semis, agni casti, se. portula-
cæ. añ. 3. 1. opij. 3. f. camphoræ sextā par-
tem. 3. 1. fiāt trochif. cum succo berberis,
vel citoniorum, vel sumach: aut fiant
trochisci de karabe cum aqua pluuiali,
vel aqua extinctionis calybis, vel lapi-
dis igniti, vel cum aqua decoctionis endi-
uix, plantaginis, myrtillorum, quos dice-
mus capitulo de fluxu ventris: aut zuc-
cæ ros. vetus: aut diacitoniten sine spe-
ciebus. Dicamus modo de ordinatione

diætæ secundum sex res nō naturales. Nu-
triat carnibus hoedorū, pulloꝝ, agnoꝝ
annalium, castratorum, perdicum, phasi-
anorum, & omnium auium syluestrium
nō aquaticarum, potius assis q̄ elixis: Et
si elixetur, addatur petro. feniculū, & cau-
les: sed in die purgatiōis, q̄ est ante ipsam
dentur potius elixæ q̄ assæ. Vtatur quan-
doq̄ oleo facto ex borragine, spinargijs,
petro. f. s. n. apio, endiuia, lactu. & bletis.
Vtatur quandoq̄ aqua decoctionis cau-
lium & lennū, in qua ponat̄ pul. ameos,
amomi, cynamomi, carda. croci, se. f. s. n.
& petro, quia laxat vētre & opilatio-
nem aperit: licet substantia eorum stypti-
cat & opilat. Vtatur brodia cicerum &
pisorum cōdito cum lacte amygdalarū.
Vtatur pulve ex farina auenæ vel farris
& iure carniū laudabilem, vel aqua
clcerum & pisorum. Vitet omnes cibos
dulces vinctuosos vel viscosos & carnes
saliras. Vitet brodia & cibos liquidos
pro posse, nisi ante diē purgationis. Vta-
tur quandoq̄ lacte recenti caprino, vel
asinino, vel vaccino in ieiunio, vel cum
melle, vel cum zuccaro & mica panis,
si sit sine feb. panis eius sit de simila spel-
tæ, vel ordeī, si tu intendis ad nutrimen-
tum: vel furfuraceus, bene salitus, bene
fermentatus, bene coctus, conditus cum
se. f. s. n. amomi, cardamomi vnius vel du-
oru diē, si incēdis ad decapilationē. Vta-
tur ex fructibus, passulis sine suis interio-
ribus. Vtatur cū suis carnib⁹ tali sapore.
℞. cynamomi, gari. añ. partes aequales:
terantur subtilissime, & aspergātur cum
succis acetosæ, berberis, vino granatorū,
agrestis et similibus, et potest addi aliqd
aquæ ros. Bibat vinum albū clarū aro-
maticum bene adaquatum cum aqua in
qua extinctus sit calybs, vel lapis igni-
tus, vel cum aqua, in qua bullierint semi-
na diuretica calida & frigida, v℞ cū aqua
decoctiōis end. acetosæ, berberis, cicoreæ,
ciperi, capparis: sed tamē hora comestio-

nis parū vñ nihil bibat, si est possibile, vt
chylus fiat siccior, sed post comestionē p
duas vel iij. horas esset magis vtile. q̄ ho-
ra comestionis, imo sitim toleret. Nec bi-
bat aliq̄ hora ad satietatē pro posse, nec
cibo repleatur, nec materiē eius multipli-
cet vna vice, vt calor naturalis humidi-
tates excicer sine regeneratione aliarū.
Et cum sitis ipsum infestat, abluit es suū
cū aceto mediæ fortitudinis, & modico
albi vini odoriferi, & cum ipso gargari-
set, quātum sit necesse: q̄a potēter sitim
reprimi. Vtā ē exercitio in ieiunio quan-
tū potest, & fricatione proprie super ven-
trē: nullo modo in die dormiat, nisi pro-
pter necessitatē scilicet si virtus sit debi-
lis. Aer habitatiōis suę vergat ad calidū,
siccū per se vel per artē cū igne, nō tamē
sit calid. superflue, ne causam calidā au-
gmentet, & calid. naturale resoluat, &
virtutē deſiciat. Ordinetur igit̄ vt aer in-
spirationis sit minus calidus, sed aer cor-
pus ambiēs magis calidus: inducat̄ gau-
diū & latitia pro posse, p̄ sonos musicos
et fabulas & spectacula gaudiosa. Cura
aschitis, qñ est sine caliditate & sine apo-
stematē & se, est vt purget̄ cū eisdē medi-
cinis, sicut & qñ est cū caliditate: propter
qd̄ sint magis acutæ, siue ducāt p̄ secessū
siue p̄ vrinā, siue p̄ vtrūq̄. Pillulę bonæ
soluētēs p̄ secessum sic sūt. ℞. folioꝝ v℞
se. mezezeon. 3. 2. euforb. 3. vnā. reubarb.
electi. 3. 2. turbith. agarici, colloquintid.
añ. 3. 6. mastichis. 10. añ. 3. 1. Conficiant̄ cū
succo absynthij vel eupatorij. Et si volue-
ris, vt cū solutione provocet̄ vrinā, adde
se. endi. cicoreæ, lactucæ, apij, se. n. petro.
añ. 3. 6. Dosis earū est a 3. 1. v℞q̄ ad duas
sero cū iē dormitū sine cœna: vt cū pillu-
lis de reubarb. v℞ de mezezeon, q̄s ponit
Mes. in suo antido. & proprie si sit opila-
tio epatis & splenis magna. ℞. reubar.
boni. 3. 7. armoniaci, serapini, bdellij. añ.
3. 10. lacce. 3. 8. oppopenaci. 3. 4. mezeze-
on, gummi arab. añ. 3. quatuor, turbith

Tractatus secundus

electi. 3. ro. spica, polij, aloca. añ. 3. 5. ma
sticis. 3. 2. myrobalanorum citrinorum. 3
ro. dissolue gummas in vino, & fac pillu
las. Dof. quatum sint. 3. 2. cum aqua ca
seis: sunt enim vltimæ fortitudinis in hy
dropisi quacumq;. Si autem pill. recipe
re noluerit, licet fortius operentur, purge
tur cum apozimate reubar. supradicto.
Soluatur etiam quâdoq; cum medicina
solum prouocante vrinam, sicut est ytu
pus diureticus supradictus: & ita fiat vl
tissim modo cum vna, modo cum alia,
ne natura fiat consuetudinaria. Neque
quiescat aliqua hebdomada, quin bis
vel ter purgeur secundum virtutem post
purgatiões vniuersales & nō prius. Vra
tur ante prandium & ante cœnam electu
arijs calidis apertius, confortarijs præ
dictis in causa calida sine permixtione
frigidiorum omnino: sicut est diacucur
ma, diaciminū, theriaca vetus, dialthea,
diacostum, dando ex aliquo eorum vel
aliquibus simul mixtis ad modum casta
neæ cum. 3. 2. vini albi clari & veteris &
potētis. Et illa hora ponātur epithemata
& emplastra prædicta super epas & ven
trem, & non prius. Et balneetur in aquis
tinnarū & balneis aluminos. & sulphu
ris, & aquis calidis stypticis cum aroma
ticitate: quoniam talia confortant epas
& stomachū excellenter. In diæta & alijs
omnibus fiat, sicut in causa calida, præ
ter quod vinum eius sit vetus clarum purū
sine aqua. Si autem sit hæc ægritudo cū
fluxu vētris, vel solutione nimia, nō vra
tur aliqua medicina solutiu, sed re
gatur cum sola medicina styptica cōfor
tatiua epatis & intestinorum dicta supe
rius in causa calida: & sic regatur per me
thodum prædictum a principio vsq; ad
finē. Et reiteretur tota cura sæpius, do
nec perfecte curetur: quia hæc ægritudo
pudrās est ex natura, quare in sex mens,
difficile curatur.

Methodus. Hypofarcha fit ex mala
complexione frigida ve
narum & mēbrorum corporis: quapro
pter corrumpitur digestio tertia, & dimi
nuitur: nec rectificancur humores, & hu
miditates nutrire debentes ea, neq; ap
ponuntur, neq; assimilātur, cruditate &
aquositate ipsorum prohibente, sed stāt
in concauitatibus & spōgiositatibus mē
brorum instantes & replentes ea, & de
mum infrigidant complexionem epatis
naturalem. Et fit hæc mala complexio
frigida (vt plurimum) propter alteram
septem causarum: quarum prima est fri
giditas epatis naturalis: Secunda est reso
lutio calidi naturalis, sicut fit post febres
chronicas & proprie quartanas: Tertia
vero propter opilationem splenis vel epas
conculcantem & mordicantem calidi
dum naturale in eis, & prohibentem se
questrationem superfluitatū secundæ &
tertiæ digestionis: Quarta est potus aq
frigida in ieiunio, vel post coitum, vel
balneum, vel exercitium, vel ablutio in
aqua frigida post euacuationem fortem:
Quinta est fluxus ventris plurimus, vel
menstruorum, vel hæmorrhoidarum eua
cuans calorem naturalem: Sexta est retē
tio mēstruorum plurima, vel hæmorrhoi
darum: quare regurgitāt ad epas & ve
nas, & ipsas infrigidant & opilant: Septi
ma est ex frigiditate membrorum circū
iacentium epatis: sicut est stomachus, inte
stinum ieiunum, diafragma, & renes.
Signa propria hypofarchæ sunt cum si
gnis communibus supradictis, vniuersa
lis inflatio omnium membrorum totius
corporis, & facies turgida, velut pugnus
inflata, & est totum corpus sine arefacti
one, & non inflatur venter neq; vmbili
cus adeo, sicut in aschite & tympanite.
Et quando digiti premūtur, vel brachia:
reddunt figuram concavam, quæ non re
dit illico: & est cum ea (vt plurimum) flu
xus ventris chilosus vergens ad albedi

ne: pulsus vndosus latus lenis, vrina eius (vulurimū) karopos v' alb. lactea, grossa. Cura hypofarche in cōmuni est calefactio & cōfortatio epatis et oīm mēbro rum cum balneis, electuarijs, emplastris, vnguentis, syrups dictis cap. de debilitate epatis. Et purgeſ de tertio in tertiu cum medicinis dictis in aschite, vel cum pilulis foetidis vel cochijs, vel cum medica mine de turbith. posito ca. de soda. Post purgationes aliquas ponātur emplastra super epar prædicta in cura aschitis: & tunc vratur electuarijs aperitiuis dictis ibidem, & proprie diacosto: & sepieliatur in arena calida, vel fimo vaccino vel columbino, & liniatur totum corpus cum iuro calido vel stercorebus calidis supra dictis: Et ster in sole calido vel stupa calida post euacuationes frequēter. Et si sit a frigidityate epatis naturali, reducat ad temperamentum cum electuarijs calidis & potu vini veris amari. Similiter & cum omnibus dictis capitulo de debilitate epatis. parag. de causa frigida humida. Et si sit propter resolutionem calidi naturalis, confortetur epar cum emplastris calidis stypticis dictis ibidem. Et si sit propter opilationem & duriciem epatis, aperiatur epar: sicut diximus capit. de opilatione epatis, et de opilatione splenis: sicut dicemus capitulo suo etiam aliqua in illo capitulo. parag. de cura aschitis a causa calida. Et si sit propter potū aquæ frigidæ, vel lotionē in ea, tunc accedat dolor sub costis post illa: quare vratur cibis calidis actu & virtute, & electuarijs calidis, & vino veteri claro puro, & emplastris calidis dictis in aschite: Et si sit propter fluxum vētris chronicum, vel menstruorum, vel hæmorrhoidarum: tunc curentur ista sicut dicetur suis capitulis, & confortetur epar cum vnguentis, & emplastris, calidis stypticis, aromaticis dictis ca. de debilitate epatis. parag. de debilitate epatis propter laxitatē suæ sub-

stantiæ, & ca. de fluxu ventris parag. de fluxu epatico. Inducat quies & somnus proposse, & nutriatur cibo laudabili, & vino rubeo dulci, vt redeat sanguinis multitudo. Et balneet corpus in balneo styptico calido, sicut est aqua tinnarum, & aqua decoctionis ablynthij & ro. & plantaginis, balauſtiæ, gallar, cypressi, cupullar, gladium, calameti, mēte, mentastri, iunipi, masticis, aluminis, sulphuris, & similium. Et si sit propter retentionem mēstruorum vel hæmorrhoidarum: prouocentur sicut dicemus suis capitulis: & prouocetur vrina cum fortitudine cū syrupo diuretico dicto in cura aschitis de causa calida. Et si virtus & ætas consenserint, & habitudo corporis sit carnosa: fiat flebotomia de saphena pedum, quæ est intus in talo. Iuxta illud Hippo. 6. par. ti. apho. Hæmorrhoidas antiquas sanāti, si nō vna relicta fuerit, periculum est hydropisim fieri. In nullo autem alio casu competit flebotomia hydropicis: quia addit infrigidationem epatis & debilitatem. Dixeretur omnis hypofarcticus, sicut dictum est in cura aschitis de causa frigida, & sitim proposse toleret: & nutriatur cibis calidis sticis aromaticis: sicut sunt carnes laudabiles, & proprie assæ nisi ante diem purgationis, tūc sint elixæ cū feniculo, petro. & bibat vinum album vetus clarum purum. Vratur cum cibo suo sapore factio ex allijs, sina, petro. mēta contusis & incorporatis cum aceto. Vratur cum iuribus suis puluere, qui sic sit, 18. pip. nigri & lōgi. añ. 3. f. cardamomi. 3. 2. cynamomi, gallangæ, zz. añ. 3. 1. croci. 3. 1. Terantur omnia subtilissime, & cribellentur. Abluat os suum sape hora sitis vehementis cum aceto mixto cū modico vini alb. odoriferi, & cum ipso gargarizet sine inglutione.

Emperica. Dicit Auicēn. 3. cano. scē. de cura aschitis qd visio lo la aquæ, vel auditio calus enis ab alto

Tractatus secundus

nocet omni hydropico, nedum ipsius bibi-
bitio vel ablutio. Item dicitur ibidem q̃
hydropici nequa q̃ debent fleboromari,
nisi sit hydropisis de opilatōe epatis pro-
pter multitudinem sanguinis, vel retenti-
onem menſtruatorum vel hæmorrhoidarū
eonſuerarum: imo neq; tunc fieri conue-
nit niſi gr̃as & virtus conſueuerint aut cō-
ſuetudo. Itē dicit̃ experti, quod ſerū ca-
prinum potatum omni die in aurora, in
q̃ ſpica nardi ſit bullita, ſimiliter & vti-
na hominis aut caprę, in q̃ ſpica ſit bul-
lita, curat oēm hydropiſim de cauſa fri-
gida: q̃a educit aquā citrinā leniter per ſe-
ceſſum & vrinā, & cōfortat epar. Si aut̃
ſit de cauſa calida addatur eis ſuccus en-
diu. & ſcariolæ. Itē dicit̃ aliquando ſe ex-
pertos fore bonū, ſuccum rad. Ireos ciu-
di non cocti, ſi ex eo ſumatur omni die
in aurora, quantum media teſta oui ca-
pere poteſt p̃ ſe vel cū ovo ſorbili miſcē-
do, quia ſanat omnem hydropiſim cura-
bilem per artem: educit enim omni die
tres vel 4. ſellas aquæ citrinæ: & ideo a
principio poſſumus eo vti ſine omni alio
medicamine, ſi cauſa non fuerit difficilis
antiqua. Itē in omni hydropiſi cū ſe, vel
ſine ſe, cōfert a proprietate ſumere omni
die in ieiunio. 3. 2. epatis lupi ſani, poſt q̃
fuerit exiccatum ad ſolem vel ignem &
ſubtiliſſime puluerizatum, vt cito pene-
tret ad epar, ſi detur cum vino albo. cla-
ro dolci. Conſert etiā vti paſſulis & gra-
nis granatorum bene malticatis cū zuc-
cario: quia a forma ſpecifica confortant
omne epar debile ex quacumq; cauſa:
Nunc in cura omnis hydropiſis plurimū
neceſſaria eſt epatis confortatio. Exper-
tum eſt etiam in cura omnis hydropiſis
& proprie aſcitis, quod ſuccus cucumeris
aſinini, vel eius aquoſitas, quæ eſt intra
cucumer, ſi excicetur ad ſolem perfecte,
donec induretur, & ſiant ex eo pillæ, ſicut
cicer: & detur vna ex eis in media nocte,
& poſt ipſam bibantur. 3. tres vini deco-

ctionis reubar. & mellis, ſanat ipſam pſe-
cte expellēdo totā aquā citrinā vna die
vel circa illud: ſed iſta cura periculosa ē,
nec debet fieri, niſi a medico perito i cor-
pore robuſto. Dixerunt etiam experti, q̃
aſcites, quæ eſt ſine caliditate vel febr̃,
curatur quandeq; cum ſolo trechiſcis la-
xatiuis, qui ſic ſiunt. & cum cōtinuo vſu
diacuremæ vel dialacæ omni die ante
cibum, præter q̃ in die purgationis, bibē-
do de ſuper aliquid vini albi, boni, odorif̃
feri. ℞. turbiti. 3. 1. zz. zuccari. añ. 3. 2.
ſcamoneę electæ, grana duo, terantur &
incorporentur cum vino, & fiat trechiſ-
cus vnus, qui ſemel detur in hebdomada
ante diem: quia facit quater aut quinque
es aſcellare aquam citrinam cum obſer-
uatione diætę ſupra dictæ, & adminiſtra-
tione emplastroꝝ ſuper epar & ven-
trem ſuperius dictorum. Sed ſi eſſet cum
fluxu ventris: non detur medicina laxati-
ua, ſed regatur ſolum cum cibis ſtypticis
& electuarijs prædictis. Dixerunt etiam
alijs, quod omnis hydropiſis, & proprie
hypofarcha frequenter curatur cum hu-
iuſmodi medicamine. ℞. reubarb. pul-
uerizati ſubtiliſſime. 3. 2. detur in aurora
cum. 3. 2. oxy mellis compoſiti, & quatu.
3. aquæ decoctionis lactucæ, ſcariolæ, ra-
di. ſeñ. dando de tertio in tertium, vel ſe-
mel in hebdomada cū obſervatione diætę
ſupradictæ: ſed ſi virtus ſit debilis,
ſufficit. 3. 1. reubarbari. Alijs vero dieba-
quibus nō datur reubarbarū, detur ante
cœnam & prandiu. 3. 1. & 6. oxy mellis
cōpoſiti vel ſquillitici cum aqua decocti
onis lactucæ, ſcariolæ, ſoeniculi. Et ſi ſit
cū caliditate vel febr̃, detur ſyrupus ace-
toſus cōpoſitus, vel mel roſ. colatum cū
eadem aqua. Et ſi ſit cum fluxu, non de-
tur medicina laxatiua, vel parum detur
& raro, nec reubarba. ſit vltra. 3. 1. ſed
regatur cū cibis ſtypticis, & empl̃. prædi-
ctis. Itē pillulæ expertæ ad oēm ſpeciem
hydropiſis, ſiue cum caliditate, ſiue cum

frigidityte, sic sunt: Euacuāt nāq; aquā citrinam, carminant ventositates, opilationes aperiūt, & par cōfortant. Itē, aloes eparicū, polypodij, añ. 3. 2. & f. catapucia elaterij, colloquintid. interioris, euforbij, turbiti, reub. añ. 3. 2. se. petro. & apij, se. endi, spicæ, portulacæ, salis indi, carui, añ. 3. 1. & f. myrobalanorū indorū & citrinorū, añ. 3. iij. & f. ezulæ 3. 2. diagridij 3. 1. fiāt pillæ cū succo cuscute, vñ absynt. deē ex eis a. 3. 2. vsq; ad. 4. Itē alix ad idē. Itē agarī 3. 5. eupatorij, reub. aristot. ro. añ. 3. 1. lacæ, spicæ, se. apij, & petrosi, añ. 3. 1. zucari al. 3. iij. fiāt pillæ. sicut cicer.

Canones. Scias, q; aq; hydropicorū duras habet partes, vñā. s. substantiale, q; est frigida, humida, aq;sa: Allam additā & accidētalem, q; est cholera vel salugo aquæ pmixta sitim faciens vehementē. Sicut verbi gfa, patet in sero lactis: Nā est ibi pars aquosa, frigida humida p naturā, & est ibi coagulū, calidū, siccū: propter quod compositū cōtras habet virtutes. Ex quo elici potest in opere notandū, q; materia hydropisis p se & essentialiter est frigida & humida: quare non curatur, nisi per calida & sicca, sed est accidentaliter calida. Quapropter oportet quādoq; in curā hydropisis addere frigida, & proprie si sit cū febris. Sciendū pterea, q; ascites est periculosior tympanire, quātū ad subiectū læsum, quod est epar, & proprie si sit propter opilationē vel duritiē vel apostema: quoniam oportet medicū vti medicinis cōtrarijs, scilicet calidis propter opilationē: frigidis propter feb. & cholera. Sed tympanites est periculosior ascite, quātū ad causam coniunctā, quæ est vērositas plurima cū aq; sitate pauca: quoniam si medicus vitur calidis acutis, generabit vērositatē ex aqua: Si vero calidis debilibus, nunq; resoluet ventositatē. Et sic patet, quod in cura vtriusq; est timor & pplexio, & proprie si sit cum feb. Quapropter

est difficile curare alterutrā ipsarum durarū, nisi fortassis in principio & ante confirmationem & cum virtutis constantia & obedientia infirmi. Item sciendum, q; in cura ascitis, si nihil physicialium remedium rationabiliter exhibitorum per exterius & interius conferre videatur: præcipiunt auctores scilicet Rasis et Auicē, fieri incisionem ventris cum ferro vel cum cauterio in loco, qui est sub vmbilico ad tres digitos, non quidem directē: quia ibidem sunt chordæ musculorum transversalium, qui si inciderentur, retraherent versus suum principium neque cōsolidari possent: sed a latere versus inguinā, vbi est carnositas eorūdem musculorum. Sed antequam fiat incisio trahatur cutis sursum, vt per eius reductum obturetur vulnus: quoniam volumus, ne tota materia simul extrahatur: quia si simul extraheretur tota subito cū nocituo exhalaretur plurimum iuuariū scilicet calor naturalis & spiritus, ex quorum resolutione necessario virtus prosterneretur: & tandem interimeretur. Vnde Hippoc. 6. part. aphorism. Quicumque hydropisi aut empici inciduntur aut vruntur, &c. Debet autem incisio profundari per totum mirach & siphac vsque ad intestina, ita quod nullum intestinum lædatur omnino: quia inter siphac & intestina tota materia continetur. Iste namque est ordo sapientiæ, vt ad medicinas fortes non procedatur: nisi quando debiles non contulerint: vt dicit Mes. Medicina autem manualis est omnīū fortissima: Vnde est vltimo fienda: Neq; cōpetit, nisi virtute forti, & agro de cuius vita medicus desperauit. Consiliū tamē meum est nullum incidere, sed potius ipsum derelinquere prognosticis: et sic ab ipso fugere, ne medicus ingloriationem incurrat. Sed in tali casu vidi quandoque fieri causticationes super planta pedis, vel dorso eius inter digitum minimum

& secundū ab illo cum cauterio vel cantharidibus, & proprie in pede dextro bene profundando usque ad chordas & nervos. Vidi etiā fieri emplastra acuta corrosiva super ventrem ex allijs, cepis, sinapi, & similibus incorporatis cum stercore caprino, columbino, et lixivio, vel virina, quæ faciebant aliqualem aperturam super totā molliem venteris, donec aqua resudabat. Vidi etiā aliquos facere aperturam cutis cum scarpellationibus, cum unguibus, donec aqua guttatim stillabat, & venter detumescere, & sanabantur: sed omnes isti ut plurimum post exsecutionem aquæ recidiebant, & moriebantur, si medicus & infirmus non instabant continue cum electuarijs & syrups aperitiuis & confortatiuis epatis & splenis dictis in methodo. Aliter namque regeneratur causa antecedens. Et quia virtus fuit debilitata per priorem hydropisim: ideo defecit in secunda. In hypofarcha vero non debet fieri incisio omnino: quia materia continetur in corpore toto. Similiter videtur, quod nec in tympanite: quia non est in ea aqua pura.

Prognosticatio. Dicit Ras. quod specierum hydropisis aschites est difficilioris curatiois, & post ipsam tympan: hypofarcha vero (ut plurimum) salubris est: & quod nullus ex ea moritur, nisi per suam inobedientiam, vel medici errorem. Item dicit Hippo. 2. prognosticorum: quod omnis hydropisis cum febre, & proprie acuta est mortalis: quoniam fortitudinem ytriussque causæ significat: cum fortis sit ignis, qui in aqua non extinguatur, ut scriptum est in commeto 34. illius apho. secundæ particulæ. In morbis minus periclitantur &c. Et vniuersaliter in omni morbo pluralitas medicinarum, & earum contrarietas inducit chronicitatē vel perniciem: quoniam natura & medicina impediuntur in earum digestionem, regulationem, & maturationem: ut patet in he-

mitritæo & feb. tertiana nota. Item dicit Hippo. 6. parti. apho. Hydropici, quibus nascuntur vulnera in corpore, non facile sanantur: quia humores impediunt consolidationē. Item fluxus ventris superueniens cum alleuatione infirmi & virtutis constantia, salubre. Strypticitas vero vel vrinae retentio superueniens, vel fluxus venteris sine alleuatione infirmi, mortale. Vnde Hippo. ibidem. Ab hydropse habito secundum venas in venterem aqua fluente, solutio fit ægritudinis. Et in 7. parti. apho. ait. Si ab albo flegmate habito diarria superuenerit fortis, soluit ægritudinem. Item in hydropi, & proprie aschite vrina rubea pauca & cum difficultate mixta, mortale est: exuberans vero & plurima & cum facilitate mixta, & colore citrino vel subcitrino salubre, et proprie virtute constante. In omni hydropi si exhibitio medicaminum rationabilium nihil confert, mortale. Item in omni hydropisi cura & alleuatio facta die vna cum reciduatione vicissim die alia, mortale: Si vero curatur & alleuatio perseverauerit, salubre. In omni hydropisi egestio sicut lotura sanguinis, vel sanguis coagulatus, mortē propinquam signat. Item vrina bicolor, ut puta rubea inferius & liuida superius, aut econuerso mortale. Item fœtor anhelitus, et sudoris, et spiritus & omnium excrementum, plus debito, similiter & cutis totius fœtor, mortale. Item Hippo. sexta particula aphorismorum: Hydropisi tussis superueniens, malum: præcedens vero, minus malum. Et hoc intellige si tussis non sit propter catarrhū, sed propter multitudinem aquæ & ventositate in ventre comprimentis diafragma: tunc namque infra quintum diem vel circa illud suffocantur, & proprie aschitici: propter quod Hip. 7. parti. apho. hoc resumens ait: Hydropicus si tussim habeat, desperatus sit. Item hydropis & proprie aschites, si sequatur apostema duri-

epatis vel splenis, difficile & raro curatur: quoniam lapidificatus est & mollificari vix potest. Item Hydropifis facta vitio epatis periculosior est ea, quæ fit vitio stomachi vel aliorum membrorum: & ideo ascites periculosior est omnium. Hydropifis in cõplexione cholerica magis periculosa est, quàm in flegmatica: quoniam maximam discrasiam signat & causam fortè. Item Hippo. secunda particula aphorismorum. In morbis minus periclitantur ægrorantes.

¶ De Icteria. Ca. V.

Icteria est defœdatio coloris corporis totius ad citrinum vel nigrum vergens, cum permissione colorum vrinæ vel exstionis & excrementum aliorum. Citrina fit vitio epatis propter sex causas in genere. Prima est mala complexio epatis calida sine materia, naturalis vel accidentalis. Secunda mala complexio epatis calida cum materia plurima, scilicet cho. rub. Tertia est apostema calidum epatis. Quarta expulsiõ cretica cholerae rub. ad circumferentiam totius corporis. Quinta est debilitas cistis fellis. Sexta opilatio. Et ista opilatio fit quatuor modis: aut in substantia & venis epatis, aut in poro, quo cistis attrahit choleam rubeam: aut in poro, quo cistis mandat choleam ad pilerõ. i. fundum stomachi gratia fortificationis digestionis primæ: aut in poro, quo cistis mandat choleam rubeam ad intestinum ieiunum gratia excitationis virtutis expulsiuæ. Has namque tres vias habet cistis: vt patet in anatomia. Nigra vero fit a vitio epatis debilis in virtute discretiua superfluitatum digestionis secundæ, & hoc vt raro: aut vitio splenis debilis in virtute attractiua melancholiæ ab epate propter opilationem factam in vijs eius, vel debilitatem sue substantiæ, & hoc vt plurimùm. ¶ Signa ictertiæ citrinæ propter calidi-

tatem epatis sine materia, sunt citrinitas faciei, & proprie albuginis oculorum, & vrina rubea intense. Et si talis caliditas insit per naturam, non separantur a corpore talia accidentia: nec nocetur patiens ex ipsis, nisi cum superfluxerit: quoniam est eius complexio propria qua degit sibi sanus. Si vero sit aduertiua, separatur ab ipso: & fortassis antecessit comestio ciborum calidorum plurimorum, & potus vini fortis plurimi, aut assiduitas famis & tristitiæ cum vigilijs & labore. ¶ Signa ictertiæ propter caliditatem epatis cum materia sunt, quod cholera rubea egreditur cum vomitu & secesu & cum vrina: quare quodlibet eorum est rubeum citrinum vehementer: neque minora sunt icteria, & proprie cum materia sit multa. ¶ Signa ictertiæ propter apostema calidum epatis, sunt febris cõtinua acuta cum dolore hypochondrii dextri pugnatio: & omnia signa apostematis epatis, quæ dicemus. ¶ Signa ictertiæ propter expulsiõem creticam sunt: quoniam accidit in feb. cõtinua acuta & in ali qua dierum creticarum vel indicatiuarum: & quia fit subito infra vnum diem propter fortem expulsiõem cholerae rubeæ ad ambitum corporis totius virtute synthomatis aut naturæ. ¶ Signa ictertiæ propter debilitatem cistis in attrahendo chol. rub. sunt, quod cum ictertia fit neusea & vomitus cholerae sine dolore hypochondrii dextri cum non sit in ipso opilatio: similiter & sitis, & amaritudo oris cum prostratione appetitus, & vrina rubea intensa: & difficile est discernere inter ipsam & illam, quæ fit ex multitudine cholerae rubeæ p̃dicta. ¶ Signa ictertiæ propter opilationem in substantia & venis epatis, vel in poro, quo cistis attrahit chol. ab epate sunt, quod sentit æger dolorem grauatiuum in hypochondrio dextro: & egestio a principio est incerta, sed post hoc gradatim dealbatur, se

Tractatus secundus

cundum quod cistis euacuatur a cholera: & vrina est tincta valde turbida grossa spumosa propter eius regurgitationem cum sanguine: nisi forte virtus discretiua & expulsiva epatis esset debilis plurimum: tunc apparet vrina gradatim alba aquosa, sicut est estrus: & fortificat icteritia: & est cum ipsa patiens sine vomitu & sine amaritudine oris, vel siti, & appetitus est fortis. ¶ Si autem opilationis sit in poro, quo cistis mandat chol. ad pilerum, signa eius sunt: quia egestio & vrina sunt tincta valde grossa & spumosa, sicut bolus armenicus sine vomitu v^t amaritudine oris vel siti: & appetitus est fortior virtute digestiua stomachi: & est vt plurimum cum fluxu ventris propter multitudinem cholerae transmissae ad intestina. Si autem opilatio sit in poro, quo cistis mandat choleram ad intestina tunc signa eius sunt stypticitas ventris cum egestionem alba dura, sicut sterlus canis, & fortificatio icteritiae subito, & vrina rubea, grossa ampullosa valde: nisi forte virtus sequestratiua epatis sit debilis, quod raro contingit: tunc vrina foret alba, subtilis: & non est æger omnino sine vomitu cholerae vel siti, vel oris amaritudine, & appetitus prostratione: sed nō sunt hæc adeo intensa: sicut in debilitate cistis in attrahendo choleram. Si autem opilationes sint plures simul: tunc & signa apparebunt plura simul: et hoc est vt plurimum. ¶ Signa icteritiae nigrae propter debilitatem virtutis discretiuae & expulsivae epatis, vel eius opilationem, sunt grauiorashypochondrii dextri. Et quia icteritia citrina præcessit nigram, cum cholera sit subtilior quam melancholia: similiter & vrina citrina intensa vel viridis antecessit vrinā nigrā grossam. ¶ Signa icteritiae nigrae propter debilitatem virtutis attractivae splenis, vel eius opilationem, est niger color cutis & dolor grauius siue extensius hypochondrii si-

nistri, cū duritie inflatione & tumore splenis, ita vt putentur flui quod sit apostema: licet sit sine febre, acuta: & est vrina nigra, grossa. Et sit hæc icteritia vt plurimum per se incipiendo sine antecessione icteritiae citrinae.

Methodus. Cura icteritiae citrinae propter caliditatem epatis sine materia est, vt vtatur vino granatorum & succo berberis, vel aqua decoctionis ei9 & aqua ordeii actu calida & acetosa: sumat omni mane vncias duas oxyzacari vel syrupi ros. vel viol. Vtatur triasand. & rosata nouella. Epithymetur epar cum sandal. ros. puluerizatis & infusus in aqua ros. & modico aceti. Viter carnes & vina, nisi sint alterata cum herbis et seminibus frigidis, & aqua frigida. ¶ Cura icteritiae propter caliditatem epatis cum materia est, vt omni die in auro ra sumat de oxyzacaro, vel de syrupo acetoso simplici cum aqua decoctionis lactucarum, endiuiae, cicoreae, vel seminum communium frigidorum. ¶ Postea soluat cum aqua casei, vel lacte acetoso acuto cum. 3. i. vel. 2. scamonee: Vel purgetur cum electuario de succo laxatiuo vel stomatico laxatiuo: vel cū decoctione, quæ sic fit. ℞. myrobalano rum citrinorum. 3. i. & ʒ. pistentur, & bulliantur cum prunis siccis in sex vncias aquae, donec medietas consumatur, coletur, & euacuatur colatura cum. 3. 2. reubarbari boni puluerizati, v^t granis quatuor vel quinque scamoneae: & addantur syrup. ro. 3. 2. & detur hoc totum antedictum: quia euacuat choleram, & sistit vomitum confortando stomachum & intestina. Deinde fiant localia remedia prædicta: diæta sit eadem cum prædicta. Cura icteritiae propter apostema calidum in epate, est cura apostematis, quam proprio capitulo dicemus. ¶ Cura icteritiae propter expulsionem ceticam chol. ad cutem est, vt iuuetur natura in ceticis

do. Ponatur ergo patiens in bulneo tepido aquæ dulcis aquæ decoctionis florum chamomillæ, melilot, & anethi. Et si vir tus sit debilis, ponantur visicæ, vel vasa terrea sub regimine super hypochondria, & circa corpus vndiquaq; repleta aqua calida: vel bibat aquam decoctionis calamenti actû calidâ in plurima quâritate: quoniam sudorē prouocat, & cholera expellit hora crisis: similiter & iulep, & vinum album aquosum, in quo crocus infusus fuerit per noctem, aut leniter bullitus. Similiter & aqua decoctionis caricæ & passularum pinguium, & seminum diureticorum. Hæc enim omnia materias viscosas subtiliant, & venas capillares elargât. Et digeratur materia post crissim diminutâ cum syro aceto, cōposito: aut oxyzacaro, dando omni die in aurora cum aqua decoctionis radicū petro. seû. & prunorum: & purgetur cum aliqua medicina supradicta. Cura icteritæ propter debilitatem cistis in attrahendo cholera, est vt confortetur epas cū illis, q̄ diximus capite de debilitate epatis propter raritatem suæ substantiæ: quoniam omnia confortantia epas confortant cistim fellis, & conuerso. Conferunt adhuc etiam omnia, quæ dicentur iam de cura icteritæ propter opilationem epatis & viarum eius, qualiscūq; fuerit opilatio, est ferè eadem cura. Si igitur sit cū feb. & vrina rubea & virtute debili, digeratur materia, & deopilentur viæ cum syro, qui sic fit. ℞. endiuia, scariolæ, lactucæ, cicoreæ, meliori. añ. m. x. scolo pend. acetosæ, polytrici, dianthos, capilli veneris, añ. m. f. pruna numero. 20. quatuor semi. communium frigidorum, ciperi, capparisi, acori, añ. 3. x. zuccari, libr. i. vel zuccari & mellis añ. 6. vncias: fiat syrupus, de quo dentur omni mane vnciæ tres cum aqua decoctionis endiuia & lactucæ: quia si præsto non sit aliquid: digerat materia cū syro acetoso sim-

plici, & aqua calefacta. Et aliū syrupum bonū aperientē, & cōfortantem epas & splenē, scripsimus ca. de opilatione epatis, parag. de cañ. Præterea purgetur cū aliqua medicina p̄dicta. Vtatur sapetri asand, vel diaprunis mixto cū diacurcuma, vel cū trisera sarracenicâ, vel dialacca. Nutriatur iure carniū bonarū elixarū cū lactuca, endiuia, fœniculo, & petro. si militer & carnibus cōditis cū succo granatorū, vel berberis, vel aceto, vel cū sapore factio ex succo acetosæ, trifolij, & petro. Nutriatur etiā aqua pilorū & cicorum. Bibat vinū albū claræ lymphatū. Si aut sit sine fe. tunc opus est deopilantibus acutioribus p̄dictis: sicut est syrupus aceto. cōpositus cū aqua decoctionis ciperi & capparisi, lizeleos, apij, petro. fœniculi: Et purgetur cū pillulis de reubarbaro, dictis in ascite. Sumat ante prandiu & cœnam lib. f. aquæ decoctionis caulii vel porrorū, & sit actû calidū: vel aquæ decoctionis apij, seû. petro. quoniam resoluūt materias, & prohibet apostema fieri in epate opilato. Nutriatur carnibus hœdorum & pulloꝝ coctis cū eisdē herbis, conditis cum sinapi vel sapore factio ex allijs & cardamomo, & aceto forti. Vtatur iuribus cōditis cum speciebus calidis aromaticis. Bibat vinū, album, purum: vitet cibos grossos, & potus turbulentos. Clysterisetur venter sape cum clysteri, primo quidem lenitio facto ex aqua decoctionis malug, bismalug, siclę mercurialis, bletæ, caulium. addendo aliquid olei viol. & mellis ac salis. Postea vero clysteri attractio acuto, quod sic fit. Si prædictis addantur aquæ decoctionis agari. colloquintidę. añ. 3. f. Vtatur sapius in ieiunio post purgationes aliquas trochisc. & electuarijs apertius atq; confortatiuis epatis dictis in ascite. Et postquam icteritia citrina curata fuerit, quantum ad eius causam, scilicet cum eius egestio iam coeperit citrinari,

Tractatus secundus

& venter lubricari, & vrina remitti in tinctura: tunc curetur color cutis foetidus cum balneo stuphæ sicca, vel aqua dulcis calidæ, in qua decocti sint flores chamomillæ, & folia caulium receñ. recipiendo eius vaporem in faciem & oculos actu calidum: quoniã potenter reliquias cholerae remouet, & citrinitatem oculorum: similiter & cū projectione vini granatorum intra oculos, donec eorum citrinitas totaliter auferatur. Et hæc sufficiant de cura icteritiæ citrinæ. ¶ Cura icteritiæ nigræ ex quacunque causa fiat: est, vt aperiatur splen & confortetur, prout dicemus ca. de opilatione splenis. Et syrupū bonum ad hoc diximus ca. de opilatione epatis. parag. de cañ. Post purgationes autē aliquas, vtatur dialacca, diacurcuma ferrata: Euitet carnes bouinas, vel ferinas, aut salitas, & fumigatas. Similiter & lentes, caules, panem azymū, & oia generantia melancholiam. Fiant clystera lenitiua prædicta, quæ possunt acui quandoq; cum sene, epithymo, polypodio, & squinanto.

Emperica. Dicūt communiter operantes, q̃ flebotomia saluatellæ, quæ est in manu dextra inter anularē & auricularē, cōfert in omni icteritiā citrina, siue sit cū fe, siue sine fe. & proprie in corpore sanguineo, cuius vrina est rubea, grossa vel rubea valde sine grossitie. Sed flebotomia saluatellæ manus sinistrae, cōfert in omni icteritiā nigra: quia istæ flebotomiæ diuertunt materiam coniunctam, & diminuunt antecedentem. Cura præterea nobilis, & experta in omni icteritiā citrina, ex quacunque causa fiat, est ista. Primo digeratur materia vitellina cum 3. 4. oxyzuccari 2. 3. 2. syrupi acetosi compositi, bibiri. 4. vel 6. diebus cum aqua casei in aurora. Cholera namq; vitellina videtur composita ex cholera rubea & flegmate: propter quod ratione cho. penetrat ad cutim et ipsam citrinat,

& ratione flegmatis opilat epar, & poros cutis: vt resoluī nō possit: et sic fit causa icteritiæ citrinæ. Hoc factio purget cū huiusmodi. ℞. agarici. 3. i. reubarbari. 3. 2. pistentē, & infundatur per noctem in 3. 4. aquæ feruentis decoctionis prunorum: deinde coletur, & manibus diligenter fricentur: & addantur. 3. 2. syrupi. violæ. in colatura propter dulcorationē: & detur hoc totum ante diem. Et si corpus sit robustum, non coletur aqua, sed cum tota substantia ministretur: vel purgetur cum 3. 6. diaprunis acuat, cum 3. 6. diagridij: vel cum 3. 2. reubarbari dādo ante diem cum aqua decoct. prunorū & viol. Vt autē post purgationes omni die in ieiunio electuario aperiēte epar: sicut est diaprunis simplex mixtum cū trisera saracenica: de quo detur in modū castaneæ cū aqua calefacta: similiter & cum hoc potu. ℞. marrubij hortulani. ma. i. decoquatur in lib. 7. clari vini albi veteris potentissimi, addito modico mellis propter amaritudinē, & bulliat vsq; ad consumptionē medietatis: postea coletur, & detur vnus ciathus ante prandium, & vnus ante coenam. Curata autem ægritudine, remoueat atur accidens, scilicet citrinitas faciei cū vaporazione eius ex aqua decoctiōis carnium bouinarum veterum salitarum, sumendo eius vaporem in faciem & oculos apertos, postq̃ caro coeperit ab ossibus separari.

Canon. Cura icteritiæ ex quacunque causa fiat, non perficitur, nisi cū deopilatione epatis & venarū ipsius, atq; cistis fellis cum infrigidatione aliquali: quapropter conferūt omnia dicta ca. de opilatione epatis. parag. de causa calida. Similiter & omnia, quæ diximus cap. de hydropisi, parag. de cura ascitis cum feb. sed omnium potentissimum est diacurcu. posita ibidem.

Prognosticatio. Dicit Hippoc. 4. par. tic. apho. Si icteritia

superuenerit in fe. acuta ante septimum diem, malum est: quoniam signat opilationem fortem in epate, vel apostema calidum propter exuberantiam cholerae rubrae in ipso: quare talis crisis non fit vi naturae, sed vi synthomatis, & multitudine materiae redundantis per corpus. Istud tamen dictum Hippo. reprehendit Auerro. 7. colligit dicens, quod licet fuerit verum tempore Hippo. quando corpora seruabant regimen sanitatis: nostro tamen tempore potest fieri bona crisis in fe. acuta per icteritiam venientem ante septimum diem, puta in fine quintae diei, & proprie si vir tus sit fortis, & materia non multum viscosa: quoniam repellet simul vna hora crudum cum digesto. Item icteritia superueniens in fe. acuta in septima die vel post, est signum & causa salubris crisis, si non senserit aeger dolorem vel duritiam circa regionem epatis, quae significarent apostema vel opilationem timorofam. Vnde Hippo. ibidem. Quibuscumque septima aut nona aut vndecima, aut decima quarta icteritia superuenerit, bonum: si non dextrum hypochondrium durum fiat. Si vero non bonum: quia talis crisis fit vi naturae, & post digestionem materiae, & in die critica cum benignitate materiae mediocriter grossae: sicut est cho. vitellina. Item ad icteritiam non sequitur hydropisis vel parum: quoniam cho. est materia calida, quae contrariatur viscositati et aquositati hydropicorum. Vnde Hippo. 4. parti. apho. Ictericus non valde inflatus fuit: verum tamen ad hydropisim proprie ascitum sequitur icteritia frequenter propter opilationis & materiae grossitiei, fortitudinem, et virtutis discretivae imbecillitatem: quare fit mortale. Item icteritia proveniens ex opilatione antiqua sclerosata, mortale. Vnde Hippo. 6. parti. apho. Ictericus si epas fiat durum, malum: quoniam quod lapidificatum est in epate vel splene amplius resolui non potest: ut dicit

Auicenna. tertio canon. fecit. 4. cap. de apostematibus epatis.

¶ De apostematibus epatis. Cap. VI.

Apostema dicitur fieri in epate, quando materia per se & primo colligitur in ipso: Exitura vero quando materia de membro alio ad epas delegatur, siue sit per modum crisis, siue sine crisi: Vlcus vero dicitur: cum apostema conversum est in saniem & post hoc rumpitur. Fit igitur apostema per congestionem, exitura per delegationem, vlcus vero per rupturam. Possunt autem haec fieri ex omni genere quatuor humorum, proprie tamen ex cholera & sanguine ac melancholia: sed forte nunquam ex flegmate: ut dicit Rasis in diuisionibus: Quia epas est membrum carniforme calidum valde. Et propter hoc neque fit ex melancholia per se incipiando, sed consequendo ad apostema calidum adustum lapidificatum. Cuius etiam apostematis, sicut & aliorum omnium, quatuor sunt tempora, scilicet terminetur ad salutem: scilicet principium, augmentum, status, & declinatio. Nam si terminetur ad perniciem, poterit in quocunque eorum inducere mortem, praeterquam in declinatione vera: quoniam in ea nullus moritur: ut dicit Galenus. 3. de crisi. Quoniam interficit statim in principio, propter materiae multitudinem: sed in augmento, propter eius acuitatem & dolorem: & in statu, propter morbi longitudinem & virtutis defectionem. Est autem principium: cum materia fluit ad particulam, et dolor percipitur: nec apparent in urina signa digestionis manifestae: & hoc tempus durat a primo puncto male sensationis usque ad dies septem ad plus. Augmentum est: cum augeatur dolor et febris, et materia tota fere fluxit: & durat quidam non apparent signa digestionis perfectae. Est autem status cum dolor et febris sunt in ultimo vehementiae, & ma

Tractatus secundus

tertiā tota fluxit ad locū: durat autē q̄diu apparet sensibilis euacuatio, si nō terminetur ad salutem. Est vero declinatio: cū facta est materiæ sensibilis euacuatio & febris & doloris minoratio, & virtutis gradatua alleviatio: & durat hoc tempus vsq; ad tempus resurrectionis siue conualescentiæ, & illud durat vsq; ad tempus sanitatis debitiæ vel cōsuetæ. Apostema præterea epatis sicut & omne aliud apostema, pōt terminari altero duorū modorū: qm̄ vel stat, vel pmutat̄. Est et̄, cū pmutat̄ ad malū, vt si in peripneumoniā, vel in frenesim: vel ad cor transferat̄. Si vero steterit in loco suo, terminat̄ altero triū modorū: Primo quidē p resolutionē sensibile, vel insensibile. Secūdo p sanie siue dubellati. Tercio p sclerosim siue indurationem. Signa terminationis eius per resolutionē, sunt: quoniā per emplastra anodina tumor resoluitur, & febris diminuitur, & dolor mitigatur, & virtus de die in diem confortatur sine apparitione exitus sanguinis, vel saniei per secesum vel vrinā. Et tempus istius terminationis est a primo puncto ægritudinis vsq; ad diē decimumquartum vel circa id: sicut in pleuresi dictum est. Si igitur vsq; ad tempus illud tumor nō diminuitur, & febris & dolor augmentantur, seire conuenit: q̄ hoc apostema resolui nō potest. Signa terminationis eius per saniationem, sunt: quoniam post decimumquartum diem vel circa id, dolor & febris acuantur, & magis in nocte q̄ in die. Vnde Hippocr. 2. parti. aphorif. circa generationē saniei dolor & febris &c. Si igitur calor naturalis vicerit: fiet sanies. Si vero accidentalis, fiet virus: vt dicit commentator ibidem: Et tussis sicca superuenit, & oculi concuantur cum rubore angulorum in eis, & ungues corrugantur, & manus & pedes calefiunt, si sit cum salute: vel infirigidantur, si sit cum pernecie: & surgit multitudo sudoris, postquam non allevi-

atur ægritudo, & pulsus cum anhelitu fit frequens. Et tempus istius terminationis est a die decimaquarta vel circa id vsq; ad diem vigesimum, vñ quadragesimū, vel sexagesimum secundum multitudinem & grossitiem materiæ maiorem vel minorem: vt dicit Hippocrates secundo prognosticorum. Post illos igitur dies superuenit ruptura, & rigor corporis torius: & apparet sanguis & sanies in vrina & secessu, & diminuitur febris & dolor, si sit cum salute. Signa terminationis eius post sclerosim, sunt: quoniā post quadraginta dies vel circa id febris & dolor falso delitescunt, non præcedente euacuatione sensibili, remanente tumore vel duritie in loco cum prostratione appetitus, & nausea: & corporis extenuatione quaque die. Nam si materia insensibiliter resoluta fuisset: non remansissent ista accidentia. Signa autem distinctiua inter apostema epatis & pleuresim scripsimus capitulo de pleuresi, parag. de prognosticatio. Signa propria apostematis calidi in epate sunt, febris continua acuta cum dolore pungitiuo forti in hypochondrio dextro sub costis, & vehementia sitis. Si autem sit ex sanguine: tunc cum istis apparet rubor faciei permixtus fuscedini, & pulsus vndosus, scilicet latus, magnus, mollis: & vrina rubea grossa, & habitudo corporis carnosā: & dulcedo oris sine manifesta causa: & ætas iuuentutis, & antecessio ciborum multiplicatū sanguinem. Si vero sit ex cholera: tunc cum prædictis apparet color faciei citrinus, & pulsus velox, durus, diuersus: & vrina citrina intense cum gressitie nō plurima, et habitudo extenuata, et cōcauatio oculorum, & amaritudo oris sine causa exteriori: & forte superuenit vomitus amarus. Signa vero distinctiua apostematis an sit in gibbo epatis vel in zima, sunt: quoniam si sit in gibbo superuenit quandoque singulus propter

compassionem oris stomachi, & tussis sicca cum sputo propter compressionem diafragmatis ex ipso, icteritia citrina propter opilationem venarum in eorum fonte: & apparet tumor in hypochondrio dextro: sicut figura medię lunę, & proprie, si magnum fuerit apostema. Si vero sit in zima, apparet fortassis egestio rubea (sicut lotura carnis) & fortassis alba, subtilis, & ylosa propter defectum attractionis. Similiter & lenitas ventris, & prostratus appetitus omnino: Et quanto maius fuerit apostema, tanto fient huiusmodi accidentia maiora & certiora &c.

Methodus. Cura apostematis de sanguine, est vt i principio et vsq; ad septē fiat dies flebotomia diuersiua de basilica brachij sinistri, propter opilationem latitudinalem: Postea fiat flebotomia eradicatiua de basilica brachij dextri, in qua sufficienter sanguis extrahatur, si virtus & ætas consenserint: vel fiat eius secundarius per tres dies, quod melius est. Si vero corpus non fuerit plethoricum, vel apostema sit confirmatum, antequam sis vocatus: fiat ilico flebotomia eradicatiua: quoniam postq; materia tota fluxa est ad locum apostematis, non est amplius sollicitandum in diuersione, sed in eradicatione. Diuersio nanque respicit materiam fluentem, vel futuram fluere: eradicatio vero materiã fluxam et collectam. Post flebotomiam ponantur epithymata & emplastra reperiussiva per exterius super locũ ex puluere ros. sandalorum, cãphorę, sanguis draconis, terrę sigillatę, boli armenici, & similibus dissolutis in aqua ros. & modico aceti, vel in succo semperuiug, solatri, lactucę, acetosę, & modico aceti propter penetrationem. Sumat in auroa & ante cenam propter reperiussionem per intus syrupum acetosum simplicem, vel oxyzaccatum, vel syrupum

ros. vel viol. vel vinum granatorum acberberis cum aqua decoctionis endiuizę, lactucę, cicoreę, solatri: Neq; permittatur hora illa venter exiccari, imo leniatur omni die ante cibum cum supposito rio vel clysteri lenitiuo dictis in capitulo de pleuresi. parag. de methodo: & munitur sanguis aliqua dierum cum vicia vna & semi. medullę cassię si, dissoluta in vncias quatuor aquę decoctionis endiuizę, vel prunorum: & detur ante diem vel cum dragma vna vel duabus reubarbari boni puluerisati, dando cum aqua decoctionis iam dicta. Contentetur hora illa pro cibo, succo ordei vel saris vel auenę: similiter & malis lapidis, lactucis cucurbitis coctis & cõditis cum agresta vel vino berberis in potu cum cibo suo. Sed si virtus sit debilis, dentur carynes hoedorum vel pullorum coctę cum herbis frigidis predictis conditis cum succo granatorum, vel berberis, aut acetosę, & modico aceti. Et bibat vinum album debile lymphatum ad medium cũ aqua frigida vel aqua decoctionis endiuizę: Melius tamē foret abstinere a vino hora illa omnino. In augmento vero ponantur emplastra leniter resoluentia sine attractione mixta cum reperiussiuo: sicut sunt emplastra facta ex floribus chamomillę, seminis lini, farina sænigraci, ordei, radices malmaufici: coquendo omnia in aqua perfecte, & pistando et incorporando cum oleo chamomillę, & aqua ros. quod sufficit addendo aliquid ex stypticis: sicut absynthij ros. grana myrti, cicoreę, & planrago: & hora illa sumat de leniter resoluentibus & aperientibus per interius, sicut est syrupus acetosus compositus. In statu vero regat cũ resolutiuus puris: & postq; se. & dolor ceperint minorari, acuanē resoluētia prædicta cũ puluere anethi, spic. myrrhę, bdellij, ciperi, capparis secundũ quantitatē diminutionis se, & doloris: et sic regat p rē

Tractatus secundus

pus declinationis vsq; ad resolutionem pfectā. Si aut morbus prologetur, neque apostema resoluatur, neq; medicinæ rationabiliter exhibita proficere videantur, & fe. & dolor de die in diem augmententur: scire debes, q; apostema tendit ad saniationem: quare intende postq; cognoueris, ad generationem saniei laudabilis cū emplastro maturatiuo dicto capitulo de apostematibus stomachi, parag. de methodo. Et sic regatur vsq; ad diem rupturæ: & si ruptura p se fiat, bene erit. Si aut fiat per artem, sicut ibidem diximus de cura dubellati in stomacho. Et postquā ruptū fuerit apostema, quod scies, quando sanguis & sanies visa sunt in egestione vel vrina: tunc sollicitandum est in cura vlceris pro posse: cuius quidem curatibus perficitur intensioibus. Prima est mundificando vlus a sanie, quod fit per styptica abstersiua: Detur ergo in potu aqua ordeī, vel hydromel, vel iulep, vel syrupus acetosus cōpositus confectus cū zuccaro, si calor sit plurimus. Secūda vero in consolidādo labia vlceris, qd fit per styptica conglutinatiua. Dentur ergo in potu 3. iij. de hac medicina cum syrupo acetoso vel hydromelle. Et post has duas horas absteineat a sumptione medicinæ abstersiue iam dictæ. ℞. se. endiuia, seminis apij, mastice, terræ sigillatæ, añ. aureum. i. rosarum tritarū, spodij, thuris, sandal, dra. añ. aureos. 2. terantur omnia subtilissime, & cribellentur. Et emplastretrur epar per exterius cum emplastro, qd sic fit. ℞. spicæ, calami aromatici, ciperi. añ. partē 1. thuris, mastice, añ. partem f. coquantur & incorporētur cū aqua decoctiōis granorū myrtillorū, citoniorū, vel sumach, vel pitorū, vel pomorum stypticorum aromaticorum: & in fine adde aliqd galliæ muscatæ: quoniā consolidat & confortat epar a proprietate. Tertia est in confortādo virtutē, ne fortassis ex morbi longitudine atq; do-

loris fortitudine prosterneatur: quare confortetur cum carnibus pulloꝝ hœdoꝝ et vitellis ouorum, & bibat vinū aibū subtile aromaticū in parua tamen quantitate. Si vero nihil prædictorum contulerit, & apostema de die indiem induretur cū remanētia tumoris & doloris in loco, & corrosione corporis, & minoratione appetitus, & delitescētia fe. falsa: tunc intē de ad mollificātia & resoluētia materias melācholicas adustas vicissim tam per interius quam per exterius. Sumat igitur omni die ante cibū diacurcu. scripta ca. de hydropisi. parag. de empericis in cura ascitis cum fe. Vel sumat de dialacca, vel deathanasia cū vino albo subtili: v; sumat de trochiscis de bdellio, qui sic fiunt, ℞. secundum Rasim in diuisionib9 rosarum tritarū. 3. 10. spicæ, nardi. 3. 2. croci, lacce, costi. añ. 3. 1. & f. myrrhæ. 3. 1. mastice, amygdalarū amararū. añ. 3. 2. bdell. 3. iij. dissoluantur bdellium & mastix cū vino, & conficiantur cum eo res aliæ, postquam puluerizatæ fuerint subtiliter & cribellatæ, & fiant trochisci: quorum quilibet sit. 3. 2. vel tres. Def vnus in aq; endiuia si fuerit plurima caliditas vel cū vino albo vel hydromelle, vel aqua decoctionis seminis apij & feniculi, si non sit feb. intensa. Emplastretrur epar cum emplastro, quod sic fit. ℞. radi. maluauiſci coctarum & mundatarum a ligno interiori & cortice exteriori, & reductarum ad substantiam axungia per pistationem. lib. 1. farinæ ordeī. 3. quatuor. fœ nigræci seminis lini. añ. 3. 2. pinguedinis anatis, anseris, & gallinæ, ac porcinae sine sale. añ. 3. duas. ciperi, squinanti, ana. 3. vnam. armoniaci. 3. 1. & f. & terebentinæ. 3. 4. ceræ quod sufficit. Dissoluantur cera & gummæ cum vino in casola ad ignem, & incorporentur cum eis res aliæ postq; bene trite fuerint, & cribellatæ, extendātur super coriū, ponat super epar: vel fiat vnguentum ex eis, & loco ceræ

ponatur oleum masticinū vñ nardinum. Hoc namq; emplastrū sua bonitate mol-
lificat, & resoluūt omē apostema indura-
tū: & proprie fit de materia calida ad-
usta. Si autem sit de materia frigida vel
grossa valde: tunc opus est emplastro for-
tiori, qđ est huiusmodi. ℞. rad. bismalug
ppararaz, vt supra lib. i. terebēting. lib.
ss. bdellij armoniaci, serapini, oppopona-
ci. añ. 3. ss. ciperi, capparis, acori, squinan-
ti. añ. 3. ss. farinae scenigraci & semi. lini.
añ. 3. iij. olei nardini. 3. 2. dissoluantur gū-
mæ in vino, & cum dissolutæ fuerint: ad-
datur terebentina, & dissoluantur cū eis,
& cum dissoluta fuerint omnia, ponātur
in mortario, & incorporētur res aliæ tri-
tæ & cribellatæ pfecte, donec vnum cor-
pus fiant. Et fiat cerotū vel emplastrum
sup̄ epar actū calidū. Ista em̄ emplastra
mollificāt, & resoluūt materias indura-
tas in epate, & confortant substantiā epa-
tis. Et si applicarentur post aperitionem
& rupturam apostematis saniosi, pluri-
mum etiam conferrent: qm̄a adiuuāt ad
expulsionem saniei, & mundificatiōem
viceris. Cura apostematis calidi de chol.
est eadē cū prædicta, nisi qđ in sanguineo
debet magis fieri euacuatio cū fleboro-
mia: sed in cholerico magis cum farma-
cia leniter purgante materias acutas: si-
cut sunt cassia fistula, tamarind, manna,
reubarbarz, dando cū aqua decoctionis
prunorū: in vitroq; tamē cōuenit fleboro-
mia & farmacia: vt dictum est.

Emperica. Dixerunt excellentes, quod
apostema epatis vel alteri-
us membri cuiuscumq; interioris vel ex-
terioris potest in principio, & antequam
materia fluxa sit ad locum, euitari tribus
modis. Primo quidem per repulsionem
eius ad loca, ex quibus fluxit: & hoc fit p
frigida styptica, quæ repercussiva nuncu-
pantur: sicut sunt solatrum, vīga pasto-
ris, semperuiua, & similia posita super
ipsum. Secundo modo per attractionem

ad partem oppositam cum ipsius calefa-
ctione & fricatione atq; ventosatione.
Tertio modo per delegationē siue trans-
missionem materiæ ad membra debilia
quęcumq;: quod fit per styptica tempera-
ta confortatiā virtutem epatis regitiuā,
vt se valeat a superfluitatibus exonerare:
sicut sunt grana myrti, rosæ, citonia,
succus granatorum & herberis cum per
interius assumuntur, aut per exterius su-
per epar emplastrantur. Dixerunt etiam
alii, quod succus agrimoniz in potu da-
tus stomacho vacuo per nouem dies li-
quesfacit a proprietate omne apostema
tam interius quam exterius.

Canones. Dicit, Galenus. 9. de ingenio
sanitatis, quod in apostema
tibus stomachi, epatis, vel splenis nō de-
bemus administrare, neq; p interius, ne-
que per exterius medicinas resolutiuas pu-
ras: quoniam resolveretur eorum virtus
simul cum materia, & sequeretur mors
festina: cum sint membra nobilissima,
quorum operatio necessaria est pro toto,
& proprie epar: cū sit mēbrum rarū, cali-
dum, mollis substantiæ & spōgiosę.
dantur igitur eis styptica aromatica: si-
cut absynth, ros. citonia, plantago, gra-
na myrti, mala pōtica, mēspila, forba,
pīra, sumach & similia. Et sicut dico de
resolutiuis, ita intelligo de mundificati-
uis. Item si apostema sit in gibbo epatis,
euacuetur apostematis materia per vri-
nam cū seminibus cōmunibus quatuor
famof. calidis vel frigidis, prout opor-
tet, additis stypticis iam dictis. Si vero
sit in cōcauo ipsius, euacuetur materia p
intestina cū farmacijs lenitiuis p̄dictis:
sed non dētur medicinz acutz: sicut sunt
scamonea, agaricus, & similia: quoniā
se, incēderent, & materiā agitarēt: & sic
augmentarēt apostema. Istū tamē cano-
nē duo impediūt. Primū quidē læsio in-
testinorū, vt in dysenteria vel liēteria cō-
uenit: tūc namq; oīs materia in epate col-

Tractatus secundus

lecta debet euacuari per vrinam, ne læsio intestinorum vltimetur. Secundum est grossities, vel viscositas materiæ: tunc namq; medicinæ vrinatiuæ sunt debiles, nec sufficient: quare oportet, vt fiat euacuatio cum medicinis ducentibus per secessum. Vtatur ergo medicus nunc ista, nūc alia: ne natura fiat consuetudinaria. Item in principio apostematis non debet poni percussiva fortia: ne forte materia induretur, & caliditas epatis mortificetur, & sequat hydrophilis ascites. Primo ergo ministrētur leuia debilia, postea fortificentur gradatiue. Item non fiat flebotomia vel farmacia, ventre constipato: quoniam euacuationem materiæ nocitiuā prohibet, & materiam iuuatiuā corrumpit. Leniatur igitur prius cum suppositorio vel clysteri. Item sciēdum, qd apostema in concauo epatis reddit ventrem lubricum: quoniam chylus non penetrat ad epar. Apostema vero in gibbo eius reddit ventrem stypticum, propter attractionem eius plurimam ad locum apostematis: nisi forte apostema sit adeo magnum, vt virtutē epatis deiciat, & vias opilet: tunc fieret fluxus lientericus perniciosus. Sciendum præterea, qd in apostemate epatis est opilatio: & licet in omni opilatione sit vrina alba, tenuis, clara, radiosa: verū tamen sit rubea, grossa, confusa propter febrem & humorum ebullitionē: quapropter si venerit alba, aquosa & liuida caloris innati mortificationem signat.

Prognosticatio. Omne apostema epatis est ex toto genere magis mortale q̃ salubre, propter epatis nobilitatem, necessitatem, caliditatem & raritatem: quare prognosticis relinquatur, nisi virtus sit fortis sufficienter, & medicinæ rationabiliter exhibitæ conferant quaq; die. Item apostema epatis si terminetur per resolutionem, salubre: si per sauiationem, est difficile propter feb. & do-

loris intensiorem, & morbi longitudinē, & membri necessitatem, & proprie circa diem rupturæ. Si vero terminetur per sclerosim, est mortale: quoniam quod in epate lapidificatum est, amplius mollicari non potest, nisi in principio, vt dicit Auicē, cap. præfati. Item apostema epatis induratum causat infra 14. dies hydrophilis asciten vel tympaniten perniciosam. Item in apostemate epatis frigiditas manuum & pedum mortalis est, qm̃ significat eius magnitudinē. Vnde Hipp. 7. parti. apho. In acutis pssionibus frigiditas extremitatū malum. Item apostema in gibbo epatis citius interficit, q̃ in concauo propter partem illam esse nobiliorem, & vias strictiores. Caue præterea ne tumorem musculorum (quæ sunt in mirach ventris) iudices fore apostema epatis vel splenis. Distingue ergo per figuram lunarem, & vrinam ignitā confusam, & egestionem chylousam, vel sicut lotura carnis, & per dolorem fortem cum febre acutissima & pulsus spissum velocem: quoniam nihil istorum in apostematibus musculorum apparere consuevit vel non plurimum vehementer. Item dicit Hippo. 7. part. aphorismorum: In flegmone epatis singultus, malum: quia multitudinem materiæ signat. Item in omni apostemate epatico fluxus ventris malus: quoniam magnitudinem apostematis, & prostrationē appetitus, & virtutis attractiue & digestiue debilitatem signat: nisi venerit in die critica, & post signa digestionis, & fuerit cum sanie laudabili, alba, leui, æquali: vel cum paucosanguine commixtus, & virtute constanter, & febre & dolore deficiente, & appetitu redeunte. Item apostema factum in gibbo epatis potest tribus modis resolui sensibilibiter ad salutem scilicet per sudorem, per vias vrinales, & per fluxū sanguinis narium. Similiter & apostema quod est in zima, potest tribus modis ter

minari: scilicet per sudorē, & per fluxum vētris, & per vomitum. Si igitur aliqua istarum terminationum euenit subito a principio, scilicet in quarta vel in septima die, salubre erit, & proprie si signa digestionis apparuerint, & virtus constet. Si vero tardauerint, mortale, & propter saniei generationem & morbi longitudinem. Vnde Hippo. 4. part. aphorismo tum. In fe. apostema non solum ad primas crises, longitudinem ægritudinis significat. Item si apostema saniosum fuerit in velamine epatis, vel musculis ventris, salubre: Si vero in substantia epatis, mortale. Cognoscitur autē & distinguī non nisi a posteriori, scilicet exeunte: quā si exiens post rupturam, vel incisionem, vel cauterium fuerit sanies alba, lenis, æqualis, venit de panniculo inuolvente epat aut de musculo. Si vero fuerit nigrū grossum, canosum, vel viride, foetidum, vel plumbeum, liuidū, significatur quoniam de substantia epatis egreditur. Vnde Hippo. 7. part. apho. Quicūq; in epate propter saniem vruntur, si quidem sanies pura fluxerit & alba, eua dunt: In tunica enim illius sanies est: si vero velut amurca, pereunt. Consulo tamē ne tales incidantur, vel vrantur: sed prognosticis relinquantur.

TRACTATUS TERTIUS tius tertiz sectionis De passionibus splenis, cuius sunt tria capitula.



Plenis passiones famose sunt res. Prima est debilitas eius in suo officio. Secunda opilatio, durities & tensio. Tertia est apostema. Nam de icteritia nigra diximus, vbi de citrina loquebamur.

De debilitate splenis. Cap. I.



Debilitas splenis quæ admodum debilitas epatis, a duabus potest causis provenire in genere: quæ sunt mala complexio, & mala cõpositio, siue laxitas texturæ suæ substantiæ: quoniam debilitatem eius factam propter solutionem continui chirurgicis derelinquo: nisi fortasse acciderit ex apostemate vel vlcere: de quibus proprio cap. dicemus. Mala autem complexio diuersa licet sit octo modorum: proprie tamen splen debilitatur maxime a calida & frigida. Nam sicca ad calidam reducitur, sed humida non debilitat, nisi opilando et extēdendo: velut in proximo ca. dicet. Signa debilitatis splenis in cõmuni sunt tria. Primum est corruptio coloris corporis, & conuersio eius ad nigredinem: quæ maxime percipitur in albuginibus oculorum. Et hoc contingit propter hoc, quod splen non attrahit melancholiam ab epate: neq; mundificat in eo massam sanguinis, cū sit eius proprium officium. Secundū est prostratus appetitus, propter paucam melancholiam acetosam, quæ transfundi deberet a splene ad os stomachi, vt appetitū excitaret. Tertiū ablatio vel diminutio hæmorrhoidarū, quæ oriūtur a splene, siue venis eius. Si autē sit ista debilitas a mala cõplexione calida: tūc cum prædictis apparer citrinitas permixta nigredine in cute corporis, & albuginibus oculorum, & destructio appetitus oīno, & sensibilis caliditas in hypochondrio sinistro, & vrina rubea grossa. Si autē sit a mala cõplexione frigida: tūc cū prædictis apparer color liuidus permixtus nigredini, & destructio appetitus nō adeo sicut in causa calida, & frigiditas sensibilis circa locū splenis: & vrina glauca, turbida inferius & clara superius quodāmodo. Si autē sit propter raritatem substantiæ splenis: tunc cū signis cõmunib; prædictis appetit medico sapienti priuatio signorum calidorum et frigidorum

& quoniam splen de facili lædit̃ ex qua cunq; causa, postquā peruenierit ad paniculum inuoluẽrem: quoniam eius substantia caret sensu, propter non esse membrum neruofum, sed carniforme: quẽadmodum epar, pulmo, & renes.

Methodus. Cura debilitatis splenis propter malam complexionem calidā, est vt in principio si corpus sit plethoricum, vel carnosum: fiat flebotomia de basilica sinistra in brachio vel in pede, vel de saluatella in manu. Post hoc si necesse fuerit: purgetur cū sene, thymo, epithymo, polypodio, dando ex eis aliquid in puluere cum aqua decoctionis prunorum, vñ in colatura cum hac decoctione. ℞. ellebori nigri, ʒ. i. reubarbari. ʒ. 2. terātur & dissoluantur in. ʒ. 4. aqua feruentis decoctionis sene, epithymi & prunorū, coletur, & detur ante diẽ. Et si præsto non sit aliud, purgetur cū dia sene, vel cum hieralogodon, dando ex eis. ʒ. 6. cum aqua calida ante diem. Vel detur reubarbarum in puluere cum sero caprino, vel cum aqua decoctionis prunorum: quoniā ista medicamina conforrāt, & deoppilāt splenē, & epar, atq; me seraicas, & humores grossos educūt aduſtos vel nō aduſtos. Post purgationes ponatur vētosa magna sine scarificatione super splenē in ieiunio cum suctione forti vt melancholia attrahat, & fricetur cum manib⁹. Epithymetur cū huiusmodi medicina. ℞. ciperi, capparis, acori, endiastuca, cicoreæ, absynth. añ. pistentur, & bulliantur in aceto forti & succo acetosæ vel berberis. Et in isto liquore actu calido infundantur petiæ, & ponantur frequẽter super splenem in ieiunio. Si vis ex eo facere vnguẽtum: bulliātur res prædictæ in oleo communi, & modico aceti, vel in oleo ros. vel de salicibus, & post decoctionem coletur liquor, et ex eo & cera sufficienti fiat vnguẽtum. Nutriatur carnibus laudabilibus, non fumi

gatis, neq; salitis, coctis cum endiuiā, lactuca, vel cum seminibus eorum cõditis cum agreſta, vel vino granatorũ & berberis, vel succo acetosæ & aceto. Bibat vinum album, clarum, debile, aquosum vel lymphatum. Vitet cibos dulces vinctuosos & viscosos, & petus rubeos grossos turbidos. Vt atriaſanda, rosata nouella, diaboraginis, diarrodon abbat̃is cum aqua calida in ieiunio. Cura debilitatis eius a mala cõplexione frigida, est eadem cum prædictis in flebotomia, purgatione, & ventofatione: sed fucaria fiat fortior, & equitet in ieiunio equos duriter incedẽs, vel descendat scalas altas. Epithymetur splen cum huiusmodi. ℞. ciperi, capparis, acori, azari, aristologia, rotundæ. añ. pistentur, & bulliātur in succo absynth, scolopen, tamarisci, corticis mediana sambuci, & modico aceti fortissimi, colentur, & exprimantur res perfecte: & in liquore illo imbibantur petiæ, & actu calidæ super splenē ponātur: vel pistentur res oēs perfecte, & fiat emplastrũ. Et si vis magis fortificare hoc medicamen, adde rutam & folia lauri, & prassium: vel si. vnguẽtum, quod sic fit. ℞. armoiniaci, bdellij, oppoponaci, serapini, añ. ʒ. ʒ. succi absynth. ʒ. iij. aceti fortissimi. ʒ. 2. olei communis veteris, vñ de ruta. ʒ. 2. dissoluātur gumma in aceto & succo: dein de reducantur ad ignem addito oleo, & cū bene liquefacta fuerint, addatur ceræ quod sufficit, & si. vnguẽtum actu calidum super splenem in ieiunio ad ignem vel solem calidũ om̃i die. Ad idem confert vnguẽtũ marciaton, arragõ, agrippa. Vtatur etiam diacostõ, diacastoreon, dialacca, diacymini, diacapparis, diacalameti, vñ diacurcumæ q̃ scripta sunt ca. de hydropili. vel trifera magna cū vino, albo puro, forti in ieiunio. Comedat carnes laudabiles coctas cum feniculo & petro, & iura earum: bibat vinum album, forte. Cura debilitatis splenis propter ra

ritatem suæ substantiæ, est vt negligant flebotomia & farmacia prædictæ: & si aut sola remedia localia. Epithymetur ergo & emplastretur cum calidis stypticis non multum excedentibus, quæ diximus. ca. de debilitate epatis. parag. de cura debilitatis eius propter raritatem suæ substantiæ. Nutriatur carnisbus laudabilibus assis proprie conditis cum vino granatorum vel berberis, vel succo acetosæ & vino styptico mixtis & incorporatis cū puluere cynamomi, zedoarij cappa. gallan. croci, & similibus: quoniam stypticant & confortant splenem generando sanguinē grossum & appetitum excitant: quare bibat vinum rubeum aromaticum, si in ipso delectetur, vel vinum album vetus amari: vtatur in ieiunio diacappa. & electuarijs, quæ dicemus statim cum vino claro subtili.

Emperica. Confectio dialacæ sublimis conferens ad omnem debilitatem epatis & splenis cum opilatione, & proprie sine feb. hæc est. ℞. lacæ ablutæ, costi, baccarum lauri, florum sambuci, liquiri, piperis. z. añ. 3. 2. aristologiæ, rub. tinctoræ, succi eupatori, azari, absynthij, anisi, gencianæ, spicæ, squinanti, croci, cynamomi, reubarb. añ. 3. 1. & 6. myrrhæ, bdellij. añ. 3. 1. mellis quod sufficit. Frangit em lapidem, & duritiē antiquatam, & inceptions hydropisis ex ipsis prouenientem decidit. Item sunt quedam simplicia splenem confortantia a proprietate. verbi gratia, borrago, buglossa, cipi, capparis, thymi, epithymi, zedoarij. sed in causa calida, endiua, lactuca, et similia. & semina eorum: sed in causa frigida, tamariscus, scolopendria, nasturciū, calamētum, squilla, aristolog. acori, azari, flores sambuci, vel cortex eius medianus. Item aqua transiens per mineram ferri, vel in qua extinctum sit ferrum, vel in qua bullitæ sunt scorix ferri, conferunt spleni a proprietate, si potest

vel cibis cōmiscet. Similiter & electuaria, in quibus ponitur scoria ferri, vel limatura acutū abluta in aqua frigida 10. v. cibis aut pluribus, postq̃ fuerit subtiliter cribellata. Scitur aut, quādo sufficienter est abluta: quoniā dum ex ipsa non inficitur amplius aqua. Sic enim abluimus & lapidē lazulum, & lapidem armenum.

Canones. sunt splenetici: quapropter dicta capitulo de melancholia, similiter & isto cap. & quæ dicuntur cap. de opilatione splenis plurimum sibi inuicem suffragantur: si calida frigidis, & frigida calidis applicentur causis. Præterea splenis debilitas cū opilatione & duritie vt plurimū accidit in ægitudinibus chronicis, velut in fe. quartana, quātum ad causas calidas, vel in hydropisi ascite & tympanite quantū ad causas frigidas. Ideo cura taliū passionū, splenē nō permittas.

Prognosticatio. Debilitas splenis inducit opilationē epatis, dum sanguinem non mundificat: opilatio digestionē prohibet, dum calorem mortificat naturalē & discursum humorum per sua loca retardat: digestio vero prohibita aquositate multiplicat supple & ventositatem: & sic tandem hydropisim ascitē vlt̃ fe. chronicam perniciosam inducit cū omnimoda appetitus profractione, & virtutis nutritiæ defectione.

De opilatione, magnitudine, duritie, & tensione splenis. Cap. II.

Ista quatuor conueniunt, & differunt. Conueniunt: quoniam sunt de genere passionum materialium occupantium splenē secundum venas & spongiositates eius, & inducuntur in eo malam compositionem. Differunt autem: quia opilatio est nomē cōmune ad oia: sed magnitudo est opilatio splenis facta a materia humoralī ipsū eleuās in tumore: Sed duri

ties est opilatio antiqua sclerotifara, cuius subtile resolutum est cum remanētia grossi terrestis: Sed tētio siue inflatio est opilatio facta ex materia vētosa. Signa omnium istarum passionum, sunt dolor lateris sinistri extensius in loco, qui est sub costis cum tumore, vel sine tumore, & cum duritie sensibili ad tactū: vel sine duritie: & corruptio coloris, & conuersio eius ad nigredinem in corpore toto, proprie autem in albuginibus oculorū: propterea q̄ splen non mundificat sanguinē a melancholia: & prostratio appetitus, propter opilationē venę mulgentis, quę verosē a splene ad os stomachi defert melancholiam acetolam guttatim profluentem, & appetitum in ipso excitātem. Si autem sit ista passio a materia humoralitunc cum prædictis apparebit, q̄ tu mor ille non cedit, vel difficulter cedit cōpressioni manus sup ipsum. Si vero fiat a materia ventosa: tunc sit locus planus, præter quod doleat, quando super ipsum sit vehemens impressio, & quādoq̄ prouenit ex eo, cum vehementer premitur, eructuarius vel rugitus.

Methodus. Cura omnium istarū passi onum præter q̄ tētionis, est vt primo fiat flebotomia saphenę v̄ saluatellę in pede sinistro cum incisione lar ga: & post hoc flebotomia basilicę i brachio sinistro, vel saluatellę in manu sinistra, si corpus sit carnosum, & vitrus & ætas consenserint: & extrahatur sanguis grossus, niger, plurimus: q̄ si clarus subtilis exierit, ilico restringatur, & ponatur corpus in aqua dulci tepida, & fricentur extrema, donec sanguis grossus melancholicus colliquetur: Deinde fiat flebotomia iā dicta: Et post flebotomiā sumat omni die in aurora & ante cōnā 3. iij. syrū acetosi, cōpositi cū 3. 4. aquę decocti onis ciperi acori, capparis, azari, v̄ oxy mellis compositi. Voco autē compositū cum in eis aliquid ponitur ex radicibus

quinq; communibus, & ex seminibus calidis quatuor cōmunibus vsitatis. Purgetur cū hierap̄. vel cum hieralogodion, vel cum aliqua medicina dicta capit. de debilitate splenis. Et fortius prædictis est diasenę acuatū cum lapide lazulo abluto, vel lapide armeno: sed leuius prædictis est oxymel compositum acuatum cum prædictis. Post purgatiōes vero prius vaporetur, vel fomentetur splen cum aceto acuto actu calido, in quo bullita sint ruta, calamentum, cappar. & azarum. Et ponatur super ipsum emplastrū, quod sic fit. Iſſ. atmoniāci, oppoponaci, serapini, bdellij. añ. 3. f. pingued. anseris, anatis & gallien. añ. 3. i. capparis, acori, ciperi, florum sambuci, vel corticis eius medianę, scolopend. tamarisci, rubę tinctorum. añ. m. f. bulliatur omnes herbe & radices in aceto forti, & pistentur perfecte, donec omnia reducantur ad formam axungię: deinde conficiantur cū adipibus prædictis & gummis dissolutis in vino, & fiat emplastrum actu calidum super splenem in ieiunio. Quod si fortificare volueris: adde absythium squillan. rutam, eupatorium herbis prædictis: Et si magis iterum, marrubiū & genestam, fraxinum, sauinam, & cīrerum si maxime, aloē & myrtham, & omne genus salis: & omne genus sellis, & omne genus vrinarum, & ex succo earundem rerum, & oleo & aceto decoctionis ipsarum fiat vnguentum cum adipibus & gummis prædictis, addito modico cerę albę. Istud nanq; vnguentum & emplastrum aperit, mollificat & cōfortat oēm splenem opilatum, & proprie si sit opilatio dura antiqua, & sine fe. Vngatur etiam vnguento marciaton ad ignem vel solem calidū: vtratur sape in ieiunio diacumę dicta in ca. de debilitate splenis. parag. de empericis: vel philantropos, vel diacapparis, vel diagallan, & proprie si in lib. i. cuiuslibet electuariorū

istoz ponatur. 3. 1. vel duræ limaturæ acutum, vel scoreæ ferri tritæ subtiliter atq; cribellatæ: quoniâ sunt tûc de genere electuarioz ferratoz. Nutriat carnib; hoc doz vel pulloz, vñ auu sylvestrium non aquaricarum, potius coctis cû petro. & foeniculo q̃ assis vel frixis, & aqua cicerum & pisoz. Bibat vinû albû clar; vetus, amarû, purû. Euitet cibos dulces viscosos: quoniâ opilat, vt est caro porcoz & correllæ: similiter & cibos valde salitos, quoniâ sanguinem adurunt, & insipis sunt. & lentes & carnes farinas & caules: quoniâ melâcholiâ multiplicât: & vinû rubeû, grossum, turbidû, & ceruissiam et medonê, quoniâ vasa replent, & aquam quoniâ humores congelat. Si aut sit cum fe. non frât vnguenta & emplastra p̃dicta: quoniâ sufficiûnt leuiora, sicut est euaporatio cum aceto forti calido puro: vel in quo decoctę sint cappares: similiter et emplastrum factum ex eisdẽ coctis perfecte. Vtatur trochisc. de ros. sæpius ante cibum qui sic fiunt. ℞. rosarum. 3. iij, oxyaloes, spicæ masticis, casie lignæ, squinant, cynamomi, absynthij. añ. 3. 1. informantur trochisc. cum vino veteri: quorum quilibet sit. 3. 2. detur vnus in potu omni die cum aqua decoctionis foeniculi, radicum apij, petro, quoniam valent opilationi omniũ membrorum, & indigestioni & iniectioni hydropisis: & feb. antiquas erraticas decidunt, si dẽtur post purgationes in aurora, & ante horâ accessionis. Et non negligatur feb. sed curetur sicut eius causa & dispositio requirunt. Cura tensionis eiusdem splenis est, vt euaporetur, & fomentetur splen cum vino veteri amaro, in quo decocta sint carui, cyminum, mentastrum, origa, satureia, lizeleos, & similia, quæ sunt carminantia ventositates: vel cum lapide ignito asperso aceto acuto. Et saccelletur cû milio & sale torrefactis in sacculo ad alto fure, additis etiâ alijs, foeniculo,

aniso, se. nasturtij, carui, sæpius in ieiunio: Et bibat post ipsum vinû purû & vetus: Vtati etiâ diacimino, dianiso, diacost. dī acastor, vel theriaca veteri cû vino decoctionis ameos, amomi, origani, saturei & similib; samē & sitim toleret pro posse: & laboret in ieiunio, & sudet: viter omnia ṽtosa: sicut sunt legumina & olea. Et ponat qñq; ventosam magnâ sup splenem ante cibum sine scarificatione.

Emperica. AD omnem opilationem splenis ex quacumq; causa fiat, conferunt trochisc. de capparis a proprietate, qui sic fiunt secundum Almanforem. ℞. radicū corticis capparis, se. agni casti. añ. 3. 10. scolopendriæ. 3. 7. aristol. ros. fol. rutæ, se. nasturtij, acori, nigellæ, armonia. añ. 3. iij. dissoluatur armon. in aceto, in quo cetera conficiantur, & informantur trochisc. quoz quilibet sit. 3. 2. ex quibus detur vnus in aurora cû vino decoct. radicū qñq; cõmuniũ: & proprie si sit sine fe. Est nanq; res vltimæ fortitudinis, p̃missa purgatiõe. Isti troch. etiam secū dũ Hebe, sic fiũt, & melius. ℞. rad. corticis capp. se. agni casti. añ. 3. 6. nigel. calamenti, succi eupatori, acori, amygdalarum amar. nasturtij, armoniaci, foliorum rutæ, aristologiæ rotundæ. añ. 3. 2. ciperi, scolopendr. añ. 3. 1. dissoluatur armoniacū in aceto, & aliarum rez puluis subtiliter tritarum conficiatur cû eo: & sit dosi aurei, 1. cum vino decoctionis radicū capparis, & radicū salicis: & sunt qui duplât armoniacū, & est melius. Ad idem conferunt trochisci delacca, & curant asciten, & febres antiquas secundum eundem. ℞. laccæ mundatæ, succi liquiritiæ, absynthij, herberis, succi eupatori, acori, astrolog. longæ, costi, azari, amygdalæ amaræ, rubec tinctorum, anisi, se. apij, squinant. añ. 3. 1. Confice cum vino veteri albo. Ad idem conferũt trochisci de agno casto, sed non sunt tantæ fortitudinis. ℞. se. agni casti, se. rama

risici. añ. 3. 4. se. rudi se. portul. añ. 3. 4. terā
tur & informantur trochisci cum vino,
quorum quilibet sit. 3. iij. Et possunt da-
ri in feb. nisi se. sit valde intensa. Ad idē
confert comestio capparis cum aceto for-
ti, vel vino decoct. radicū. quinq; cōmu-
niū, vel ameos, vel amomi quoniā san-
subtiliant, apostema prohibēt, appetitū
concentant aperiendo vias splenis. Quod
si bulliatur in oxymelle vel aqua & ace-
to forti, & pistentur optime, & emplastrē
tur super splenē sæpius in ieiunio post pur-
gationes, confertur vehementer authori-
tate Galeni de ingenio sanitatis, reiterā-
do frequēter, post q̄ infrigidatum fuerit.
Et quandoq; additur absynthium & ole-
um rutæ, aut de salic. vel de lilio: quoniā
facit penetrare, cappare nancq; splenē
respicunt a proprietate. Ad idē confert
stercus caprinum, bouinum, columbinū
cum fece veteris vini, & aceto forti deco-
ctum, atq; emplastratū: & proprie si opi-
lario non sit difficilis, antiqua: & præcel-
serit rheotomia sapradicta: & sint anti-
malia pasta ex herbis acutis in locis mō-
tanis. Confert etiam vrina propria bibi-
ta actu calida in ieiunio: & quando quis
priori die sumpserit vinum album vetē
amarum: quia splenē subtiliat, & remo-
uet hydropisim inchoatā ex duritiē epa-
tis aut splenis, aut aquā educit per seces-
sum: vt dicit Auic. 2. cañ. capit. de vrina.
Et ex rebus nobilibus est syrupus diureti-
cus positus capite de pfectione epatis,
parag. canon. Item confectio ad idē. 78.
radicum enulæ campanæ, & radicū ra-
phani. añ. 3. 1. corticis medianæ tamaris-
ci, & florum eius. añ. 3. 6. limaturæ ferri
3. 2. betonicæ, zinzi. añ. 3. 2. mellis quod
sufficit. Detur ex ipsa ad modum auella-
næ in ieiunio semel vel bis omni die cum
vino albo veteri. Item vnguentū ad idē.
78. absynthij, rutæ, squinantij, acori, cap-
paris, eupatorii, panis porcini, florum ta-
marisci, vel sem. eius vel corti. medianæ

sambuci. añ. 3. 2. aceti squillit. vini veteris. añ. lib. 6. olei, det amarisco, vel de ru-
ta, vel de cappar. vel de lilio, vel olei lau-
rini lib. 1. bulliantur oīa in vino & aceto
perfecte. Deinde addatur oleū, & statim
ab igne deponatur, coletur, et addatur ce-
ræ quod sufficit. Et si vis acuerē magis,
addatur assa foed. armoniaci, bdellij, se-
rapini, oppoponaci: sed dissoluatur cum
vino in cazola, & incorporentur cum re-
bus p̄dictis. Et ex oleis nobilibus est ole-
um de fraxino, & de iunipero, quæ dice-
mus capi, de lepra. libro. 2.

Canones. Omnis medicina expilatiua
cuiuscunq; membri oportet
necessario vt sit acuta, calida, subtilis,
penetratiua, & proprie in splene: cum sit
membrum melancholicum grossum. Si
igitur opilatio sit noua & modica, suffici-
unt calida leuia. Si vero sit antiqua, in-
durata: requirūtur fortia nisi febr. vel vir-
tutis debilitas id ipsum impediant: q̄pro-
pter opilatio in causa calida difficilis est
curationis: cum in hac necesse sit medi-
cum habere duas intensiōes contrarias,
scilicet frigidandi & aperiendi. Item me-
dicinæ expilantes debent dari in subti-
li substantia, vt cito penetrent: & ideo si
sint apozimata, colentur: si pulueres, cri-
bellentur: si emplastra, vel vnguenta vlti-
mē pistentur. Itē in emplastris resolutiuis
vel mollificatiuis semper oportet poni
styptica: vt est absynthium & calamen-
tum, ne virtus eius resoluatur: quoniam
splen est membrum nobile necessarium
pro toto. Item in febribus quartanis, &
febribus erraticis (q̄ planeticę dicuntur)
& febribus quotidianis de materia gros-
sa, & proprie in quibus ager peccat in re-
gimine, & bibit aquam frigidam pluri-
mam fiunt opilationes splenis antiquæ
periculose: quapropter in cura ipsarum
splenem non pertranseas.

Prognosticatio. Opilatio splenis re-
manens vel inducia

post feb. quartanam vel erraticam, recidivam minatur; nisi medicus supervenerit rectificando splenem. Item opilatio splenis inducit infrigidationem epatis. Infrigidatio indigestiōem, indigestio hydropisim periculosa. Item opilatio indurata antiqua raro veli nunq̃ recipit curacionem: sicut neq̃ apostema sclerotisatum. Item opilatio epatis vel splenis dū pungit, & sentitur, est recens: dū vero nō sentit, est antiqua confirmata: quare nō curatur. Itē caue ne inflationē musculorū ventris vel intestini colon transeuntis super splenem, iudices opilationē splenis, seu apostema. Distingue ergo per colorē corporis p̃dictum & profunditatē loci, & urinā albā, subtilem, radiosam, vel rubeam confusam: quoniam ista nō apparent in doloribus intestinorū vel musculorū. Et certius signū sumitur a stypticitate ventris, quæ seguitur & antecedit tales dolores, & satietas nauseatiua: quare per resolutionē ex alesiātoris (vt plurimū) soluit, vel cū fluxu vētris: qđ nō contingit de apate vel opilationē splenis.

¶ De apostemate, vlcere & exitura splenis. Ca. III

Apostema, exitura, & vlcus, habent fieri in splene eodem modo, sicut in epate. Et cura & prognosticatio sunt eadem omnino, cum vtrumque ipsorum sit membrū carniforme & nobile, nisi quod splen est dēfioris substantiæ, & minoris caliditatis: propter quod in ipsius resolutione minor cadit timor, quam in epate. Similiter autē in maturatiōe & mollificatione: duo tamen hæc attendenda sunt in canone. Quorum primū est, quod sicut apostema epatis (vt plurimum) sit a causa calida, scilicet sanguine, vel cholera: ita apostema splenis (vt plurimum) sit a causa frigida mela cholica, non quidem per se incipiendo, sed consequendo ad apostema calidum

sclerotisatum. De cuius cura plura reperies cap. de apostemate epatis, parag. de apostemate indurato & de opilationē splenis per totū. Secūdū est, quod sicut in medicinis epatis administrandis per interius vel exterius addere cōuenit directiua respicientia epar a proprietate, quæ sunt endiuia, spica, squinantū, eupatorium, ameos, amomum: Ita in medicinis splenis opus est addere directiua respicientia splenem a proprietate, quæ sunt ciperus, capparis, acorus, azarum, limatura ferri, tamariscus, scolopendria, &c.

¶ TRACTATUS QUARTUS tutis tertiz sectionis, de passio- nibus intestinorum.



Intestinorum passiones sunt quatuor: Prima fluxus ventris: Secūda stypticitas: Tertia dolor extensivus, qui colicus & iliacus dicitur: Quarta apostema, sub quo comprehenditur exitura & vlcus. Sunt autē intestina sex numero secundum distinctionem nominis & operationis: licet omnia sint vnum corpus continuū & a piloron, i. fundo stomachi, vbi est ipsorum orificium initiatum vsq̃ ad fisterim, i. anum, vbi est ipsorum orificium terminatum: quorū tria sunt gracilia, & sunt superiora, plures reuolutiones habentia: quia chylum debent retinere, donec totus attrahatur per meseraicas ad epar. Primum autem vocatū est duodenum: quoniam longitudinē latitudinis, 12. digitorum continet. Secundum ieiunum: quoniam anatomistæ raro quicq̃ in ipso reperiunt propter plures meseraicas, quæ veniunt ad ipsum. Tertium ileon, i. gracile, qđ cōmune nomen sibi vsurpauit: & situs eorū est circa vmbilicum directe in anteriori parte vētris, maxime tamen sub vmbilico ad quatuor digitos, Tria vero sunt grossa paucas habentia tortositates propter meliorem

stercoris expulsionem iam sequestrati a chylo: quorū primū nominatū est monoculū profundū, in quo formatur stercus per residentia grossi, ac superfluitatū, & supnationē subtilis succosi: & situs ei9 est in hypochondrio dextro sub epate, & iuxta renē dextrū qui versus dorsum re sider locatus. Secundū vero colon: quoniam plurima colla habet, vt in ipso si quid residui chylosi fecibus cōmixtum remanserit, attractionem epatis adhuc non euadat: & processus eius est ab hypochondrio dextro transeundo sup epar & stomachum & splenē, descendendo p hypochondrium sinistrum vsq; ad locū renis sinistri: quod ideo factū est, vt plurima cholera possit delegari ad ipsum ab epate propter virtutem expulsiuā excitandā: & propter hoc cōtingit, vt epar & stomachus & splen frequenter eidem compatiuntur in passione colica, vel vē tris tūplicitate. Tertiū est longaon siue rectum: quoniam eius est directus & precipitosus descēsus a rene sinistro ad anū, propter quod contingit, vt in hora egesti onis puter homo quasi lapidem a stoma cho ad anū prācipitari, & eius anhelitū elongari: & hoc intestinū est om̃ium am plissimum & rectissimū amtractibus at que circumuolutionibus penitus priua tum, vt stercoris grossities, vel quātī as ipsum non opilet: & est in lōgitudine cō inens palmam vnā & semis vel circa il lud: propter quod & suppositoria tanta possunt per anum immitti.

De fluxu ventris omnium modorum. Cap. I.



Fluxus vētris causas & mo dos habet plurimos: quorū sufficientia & numerus plu rimo studio taliter potest de prāhēdi: ita vt & exiēs mu ratum & mēbrum, quod est causa exeu tis, & forma exeundi cum sua necessita

te totaliter comprāhendat. Omne igitur quod egreditur per secessum, est aliquid istorū triū: scilicet cibus, humor & sanies. Nam squamā vel cortices non egrediūtur, nisi ratione saniei corrodentis. Si igitur quod egreditur, est cibus siue chy lus, sic vocatur communi nomine liente ria. Si vero sit humor alius: a sanguine: sic vocatur diarria. Si sanguis vel sanies vel mixtū ex eis: sic nominatur dysente ria. Et quoniā sanguinis & saniei flux9 eadem sunt causae: quoniā ex sanguine corrupto alterato fit sanies: ideo ipsorū fluxus cōmune nomen retinuit: propter quod ait Hipp. 6. part. aphor. Si sanguis in ventrē, i. in locū extra venas quocūq; modo effusus fuerit, necesse est in sanie m conuerti: supple vel in virus, vel in aliā rem pessimā, si tempus ad hoc sufficiat. vnde versus. Cruda liē, simplexq; diar, cum sanguine dysent. Licet dysenteria proprijs sime loquendo, sit fluxus cū ex coriatione intestinorū. Signa lienteria sunt: quoniā cibus egreditur in eadē qua litate, in qua assumptus est: vel si altera tus & attractus est ad epar, est modicum valde: & quandoq; non egreditur cibus crudus, sed perfecte in stomacho digest9 quod chylus dicitur & est res albā, lenis, equalis: sicut pitfana non colata: & sic quādoq; egreditur chylus permixtus cū melancholia vel cholera vel flegmate: & tūc permutatur color eius ad subcitrinum vel viridē vel liuidū: & est vt plu rimū cū prostratione appetitus. Signa diarrię cōmunia sunt: quoniā quod egredi tur non est cibus, neq; chylus, sed flegma vel cholera vel melancholia vel mixtū ex eis & cibo cum prādominio humoris super cibum. Signa communia dysente rię sunt: quoniam quod egreditur, est san guis, vel sanies, vel virus, vel mixtū ex eis. Et si quid ex cibo vel humore fuerit cū eis, nomen non mutabit & est quādo que cū dolore in vētre, no, & quādoq;

de lienteria. Succedit em̃ agri
subalbida, inequalis et aquosa
adest aut tunc
quādoque

sine dolore. Dicamus autē sequenter de speciebus & causis eorum in speciali.

Methodus. Lienteria fit propter vnā quālibet ex causis. 12. Quarum prima est sumptio cibi peccantis in quali: vt cū est lubricus, sicut pruna cruda: vel fluidus, vt iura vel brodia & Coleta plurima: vel mollis, vt pingula, & vinctuosa: & signa eius apparēt ex relatiōe patientis. Et cura eius est abstinentia a talibus omnino: quoniā in omni morione corporis cū ceperit, &c. vt inquit Hip. 2. part. apho. Et vsus ciborum stypticorū cum declinatione ad calidum vel frigidum, prout dispositio requirit: sicut sunt carnes assæ, vel frixæ conditæ cum puluere piperis longi, carpobalsami, gallan gæ, cynamomi & croci, vel cum vino granatorū & berberis & sumach & agre sta. Bibat vinum stypticum vetus purū, in modica tamen quantitate: vel lympharum cū aqua extinctionis chalybis, vel aqua pluuiali vel aqua decoctionis myrrilli. Balneetur quandoque in aqua decoctionis balaustrarum, cupularum glandium, ros. mentæ, calamenti, mentastri, foliorum salicis, foliorum chama millæ, meliloti, pirorum ponticorum, mespilorum, malorum macianorū, cynamori rubi, & similia. Et post balneumumat drag. duas diagallangæ, vel diarrodon abbaris cum syrupo rosaceo, vel vino prædicto. Confortetur stomachus cum emplastro facto ex saluia, mēta, ro. absynthio, coctis in vino styptico & aqua pluuiali, vel succo plantaginis, & pistatis: perfecte, deinde expressis diligēter & actu calidis positis super stomachum cum reiteratione frequenti in ieiunio, postquam ceperit tepescere: quoniam tepida resoluūt robur ventris, vt dicit Galenus septimo de ingenio sanitatis. Et potest additus & mastix dissoluendo ea in vino rubeo ad ignem, & incorporando cum prædictis. Se-

cunda causa est sumptio cibi peccantis in quanto grauantis stomachum & debilitantis eius virtutem retentiua: sicut accidit illis, quorum appetitiua excedit digestiua: vt contingit in appetitu canino, & stomacho frigido sine materia. Et cura est minoratio cibi & potus, & labor & exercitiū in ieiunio, & mēsuratio cibi secundū quantitatem, qua nō superet vel soluat naturā. Et si læditur propter vehementiam appetitū,umat aliqd ex cibo vinctuoso, sicut butyrū recēs sine sale, et caro porcina recēs: & fiat oīa dicta ea. de appetitu canino. Tertia vero causa est multitudo effusiōis melancholiæ acetosæ vel ponticæ ad os stomachi: quare sua acuitate excitat virtutē expulsiuā, et sua prouocatione intēsina facit cibū superfluere. Et si gna eius sunt multitudo appetitus, sicut in causa secūda: Sed differunt, qm̄ in ista est mordicatio sine ardor fortis in ore stomachi ante cibū: et acetositas in ore: propter qd nō tolerat, quin cibumumat, et sedatio eorū post cibū vel potū rei vinctuosa. In alio autē appetitu canino nō est ardor stomachi, neq; acetositas oris, sed desiderium purū. Et in hac tertia causa, est multitudo egestiōis cum multitudine comestitionis, quæ (vt plurimum) est liuida vel plumbea propter permixtionē melancholiæ cum chylo. Quod si diebus aliquibus affellationes cōsuetas non habuerit: ilico grauabitur, & prostermitur appetitus. Et cura eius dicta est ea. de appetitu canino, quæ perficitur proprie duobus modis primo per rectificationē splenis cū flebotomia & purgatione & ventosatione: secundo per alterationem stomachi cum iuribus vinctuosis sumptis in ieiunio frequenter. Quod si superfluxerit ista solutio: requiritur tertio confortatio intestinorū cū cibis & clysteribus stypticis, vt dicitur infra de dysenteria: qm̄ forte melancholia ista mordificatione plurima corroderet intestina. Vnde Hippo. 4.

partii.apho. Dysenteria si a felle nigro in
choauerit, mortale. Nutriatur tamen car
nibus laudabilibus coctis cum myrtillis
& lactucis, conditis cum vino granato
rum vel berberis. Bibat vinum album
lymphatum, stypticum cum aqua pluui
ali, in qua extinctū sit ferrum vel lapis:
vtatur piris & citonjs assis mespilis, &
similibus ante cibum. Et scias, qđ in isto
fluxu requirit̃r sēpissima mōdificatio me
lancholia cū myrobalois indis, thymo,
sene, & epithymo: vt dicemus ca. de de
bilitate digestionis stomachi. parag. de
canone: quoniā euacuando causam con
fortat stomachum & intestina & restrin
gunt fluxum. Valet etiam ad hoc hiero
logodion dando ex ipso 3. f. in sero, cum
iurū dormitum, in aqua calida. Quarta
causa est motus laboriosus illico super ci
bum: quare concutitur ad latera stoma
chi, & debilitat eius retēriam: sicut ac
cidit viatoribus et athletis: propter quod
ait Gal. 6. de accidenti & morbo: qđ mo
tus laboriosus compedit in ieiunio ad re
solutionem superfluitatis, & ignitionem
calidi naturalis. Motus vero debilis &
modicus post cibum facit ad descensum
ipsius ad fundum stomachi. Et cura eius
est somnus & quies post comestionem:
quia si necesse fuerit moueri post cibum,
sit cibus modicus & stypticus, & potus
nullus, vel modic⁹ ex vino styptico. De
inde parum dormiat, & quiescat, & tunc
proficiatur, vel exercitetur. Et cum to
tus labor completus fuerit, faciē & ma
nus abluat cū aqua frigida. Deinde quie
scat, donec calor naturalis ad interiora
redierit: postea cibum copiosum & neces
sarium recipiat, & ibidē quiescat donec
perfecte digestio compleatur: vt scripsi
mus plenius capitulo de regimine sanita
tis. Quinta causa est potus plurimus cū
cibo, vel post cibum reddens ipsum flui
dum et penetratiuum per fundum stoma
chi, anteq̃ compleatur digestio prima, et

proprie potus aqua plurima. Cura eius
est cessatio a talibus, & cito dormire su
per cibum, vt flegma salsum, vel chole
ra sitim faciēs digeratur; & sitim tolera
re, & cum aqua frigida & aceto garga
rizare, prater quod aliquid ingluuiatur.
Sexta est error in ordine comedendi, vt
bigratia: vt si i vētre naturaliter lubrico
subtilia vinctuosa pramittantur, grossis
stypticis, vt brodia & holera pinguia as
lis vel frixis: quia natura primi cibi sapit
tota diatatio: vt dicit Galeñ, in ij. alimē
torum ca. de pomis: vel si fiat mora pluri
ma in sumēdo cibum: quia primus dige
retur, anteq̃ postremus assumatur: et tra
het eum post se ad intestina. Et cura eius
est pramittere in tali ventre styptica: vt
sunt cotonea, pira assa, vel carnes assa
vel frixa, vel pastilla & similia: neq̃ su
mere diuersa genera ciborū in eadē men
sa, sed duo ad plus: & bibere cū cibo suo
vinū rub. stypticum, sed in modica quan
titate. Completa vero digestione prima,
quod est hora vesperarum, vel circa id,
potest bibere haustum bonum vini albi,
clari, puri vlymphati parumper gratia
extinctionis & delationis. De speciebus
autem potus, & hora, & ordine bibendi
plene scripsimus ca. de siti. parag. de ca
none. Septima est catarrhus descendens
a capite ad stomachum per mery, id est
isophagum eius digestiua debilitans sua
frigidityte & retentiua deiciens sua lu
briciate. Vnde Hippo. 6. parti. aphorif.
Trauli a diarrria maxime capiunt lōga.
Et signa eius sunt: quia sit fluxus ventris
per somnum & resupinationem: deinde
retinetur vēter, dum perseuerat homo vi
gilans: & si in suis egestionibus apparer
flegma & spuma. Vnde Hippo. 7. part.
apho. Quibus cūq̃ egestionibus spumosa
fiunt: ijs a capite defluit flegma, & ege
stio lata liquida, sicut vaccarum cum ru
gitu & trullis plurimis. Et certius signum
est: quoniam aeger forte descensum fle

gmatis sentit per gulam, si fuerit studiosus. Et cura eius duobus perficitur modis. Primo per confortationem particulæ mandantis, quod fit cum syrupo de sticados dicto ea, de debilitate visus: & cū medicinis rubificantiis emplastratis super caput dictis cap. de cararho. & cap. de prisi: & cum vigilijs plurimis super cibum, & abstinentia a cibo plurimo vaporoso: & proprie circa noctem. Secundo per confortationem particulæ recipiētis, stomachi scilicet & intestinorum: quod fit cum euacuacione flegmatis cum pillulis cochlejs, vel medicina de turbith vel hierapicra Gale. vt diximus ibidē. Et post purgationes cum cōtinuo vsu electuarij de coroneis, vel de thure, quod ponemus infra de dysenteria: viter patiens potum vini plurimi & brodia: & vtatur cibus assis & puris & coroneis post cibum: Et sit eius cœna leuior prandio. In fine vero & postq̃ stomachus & cerebrū bene fuerint exsiccata: suffumigetur cum thure, & mastice omni sero, quando itur ad lectum: vt eadem mēbra stypticet, & confortet: sed ante purgationes hoc foret malum: quoniā materias inspissaret & eas euacuaciones prohiberet: quare hora illa fiant masticationes ex pipere & pyrethro, & sternutationes ex condisi, & gargasmata ex sinapi vel oxymelle composito: & vomitus post expurgationē cum aqua tepida, si sit possibile: & fricatio cum pectine vel panno aspero. Et sollicitandum est in cura eius fluxus, quoniā si fuerit de flegmate dulci, defectū nutritionis & hēcticam inducet. Si vero de flegmate salso, dysenteria perniciosam. Octaua causa est multitudo flegmatis congesti vel collecti in stomacho & intestinis. Et signa eius est egestio alba, & multitudo saliuæ & spuri, & naufex: & quandoq; superuenit vomitus flegmatis, & exitus eius cū cibo et egestione: & egestio eius non est plurimum altera-

ta, imo reperitur in ea qualitas ciborum & sitis paucitas. Si autem sit flegma modicum lubricans solū superficiem intestini & stomachi cum egestione, nō egreditur flegma, nec fit vomitus, sed apparet egestio ciborum oīno nō alteratorū, vel modicum, & illud ideo, quoniā sunt velocis exitus & descensionis, & proprie si infirmus moueatur fortiter super cibū, & sentitur grauitas cibi descendētis in ventre subito precipitati ad inferiora, sicut lapis cadens. Cura eius est vomitus cum oxymelle composito, vel aqua tepida decoctionis raphani, atriplicis & anethi, si sit possibile præmissa saturitate ex leguminibus & cepis & porris & carnibus vel piscibus plurimum salitis. Postea purge cum hierapicra Galeni, vel cum myrobalanis dictis de debilitate digestionis stomachi. parag. de casū. vel cum benedicta laxatiua, & proprie post digestionem flegmatis cū oxymelle composito, & aqua decoctionis petro, anisi, zinz. mastice galangæ. Nutriatur carnibus hœdorum vel pullorum assis vel elixis cum petro. conditis cum speciebus calidis aromaticis. Bibat vinum album, verus, clarum, forte & purum non calidum actū neq; tepidum, sed frigidum: quia omne actū frigidum secundum q̃ huiusmodi, est vomitus & fluxus restrictiuum: sed tepidum est vomitiuum, calidū vero secessiuum: vt patet in 3. regi. acutorū. Et si sitis, vel calor intēsus sit, potest dari aqua veri frigoris, & proprie pluuialis, vel in qua ferum est extinctum siue lapis. Vtatur frequenter ante cibū diatrion pipereon, vel diacatoniten cum speciebus, vel elect. de thure, quod infra dicemus de dysenteria: parum & sape comedat & bibat. Nona est debilitas virtutis retentiue stomachi & intestinorum, quæ mollificatio dicitur, facta in substantia ipsore, propter raritatem seu debilem nexū suæ substantiæ, vel laxitate cōplexionis vel humiditate cōplexi

Tractatus quartus

onis naturalis in eis. Et signa eius sunt oia signa octauæ modi, præter q̄ q̄ egestio nō est flegmatica: sed cibalis v̄ chylosa. Et cura ei⁹ est eadē cū illa: nisi q̄ nō est opus vomitu vel purgatiōe, sed alteratione et cōfortatione sola cū electuarijs stypticis p̄dictis, & emplastris & cerotis & balneis dictis ca. de debilitate digestionis stomachi, parag. de debilitate eius propter raritatem suæ substantiæ, & de causa humida, & empericis per totum. Decima est debilitas virtutis attractiua epatis: hæc autem debilitas fit vel ratione opilationis zime epatis vel meseraicarum. Et signū eius est egestio alba chylosa vel viridis propter cōmixtionē chyli cū materia alterata in miseraicis: & sentit̄ dolor grauius in hypochondrio dextro, & prosterius appetitus omnino, & mollescit corpus cū eo, & deficit in virtute, & minoratur sanguis eius in venis, & citrinatur color & albificatur, et apparet vri na subtilis citrina. Vel fit propter frigiditatem complexionis epatis. Et signa eius sunt eadem, præter q̄ vrina est alba grossa, vel subtilis aquosa: & sentit̄ grauitas i latere dextro sub costis. Vel fit propter debilitatē epatis in substantia sua: & tunc dicet̄ de eo infra de dysenteria. Et q̄cūq̄ duarū causarū fuerit, cura est cū syrupis, & electuarijs calidis subtilibus penetratiuis & deopilatiuis dictis ca. de opilatione epatis, parag. de causa frigida: Et confortatio post hoc cū emplastris stypticis dictis cap. de debilitate epatis, parag. de raritate suæ substantiæ: & positio ventosarum sine scarificatione super epar vice vna: & emplastrorum vice vlcera aperientium, & confortatūm epar, sicut est hoc. ℞. succi absynthij vel eupatorii ʒ. ʒ. vini albi odoriferi ʒ. iij. pul. ros. sandalorum spice. añ. ʒ. 2. armoniaci. ʒ. 2. dissoluatur armoniacū in vino ad ignem, & cum eo succo conficiatur res aliæ: & fiat emplastrum, vel epithyma actu calidū.

super epar frequēter ante cibum. Nutritur irribus carniū laudabiliū remota pinguedine, cōditis cum cynamomo & speciebus calidis penetratiuis: & carnibus pullos vel perdiciū elixis cū petro. & feniculo subtiliter contusis, & colatis, vt ei⁹ to penetrēt. Bibat vinū purū, albū, forte, parū quātītatis. Vitet oia dulcia, viscosa, vel vinctuosa, grossa, opilatiua: vt est mel, vinū rubē, pasta, & caro porcina. Vitet legumina, & olera omnia: quoniā sunt vel secessiua, vel opilatiua: quæ duo sunt maxime contraria præsentī curatiōni. Vnde prima est vlcus vel bohor in stomacho vel intestinis, super q̄ cibis transiens inducit mordicationem, & excitat ipsorum virtutē expulsiuā. Et signa eius sunt sensatio doloris in stomacho vel intestinis post cibū, qui nō reperiebat̄ ante cibum. Cumq̄ cibis descēderit per stomachum & intestina de loco ad locū, fit sedatio doloris in loco primo, & eius cōmotio in loco alio, donec descenderit ad anum: & q̄ in egestionē est virus subtile, & cibi egerunt oīno nō alterari aut parum: & putatur esse colica passio, cū non sit: quoniā est cum fluxu chylosa sanioso, & dolore post cibum tārū, quæ non sunt in colica. Et iuuatur a frigidis stypticis, ex quibus nocetur colica omnino. Et cura eius est, vt primo mūdificetur vlcus cum ripticis lenibus: sicut est aqua zuccari, vel hydromel in potu datum, v̄ dyltere factū ex aqua decoctionis lētiū exorticatorum, ordeī depilati colara, addito oleo ros. et sepo hircino, vel ceruino in colatura iniiciendo tepidum. Et post assellationem immediate purgerur quandoque cum reubarbari boni puluerisati ʒ. 2. infusi per sex horas in aqua feruenti decoctionis granorum myrti vel ros. vel sumach: Deinde colet̄, et addatur syrup. ro. ʒ. 2. vel iij. & detur rotum ante diem. Et scias, q̄ si bohor aut vlcus fuerit in stomacho vel intestinis superioribus, magis

conferunt exhibita per superius: Si vero in intestinis inferioribus, magis conferunt exhibita per inferius: quoniam virtus omnis medicinx in longa via resoluitur. Post mūdificationes plurimas vtatur cōsolidatiuis stypticis cōsolidatiuis, sicut est trochis. qui sic fit. ℞. boli armenici, dragaganti, mummiæ, masticis. añ. 3. f. & terantur omnia subtiliter, & incorporantur cum vino decoct. granorum myrti, vel plantaginis, vel coroneorū: & detur per os ante cibū cum syrupo ros, vel de cotone is: vel dissoluat in clysteri prædicto, & inijciatur. Vtatur zuccaro ros, vel diactoniten sine speciebus, vel rosata nouella, & similibus. Nutriatur carnibus assis vel coctis & conditis cum agresta & sumach & vitellis ouorū. Vtatur piris assis, vel coroneis ante cibum. Viter acetum: quoniam est mordax & corrosiuum, si plurimum ex ipso sumatur: vltus tamen eius moderatus appetitum excitat sine nocumento. Vtatur pro condimento suorum iurium hoc puluere. ℞. granorum myrti, spodi, añ. 3. 2. cynamomi, galangæ, cardamomi, zuccari. añ. 3. f. croci. 3. i. quia appetitum confortat, & digestionem & retētiūam. Bibat vinum rubeum, ponticum, stypticum lymphatum cū aqua ciceſ. vel in qua extinctus est lapis, vel ferrum, vel cum aqua decoctionis pitorum cydoniorum, myrtillorum, & plantaginis, & similibus. Vtatur saepe ante cibum puluere consolidatiuo & styptico: qui sic fit. ℞. granorū granatorū & proprie acetosorū, granorū pascularū, granorū myrti, spodi, gūmi arabici ass. & rosarū siccatū, mentæ siccæ, calamenti sicci, omnium. añ. terātur & cribellentur, & lambatur de ipso de mane omni die ex manu: vel misceat cū zuccaro ro. vel syru. ro. & oxyzacarro: qm̄ vltus cōsolidat, dolore mitigat, & retētiūā confortat. Duodecima est densitas corporis, & pororū strictitudo: quare nihil re-

soluitur ex eis, aut modicū. Culus signa sunt habitudo corporis carnosā cū duritie cutis, & grossitie musculorū: color faciei liuidus vel rubicūdus, paucitas sudoris, & multitudo quietis, dimissio exercitiij et laboris, & multitudo egestionis cū paucitate comestionis, & prostratione appetitus. Et isti sunt proni ad febres putridas, & apostemata pernicioſa propter retentionem superfluitatum secundā & tertiā digestiōis in mēbris. Et cura eius est exercitiū, et balneatio cū frictione ex farina fabarū et surfure, et sudatio in balneo ante cibum proposse: & abſtinentia a cibis grossis, viscolis: nisi fluxus excesserit &c.

Methodus. Diarrhia fit propter aliquā quinque causarū. Prima est sumptio medicinx effreniter laxantis, non cōsolatæ cū suis theriacis, vel nō mēsuratæ fm̄ proportionē conuenientē corpori: propter qd̄ post eductionē humorū, q̄s respicit a proprietate, educit humores alios p̄ter sanguinē. Quia si ad sanguinē virtus eius se extēderit, iā dysenteria inducit. Et signa eius sunt anxietas ægri plurima cū solutione vētris, quā non intēdebat æger vlt̄ medicus: propter quod ait Hip. 1. par. apho. In perturbationibus ventris &c. Et mutatio egestionum in colore & substantia ad humorē aliū a principio, et vehemētia sitis, & oīa dicta ca. de siti, parag. de canone. Et propter hoc dicit Ras. in diuisionibus, q̄ medici debent esse cōtēti ex medicinis solutiuis facilibus: cuiusmodi sunt myrobalani, viol. pruna, syrupus ros. & proprie ex ros. recentibus, & syrupus viol. & tamarind. & manna, & cassia si, & fumus terræ. Quod si necessitas fortiora postulet: sint cōtēti turbiti, aloë, epithymo, sene, polypodio, pulpa colloquintidæ agarico, scamonea cōsolata, quæ diagridion dicitur. Et pro medicinis vomitiuis sint contenti syrupus acetoso, & aceto & raphano & semine anethi & ruta. Quia si vomitu forti

Tractatus quartus

aliquantulum indigemus: sint contenti parum ex conditi & nuce vomica: deui- tent solutionem fortem: Et omnia facien- tia vel vomitū fortē cū medicina for- ti vel ignota: sicut sunt mezereon, & co- coguidiō, & species lacticianiorum & thy- mali, sicut est esula, anabula, carapucia, & elleborus niger & albus: quoniā faci- unt accidentia valde mala. Et subdit ibi dem: quod si vis tribuere alicui medici- nam aliquam, prius interroga, quā me- dicinam potare consueuerit, & sub qua docti, & quot a scellationes habere consue- uerit: vt significetur tibi, quod & quantū conueniat in potu tribuere. Et si tibi ne- cesse fuerit alicui medicinā tribuere, qui nūquam medicinam antea sumpsit vel nescit quam vel quantum sumpserit: da ei in primis medicinam leuē aut minore quātitatē ex forti: deinde acutē grada- tim, donec eius naturam cognoueris.

¶ Sciendū præterea: quod homines ma- cilentī naturaliter, cuiusmodi sunt melā- cholici & chol. sunt vt plurimum facile solubiles per medicinas: quia sunt rā- ræ texturæ & compositionis, & laxæ car- nis. Homines vero pingues carnosī natu- raliter, cuiusmodi sunt flegmatici, & san- guinei, sunt (vt plurimum) difficile solu- biles: & ideo fortiori medicina indigent: quoniam sunt densæ compositionis, & compactæ carnis, & strictas habent vi- as. Et cura eius est, vt ilico cū medicina cœperit superfluere: frangatur eius vir- tus, & lauentur intestina cum hausto ma- gno simul sumpto ex aqua ordeī, vel iu- re pulli antiqui. Et post hoc dentur stypti- ca in potu, ex quibus præcipuum est lac vstulatum cum lapide vel ferro ignito, donec fiat acetosum: & sicut est aq̄ pluui- alis, & aqua decoctionis masticeis, cyna- momi, lentii, myrtillorū, pisorū, mēspilo- rum, sorbarū, sumach, mili, risi, planra- ginis, & similiū: & nō colēt aq̄, sed dul- coretur cū zuccaro ros. veteri, & ligētur

extrema vehementer, primo adiutoria, deinde coxæ, & ponantur vētose siccæ su- per epas, stomachum, & splenē, & spatu- las cū suctione forti. Et detur in potu the- riaca recens, vel philoniū cū vino rubeo styptico, & ponatur in aere temperato: quoniam aer frigidus soluit ventrem cō- primendo materias ad inferiora: astuo- sus vero soluit virtutem. Confortetur ce- rebrum cū odoracionibus frigidis stypti- cis, vt sunt rosæ & succus granatorum, & acetum. Et si virtus toleret: fac ipsum sudare in balneo aquæ dulcis non stypti- cæ, vel in vapore aquæ calidæ sub pānis suis extractio capite, in quo fricetur cor- pus vehementer. Cumq̄ multum suda- uerit: da ei in potu styptica prædicta. Et epithymetur epas & cor cū aromaticis: sicut est aqua decoctiōis myrtillorū, san- dalorū, cāphoræ, masticeis, ros, & succus cydoniorū, & malorū macianorum: quo- niam redolentia cōfortant spiritus, & hu- mores ad se attrahunt. Et epithymetur stomachus & intestina cum aquis stypti- cis, sicut est aqua aluminis & sulphuris, & cydoniorū, & corticis granatorū, & corticis papaueris, & absynthij, & olei de mastice. Et oportet, vt omne eius nu- triens sit cibus stypticus actu frigidus in- frigidatus cum niue: sicut est agrestis, & vinum granatorum, & pira assa & cy- donia, & risum, & milium, & caro pullo- rum assorū, & tortellæ bis coctæ, & vinū rubeū pōticum. Et si potest sufferre bal- neum, ponātur manus & crura in aqua calida, & continue fricentur, & non po- nantur extrema in aqua frigida: quoniā materia repelleretur ad interiora. Et si omnia ista non suffecerint: da ei in potu hoc medicamen expertū: vt dicit Auic. in casū. seu capit. 4. de restringendo fluxu superfluo ex medicina. ℞. sem. nasturtij torrefacti ad ignem, donec partes acutæ resoluantur. 3. iij. deinde coquantur in la- cte aceto, vel ex quo extractū est bury-

rum per extinctionem lapidis vel chalybis, donec fuerit inspissatū: Est namq; vltimū in bonitate: & inducat somnus pro posse cum quiete & taciturnitate in loco obscuro: & si superuenerit sincopē, vel dispositio similis, confortetur cū potu vini puri fortis, vel parū lymphati grāa penerationis subite. Et si adhuc nihil p̄dicto rum omnino contulerit, da ei narcotica: quoniā sunt vltimę fortitudinis in restrin gendo fluxu, & inducendo somnū, q̄ dicētur infra de dysenteria: & sicut est hæc ℞. gummi arabi. assi vel torrefacti ad ignem, boli armenici, sanguinis dra. ter ræ sigillatæ, baccaꝝ lauri, masticis, añ. 3. 2. granorū granatorum, granorū passula rum. añ. 3. iij. opij. 3. i. terantur subtiliter, & incorporentur cū decuplo zuccari ros. vetustissimi, & in potu tribuat ex ipso frequenter. Et cauēdum est a narcoticis pro posse, nisi debilitas & fluxus & inso mnetas ægrum ad defectionem perdu xerint: vt dicitur, 12. de ingenio sanit. & tunc detur gradatim non subito & pro prie versus diem & vigilias: ne frigiditas & stupor vltimentur. Et plura restricti ua scripsimus capi. de sputo sang. Et sci as quod somnus & quies sunt de maxi me iuuantibus fluxum, cum superfluit.

Secunda causa est delegata plurimā chol. rub. ad intestina ex cisti fellis. Et si gna eius sunt: quia sit post se. acutas ad uerentes, aut post sumptionem medicina rum calidarū, vel vini veteris amari plu rim & omnium calefacientiu epar, & mul tiplicantiu in eo cho. & egestiōes citrinæ subtiles liquidæ mordicantes anū: & vri na subtilis ignita, & color faciei citrinus & proprie in albugine oculorum. Et soli citandū est in cura huiusmodi fluxus: quoniā vt plurimū pducit ad excoriatio nem intestinorū & dysenteriam pncio sam. vnde Hip. 7. part. aphor. In choleri co secessu dysenteria, malū. Et cura eius est, vt primo mundificentur intestina cū

medicina purgante cholera, & restrin gente fluxū: sicut est ista. ℞. myrobala norū citrinorū & emblicorū. añ. 3. i. myr tillo. acerosæ, portulacæ. añ. m. i. pistet, & bulliantur in. i. 3. aq̄, donec medietas consumatur: coletur, & in colatura adda tur. 3. i. zuccari ros. veteris, & bulliatur iterum, & coletur, & totum detur ante di em: hoc enim apozima est ex myrobala nis, qui a propiciate suæ speciei solunt cōprimendo. Sumat omni die in aurora oxyzaccharū cū aqua pluuiali, vel syru pum ros. cū aqua decoctionis plantagi nis, & myrtillorū. Sumat ante cibū vnū ex trochiscis de acetosa, quę sic fiunt. ℞. ros. rubearū, spodiū. ana. 3. 4. sumach, se. acetosę, vel herbę eius, balaustiarū, gūmi arabici, semini. portulacæ, granorum coriand. insusorū in aceto & torrefactorū añ. 3. 2. & f. opij. grana. 2. informētur tro chisci cum succo cydoniorū, vel vino granatorum vel berberis, quorum quilibet sit. 3. 2. & detur vnus cū syrupo, vel aqua p̄dicta. Vtatur rosata nouella mi xta cum triasand. Nutriatur cum lacte acetoso, in q̄ sint extincti lapides & fer rum, Vt at riso, & carnibus assis, vel pul mento ex farina similæ: vel cancris flu uialibus coctis in lacte. Bibat vinum ru beum stypticum, vel ponticum lymphatum cum aqua decoctionis granorū gra natorum, vel berberis, vel aqua pluui ali. Si autem medicinæ non videantur con ferre, & virtus continue debilitetur, & fluxus superuenerit: fiat cura blanditiua dā do in cibo iura carniū leuia, pinguia, vel cū vitellis ouorū inspissata, sæpe in die sed parū qualibet vice: vt cholera frā gaf, & dolor intestinorū mitigeť. Et fieri possunt clysteria dicta de liēteria, causa ta ex borho & vlcere in intestinis, & ro macho: & sic differatur mors, quantiū est possibile. Tertia causa est discursus hu morū & humiditatū a venis & membris corporis totius ad epar & intestina cali

Tractatus quartus

dorum vel frigidorū naturaliter vel symptomatice. Et signa eius in cōmuni sunt inanitio venarū, & cōsumptio corporis de die in diem cum febre: & si fiat vi natura, tunc supuenit tempore bono, puta in aprili, vel maio, vel septembri cū allevatione ægri post somnū, iuxta illud Hip. 1. part. aphor. In perturbationibus vētris & vomitib⁹, &c. Si vero fiat symptomace, signa contraria apparebūt. Si vero humor sit calidus: apparebit egestio subtilis, citrina, vel viridis cū adustione & mordicatione ani sine viscositate omnino, & prostratione appetitus cū vehemētia sitis, & amaritudine oris, & vrina est ignita subtilis: potest tamen esse turbida propter humorū agitatiōem. Si vero humor sit frigidus: signa contraria apparebunt, præter quod humor potest apparere citrin⁹ & viridis tā in causa calida quā frigida. Sed signa distinguētia quando sit ex cholera, & quādo ex flegmate, scripsimus ca. de vomitu. parag. de canone. Et cura eius, si sit de causa calida, est vt si fuerit vi naturę, nō restrin-gatur, nisi virtus debilitetur, & fluxus superfluat: sed regatur bona diæta nutritiua, & confortatiua: sicut sunt iura carniū laudabilium, & vinū album subtile aromaticū. Quod si superfluat, vel fuerit a principio symptomaticus, purge illico cū decoctiōe ex myrobalanis citrinis & embli. scripta in cura præcedenti proxima: vel cū decoctione facta ex 3. i. reub. & 3. i. myrobala. pistatorū & bullitorum in 3. 6. aquæ decoctionis myrtilli, donec medietas consumatur, colatis & dulcoratis cū zuccaro ro, sicut prius. Vt aut omni die ante cibum post purgationes trochi. de bolo dictis ca. de spūto sanguinis vel trochisc. de berber. dictis capit. de hydropis. parag. cura hydroptisis ascitis, mixtis cum zuccaro ros. veteri: & post illud bibat vinum rub. ponticū, in quo decocti sint myrtilli, vel sumach, vel berbe, vel

si sit cū se. bibat aquā cisternæ, vel aquā decoctionis earundē rerum. Confortetur stomachus, & intestina cū oleo mastici no, & myrtino, & ros. mixtis, & incorporatis cū cera sufficienti & cerotis dictis cap. de vomitu, & proprie de causa calida, & vnguentis dictis illic. Inducatur somnus pro posse, & quies: quoniā est maxime conferens in omni fluxu. Et dormiat super ventrem: quoniā per hoc retentiua & digestiua plurimū cōfortā ē. Quod si ista non contulerint: fiat vomitus cum syrupo acetoso & aqua decoctionis anethi præmissa repletionē ex leguminibus & oleribus nō acutis: quoniā cū sum humorū diuerret ad superiora. vnde Hip. 6. part. aphor. A diarria habita diuturna vomitus spontaneus superueniēs soluit diarriā: et proprie si vomitus nō sit difficilis vel laboriosus, aliter vero nequāq̃ potest fieri. Nutriatur si sit cū feb. rifo & faba fracta in modum risi, & pulmento facto cū farina aue næ & ordei vel faris & aqua pluuiali condita cū vitellis ouorum & puluere myrtillosum. Comedat quandoq̃ oua cocta in aceto, vsq; ad in-duratiōem sumēdo corū vitellos cū agresta vel vino granatorū. Comedat tortelas ex farina simile & vitellis ouorū & plantagine confectas, vel pultem ex mica similæ. Bibat vinū rubeū dulce, si intendis ad humorū multiplicatiōem vel vinū rub. stypticū, si intēdis ad fluxus restrictionem, lymphatum cū aqua pluuiali, vel aqua extinctiōis chalybis, vel aq̃ decoctionis mespilorum cydoniorum sorborum, pirorum, & similium. Si autem sit debilis, vel sine feb. nutriatur bonis carnibus assis vel fraxis pullorum & hoedorum, perdicum, auium phasianorū & non aquaticarum, &c. Bibat vinum p̃dictum purum: Er caroturturum proprie in hoc casu confert in cibo sumpta. Si autem sit de causa frigida flegmatica, iterum non restringatur, si fuerit natu

calis, donec coeperit superfluere: tunc restringatur. Si sit a principio symptomaticus, inducatur vomitus levis frequens cum oxymelle, & aqua decoctionis raphani & anethi præmissa saturitate ex le gumini bus & cepis bene salitis, si sit possibile: vel purgetur cū decoctione ex myrobalanis kebulis & emblicis dicta capitulo de debilitate digestionis stomachi. parag. de canone: quia soluendo flegma restringit ventrem. Vtatur sæpe dacitoniten cum speciebus vel sine speciebus, si sit cum febre: vel electuario de thure, quod dicemus infra capitulo de dysenteria. Nutriatur autem carnibus laudabilibus assis vel frixis cum petro, cōditis cū succo berberis, vel vino granatorum, vñ agresta, si cum feb. vel si sit sine fe. cum puluere cynamomi & cardamomi. Bibat vinum rubeū stypticum lymphatū cum aqua decoctionis herberis melsillo rum vel sorborum. Possit quandoq; comedere risum & lentes exorticas: quoniam cortex earum fecessius est, & medulla styptica, & fabas fractas conditas cum adipe renum caprarum. Et sollicitā dum est in cura fluxus proueniētis ab hac tertia causa: quoniam vt plurimum perducit corpus ad marasmū & hecticam. Confortetur ergo virtus retēntiua membrorum cum vngueto styptico facto ex oleo masticino, oleo ros. nardino, oleo myrrino, añ. mixtis & incorporatis cum cera sufficienti: vel cum ventosis succis positis super epar, stomachum & spatulas, & fricationibus lenibus perdurātib. in balneo aquæ dulcis repidæ sine mora in ipso: ne virtus resoluatur, & ligationibus extremorum, & flagellarionibus leuibus curis: donec rubescat, & emplastris attractiuis ex pice confectis. Quarta causa est propter crissim in febre continua vñ interpollata vi naturæ, vel symptomaticis. Et signa & cura habentur ex proxima causa prædicta. Quinta causa est tre-

na smon: Et signa eius sunt frequens appetitus afflandi cum modicitate egestionum, & ardore ani & longa on & oia quæ dicuntur in signis tena smonis.

Methodus. Dysenteria vt dictum est: est fluxus ventris cum sanguine, vel sanie, vel utroq; simul. Fit igitur propter aliquam. 14. causā. Prima est, exhuberantia & peccatum sanguinis in quanto super corpus totum, vt dicit Galenus. 6. de accidenti. Et signa eius sunt, quia corpus est sanguineum, carnosum, ocio gaudens & quiete, cibis vtens & potibus sanguinem generantibus. Et iste fluxus potest quandoq; accidere corpori mutilato: quoniam tūc virtus epatis sanguifica, quæ per naturam regitiuam totius fuit proportionata corpori toti nutriendo, fit excedens post aliquid cuius membri detractionem: quare sanguis ille periodice regurgitabit ad epar, & per meseraicas ad intestina, & quandoque expurgabit per vomitum, quandoque per secessum. Et cura eius est vt nō restringatur, nisi superfluat, & virtutem deiciat: quoniam est naturalis, & tunc restringatur cum ligatione extremorum forti, & positione ventosarum siccarum super epar, splenem, & spatulas: & vsu ciborum & potuum stypticorum prædictorum: & post restrictionem minorer cibum suum: & abstineat a vino omnino, vel bibat album lymphatum ad medium in parua quantitate, & addat in exercitio & labore, & sudet in ieiunio. Secunda causa est peccatum sanguinis in quali: propter quod membra fortia ipsum refutant & a se repellūt: cū sit inconueniens eorum nutritio. Nam si forent debilia, fierent inde hydropisis hypofarcha. Et signa eius sunt vrina alba, aqua vel lactea: & sang. qui egredit, est subalbidus, propter flegma plurimū permixtū & vniuersaliter oia signa epatis frigidi debilis i virtute sanguifica. Et cu

ra eius est rectificatio epatis frigidi dicta cap. de debilitate epatis. parag. de causa frigida. Tertia causa est debilitas epatis in sua substantia, quæ mala compositio, siue raritas texture nuncupatur: Et signa eius sunt egestio similis loturæ carnis cū dolore aliquo in hypochondrio dextro vel sine dolore: quoniam substantia epatis nō sentit: sicut neq; substantia splenis, vel renum, vel pulmonis: cum sint mēbra carnea. Et fit ista debilitas (vt plurimum) post febres acutas, vel chronicas, vī apothemata, vel sumptionem medicinarum calidarū vsu immoderato: propter quod resoluit virtus epatis & laxatur eius substantia: Et cura eius est dicta cap. de debilitate epatis. parag. de raritate suæ substantiæ. Quarta est opilatio epatis in parte eiꝝ gibbosa, vnde oriū vena kilis: propter quod sang. etiā laudabilis penetrare non potest ad mēbra, sed regurgitat per eius cōcauum ad intestina. Et signa eius sunt, dolor extrinsecus in hypochondrio dextro cū tumore, & duritie aliquali & egestio san. boni, puri, plurimi: & inanitio venarum de die in diem: & bonitas appetitus: nisi forte stomachus epati compatiatur. Et cura eius est, cura lientericæ, propter opilationem zimæ epatis, cū aperitiuis aromaticis dictis illic. Quinta causa est retentio menstruorum vel hæmorrhoidarum in corpore cōsuetō: quare san. collectus expellitur cum impetu per vomitū vel secessum. Et signa eius patent ex relatione infirmi. Et cura eius est, dimissio fluxus, donec coeperit superfluere, tunc restringatur, vel diuertatur cum ligationibus & fricationibus dictis ca. de vomitu. parag. de causa tertia & quarta. Sexta est ruptura alieuius venæ in intestinis magnæ vel parvæ. Et signa eius sunt egestio sang. puri, pauci vel multi cum dolore circa vmbilicum secundum q̄ situarum est intestinū, vt diximus in principio istius tractatus: vt plurimum: tamen iste san. est pau-

cus: quoniam sang. nutries intestina paucus est, & venæ graciles: cum sint membra solida nervosa. Et cura eius est, cura vomitus sanguinis dicta eodem ca. scilicet cap. de vlcere stomachi. Septima est hæmorrhoides intrinsecæ vel extrinsecæ. Et si sint extrinsecæ atq; apparentes, sensus id demonstrabit: Si vero latentes aut intrinsecæ, sentitur dolor intra anum: & accidit difficultas egerendi, & cum egestionē emanabit semp vel periodice sanguis aut humor malus, aut ante egestionem aut post. Et certius signum in hoc casu est, inuersatio longaonis cum ventosa magna absq; incisione, posita sup anū: & inspectio cū oculis super ipsum intestinū inuersatū, an in ipso sint ficus, an non: & an sint duræ, siccæ, an molles humidæ, emittētes sanguinē vel saniē, vel virus, vel materiam aliam. Et cura eius est cura hæmorrhoidarum, quæ dicitur. Octaua est tenasmon: Et signa eiꝝ sunt appetitus affellandi frequens cum egestionē modica vel nulla, & ardore in ano sine mordicatione. Et cura eius est, cura tenasmonis, quæ dicitur. Nona est sumptio medicinarū effreniter laxantis: quare post educationē humoris sui, quem respicit, educit humorem alium, & causat diarriam, & forte puenit virtus eius ad hoc, vt educat sanguinem, cum valde superfluit: quare & signa eius patent ex relatione infirmi: Et cura eius est, cura diarricæ factæ propter eandem causam: vt plene supra scriptū est. parag. de methodo diarricæ. Decima est casus vel percussio: Et signa eius patent ex relatione patientis: Et si sine vulnere sit: curatura principio cum flebotomia diuersa in brachio eiusdē lateris, et ligationibus extremorum, & proprie superiorum, & cibis & medicinis stypticis dictis cap. de spūto sang. & ca. de vlcere stomachi. Si vero sit cum vulnere, chirurgicis derelinquo. Undecima est crisis in feb. acutis vel non acutis, et proprie in-

synocha: vt dicitur 6. de accidenti: Et cura & signa dicta sunt supra de cura diarrie propter ciliū. ¶ Duodecima est debilitas virtutis attractiue, & nutritiue, membrorum: propter quod sanguinem sibi delegarum per venas neque apponunt, neque vniunt, neq; assimilant: quare grauās venas regurgitat ad suum fontem: vt dicitur 6. de accidenti, & deinde per meseraicas ad intestina. Et signa eius sunt: quia fit (vt plurimū) in corporibus heceticis & marasmati, & si ad sit, omni die inducit marasmū. Et crura eius est cura corporis hecetici cum omnibus, que faciunt ad corporis impinguationē: sicut est balneum aquæ dulcis tepidæ cū fricatione leui membrorum sine mora in ipso: ne corpus fiat euaporabile: & deportatio eius super lectum mollem, & cibatio ex lacte caprino vitularo, & pultribus ex farina similā, & iuribus carniū laudabilium inspissatis cum vitellis ouorū, & carnibus pullorum & hœdorū & perdicum & auium omnium paruarū mon ranarum: quoniam sunt leuis carnis & facili digestiōis: & emplastratio cutis cum pice: & potus vini rubei dulcis aromati ei puri vel lymphati cum aqua pluuiali: & omnibus, quæ dicuntur libro 2. cap. de impinguatione corporis macri, si deus vo luerit. Tredecima causa est eruptio apostematis saniosi vi naturæ vel symptomatis. Et signa eius sunt: quoniam antecellit se, acuta cum apostemate vel stomachi vel splenis, aut pleuretis, aut peripneumonia cum proprijs signis, & dolore forti, quæ tendebat continue ad conuersionem in saniem, neq; resolui poterant. Deinde aliqua dierum, & proprie 40. vñ circa id mitigatus est dolor, & febris, & remansit grauitas & induratio in loco, quæ significant apostema fore disruptum, & incipiūt sanies & sanguis appere in egestione. Et scias, qd si apostema fuerit in epate, vel stomacho, vel splene: tunc sa-

nies & sanguis egredient post exiturā in plurima quantitate. Si vero fuerit in membris, q non habet amplos meatus ad stomachum vel intestina, sicut est pectus et pulmo: tunc sanies & sanguis paulatim egredient p secessum. Et cura eius est, vt primo mundificetur intestina, & abluantur sanies, anteq; corrodant loca sup q currit, cū potu aquæ mellis vel zuccari rub. vel aqua ordeī, vel cū clysteri factio ex aqua mellis, in qua dissoluta sint duo vel tria vitella ouorū, & aliquid pinguedinis anseris vel gallinæ. Ex post istam mundificationem administrentur styptica consolidatiua per superius & inferius: Per superius quidē, sicut sunt trochisci de bolo dicti capitulo de spuro sang. mixti cū zucaro vel syrupo ros. vel vino rubeo styptico de citronijs & trochis. de berberis dicti cap. de hydropisī. Et trochis. de mumia dictis supra de curā heceticæ ppter bothor & vlcera in stomacho vel intestinis: Et sicut est electuariū de thure, quod sic fit. ℞. granorum passularum lib. 6. granorum myrti. 3. iij. balauftiæ de granatis, & de rubo. añ. 3. quinq; thuris, ligni vel fructus ramariscī, añ. 3. 4. ameos 3. 8. zuccari, quod sufficit: terātur omnia vt alcohol, & fiat electuarium cum zucaro: quoniam vterem stringit, vrinam prouocat, vlcera consolidat, & excoitationem prohibet: & sicut est zuccarum ros. vetus mixtum cum puluere gummi arabici alii, & holi armenici, & mastice, & sanguine draconis, & terra sigillata, & similibus. Nutriatur bonis carnib; elixis in aqua pluuiali, vel alius, & bibat vinum rubeum. stypticum lymphatum cum eadem aqua, vel decoctionis myrtillorum, vel sumach, vel berberis. Si autem sang. & sanies in plurima quantitate effluxerint, quæ debilitent infirmum: tunc detur omni hora ius carniū, & parum vini puri, & tortella panis alii cum ipso: Et odoret rosas & aromatica, vt nō

Tractatus quartus

cadat virtus: Et cum cœperit egestio minorari, & virtus cōfortari: tunc procedatur ad lauaria vice vna, et consolidatiua prædicta vice alia, vsq; ad perfectā exitura mundificationem & consolidationē. Per inferius vero cū clysteri incarnatiuo & consolidatiuo, quod sic fit. ℞. eupatoriij, myrrillorum, herbæ hircinæ, vel succi eius, qui hypocistidos nominatur glandium, vel corticis earum, añ. 3. i. risi abluti. 3. 2. coquatur in aqua perfectē, & in lib. 1. illius aquæ colata dissoluatur hoc medicamen. ℞. thuris, sang. draconis, cerusæ, lirargyr. ana. 3. vnam. opij. 3. vnum: terantur, & cribellentur, & milceantur cum duobus v℞ tribus vitellis ouorum, & addantur liquori prædicto: & totum simul iniiciatur tepidum cum clysteri post asellationē saniei. Et si vis: potes præmittere clystere mundificatiuum prædictum. Si autem sang. & sanies paulatim exierit cum egestione: tunc confiderra, per quam regionem natura mundificet apostema: quoniam si per vrinam, adiuvetur cum prouocantibus vrinam, dādo in potu aquam decoctionis dauci, seſſi. petro. cicoreæ, endiuiz, addito melle vel zuccaro propter dulcorationem. Et si per sputum: tunc detur aqua decoctionis hyſop, liquiritiæ, ireos, & modico croci, addito iterum modico melle vel zuccaro: qm̃ vnde cūq; natura cœperit & c. vt di. Hip. Et postq̃ sēſeris saniei minora ri in exitura: tūc procede ad mundificatiua vice vna, & incarnatiua vice alia: si cur iā dictū est. ¶ Decima quarta & vltima causa est corrosio intestinorū, & propriissime dyſenteria nūcupat. Fit autē ista corrosio, aut propter flegma salum, aut cholerā, aut sang. aduſtū, aut melācholiā aduſtam: & vel est recens sine putredine, vel antiqua ferens cum putredine. Et licet fieri possit in om̃i loco intestinorum, fit tamē maxime in intestino recto: quoniam cum sit infimum, plurimum mate-

ria per ipsum descēdit. Et signa eius communia sunt, egestio muscillaginosa cum dolore pungitiuo in ventre, & permixtio saniei vel sanguinis cum muscillagine: Signa vero eius propria sunt: quoniam si sit de flegmate salso, antecessit coityza & catarrhus: & est cū egestione flegmatica permixta cum sanguine vel sanie v℞ cum ambobus, viscosa sine multa acuitate, quæ pungat, sed cum multa ventositate, & non est cum ea sanies plurima: & color eius est albus, viscosus sine viriditate & citrinitate omnino: & si corpus fuisset pruriginosum, tunc hoc certius fuisset signum. Si vero sit de cho. apparet egestio citrina vel viridis subtilis sine viscositate om̃ino, cum ardore plurimo in ventre & angustia & siti. Si vero sit de sanguine aduſto, apparet egestio rubea, grossa, vel nigra, vel liuida. Si vero sit de melācholia aduſta, apparebit egestio nigra habens odorem aceti, quæ cum caedit super terram arenosam vel spongiosam bullit, & fugiunt ab ea muleæ, & est cum dolore in ventre & punctura affidua: Et ista causa nunquam potest esse recens, imo semper antiqua, vt dicit Rasus in diuisionibus. Et si excoriatio fuerit recens, est plus de sanguine quā de sanie: & forte egrediuntur squamæ albæ subtiles, latæ, quæ sunt cortices intestinorum. Et si sit corrosio in intestinis superioribus, dolor sentietur vt plurimum supra vmbilicum, vel sub eo, v℞ infra ad duos digitos directe in medio ṽtris: & in egestione apparebunt feces bene commixtæ sanguini & saniei propter longā viam. Et non egreditur egestio ilico super dolum, sed post horam Si vero in inferioribus sentietur dolor, vt plurimum sub pectine versus dorsum vel in altero latē quā sit dolor tenum, cum non sit: Et materiæ exeuntes apparebunt distinctæ, vel non bene commixtæ: & quando egestio egreditur sit punctura. Et scias, q̃ li

corrosio fuerit in intestinis superioribus, magis conferent exhibita per superius: vt syrapi, & pulueres, & trochisci, & similia electuaria. Si vero in inferioribus, conferant clysteria, & suppositoria liniuua. Cura dysenteriae cum corrosione intestinorum facta propter slegma falsum, est vt restringatur primo catarrhus, & rectificetur caput: vt scripsimus capitulo de catarrho, & cap. de ptisi. Post hoc clysterisetur frequenter cum clysteri mundificatio facto ex aqua decoctionis siclae, maluae, bis maluae, & aliquantulo mellis: & iniiciatur tepidum bis vel ter in die semper immediate post assellationem.

Vel cum clysteri facto ex aqua decoctionis siclae, polypodij, fumiterrae, ordeï, & mellis, sumendo de colatura illius aquae lib. vnam, vel lib. vnam & semis, & addendo olei masticeini, vel chamomillini. vn cias tres, & iterum reducendo ad ignem lentum breui hora, & tepidum iniiciendo. Et non debet in corrosione quacunque intestinorum iniici clystere calidum: quoniam calidi per se est mordicare & corrodere, sed vel frigidum, vel tepidum. Et post ista iniiciantur successiue clysteria styptica consolidatiua facta ex aqua decoctionis sumach, myrtillorum, & rosae plantaginis, boli armenici: coletur, & dissoluatur in ea puluis de bolo armenico qui iam est dictus: Vel trochisci de mastice dicti cap. de sputo sanguinis, & vitelli duorum ouorum vel trium, & aliquid de adipe renum caprarum vel hœdorum, et modicum vini rubei pontici: Vel clysteria facta ex vino rubeo styptico decoctionis myrtillorum, in cuius colatura dissoluantur vitelli ouorum, vel adipēs renum caprarum: & hoc etiam plurimum confert in tenasmo. Sumat in aurora vinum ex trochiscis eisdem cum syrupo rosae, vel ex zuccaro & aqua decoctionis myrtillorum, mespilorum, & similia: vel puluerem boli armenici, qui sic fit,

℞. psillij assii dragmas viginti. Nā quando non est torrefactum psillium, lubrificatiuum est, propter eius partes humidās, quae resoluuntur per assationem arnoglossae, dragmas decem, gummi arabici, boli armenici, añ. 3. 20. semi. portulacae, seminis myrti. añ. dragmas decem, terantur, & cribellentur, & dentur ex eo in aurora, et ante coenam. 3. iij. cum aqua decoctionis cydoniorum, vel mespilorum, vel sumach vel cum vino rub. styptico, vel cum aqua decoctionis myrtilli, ameos amomi, anisi. Nutriatur iste dysentericus & omnis alter, qui est cum corrosione ex riso cocto in aqua pluuiali, vel lacte vstularato, vel aqua chalyda condito cum adipe renum caprarum, vel hœdorum, et vitellis ouorum. Comedat etiam lac recens caprae, vel asinae, in quo ferrum vel lapis est extinctus, & pulmentum ex farina similiae conditum cum eodem lacte & pullos assos vel frigos potius, q̄ elixos, & fabam fractam, & extrema porcorum & vitulorum, & pira & cydonia assa ante cibum assumpra: & sit cibus eius panis azymus de simila coëctus: Et in cibo suo diminuat sal proposse. Sic cibus eius actus frigidus, vel tepidus, nō calidus. Et scias, q̄ ex pinguedinibus & oleis nullum confert pro condimento ciborum suorum, nisi si adeps renum caprarum, vel hœdorum adulatorum: quoniam omne aliud vinctuosum est humidum secessiuum. Vtatur pro sapore succo cydoniorum, vſ granatorum, vel berberis, vel pisorum, vel agresta vel sorbis inspissatis cum vitellis ouorum. Accutum deuret tã in cibis q̄ medicinis: quoniam corrosiuum est, sed in fluxu sine corrosione non obesset. Vtatur pro speciebus suis puluere cynamomi, cardamomi, myrtillorum, & croci: quoniam species acutae sunt mordificatiue, vt piper, grana paradisi, et similia. Comedat etiam vitella ouorum coctorum in aceto visq̄ ad indurationem, et carnes autem syluestrium nō aq̄ricas, et tortellase ex

Tractatus quartus

farina similæ, & vitellis ouerꝫ cōfectas. Bibat vinum rubrum grossum dulce, si sit cum extenuatione corporis, vel ponticum, si sit cum fluxu plurimo lymphatum cū aqua styptica prædicta. Et si vir tus constaret: posset purgari quādoqꝫ cū decoctio, myrobalanorum Kēbulorum, & emblicorum dicta capit, de debilitate digestiōis stomachi, parag. canones: quoniam soluendo materias stringit ventrē. Cura dysentericæ cum corrosione propter cholera, est vt mundificetur sapius in die intestina cum clysteri ablutio factio ex aqua decoctionis ordeī depillati, ros. viol. maluæ, bismaluæ, colata & iterum bullita cum oleo ros. vel viol. vel cum clysteri factio ex aqua mellis, vel vitellis ouorum, & adipe renuū caprarum, vel ceco hircino, vt dixim⁹: et sint tepida ver gentia ad frigidum, quando inijciuntur atqꝫ immediate sequantur clysteria styptica consolidatiua facta ex aqua decoctionis myrtillorum, plantaginis, ros. siccarum, fabarum, sumach, lenium excoctatarum balaustrarum, cupularum glādiarum, risi, & similia cum aqua colata misceatur sepum hircinū, vel pul. boli armen. præd. Si autem ista non conferant, mundificetur cum decoct. myrobalanor. citrinorum & emblic. & myrtorum ac berberis, dicta capi, de debilitate digestiōis stomachi, parag. canon. dando ante diem: quoniam euacuādo cholera stringit ventrem. Et fiant omnia dicta de cura lentericæ propter vlcera & bothor in intestinis. In diætā fiat sicut in flegmate salso, sed vinum negetur, vel lymphetur vltra medietatem cum aqua pluuiāli, vel aquis prædictis. Cura dysentericæ cum corrosione propter sanguinem adu sum, est eadem cum illa, quæ ex cholera adusta, sed minoris periculi, & leuioribus indiget medicinis. Cura eius, quæ ex melancholia adusta est, est vt omni die in auroraumat syrupum ro. vel de nenupha

re cum aqua pluuiāli decoctionis myrtillorum vel ros. vel sumach, vel sem. portulacæ, se. ameos, & papaueris, vel pirorum & cydoniorum & mespilorum & sorborum. Et omni die bis vel ter inijciantur clysteria mundificatiua prædicta immediate post assellationem: ad quæ immediate sequantur styptica facta ex aqua decoctionis eupatorii, succi barba hircinæ, acaciæ, risi abluti, glandium, corticū granatorum, corticum papaueris: in quibus post colaturam dissoluantur duo vitelli ouerꝫ vel tres: Et addat aliqd de puluere isto. ℞. thuris, san. dra. cerusæ litarg. añ. 3. i. opij. 3. f. & tepidū in iijciat. Et imponantur vicissim clysteria modo mūndificatiua mō cōfortatiua pluribus vicibus omni die. Si autē ista non conferret: neqꝫ per ea fluxus & dolor vētris minueretur: purgetur cum decoctione, quæ. ℞. senæ, epithymi, myrobalanorum indorū, añ. 3. f. anisi, ameos, añ. 3. 2. pistentur grosso modo, & bulliantur in. 3. 6. aquæ pluuiālis, donec medietas consumatur: coletur & in colatura addatur pulueris reubarbari boni. 3. i. & detur totū ante diem: Et potest addi aliquid zuccari ros. propter delectationem in colatura. In diætā fiat, sicut superius, præter quod magis euitandum est acetum in cibis & medicinis, q̃ in quocumqꝫ alio fluxu: quoniam addit in causa & dolore vehementi, sed frequenter in eis aqua extinctionis chalybis, & aqua ablutionis scoriz ferri, & omnia respicientia splenem rectificantia melanchol. Et sollicitudinem est in cura istius fluxus a principio, quoniam si antiquet, nō sanatur propter causæ inobedientiam, & corrosionem fortem, & doloris intensiorem.

Emperica. Vinum stypticum delectabile conueniens in omni fluxu, sic fit. ℞. vini rubei pōtici lib. 2. zuccari ro. veteris. 3. 4. granorū myrtilli & gariofil: & cinamo. grosso modo: & oia

diffoluantur in vino, & bulliatur, donec medietas consumatur: coletur, & reseruetur. Detur ex eo ante cibū & cū cibo & in aurora loco syrupi, potest dari actu frigidum. Item electuarium restrictiū, ℞. sumach, berberis, granorū granatorum, boli armen. gūmi arabici, acatiz hypocisti dos. añ. 3. 2. lapidis hæmati. coralli albi & rub. sandal. alb. & rub. añ. 3. 3. f. cyna momi. 3. 4. amyli: symphyti: ros. sicca: myrtillorum, psillij, corlandij torrefacti, lentiū ex corticatarum. añ. 3. iij. masticiis, olibani, dragaganti, añ. 3. 1. balaustiarū psidiz, se. cydoniorum mundatorū. ana. 3. 2. se. papaueris albi, se. portulacę, se. ro. se. plantaginis, corrigiolę añ. 3. 1. mandragorę. 3. 3. costi, storacis, calamitę, spodij, solij gariofil. foliorū lauri, arillorū. ana. 3. 3. sanguinis drac. terrę, sigillatę, gallarum canabę, fisticelli. añ. 3. 3. mentę, bistortę, piroę ponticorę, sorborum, cydoniorū, melsilorū. añ. 3. 1. zuccari ros. qđ sufficit. Detur ex eo ante cibū bis in die cum vino rubeo styptico, vel aqua pluuiali. Est namq; fere continens omnia styptica, & ventris restrictiua. Pillulę præterea stypticę contra omnē fluxum ex quacūq; causa, sic sunt. ℞. myrtillorū balaustiarū, psidiz, symphyti, sang. dra. boli. ar. acatiz, hypocistid. ros. sumachi, croci, galliz, mul. gallarum, spodij, cynamomi, macis, gummi arabici, dragaganti. añ. 3. 2. opij thebaici. 3. 3. Confice cum succo plantaginis, vel lentici, vel bistortę, & da. 12. vel 9. cum aqua pluuiali, vel aqua ros. in causa calida, vel cū vino in frigida sero cum itur ad lectum: vel fiat tragea ex eis cū zuccaro, & detur cum vino rubeo pontico, vel aqua plantaginis, vel incorporentur cum zuccaro ros. veteri: & fiat cōfectio. Et si vis somnū prouocare: adde se. papaueris, se. iusquiamis. añ. 3. 2. vel opij. 3. 1. & admixtetur, sicut prius. Et iterū cortex salicis cōbustus, & in potu datus cum aqua

ustulata prohibet oēm fluxū corrosiū, quapropter cōsolidat vlcera, quādo spargitur super ea. Itē syrupus myrtinus conferens omni fluxui secundum Hebe. sic fit. ℞. granorū myrti lib. 2. malorū cydoniorū lib. 1. sumach, acatiz, añ. 3. 3. ros. 3. 2. hypoc. iij. mastie. 3. 4. decoquantē oia in aqua pluuiali: & post colaturā fiat syrupus cū lib. 3. zuccari, & lib. 1. mellis: de ē ex eo. 3. 1. vel 2. cū aqua decoctionis plantaginis in aurora & ante cenam: quoniā humorum ebullitionē sedat, & intestina confortat. Itē trochisci de Karabe secundū eūdē. ℞. carabę. 3. 8. cornucervi vsti, coralli vsti, tragaganti, acatiz, hypocistidos, balaustij, masticiis, lacce, se. papaueris nigri assati. ana. 3. iij. thuris, croci, opij, añ. 3. 2. fiant trochisci cū muscillagine psillij: quorū quilibet ponderet. 3. 1. detur vnus post mediā noctē cū aqua decoctionis plantaginis, vt ante cenā. Eodem modo plurimū conferunt isti trochisci in fluxu menstruorū, præmissis purgationibus, & remedijs vniuersalibus, quoniam humores inspissant, & vias cōstringunt. Itē clystere styptico. ℞. aquę ros. aquę decoctionis plantaginis, ros. siccarum, bistortę consolidę maioris, myrti, balaustiz, cupularū glandiū. ana. lib. 3. distemperentur in ea dum est calida, duo vitelli ouorū, & pul. boli armen. terrę sigillatę, sanguinis draconis. añ. 3. 1. & f. & tepidum iniiciatur. Itē clystere factū ex vino rubeo styptico decoc. cōsolidę maioris, & casei antiqui non pinguis incisi subtilissimo, & bullito vsq; ad cōsumptionem medietatis: postea colato & inspissato cū vitellis ouorū & pulueribus prædictis. Itē in omni fluxu ventris sine excoiatione, confortet hoc medicamē. Ellixentur fabę & plantago, & maiorana, & rubus in aqua & aceto, præterea exprimantur, & pistentur & incorporentur cū succo plantaginis, vel aqua distillatidis: & fiat emplastrū super stomachum &

Tractatus quartus

venire actu calidū, & recipiatur vapor aque eiusdem per anum: quoniam fluxū ventris, & vomitum stringit. Sed in causa frigida possunt eadem res post elixationem & pistationem incorporari cum aqua vitæ actu calida: sicut prius. Si autē vis ipsum fortificare: adde balaustias, rosas, absinthium, masticem, mentam, cydonia, pira, myrtill, bdellium: thus, gallas, glandes, cortices quercus, & similia: vel fiat ex aqua decoctionis eorundem encathisma, si virtus sit fortis: vel fomentatio cum lana & spongia infusa in aqua decoctionis earūdem rerum, quæ aliquantulum expressa, reiterentur frequenter actu calida vel frigida super ventrem ante cibum. Item in fluxu recenti & modico, & fluxu puerorum sufficit dare in cibo tortellas factas ex vitellis ouorum & farina similæ, & pulvere plātaginis, omnibus adinuicem incorporatis perfecte: vel pullos ascos conditos cū cera & sepo hircino: & prohibeantur a potu superfluo pro posse: & bibant vinū rubeum ponticum mixtum cum succo, vel aqua plantaginis, vel in qua ferrum, vel lapides sint extincti.

Canones. Scias, q̄ in omni fluxu ventris medicum oportet intendere ad tria: Primo ad materiæ peccantis euacuationem: Secundo ad ventris restrictionem per hypptica prædicta, & ad epatis & stomachi confortationē per aromaticā aperitiuā dictā capitū suis: Tertio ad mēbrorū impinguationē, & prohibitionē a marasmo: qd̄ fit p̄ cibos viscosos: vt sunt cancri fluuiales, extrema porcorū, vinum rubeum, si nō prohibeat opilatio epatis & balneum aquæ dulcis sine mora in ipso & inunctio dorsi post ipsum cum butyro recenti, & populeon simul mixtis: Et vsus electuarius restauratiuorum ex ranis & limacijs & torticis, quæ dicuntur libro secundo de heceticis. Et notabile restauratiuum est hoc: scili-

cet lac recens calidum in potu datum per se, vel cum mica panis & zuccaro: Sed non debet dari, nisi fluxu cessante: quia fluxum augmentaret propter eius partes serosas, & inflammationem humorum excitaret propter eius partes butyrosas: cum omne vinctuosum sit facile inflammabile propter pabulum caliditatis innatæ in materia oleagena: vt dicitur in alia scientia. Vnde Hippocrates ait quinta particula aphorismorum. Lac dare caput dolentibus malum: verum tamen nocumenta rectificari possunt per vstulationem lactis cum lapide vel ferro ignito frequenter in ipso extincto: quoniam consumuntur partes prædictæ, remanebit pars tantum caseosa. ¶ Scire tamen debes, q̄ lactis diuersa sunt genera, similiter & virtutes. Nam lac camelarum, & propriæ foetarum, id est parui propinquarum, est omnium calidissimū: propter quod habet exopilare epas & splenem: vt ponit Auic. 3. cañ. señ. 14. Sed lac asininū est omnium subtilissimū & aquosissimū: propter quod vētrem lubricat sine inflāmatioē. Et ideo Hipp. 3. regi. acutorū: præcipit ipsum dari in causone pro medicina laxatiua. Sed lac muliebre est omnium conuenientissimū corpoti nostro nutriendo, propter similitudinem: post hoc caprinū, & propriæ capræ pascētis bonas herbas: quia est mediocriter inter grossum & subtile: sed lac ouinum est omnium grossissimū: idcirco de facili caseatur in stomacho, si nō cum melle vel zuccaro sumatur: Sed lac vaccinū est omnium vinctuosissimū, & plures habet partes butyrosas. Ex quibus apparet, q̄ in fluxu ventris non est conueniens lac, nisi caprinū, v̄ muliebre, si fastidium nō prohiberet. Item sciendum, q̄ somnifera sunt necessaria in fluxu ventris calido, et propriæ chronico p̄durante: qm̄ somnus est maximū remediū omnis fluxus, sicut & quies, & propriæ in loco obscuro tēpa

rato. Medicinē p̄terea laxatiue meliores in fluxu per superius vel inferius curādo sunt myrobalani secundū oēs ei⁹ species: qm̄ solūt cōprimendo: vt docuimus ca. de debilitate digestiōis stomachi. para: cañ. sicut ecōuerso in stypticitate vētris, vel menstruorū retēsiōne, vel soda stomachica sunt deteriores, & in fe. putrid. qm̄ relinquēdo stricturā vētris augmentār p̄dictas passiones. Recordare etiā q̄ sicut in ca. de vomitu monuimus: Nullus est fluxus ilico, sed gradatim restringēdus. Incipiendū igit̄ primo a cōstrictiōis debilib⁹, et ad fortiora paulatim tendendū. Ne forte materia retenta in vētre torsiōes inducat, vel ad mēbra nobilia rapiat: & p̄ cōsequēs occasio maiorū passionū. Nam si regurgitaret ad epat, opilationem vel hydropsim, vlt̄ apostema produceret: Si ad cor vel os stomachi, syncopim: si ad cerebrū, frenesim vlt̄ subeth: Si ad matricē: matricis induceret suffocationē: vt dicitur Ait. 3. cañ. 14. ca. de causis flux⁹ epatis circa finē. Attendendū etiā, q̄ fluxus ventris, & proprie lientericus, quandoq̄ vomitu curatur propter diuersionem: sed hoc solum verum intelligo in cholerico, & adhuc minus in melancholico. Vnde Hippocrates quartā particula aphorismorum. Quibus ventres sunt lienterici, hyeme superius medicari malum. Adhuc autem, vt melius prognosticare possimus, aliqua de humorum distinctiōne secundum ipsorum substantiam & colorem sunt differenda. Vbi sciendum q̄ massa sanguinea genita in epate & cōtēta in venis, quatuor humoribus specie differētib⁹ integrat̄, scilicet sanguine, cholera, flegmate, & melācholia. Nam in omni decoctione alicuius liquoris heretogenij h̄e quatuor substantiæ generant̄: quoniā eius temperata, quam temperatus calor decoquit, fit sanguineus, cuius color est rubeus, clarus vt purpura, neq̄ grossus neq̄ subtilis, neq̄ viscosus, neq̄

fluidus, sed medius inter eos. Secunda vero pars grossa in fundo residens terrea, fit melācholia (cuius color est niger vel plūbeus) cinericia, fixa, nō liquida. Cui parti grossiæ vel accidit adustio inspissans, & hoc est vt plurimū: vel frigiditas congelans, & hoc vt in paucioribus: propter quod sapius fit in nobis melancholia nō naturalis tam per adustionem q̄ congelationem. Vnde 6. secundo de complexiōibus ait. Sæpius potest in corporibus nostris reperiri calidum adurens, q̄ frigidum congelas, propter frigidum esse naturæ inimicū, calid. amicū. Iccirco raro generatur in nobis flegma vicinum vlt̄ gypseum, vt plurimū aut phlegma salsum. Et quādo fit, non fit in epate nec venis: qm̄ natura nō sustinet tām frigiditatem in mēbris nobilib⁹, sed fit extra venas in locis ignobilibus, scilicet intestinis: vt Galeñ. fatetur de seipso, primo de complexi. & ad sensum apparet in passiōibus cholicis. Ex quo patet, q̄ plures passiones melancholicæ fiunt a melācholia adusta q̄ congelata, vt est cancer, lepra, fluxus ventris et similes. Cum om̄is melancholia sit per se frigida: cum sit de substantia grossa, terrea: cuius subtile vntuosum exhalauit. Illa tamen, quæ per adustionem generat̄ acuta caliditate plurima nitrosa participat per accidens, scilicet ratione impressionis, quam ab adustione recepit: sicut contingit in cinere & lixiuio. Et ideo eius passiones curant̄ per frigida lenitiua, sicut passiones de cholera. Tertia vero pars, quæ est subtilis, æthereā, facile inflammabilis, fit cholera: cuius color est citrinus, igneus vel viridis adustus cum amaritudine & subtilitate suæ substantiæ, qui prasinus vel zimiriinus appellat̄, qui est venenosior citrino. Quarta vero pars est viscosa, mucillaginosa, aquosa, quæ in flegma conuertitur, quam calor agens elaborare non potuit nec subtilitate: cuius color est albus p̄

Tractatus quartus

se vel pallidus, & si quādoq; reperitur citrinus vel viridis, hoc non est, nisi per remanentiam qualitatis symbolæ cibi vel potus, ex quibus factum est, vt contingit post esum olerum, fructuum, vel pirorū imperfecte digestorū in stomacho & in intestinis. Propter qd etiā eius substantia nunq̄ est cum tali colore subtilis, sed viscosa, & p hoc distinguitur a cholera. Ex quibus omnibus medicus in duobus dirigitur: Primo in cognitione quatuor humorū exeuntium in fluxu ventris. Secundo in cognitione modorū, quibus prædicti humores in nobis generantur. Quoniā vel generatur a calido tantū, vt sanguis & cholera: vel a frigido tantum, vt flegma, vel a frigido & calido, vt melancholia. Quapropter sanguis & cholera sunt per se calidi & flegma omne per se frigidū, præter flegma salsum, quod est calidū ratione cholerae ad mixtā, vel ratione adustionis sibi per accidens aduenientis. Sicut melancholia est inter hæc diuersa, vt dictum est.

Prognosticatio. Si in cura fluxus ventris ex quacunq; causa, imo in cura morbi cuiuscunq; remedia rationabiliter exhibita, non contulerint, morbi estenitātē, & forte perniciē minatur. Quia ait Galeñ. in commento illius apho. 2. part. In quo morbo somnus &c. Item in omni fluxu ventris spontaneo vel artifi. & proprie diarrico diuersitas coloris & substantiæ in egestionibus bonum: quoniā signat mundificationem corporis a diuersis generibus superfuitatū humoralium, supposito, tamē q fluxus nō superfluat, & virtus bene toleret & præcesserint signa digestionis perfectæ: Et si sit in febre, & egestionem non mutetur ad colorem simpliciter malum, sicut est niger: vel substantiam simpliciter malam, sicut est sang. & cortices membrorum spermaticorum, & adeps membrorum carnisformium, Et sic intellige illum aphorismū

secundæ particulæ. In ventris fluxibus mutationes egestionum iuuat, si non ad malum transmutetur: & cum ipso concord. ille aphorismus quartæ parti. Egestionem nigrā, vel quasi sanguis sponte veniētes & cum febre, & sine febre, pessimæ: Et quantocunq; plures colores fuerint, magis malum: cum farmaco vero melius. Item in febribus acutis & chronicis fluxus ventris niger, vel vomitus superueniens ante signa digestionis perfectæ, & per consequens in principio vel augmento, mortale: quoniam peccatum materiæ in quanto & quali cum virtutis debilitate pfiguratur. Et sic intellige illū apho. tertie parti. Egritudinibus quibuscunq; incipientibus, si cholera nigra aut sursum aut deorsum exierit, mortale: Similiter et illum ibidem. Quibuscunq; egritudinibus acutis aut multi tēporis, aut abortibus aut aliter extenuatis fel nigrum exierit, aut quasi san. niger, sequenti die morietur. Item idem in eodem dysenteria si a felle nigro inchoauerit, mortale. Item ibidem. Si dysenteria iam habita nigre egestionem, vt intestinorum carnes, id est cortices albæ squamosæ egerantur, mortale. Item diarria cholericā quādoq; mutatur in sodam calidā cū surditate propter raptum cholerae sursum, & quandoque econuerso: sed tamē conuersio est melior. Vnde Hippo. ibidem. Quibuscunq; fel leæ egestionem sunt, surditate superueniente quiescunt, & quibuscunq; surditas inest &c. Item post fluxū diuturnū spasmus aut singultus superueniēs, mortale: quoniam spasmus de inanitione significat, qui nequaquā curari potest. Vnde Hippo. part. 4. apho. Spasmus & singultus post nimiam inanitionē, malum. Item Hippo. 6. part. apho. Trauli a diarria maxime capiuntur longa, scilicet propter humiditates linguæ & cerebrī fluētes ad stomachum & intestina: sicut em in lingua cauant balbutiem, ita in intestinis mollis-

apho. 14
In pph
nisi
mutatis
apho. 92

22
quarta

23

24
26

27
28
29

cationem, et in stomacho eruditur. Item in fluxu ventris, & proprie lenterico vel diarrico vomitus spontaneus, & sine auxilio medici superueniens, salubre: quoniam naturæ confortationem, & fluxus diuersionē demonstrat. Vnde Hip. 6. par. apho. A diarria habito diuturna vomitus spontaneus superueniens soluit diarriā. Istud tamen aliqui amplificāt ad vomitum artificiosum, & proprie si causa sit cholericā, vel flegmā subtile. Item fluxus ventris perdurans, & proprie sanguineus hydropisim minatur propter epatis infrigidationē, vel hecticā propter membrorum inanitionem. Conetur ergo medicus hora conualescentiæ talibus periculis obuiare. Item si in processu et perdurante lenterici superuenit eructuatio acetosa frequens, bonum: quoniam virtutis retenticiæ & digesticiæ stomachi fortis, significat: sed si in primo superuenerit, fortificationem lenterici præfigurat. Nam sicut in ea, de vomitu notauimus, parag. Canoñ, sapor acetosus est duplex, vnus præcedit digestionem, & caliditatem perfectam: & iste significat digestionem mox sequentē, & per consequens est boni nuncius. Alter est, qui sequitur caliditatis exhalationē, & iste significat putrefactionem futuram, & per consequens corruptionē. Vnde Hip. 6. partic. apho. In diuturnis lentericis oxyremia superueniens prius non existens, signum bonum. Item Hippo. 4. partic. apho. Mulieri in vtero habenti si venter multum fluat, suspectio est abortiendi. Idem in eodem. Sanguine multo fluente, spasmus innatus, aut singultus, malum signū & mortale, siue sit fluxus ventris, siue mēstruorum, vel hæmorrhoidarum, vel natiū, vel vulneris cuiuscūq;. Item in omni fluxu & proprie in dysenterico chronico prostratio appetitus malū: quoniam inanitionem extremam sine refectione præmonstrat. Vnde Hippo. Ibidem. In longis dysenterici abstinētiæ,

malum, & cum feb. peius. Item si splenicus fiat dysentericus, & dysenteria perduret, mortale: quoniam si melancholica materia splenetica fuerit adusta, inducit cortosionem penetratiuam: Si vero non adusta, inducit hydropisim & lienteriam propter epatis & stomachi infrigidationem. Vnde Hip. 6. part. apho. Quicūq; spleneticus a dysenteria capiunt, ipsi suppetente longa dysenteria, hydrops innascitur, aut lenteria, & pereunt. Si autem dysenteria non perduret: tunc fiet cura opilationis & duriciæ in splene propter causam euacuationē. vnde Hip. ibidem. Splenetici dysenteria superueniens, bonum. Itē fluxus ventris & proprie niger, melancholicus, superueniens mania vel melancholiciæ soluit ægritudinem, euacuando causam. vnde Hip. 7. partic. apho. In mania dysenteria superueniens, aut hydrops aut extras., id est furoris augmentatio, bonū. Item in omni fluxu ventris chronico desipientia superueniens, malum: quoniam læsionem cerebri significat. vnde Hip. 7. partic. apho. In sang. fluxu perdurante, vel in quocūq; alio fluxu perdurante, in quacūq; regione corporis desipientia superueniens aut spasmus, malum. Item in fluxu supereffluente propter medicinam effreniter laxantē, & proprie in corpore vetulo vel debili, singultus superueniens, malum: spasmus autē superueniens, mortale. Vnde Hip. 4. part. apho. Spasmus ex elleboro, mortale: & in 7. part. Si superpurgato seniori singultus superueniat, non bonum. Et ex hoc scire potes, quod singultus est sicut paruus spasmus, & ideo est minus malum signum. Item in omni fluxu ventris, siue sit cum sanguine, siue sine sanguine chronico & perdurante si solutio ægrum alleuiat, & eius restrictio per se vel per artem debilitat, mortale: quoniam causam venenosam significat, cuius exitus diuturnæ virtutē deſicit propter inanitionem: cuius retentio virtutem

Tractatus quartus

prosterne propter oppressionem. Medicus vero postquam talē cognouerit, prognosticis derelinquat: ne sic inter contraria perplexus & de morte accusetur. Si autē fluxus sit breuistemporis, vel creticus & post signa digestiōis & in die cretica supueniens cū virtutis cōstantia, tunc bonū signū: quoniā significat aegritudinis pessimæ naturalem atq; salubrē non symptomaticā expulsionē: vt videtur et se de mēte Auic. 3. cañ. fēñ. 14. ca. de causis fluxus epatici satis circa finē. Itē dysenteria facta per corrosionem intestinorum gracilium, periculosior est quam quæ grossorum propter viæ longitudinē, & particulę difficultē consolidationē. vnde Hipp. 4. part. aphor. Si intestinorū aliquid gracilium incidatur, non conglutinatur. Item omnis fluxus cum superfluit, est magis timorofus in corpore macro & laxæ carnis: sicut sunt corpora mollis cutis, quam in corpore pingui vel carnosio, solido & compactæ carnis: sicut sunt corpora duræ cutis: quod fit propter viarum latitudinem, humorū subtilitatem, & virtutis debilitatē. Ex quo patet, qd fluxus omnis, vel sudor, vel calor febrilis cum resolutus, est magis periculosus in corpore cholericō vel melancholico, quam sanguineo vel flegmatico.

De stypticitate omnium modorum. Cap. II.

Stypticitas ventris est effectus siccitatis in ipso. Hæc autē siccitas, aut fit propter causam antecedentē, aut primitiuam. Si propter antecedentē, aut est mala complexio, aut mala compositio. Si mala cōplexio, sic fit propter aliquā quatuor causarum. Prima est mala complexio sicca intestinorum, fortificans eorum retentiuam vltra debitum: sicut in corporibus melancholicis per generationem vel dietam vel æratem. Secūda est mala cōplexio calida intestinorū vel epa-

tris, consumēs eorū humiditatē circūfluis-
cam: sicut in corporibus cholericis, vel
iuuenibus febricitantibus. Tertia est ma-
la cōplexio calida renū vrinam multiplicans, & stercois succositatem ad se tra-
hens. Quarta est destructio sensus intesti-
norū propter malā cōplexionē eorū omni-
quaq; qua non excitatur eorū virtus ex-
pulsiva ad secessum procurandū. Si ve-
ro mala cōpositio, sic fit propter aliquā
quatuor causarū: prima est strictitudo,
vel opilatio vię, quę est a cisti fellis ad in-
testinum duodenu: propter quod cholera
modica mandat ad ipsum: licet etiā cho-
lerę modicitas possit fieri propter aposte-
matis frigiditatē: sicut in corpore melan-
cholico vel flegmatico vel hydropico.
Ista tamen frigiditas, si vltimetur, non
stypticitatem, sed ventris inducit fluxū
lientericū. Secūda est flegma grossum
viscosum adhærens parietibus intestino-
rum: & ista est causa, quæ plurimū cōtrin-
git. Tertia est viuentia raritas corporis:
quare insensibiliter euaporāt oēs
humiditates tam substantiæ q̃ nutritiæ.
Quarta est apostema intestinorū opilans
eorū meatū: propter qd fit quicq; stercois
p̃ superius emissio: sicut infra dicitur ca.
de apostemate intestinorū: vel apostema
musculorū ventris, vel matricis, vel vesi-
cæ cōprimens ea vehementer: de quib; q
suo cap. dicet. Si autē fit propter causam
primitiuam, sic fit similiter propter aliq̃
quatuor causas. Prima est cibi siccitas,
& proprie in principio comestiōis: vt sunt
risum, miliū, pira, & cydonia. Secūda est
eius paucitas, vt fit in annis sterilitatis, et
in prostratiōe appetitus. Tertia est labor
fortis sudare faciēs. Quarta est caliditas
aeris resoluens, sicut fit in balneo, vel so-
le calido.

Methodus Signa eius, q̃ fit propter in-
testinorū siccitatē naturālē,
sunt extenuatio mirach, vētris, & eius sub-
tilitas cū priuatiōe ois causę alterius: Et

stomach⁹ sit calid⁹ cōplonis, sit siti bñ
 dus frequēter, sed modicus ei porus suffi
 cit pro vice, & plurim⁹ in eo fluctuat, &
 inūdāt. Et cura ei⁹ est, sumere in principio
 comestiois, iura pinguiā, & cibos vñctu
 olos ex oleo vel butyro, vel adipe castra
 troum, & colera pinguiā facta ex sicla &
 spinarchijs & malua & cerasa, vel vuas
 receñ. vel pruna, vel ficus: vel bibere vi
 nū dulce nouū, vel vēr⁹ rub. Sumatq; ei
 hos participātes acuitate, q̄ stimulet ad
 secessum, sicut est aq̄ decoc. caulīū. vel lē
 tiū cōdita cū et sale vñctuos p̄dictis, &
 fa seolis, & pisa cocta cū carne pingui
 strator⁹ vel pullos: deuit cib. assos. Su
 mat in aurora diaprunis simplex: vitet
 balneū pro posse: & cū necesse fuerit rati
 one sordis & sudoris balneē in aq̄ dulci
 deco. maluar⁹ & populi sine mora i ipso.
 Clysterizet qñq; cū lib. i. & f. aq̄ decoc.
 maluar⁹, bismaluar⁹, mercurial. sicla, herbe
 viol. in qua ponant olei viol. 3. iij. mellis. 3
 x. salis 3. i. Et iter⁹ bulliat, & tepidū inijci
 atur in ieiunio: & conet ad impinguatō
 nē corporis pro posse. Signa ei⁹, q̄ sit pro
 pter caliditatē intestinoꝝ & epatis, sunt
 vehemētia sitis, & durities fecum, & qd̄
 egredit̄ ē sicut squibale, & forte sentitur
 ardor in vētre & ano hora egestionis, &
 vrina subtilis ignita. Et cura ei⁹ est, sume
 re in ieiunio cerasa & pruna, & diaprunis
 & ficus, & vuas receñ. & melones, & pe
 pones & citrulos, & similia: & comestio
 oleris facti ex mal., sicla, lact. portul. cu
 curbitis, melonib. spinarc. attriplice, & si
 milibus coctis cū e arnibus agnor⁹ & pro
 cellor⁹ & vitulor⁹ lactantiū, conditor⁹
 cū sapore facto ex aceto vel succo berbe
 ris. Bibat vinū albū debile lymphatū cū
 aq̄ fontis viui. Et si sit cū se.umat in au
 rora syrupū viol. & bibat aquā ordeī, v̄p
 iulep loco vini p̄dicti. Clysterizet sape
 in ieiunio cum clysteri p̄dicto: diminuat
 pinguedinē in cibis: quoniā omne vñctu
 osum est de facili inflāmabile, & coleris

excitatiū: & diligat humida pro posse
 vergētia ad frigidū. Signa eius, q̄ sit pro
 pter caliditatē renū sunt exuberantia vri
 nā plurimā cū siti & ariditate corporis:
 cui si medic⁹ nō subuenerit, p̄ducat agrū
 ad hectica & marasmū, & caliditatē sen
 sibilē circa renes, & proprie si passio fue
 rit pāniculis eius cōmunicata: quoniā re
 nū substātia non sentit: & est vrina subti
 lis, aquosa, nō citrina: quoniā pauca cho
 lera non potest plurimā tincturā induce
 re in plurima aquositate. Neq; etiā cho
 lera generatur a caliditate renū, sed epa
 tis. Vnde Hippo. 4. part. aphorif. Vrina
 multa noctu facta, modicū secessum si
 nificat, & conuerso. Et cura eius est assi
 duare in ieiunio & principio comestionis
 oia lenificantia vētre cū opilatione vi
 arum vrinæ: sicut sunt passulæ pingues
 & nucleatæ & ficus caricæ, & dactyli, et
 pulses facti ex amylo, penidijs, vel fari
 na ordeī condita cū butyro plurimo: &
 butyrum recens cū mica panis fursura
 cei, & pruna recentia vel sicca infusa in
 aqua decoc. zuccari, & olus factum ex si
 cla & mal. & spinarc. lactuc. attrip. con
 ditū cū butyro & sale non pauco. Bibat
 vinū dulce, clarū, lymphatū parūper: de
 uiter cibos & por⁹ diureticos: sicut est aq̄
 cicerū & faseolorū & pisorum, & vinū
 albū subtile aq̄sum, & multiplicatio sa
 lis in cibo, & generaliter oia calida vel
 frigida: assiduet acceptionē syrupi viol.
 in aurora. Soluatur qñq; cum medicina,
 quæ leniat lubricū faciendo: sicut est ista
 78. aqua decoct. prunorū. 3. 4. dissoluat
 ur in ea medullæ cassiæ. ramarindorū,
 manna. añ. 3. i. coletur & detur ante diē
 actū calida: vngatur locus renū frequē
 ter cū populeon, vel oleo ros. mixto cū
 aliquantulo aceti, & puluere boli arm. et
 san. dra. ¶ Signa eius, q̄ sit propter de
 structionē sensus intestinoꝝ, sunt: qm̄ nō
 sentit vel pauca sentit mordicationē in
 vētre post assumptionē pigis, vel sin. vel

alorum acutum. Si cura eius est, ut al-
sudet cibos & sapores acutos secessiuos:
sicut est sinap. fracta & condita cum vi-
no & melle: & legumina cocta cum buty-
ro & sale cum aqua decoctionis caulium
& corticis lētum conditi cum oleo
vel butyro & sale & substātia caulium se-
micoctarum: quoniam per cocturā for-
tem resoluuntur partes acutæ. Bibat vi-
num dulce vetus, vel claretū. Signa eius
quæ sit propter paucitatem cholerae trās-
missæ ad intestina, sunt difficultas egerē
dī cū siccitate & albedine fecum (sicut
stercus canis) & inflatio ventris, & sit ut
plurimum in icteritia citrina: Et est quā-
doq; cum vomitu cholerae & vrina igni-
ta: quoniam cholera per istas derivat res-
giones. Et cura eius, si sit propter opilati-
onem est illa, quam diximus ca. de icte-
ritia. parag. de icteritia citrina propter
opilationem pororum felleis. Si autem sit
propter frigiditatem epatis nō multipli-
catis cholera, curam eius diximus ca.
pit. de debilitate epatis. parag. de causa
frigida. & ca. de cachexia. per totū. Vt
tur in omni causa rebus calidis aperitiuis:
sicut est sinapis cōdita cum vino & mel-
le, & modico aceti acutissimi: & ficus sic-
cæ pingues, & similia. Signa eius, quæ sit
propter flegma grossum viscosum in in-
testinis: (flegma nāq; subtile liquidum,
aquosum fluxum vētris diarricum, vel
hentericum causaret) sunt: quoniam sit
post satiētiā nauſeariā ex piscib;
vel fructibus & caseo & pane de simila,
& retinetur sex & ventositas omnino, et
multiplicatur nauſea, & foetet eructua-
tio, & surgit in ventre dolor colicus for-
tis, ad quem forte sequitur sudor frigidus
& est vrina alb. grossa viscosa cum spu-
ma plurima. Et cura eius est, ut hora pa-
roxysmi & doloris ilico leniatur venter
cum clysteri lenitius supradicto. Et si nō
suffecerit: si. clystere acutius quod sic fit
℞. ficus citrinas siccas pingues numero

40. surfus. pugill. i. malux, sicca, bismaſ.
añ. m. i. decoquantur in lib. 2. aquæ, do-
nec medietas consumatur: tunc coletur,
& dissoluatur in ea olei communis, vel
olei rūraceuti (quod melius est). 3. 4. mellis
3. 2. & iterum bulliantur aliquantulum,
& crepidum inijciatur frequēter, donec do-
lor sedet, vel minuat. Et si non suffece-
rit: fiat tale clystere acutius dissoluēdo in
colaturā iam dicta. 3. 2. vel. iij. pulueris
qui sic fit. ℞. salis gēme. 3. 10. colloquia-
tid. scamoneæ. añ. 3. 2. & f. terantur sub-
tiliter, & iste est pulvis Asmaſi. ex quo fit
unt suppositoria cū melle vel succo ab-
synthij, quæ ipse vocat pillulas albas, &
sunt veloces instypticando ventrem, &
mitigando dolorem colicum ventosum
& humoralem ex materia frigida visco-
sa. Et plura clysteria dicemus ca. de coll-
ea. parag. de colica ventosa. Hora autē
quietis abſtineat a satiētiā pro posse, &
vratur cibis subtilibus calidis: sicut sunt
carnes laudabiles, & iura earum condita
cum pipere cynamomi, cardamomi, &
croco, inspissata cum vitellis ouorum si-
ne albumine. Bibat vinum album vetus
& amarum: & multiplicet in cibo suo sal
& callia & sinap. Deuitet oēs pisces &
fructus: quoniam viscosi sunt, & omnia
legumina: quoniam ventosa sunt, & oia
olera præter ficus siccas & nuces & fisti-
cos, quibus vti potest in fine cibi: Et quā-
doq; vratur cibis acutis secessiuis dictis
de cura stypticis propter destructio-
nem sensus intestinorum. Assiduet omni
die in aurora vsum electuarij diatriopici
pereon, diaciminum, diagallan. diac-
titen cum speciebus & similibus. Deui-
ter frigida styptica: sicut ē agrestia, berbe-
ris, & acetum: nisi sit acutum valde: tūc
potest ex ipso parum aliquid addi in sa-
poribus & condimentis propter frigidita-
tis incisionem, & appetitus expergeſ-
tionem, Prouocetur quandoq; vomit-
cum aqua mellis, vel syrupo acetoso cō-

posito, vel oxymelle, & aqua decoctionis anethi & raphani, præmissa repletionem ex cibis & poribus: ut docuimus cap. de febre nasi. Deuret aquam frigidam et vinum stypticum vel ponicum: & diligat vinum dulce, clarum, vel amarum putum vel claretum, Hora etiam doloris confert faccellare ventrem totum cum latere ignito, asperso aceto acuto, vel cum sale & milio torrefactis in sacco: et sedere in balneo calido aquæ decoctionis floræ chamomilæ, meliloti, anethi, absynthii, origani, arthemisiæ, rutæ, et silium: et cum coeperit in eo debilitari, exeat et quiescat in lecto molliter: et inungat ventrem cum oleo chamomillarum, vel de lillo, vel anetho, vel de ruta, vel de lauro: in quibus aloe dissoluatur actu calido, et ita vicissim regatur modo cum isto modo cum illo, donec dolor et eius causa totaliter remoueat. Signa eius, quæ sit propter raritatem corporis sunt paruitas fecum in omnibus diebus suæ sanitatis respectu cibi assumpti & siccitas eius plurima semper, & multitudo famis, & vehementia appetitus, & habitudo corporis sicca, macra: Et si ambulet in sole calido, vel more in balneo, vel labore: dissoluitur vehementer eius virtus, & inflammatur corpus. Et cura eius est, ut cibis grossis viscosis pinguis: quia præbent plurimum nutrimentum cum difficili nutritione, & tarda dissolutione, vel resolutione: ut est caro porcorum & vitulorum, & pulres ex farina similia: quoniam in hoc corpore non est timor fortis in opilatione, neque in causis intrinsecis, imo magis nocet a calidis extrinsecis. Bibat vinum rubeum dulce grossum multum, & sæpe comedat si stomachus id tolerare queat. Si vero stomachus sit debilis, parum & sæpe comedat: Et sumat iura carnum inspissata cum vitellis ouorum & mica panis. Gaudeat otio & somno super cibum: habitet in aere frigido: inungat corpus totum cum aqua ro-

vel oleo & cera. Et si corpus sit carnosum & membra principalia bene cooperta, intret aliquando aquam frigidam, & abluatur in ea: aliter vero nequaquam. Abstineat a coitu & labore pro posse: In clysterijs, & cibis alijs regat, sicut stypticus propter siccitatem complexionis intestinorum. Signa eius, quæ sit propter apostema dicuntur ea, de apostemate intestinorum: ubi & cura eius ponetur. Signa eius, quæ sit propter siccitatem ciborum in principio assumptorum, patent ex relatione infirmi. Et cura eius est postpositio talium omnino, & assumptio lubricantium in principio sæpe dictorum. Et si quandoque cibi sicci fuerint assumpti, ut risum, milium, fabæ fractæ, & similia: & æger sentit lationem in ventre cum stypticitate: sumat in potu syrupum violæ vel iulep, vel aquam decoctionis ficuum siccarum pinguium, vel oleum amygdalarum, aut oleum commune in quo bullitum sit super ignem de penidijs, vel zuccaro ruquantum ipsum est, usque ad spissitudinem: quoniam ista confectio lenit vehementer ventrem, si ex ea lambatur frequenter, & bibatur post ipsam aliquid ex liquoribus prædictis, vel vino dulci. In cibis & poribus & clysterijs tam lenitiuis quam acutis, fiat sicut in stypticitate propter flegma grossum. Signa eius, quæ sit propter paucitatem cibi, per se patent. Et cura eius est, reductio ad contrarium pro posse, & confortare appetitum: ut suo diximus capitulo. Signa eius, quæ sit propter laborem fortem vel aerem calidum resoluentem, patet ex ægri narratione. Et cura eius est postpositio talium, & inungere corpus cum oleo rosæ, in quo dissoluta est cera, & balneari in aqua frigida, & aqua decoctionis rosæ, siccarum, foliorum salicis, & vitis & solatri, & orare faciem cum aqua rosæ, & camphora, sandalis & aceto: In cibis & poribus fiat sicut prius: & etiam in clysterijs.

Tractatus quartus

Emperica. Scias, quod omnem vētris stypticatē adiuuat om̃i die in aurora morose de somno surgere sine strepitu, vel stupore, & stare corpore erecto, postea sedere: & sic vicissim in vno loco fixe manere sine motu om̃ino, donec feces per omnes intestinorum reuolutiones totaliter descendāt: neq; laborē diurnum arripere, donec euenierit assellatio debita vel consueta: quoniam labor & motus feces exiccant, & earum descensum per diuerfos anfractus retardāt. Lubrificatur præterea venter stypticus quatuor modis in genere, scilicet ꝑ cibos, ꝑ medicinas, ꝑ suppositoria, & clysteria: de quibus ꝑ ordinem famosiora & maxime familiaria percurramus. Ars leniendi vētrē ꝑ cibos, est a principio comestitiōis sumere ex lenitiuis: vt sunt pruna matura, vuarū pingues, cerasa dulcia, passulæ enucleatæ: dactyli pingnes: & si cut est olus factum ex sicca & malua coctis in aqua perfecte & conditis cum butyro, vel lacte amygdalarum dulciū salitis plus debito: Et sicut est butyrum recens sumptum cum mica panis surfura cei, vel caules semicocti, & proprie ius eorū: quoniā perfecte cocti fiunt styptici ꝑpter partiū acutæ resolutionem: Et sicut sunt lētes semicoctæ, & proprie ius earū primū, & pulpes facti ex amylo & farina ordeī conditi cū penidijs & butyro: & omnia lenificantiā vētrem, & diuerſa materias vñs vñalibus, & sicut sunt acuta excitantia virtutem expulsiuam intestinorū. verbigratia, sinap. condita cum melle crudo, & potus aque salis plurimæ & vsus piperis moderatus. Naturam namq; primi cibi sapit tota diætatio: vt dicit Galen. 2. alimentorum. cap. de pomis. Ars vero leniendi vētrē stypticum ꝑ medicinas leues non difficilis, est: vt semel i hebdomada, vel quādo necesse videtur,umat de puluere, q sic fit, et proprie i causa flegmatica. ℞.

turbith optimi. 3. f. zz. cynamomi. añ. 3. 2. gallægæ, macis, garioh. cardomomi. añ. 3. f. zuccari alb. 3. iij. terantur, & miscantur. Detur ex hoc puluere. 3. f. vel. 3. 6. cum aqua calida, vel iura pulſorum sero sine cœna: quoniam materias crudas in stomacho collectas leuiter educit: Et differatur in crastinum comestio super ipsum: quoniā est tarda solutionis. Idem facit pulvis de tarraro vini albi, si detur ex eo in cibo aliquo, vel ꝑ se, cum zuccaro. 3. i. vel plus: sed sciendum est de corrosione intestinorum, si frequentetur causa cholerica detur stomachi laxatiui 3. f. vel. 3. 6. cū aqua calida in matutinis. In melancholica vero adde ad puluere prædictum senæ mundatæ & electæ quantum de omnibus: & si adderentur flores borraginis & ros. sicca, stomachum & splenem confortarent. Si autem venter sit constipatus ꝑpter caliditatem & siccitatem intestinorum naturalem vel acquisitā:umat in aurora. 3. iij. syru. viol. cum aqua decoctionis prunorum maturorum, vel prunorum damasceni siccorū velumat de zuccaro viol. cum eisdem: quoniam est ex solutiuis prædictis: vt dicit Auicē. vel dissoluatur cassiæ. 3. z. in aquis eisdem: & coletur, & detur in matutinis: & idem faciunt tamarindi, atq; manna. Similiter & hæc confectio. ℞. medullæ cassiæ. manna. tamarindorū, añ. 3. i. elect. de succo ros. lax. 3. 2. zuccari viol. 3. 4. miscantur perfecte, & detur totum ante diem, & est conueniens in principio se. ad minorationem materiæ, quæ datur ante digestionem. Si autem vēter sit stypticus ꝑpter flegma grossum viscosum: tunc necessario permittenda est digestio: quoniam materia est inobediens. Potest tamen dari pul. talis. ℞. galang. zz. cynamomi. añ. 3. i. cubebe, anisi, agaf. añ. 3. 2. esule quantum de omnibus: zuccari quod sufficit ad dulcorandū. Detur. 3. 2. vel. iij. in sero cū vino calido, vel

vino decoct. zz. bæccar. lauri, sina. & similiū. Si autē sit venter stypticus propter ventositates coartantes, solvatur cū tali medicina. ℞. tartari, polypodij, añ. 3. 2. anisi, carui, cynamomi, añ. 3. iij. senæ ad pondus omnium, zuccari quod sufficit. Det. 3. f. vel .3. r. cum vino calido, vel vino decoctionis bæccarū lauri. Et ad hoc confert ius galli decrepiti, si cum eisdem rebus decoquatur in aqua dulci, vsq; ad ossium separationem: & ex eo bibatur lib. i. vel. f. in ieiunio. Facit em̄ assellan do trullas emittere. Si autē solutioni leui intendis totā massam sanguinis munda re cū confortatione stomachi, epatis, atque splenis: fiat talis pulvis. ℞. foliorū horrag, ros. siccarū, añ. 3. f. semi. ameos, amomi, cipe, cap. se. end. sen. añ. 3. 2. quin que myrob. añ. 3. f. cynam. gariofil. zz. añ. 3. i. turbit. alb. & elect. 3. 2. reubarb. 3. r. zuccari quod sufficit: fiat pulvis vel electuariū: quoniam educit cholerā flegma & melancholiam, & confert coporibus delicatis. Detur ex eo, 3. i. vel. f. in vino calido lymphato. Ars vero leniendi ventrem stypticum per suppositoria, sic fit. ℞. esulæ. 3. i. salis gēme. 3. f. mellis quod sufficit: fiant suppositoria lōga. & imponantur in ieiunio, vel sic. ℞. agari. colloquint. partes quatuor, salis communis partē. 6. mellis quod sufficit: vel fiat suppositoriū ex sale gemma solū, vel ex sapone, vel lardo salito: vel fiat suppositoriū ex fellibus quod sic fit. ℞. farinæ surfuris, vel ordeī, vel auenæ, vel siligin. quātū vis, salis communis, vel mel quod sufficit: incorporando pro duobus suppositorijs, vñū sel alicuius animalis, scilicet bouis, vel capræ, vel porci, vel vituli, vñ canis. Si vis magis acuire, adde aliquid aloes. In pueris vero sufficit suppositoriū ex pēdijs. Ars autē leniendi ventrē per clysteria, sic fit. ℞. malux, bisimalux, mercurialis, attriplicis, vngulæ, caballinæ, brææ vsinq; siccæ oim vel quo

rundā. añ. m. r. decoquatur in .4. lib. aquę donec tertia pars atq; cōsumatur: coletur, & addantur mellis. 3. iij. olei cōmunis. 3. 4. salis. 3. f. & iterū bulliatur parūper, & coletur & tepidum inijciatur: & possunt addi fores chamomillæ & farina surfur. vel fabarum. p. r. propter abstersiōem. Item clystere aliud lenitiuū & proprie in feb. ℞. malux, altheæ, prunorū viol. lactucarum, rasuræ cucurbitæ, foliorum papaueris, añ. m. r. olei viol. 3. 4. zuccari 3. iij. salis. 3. 2. fiat sicut prius. Item clystere acutum. ℞. malux, altheæ, siccæ, foliorum caulium recentium, centaureæ, rutæ, absynthij, añ. m. r. olei chamomill. vel rutacei. 3. 4. mellis. 3. iij. salis. 3. f. fiat sicut prius: Et si sit cum multitudine flegmatis: adde in decoctione prima hermodactylorum, agarici, colloquintidæ quātum necesse videtur, vel hierapier. Gal. vel bened. laxat. in colatura. Si autē sit cū multitudine vētositatis & torsisōis in vētre, adde polyp. quercin. cart. ani. ear. cymi. in decoc. vñ diacy. in decoc. colatura. Si vero cum melancholīa: adde senegthy mi, epithymi, esulæ, in decoctione: vel feralodion & dialene in colatura decoctionis. Et scias quod in omnibus clysteribus possunt poni soluentia lubrificando, & proprie in colatura: vt sunt cassia, tamarindi, manna. Item clystere vltimum in lubrificando ventrem exiccatum, quod confert quando alia euacuantia ducere non possunt, sic fit. ℞. succi mercurialis, succi malux, succi altheę, omnium vel quorundam. 3. 4. medul. cassiæ. 3. 2. olei viol. 3. bulliant iuste, & totum tepidum inijciatur. Et si succi haberi non possunt, vt in hyeme, fiat ex aqua decoctionis earundem rerum addita fatina fœnigraci, seminis lini, psillij, caricis, prunis maturis. Item dicunt experimentatores, quod sel porci, vel canis, vel bouis cum oleo bullitum patumper, & ab vmbilico superius

Tractatus quartus

inunctum vomitum procurat, ab vmbilico inferius secessum: propter quod & fella reperiuntur poni in laxatiuis vnguētis: & si vis acuerē, adde aloes quantum de fellibus.

Canones. Medicinās & cibos laxatiuos non conuenit omni die assiduare: quoniam virtutem stomachi retentiuam deficiunt: & virtutem intestinorum expulsiuam reddunt consuetudinariam, adeo vt pigritetur in expulsiōe superfluitatū, nisi fuerit stimulata. Item omnem cibum vel medicinam laxatiuā expedit dare in ieiunio, vel in principio comestiōis: ne forte cibum corrumpant cui permiscetur, & virtutem propriam amittant, præter solum diacitoniten acetum, quod post cibum illico dari cōuenit: quoniam soluit comprimendo, similiter myrobal. ¶ Sciendum præterea, q̄ ex medicinis solutiuis exhibitis per superius melior in stypticitate ventris est, quæ sumitur ex viol. cassia. manna, tamarindis: quoniam soluedo ventrē, relinquunt lubricitatem: similiter & diaprunis acetum: & syrupus violaceus acuat cum diagridio vel reubarb. & proprie in causa calida. Neq̄ vtatur aliqua solutione facta ex myrobal. quoniam est deterior solutionum in hoc casu. Vniuersaliter tamen melius est lubricicare ventrem per inferius cum clysteri vel suppositorio, q̄ per superius cum medicina: quoniā omnis laxatiua quantumcūq̄ lenis vel consoleta debilitat membra nobilia, & proprie stomachum & ep̄ar: propter q̄ omnia pharmaca sunt euitanda, nisi quādo requiritur aliorum membrorum euacuatio v̄l venarū. Item conē sanitatis custos omni die ventris lubricitatem debitam seruare: quoniā est maximum in ea iuuamentum, & præseruans a multis passionibus & proprie a foda pulsatiua, vertigine, scotomia, fe. putridis, apostematib; mēbrorum interiorum, hydropisi, & colica.

Quapropter ait Galenus 1. alimētorum ca. de frumento elixato: Solum est hoc remedium indigestiōis querere, secessum stercoreum quantioris quacūq̄ die.

Prognosticatio. Ventris stypticitas superflua in omni ægritudine, malum: quoniā virtutem ægri deficiit, appetitum prosternendo: membra grauat, replendo: angustiam inducit, ad cerebrum fumando: torsiones procreat membra nervosa sciindendo: & quod deterius est, morbum & suam causam fouet, dispositionem fortificando, & causæ euacuatiōem prohibēdo. Conetur ergo medicus omni die ventrē lenire cum clysteri, si virtus sit fortis: vel cum suppositoio, si sit debilis et proprie post somnū, & ante cibum, vel hora sanitatis suæ cōsuetā, vel hora maioris quietis, si fuerit cum fe. quacūq̄. Item dicit Hippo. 2. parti. apho. Quibuscūq̄ iuuenibus extēstibus ventres sicci sunt, ijs senescentibus humectantur, & econuerso: quoniā mutata complexionē naturalī, mutātur eius operationes: hoc tamē fallit in duobus casibus: vt dicit commentator ibidē: primo quidem, si cholera sit pauca: quia fiet minor in senio, & per consequens remanebit ventris stypticitas. Secundo si ep̄ar sit frigid. naturaliter: q̄a fiet magis frigidum in senio, & per consequens remanebit humiditas & lubricitas vētris, quæ fuerat in iuuentute.

¶ De colica, iliaca, passionibus. Cap. III.

Istæ tres passionēs cōueniunt in forma siue essentia: quoniā vnaquæq̄ ipsarū est torsio, siue dolor vētris: propter q̄d si fortificetur, videtur homini, q̄ eius corpus terebello perforet: Sed differūt subiecto siue materia & causa efficiēte. Nam colica dicitur, quando causa doloris, putrescens, humor, vel ventositas in intestinis grossis, & proprie colo continetur:

propter quod sentitur dolor circa vmbilicum ad quatuor digitos, vbi est stomachus situatus, super quē circulariter tranfit colon: Et si declinet ad alterum laterē, hoc erit magis versus hypochondrium sinistrum, vbi cōtinuatur cum longaone. Iliaca vero dicitur, quando doloris causa prædicta in intestinis gracilibus & proprie in ileo continetur: propter quod sentitur dolor sub vmbilico directe, vel infra ad duos digitos. Ileos vero dicit, quando causa doloris est apostema natum in intestinis quibuscunque, & proprie superioribus gracilibus eorum claudens tranfitū: adeo vt stercus & fex per ipsa descendere non possint: propter quod æger cogitur in ea stercus vomere, & est cum febre præcursa, & non extenditur vltra primā periodum, quæ est in die quarto, & terminatur ad salutem vel perniciem. De primis igitur duobus dicamus passionibus: quoniam de ileo in proximo sequenti dicetur ea. Sciendum præterea, quod dolor renalisis similis est in loco & situ prædictis passionibus: ita vt dolor renis dextri iliacæ, & dolor renis sinistri colicæ simuletur. Signa tamen distinctiua certa ponemus infra cap. de calculo & arena &c.

Methodus. Colica & iliaca tribus de causis in genere dignoscuntur fieri: aut propter stercus exieccatum in intestinis ea scindens: aut propter ventositatē grossam plurimam ipsa vehementer extendentem: aut propter vermes in eis natos ipsa mordicantes. Signa earum prout habent fieri propter stercus, præterea & curam plene posuimus in ca. de stypticitate ventris omnium modorum, nisi quod hoc solum oportet addere, scilicet postquam venter lenificatus fuerit per remedia illic posita, & feces sint educæ, fiat aliqua anodina clysteria propter reliquas stercoris & trullas radicatus extirpandas: sicut est clystere factum ex aqua decocti onis florum chamomillæ, meliloti, mal

uæ, maluaufici, cetaureæ, roris marini, & fursu, colata, & cum aliquatulo olei chamomillini, vel anethini, vel laurini, & modico mellis & salis iterum bullita, & tepida bis vel ter injecta ante cibum. Colica vero & iliaca quando sunt propter ventositatem, solerti pro earum cognitione & curatione indigēt discussione: quoniam aut ista vêtositas est plurima sine humoris vitio omnino, aut plurimo, et tunc fit a mala complexionē frigida stomachi & intestinorum sine materia, et hoc est vt raro: aut cū humoris vitio, a quo continue eleuatur, quod est vt plurimū. Et iste humor, aut est flegma, aut melancholia, aut cibus inflatus viscosus. Item ista ventositas, aut est contenta in spongiositate bus eorum penetrās inter tunicā & tunicā: cū intestina sint mēbra nervosa villosa, pāniculosa. Signa igitur ipsarū, quoniam sunt propter ventositatē sine materia humoralis oīno, aut plurimosunt: quoniam euaporatōnes et sacellationes calidæ conferūt etiā a principio, nō pmissa euacuatione cum medicina, vel clysteri: & dolor per ea mitigatur illico, & est cū obedientia & ventris lenitate debita. Cum igitur omnia talia apparuerint & venter sit inflatus cum dolore et tēsiōne, quæ nō cedit impressioni, vel vix cedit, sicut est vesica inflata: & auditur rugitus, & cructuatio frequens difficilis, & fit retēsiō vêtositatis omnino, vel si quod ex ea egreditur, est modicum et quod nō sedat dolorē vehementē, & vrina est alba subtilis aquosa: tunc colica erit ventosa pura: & si antecessio vsus oleris vel leguminū. Et corpus consuevit terminare talē passionē per exitū ventositatū plurimarū sine vomitu vñecessu: tūc magis certa fiet significatio. Et cura eius est, vt hora paroxysmi statim a principio saccellet venter totus cū milio, sinap. nasturtio, torrefactis in sacculo super lapidem ignitum aspersum aceto acutissimo frequenter actu calido: vel fomento cū

latere lato, seu lapide molari ignito vehementer, & inuoluto pannis lineis subtilibus, aceto modico asperso: vel vaporetur cum petiis infusis in vino decoctionis anisi, carui, cymini, rutæ, foliorum lauri, absynthii, florum chamomillæ, anethi aliquantulum expressis actu calidis reiteratis saepe super ventrem: vel ponatur ventosi sine scarificatione super locum dolorum cum succione vehementi. Omnia namque remedia resoluunt ventositates sed in passione, ubi non est materia humoralis vel modica: & idcirco dolorem illico sedant & mitigant. Præterea injiciatur clystere calidum, quod sic fit. ℞. rutæ, centaureæ minoris, calamenti, origani, saturiæ, plyphii, mentastri, añ. M. i. carui, cymini, anisi, anethi, polypodij, ana. 3. f. decoquantur in lib. 4. aquæ fontanæ, donec medietas consumatur: coletur, & in colatura dissoluatur olei communis, vel chamomillini, vel rutæ (quod melius est) 3. iij. mellis cocti 3. f. castorei, sinapis, serapini, opposonacis, añ. 3. i. vel 2. Et iterum bulliatur aliquantulum ad ignem lentum, & coletur, cum tepidum factum fuerit: fiat ex eo duæ vel tres injectiones continue se sequentes: hoc namque clystere si frequenter, dissoluet colicam ventosam fortè. Quod si dolor fiat fortis, & difficile tolerabilis patiēti, ponat in ipso quāti tas ciceris vel fabæ de opio. Irè clystere alius carminans ventositates poterit. Decoquatur ruta in oleo cōmuni tribus vicibus: deinde sumatur de illo oleo. 3. iij. & dissoluatur in eo serapini opposonacis, castorei a mediâ 3. vsq; ad 3. i. & injiciatur tepidum: quoniam sedat (vt plurimum) dolorem ventosum eadem hora, & inducit somnum, & proprie, si addatur opium ad quantitatem ciceris. Quod si fortior fuerit dolor, ita vt intolerabilis fiat, & virtutem desiciens: detur ei in potu philonium recens cum vino veteri albo puro, vel theriaca noua, vel theriacæ

veteris 3. f. in qua ponatur granum vñi, vel duo opij & inducatur somnus proposit se. Et virtus toleret: non comedat tribus diebus aliquid, vel parum de mica panis infusa in vino veteri albo pure, amaro. Cum autem dolor ceperit mitigari: intret balneum aquæ tepidæ decoctionis florum chamomillæ, meliloti, foliorum lauri, origani, & similibus: & exeat quando debilitatur: & sic vicissim per fomentationes, & clysteria, & balnea regatur, donec oīno pettrāsierit paroxysmus, et su puenerit hora getis. Tūc igitur caueat ab oibus vētosis: sicut sunt legemina, olera, fructus. Caueat etiā a frigidis: sicut sunt cucurbitæ, melones, pruna, persica, & similia. Caueat etiam a hypticis: sicut sunt pira, cydonia, mora, rubi, melspila, sorba, risum, & similia. Caueat a potu aquæ frigidæ omnino. Nutriatur carnibus laudabilibus pullorum, hœdorum, auium paruorum montanarum, & iuris bus earum inspissatis cum vitellis ouorum, & speciebus calidis aromaticis: sicut sunt zinziber, cinamomum, piper longum, cardamomum, crocus, & similia. Vtatur sapore facio ex alijs vel sinapi & speciebus eisdem, & melle non crudo (quoniam ventosum est) sed cocto bene spumato. Bibat vinum album verus, clarum, potens, purum. Sumat saepe in aurora aliquid theriacæ veteris cum eodem vino, vel cum vino decoctionis ameos, amomi, carui, cymini, piperis longi, fizeleos, origani, & simillium. Vel sumat diaciminum, triseram magnam cum eisdem liquoribus, vel confectiōe de bacis lauri, quæ sic fit secundum Rasm. ℞. seminis rutæ dragmas decem, ameos, amomi, & nigellæ, seminis leuistici, origani, carui, seminis petro, amygdalarum amararum, piperis nigri & longi, calamenti, dauci, acori, ana. dragmas 2. castorei, serapini, opposonacis, añ. dragmas 4. terantur & conficiantur

cum melle, quod sufficit. Detur ex ipsa ad modum castaneæ cum vino calido: quoniam ventositates potenter carminat, et dolore sedat: nec est ei par in hoc alia medicina. Exercitetur omni die in iunio, & parum & raro comedat, donec in eo fortificatus fuerit calor naturalis. Super venter deferat continue cerotum de granis lauri: quoniam dolore stomachi intestinorum, renum, matricis, vesicæ, & viscerum frigidis & ventosos potenter sedat, & membra calefacit: quod sic fit secundum Iohannem Hef. in suo auditorio. ℞. olibani, masticis, myrrhæ, ana, vnciam vnam, granorum lauri, vnciam duas ciperi, costi, ana vnciam, f. mellis colati, quod sufficit ad aggregandum, & extendatur parum, & calidum superponatur vbi oportet. Si autem triplerum cyperus, & ponitur de stercore caprarum aut vaccarum ad pōdus oim inuenitur mirabile ad hydropisim, si ponitur super ventrem post aliquas purgationes. Signa colicæ & iliacæ si fuerint propter ventositatem cum humoris flegmatici vitio, quod est vt plurimū sunt: quoniam facillationes & fomētationes calidæ non conferunt ante purgationes, imo causant dolorem, & fortificant, & antecessit fatietas nauseatiua antiqua, & forte egreditur flegma viscosum cum vomitu & secessu: & est eius vrina alba, grossa, viscosa, spumosa, & forte sedat dolor quandoq; & credit, & commouetur post duas horas aut tres: prout ventositas nunc eleuatur a flegmate, & nunc resoluif viscosum, & proprie si flegma sit subtile. Si vero fuerit grossum viscosum, retinetur fex & ventositas omnino, & multiplicatur nausea, & fit dolor in ventre fortis cum rugitu, & sudat æger quandoque sudore frigido. Et cura eius est, vt hora paroxysmi statim a principio purgetur cum clysteri, quod sic fit. ℞. cologuintidæ, agarici, ana, vnciam, f. centau

rea minoris, rutæ, calamenti, origani, saatureiæ, ana, m. i. polypodij, vnciam vnā decoquantur in .2 lib. aquæ, donec ad vnam redierit: coletur, & in colatura ponantur olei rutacei, vel laurini, vel anethini. 3. iij. mellis, 3. i. salis, 3. 2. & iterum bulliatur aliquantulum: postea coletur, & tepidum inficiatur ante cibū: & si vis ipsum magis acuire: adde in colatura primā aureum i. pul. al. dicti in ea. de stypticitate ventris. parag. de stypticitate propter flegma grossum, v. hyerap. Galen. 3. f. vel bened. laxatiuæ. 3. i. Et fiant ei suppositoria ex puluere albo predicto. Et purgetur quādoq; cum hyerap. Gal. dando ex ea. 3. f. ante diem cum aqua calida, vel cum catarrico imperiali, dando eodē modo, & eadem hora, vel cum bened. laxatiua cōmuni, vel cū huiusmodi medicina. ℞. turbiti albi & electi. 3. i. hermodactyl. 3. f. scamonæ grana. 6. zz. 3. f. Zuccari rubei. 3. i. fiat puluis grossus, qui detur totus ante diem cum vino calido: Et differat post ipsum cibis: quoniam est leuis & tardæ solutionis. Fiat etiam vomitus cum oxymelle vel syrupo acetoso cōposito, & aqua decoctiois anethi, vel raphani, præmissa repletionē ex oleribus & cepis & piscibus salitis: prout docuimus cap. de fœtore nasi. Post purgationes fiant clysteria carminatiua ventositatum. Et fiant omnia remedia localia p ordinē, sicut scripta sunt in colica vêtosa sine materia. Signa ei, q̄ sit propter ventositatē eleuatā a cibis, sunt: qm antecessit fatietas nauseatiua recēs opprimens calidū naturale stomachi & intestini suā multitudine, aut in flās & extendēs ea suā vêtositate: sicut est crapula ex piscibus, oleribus, leguminibus, fructibus et similib; cū stypticitate vêtis: propter quā nō egrediūt stercore, & vêtositas: vel adeo parum egrediuntur, vt dolorem nō minuant vehemencem. Et surgit rugitus in vêtre, & fit eructatio fœrens assidua.

1444
yūm 5

Et cura eius est eadem cum ea, quæ sit de flegmate: nisi quod si sit possibile, conuenit ut vomitus præcedat purgationem, vel proprie si crapula sit adhuc in stomacho, vel pars eius. Si vero tota descendit ad intestina: quod scies, quia doler & grauitas omnino sedata sunt circa vmbilicum: tunc fiat primo clystere lenitiuum prædictum. Et si non sufficit: fiat acutum, vel purgetur cum aliqua medicinarum prædictarum: & ultimo fiant localia: & non comedat per duas vel tres dies, si sit possibile: donec tota crapula euacuetur, vel digeratur, & appetitus redierit. Si autem virtus debilitaretur: bibat parum vini albi, clari, veteris, potentis & puri, & comedat tortellas infusas in eo. Vtatur diagallangæ, diatriopipereon, diacimini, electuario duce diamargariton, & similibus cum eodem vino actu calido: in alijs fiat sicut prius. Signa eius, quæ sit propter ventositatem eleuatam a melancholia plurima effusa in ventrem, sunt acetositas eructationis, inflatio ventris illico cum dolore vehementi post effusionem eius ex splene, & forte sentitur grauitas vel inflatio in loco splenis, & fit (ut plurimum) in corporibus melancholicis per generationem vel ætatem. Et cura eius est, ut hora paroxysmi clysteris sepius cum clysteri lenitiuo carminatiuo ventositatum, dicto in colica ventosa pura: Et valetur cum pannis lineis mollibus infusis in aceto forti decoctionis ciperi, caparis, rutæ, calamenti, origani, sive zeleos, fatureiæ, granorum nigellæ, carui, cymini, cardamomi, & similium actu calido. & expressis aliquantulum cum reiteratone frequenti, vel cum lapidibus ignitis aspersis eodem liquore. Et si non suffecerit, nec per ea dolor sedetur: detur in potu aliquod vini albi clari calidi, in quo cocta sint cuminum, carui, anisi, cardamomum transiando ex ipso parum post parum. In hora autem quietis abstineat a cibis

& potibus melancholiam generantibus: sicut sunt lætes, caules, caro ferina, vinum grossum rubrum, & similia. Diligat iura carniū hœdorum, pullorū, agnorum, & vinum album subtile clarum lymphatum parumper. Et purgetur quandoque, sicut diximus ea, de opilatione splenis: & rectifice splenem, sicut docuimus ea, de debilitate splenis, parag. de causa frigida: quoniam ista ventositas non potest eleuari (ut videtur) a melancholia congelata, vel naturali superfluente in quantum. Si autem patiens sit senex vel delicatus, soluator cum hac medicina. Decoquat gallus antiquus decrepitu in aqua pura, in cuius ventre ponatur polypod, senæ, cartami, añ. 3. 2. consueto diligenter locum, ne quid ex medicinis exeat, & bulliatur usque ad ossium separationem cum obduratione ollæ: detur ex hoc iure in aurora. 3. 4. vel. 6. actu calido: quoniam facit affelluar trullas emittere, & digerit, & euacuat melancholiam paulatim. Signa eius, quoniam ventositas est clausa inter tunicam ventris, scilicet mirach & tunicam intestinorum sunt: quoniam raro fit per se incipiendo, sed consequendo ad colicam antiquam de flegmate, & est cum angustia & vehementia doloris maximi, quæ non alleviatur vel parum valde vomitus vel secessus, & non egreditur ex ventre ventositas, vel eructatio omnino, sed retinetur nec pergit venter: & si desuper comprimatur. Et certius signum est, quoniam non mouetur dolor de loco ad locum, licet sit ventosus, sed continue in eo figitur sicut dolor renalis: nec permittit ægum vna hora quiescere: & clysteria carminatiua ventositatum modicum in ipsa commiserunt. Et cura eius est, ut hora paroxysmi fiant fomentationes, & vaporatiões, & saccellatiões dictæ capit. de colica ventosa sine materia cum reiteratione frequentata: & ponatur ventosæ, lata cum igne super locum sine scarificatione sed cum

suctione vehementi: & cum coeperit doctor sedari, sumat aliquid ex theriaca veteri vel diacymin, vel diamargaritō cū vino alb. veteri puro, vel vino decoctionis carui & cymini actu calido. In hora vero quietis absteineat a vino superfluo pro posse, & proprie veni oleo, & laborer, & sudet in ieiunio. Nutriat carnibus laudabilibus & iuribus earum conditis cum pipere cardamomo, croco, & similibus. Et bibat vinū album clarum vetus amarum, & purum, sed pars pro vice, vt calefaciat ventrē sine humectatione omīno: Et omni die in aurora sumat aliquid de confectioe de baccis lauri dicta ibidem cum vino prædicto. Fiunt etiam colica & iliaca ex vermib9 generatis in intestinis iuuolutis & transuersatis cū stercorebus mordicantibus ea vehemēter. Et signa eorū sunt antecessio satietatis nauseatiuz assiduaz, & proprie ex fructibus, et oleribus, & cibis putrib9 seu facile putrescentibus: sicut sunt pruna, cerasa, persica, poma, & pisces corrupti: quare fit iste dolor maxime in pueris & gulosis & tēpore autumnali: & est cum eis fœtor oris plutimus, & multitudo comestionis cum paruitate egestionis, & habitudo macra & multitudo saliuaz currentis ex ore præter solitum, & ventris inflatio non multa: Et fortassis apparet vter inanitus & dolor augmentatur hora famis: & est cū eo grauitas oculorum & frigiditas nariū cum pruritu aliquo in eis propter fumos ascendentes ad nares: & quandoq; dispositionis similis epilepsiaz & spasmo propter mordicationem, & quandoq; mors. Et scias, quod vermes nati in nobis sunt trium generum. s. longi, qui nascuntur in intestinis gracilibus, & lubrici vocantur: Alij vero lati, qui nascuntur in intestinis grossis, qui cucurbiti vocantur: quoniam sunt lati curti, sicut semina cucurbitaz. Tertijs vero minuti rotundi, sicut tineaz, q̄ generantur in ano, & magis habēt indu

cere tenasmonē q̄ colicā passionem. Et quicūq; fuerint, semper generantur ex materia marcida viscosa frigida, i quā agit calor naturalis ventris, & calor putredinalis illius materiæ cū regulatione caloris solaris, qui calor appellatur vniuersalis. Et cura eius est, vt aget famem toleret, & exercitetur, donec fortis fames superuenerit: tunc sorbeat ante comestionem suā aliquid lactis dulcis recentis vaccæ vel capræ, & cum hoc fecerit tribus vel quatuor diebus, & vermes assuesciti sunt in poru lactis, sumat quinta die eadem hora hoc medicamen interficiēs eos. ℞. succi absynthij recentis, rutæ, & abrotani, narcisci, amygdalarū amararum, & lupinorum amarorū, & persicarie, & nucleorū persicorum. añ. quantum volueris de quolibet istorū succorum, vel de vno solo, & misce cum lacte dulci prædicto, & potest addi modicum aceti. Si autem succi haberi non possunt: fiat aqua decoctionis earundē herbarum, quæ postea misceantur cum lacte amygdalarū amararum & nucleorum persicorum: & oīa incorporentur cum lacte dulci prædicto & modico aceti. Et bibat ex hoc patiens magnum haustu in ieiunio hora famis magnæ. Et ad idem cōfert semen absynthij coctum in vino veteri, & bibitum sepius in ieiunio: quoniam omnia amara interficiunt vermes: sicut dulcia nutriūt. Vngat totum ventrem cum vnguento quod sic fit. ℞. olei rutæ, vel amygdalarum amararum, vel de nucleis persicorū 3. 4. aceti acutissimi. 3. f. pulpe colloquintidæ, rutæ, fellis vaccini. añ. 3. 2. vel si aliud præsto non sit: potest fieri hoc vnguentum ex lacte amygdalarum amararū & nucleorum persicorum, in quibus dissoluatur hierapi. Gal. 3. 2. aloes. 3. f. addēdo aliquid aceti gratia penetrationis, & fel prædictum, ipsum namq; suo fœtore & fortitudine vermes in intestinis natos interficit adeo, vt si quandoq; stomachū

Tractatus quartus

Intrent, vel mery, vbi tamen nullatenus generari possunt (vt dicit Gal. 4. de acci denti) propter caliditatem plurimā stomachi, & loca illa inungantur exterius, interficiant eos, & faciant eos redire ad intestina: quoniam timorosa esset ipsorum reductio per superius spontanea vel coacta, propter vomitum esse motum laboriosum & naturæ stomachi & mery contrarium: nisi forte in corpore consue ro, & facillime vomenti: & super vnguē tum ponat illico tale emplastrū. *℞.* absynthij, rutæ, abrotani, foliorum persico rum, sticad, arabi, polij montani, añ. m. vñ. pistentur, & coquantur in aceto forti. Et cum eis incorporētur fel tauri, pul. lupinorum amarorum vel nucleorū persicorum, ana. 3. vnam aloeis. 3. f. & actu calidum ponatur super ventrem cum re iteratione frequenti. Postq̄ autē hoc factum fuerit per dies aliquot & cognoue risiam vermes esse mortuos, quod scies: quia æger paruam vel nullā sentit mordicationem: tunc educatur cū. 3. f. hierapii, Gal. vel hieralogodion, dādo ante diem cū aqua calida, vel cū. 3. i. & f. de pilulis cochij vel aureis, vel cū medicamine de turbith dicto ca. de soda. Si autem patiens sit infra. 14. annū ætatis suæ. purgetur cum 3. i. & f. cassiis, dissolutæ in 3. 4. aquæ feruentis decoctionis nucleorū persicorum, vel amygdalarum amaram, vel aquæ simplicis. Si autem sit puer, vel infans lactens, soluatur eius venter solum cum lacte amygdalarum & nucleorum persicorum mixtorum cum aq̄ calida, dādo in potu ex eis sæpius. Quā liter autem interficiantur vermes in ano nati, dicitur cap. de vermibus in ano: ab stineat a cibis dulcib⁹ viscosis: sicut sunt pisces torrellæ & pasta. Abstineat a fructibus & oleribus & rebus putridis & corruptis. Nutriatur carnibus laudabilibus assis vel coctis conditis cum pipere & speciebus calidis. Vtatur saporibus

factis ex alijs, vel sinap. & aceto. Bibat vinum vetus clarum amarum.

Emperica. Quoniam istæ passiones sunt timorose atq̄ periculose cauti⁹ est subita & efficacia exhibere remedia in methodo scripta quā sub cura blanditiua emperica dubiosum patientem per dies plurimos detineri. Et sciendum præterea, quod licet apud communiter operantes colica & iliaca iudicentur passiones de causa frigida, & per calida curentur secundum omnes eius species siue modos, prout visum est. Refert tamen Galen. 12. de ingenio sanitatis se reperisse quendam hominem colicū cui dum talia clysteria de oleo rutæ iniectisset, & Syrupos calidos subtiliativos atq̄ incisivos humorum grossorum viscosorum administrasset, & alia, quæ putabat conferentia: magis ac magis dolor fuit per hoc augmentatus. Tunc igitur (vt dicit) morbi causam cognouit, quod fuerat chol. rub. in ventre contenta mordicans intestina: quare curā illico ministravit in contrariū. Primo igit materia acutas paulatim eduxit de quarto in quartū: quoniam virtus fuit in agro debilis cū sua hierapicra. Deinde intestina confortauit cum frigidis stypticis tam cum cibis & potibus quam medicinis: sicut sc̄ptum est capi. de fluxu ventris. parag. de cura diarrhæ propter choleram plurimā transmissam ad intestina: & postea cœpit dolor mitigari, & æger posuit dormire, quod diu antea nō fecerat: & sic infra 20. dies extiterat liberat⁹ perfecte. In quibus verbis Galen. duo vtilia insinuat nobis: primum scilicet quod sunt morbi alii qui absconditi difficiles: quorum causa non cognoscitur, nisi ex posterioribus scilicet a iuuantibus, & nocentibus: quoniam in effectu operis vnaquæq̄ res approbatur. Secundum vero, quoniam morbus non curatur: nisi prius eius causa cognoscatur. Et si curetur: est magis ex be-

neficio naturæ, vel ex casu, quā auxilio medici. Sciendum præterea, quod licet colica & iliaca sint vt plurimum cum retentione & stypticitate ventris: propter quod ventositates & humores nocitui congregantur: est tamen quandoq; cum fluxu lienterico: vt puta quando doloris intensio impedit virtutem retentiuam stomachi & intestinorū: q̄re tūc medicus est perplexus indigens stypticis contra fluxum & calidum subtiliantibus contra materiam, & anodinis leuibus contra dolorem. Fiant igitur in tali casu emplastra & fomentationes calidæ stypticæ supra stomachum dictæ cap. de fluxu ventris, paræ de cura lientericæ propter debilitatē virtutis retentiuæ stomachi: & dētur cibi sicci & assii non liquidi: & diacitoniton. Et minoretur potus pro posse, qui sit vinum rubrum lymphatum cum aqua decoctionis masticeis. Fiant autē clystere & balnea resolutiua vsq; ad vmbilicum dicta in isto cap. paræ de cura colicæ ex ventositatē sine materia, & de colica ventosa cum materia flegmatica: & purgetur cum myrobalanis emblicis, & si necesse fuerit, & non cum re alia: sicut dixima ca. de fluxu ventris, paræ de lienteria propter flegma in stomacho & intestinis, sic namq; liberantur, si deus voluerit. Et si fluxus plus infestet, quam dolor, augmenta styptica: si autem augmenta carminatiua: si vero æqualiter: æqualia.

Canones. In cura malorum intestinalium: clystera & medicina, q̄ administrantur, in hoc differunt, quoniam si administrantur pro cura fluxus ventris conuenit vt cum liquore modico exhibeantur: si vero cura stypticitatē ventris, cum liquore plurimo: in colica vero medio modo. Cauendum tamen, ne pecces excedendo vel citra sistendo: quoniam humor exuberans virtutē euacuantis medicinæ dissoluit, & colliquitur: liquor vero deficiens eorū virtutem reducere retardat.

Prognosticatio. Colica & iliaca si fuerint cum fluxu ventris aut vomitu, & per hoc dolor alleuetur, bonum: quoniam causæ expulsiōe significat. Si vero cum fluxu non alleuetur, malum: quoniam causæ multitudinem, virtutis defectum, s. retentiuam, nec non cursum humorū symptomaticū designat. Itē colica p̄durans, quæ neq; arte, neq; natura tollitur: in tympanitē muræ perniciosam. Vnde Hipp. 4. part. aphor. Quibuscūq; torsiones, & circa vmbilicum dolores & lumbos, & dolor non soluit, neq; farmacis, neq; aliter, in hydroperem siccā perficitur. Itē in colica se, superueniens p̄ se vel p̄ arte tollit ægritudinē. Vnde Hipp. 6. part. apho. Quibuscūq; dolor sit circa hypochondria sine flegmone, i. sine apostemate, se, ijs sup̄ueniens soluit dolorē. Itē in colica & iliaca si retineatur stercore & vrina simul cum dolore plurimo interficiet intra septē dies si nō superuenerit fluxus ventris flegmaticus fortis, vel vrina grossa alba plurima, v̄l febris. Vnde Hippo. 6. part. aphor. Quibuscūq; ex stranguria ileos innascitur, in 7. diebus perimit, si nō superueniat febris: aut multa vrina fluxerit. Et expone ileos, i. iliaca. Item si fuerit cum retentione ventositatum omnino malum. Item sollicitandum in curastorum dolorū. Quoniā vt ait Auic. primo cañ. señ. 2. cap. de dolore. Dolor est de maxime virtutē prostermentibus. Maximerum autē dolor corpori nostro accidere possibile sunt ij tres. Dolor articulorum, dolor dentium, & dolor viscerum: vt asserit Auerro. 2. sui colligit: & proprie in corpore sensibili, raro, delicato: quapropter timendum ne forte cadāt in syncopim p̄niciosam.

¶ De apostematibus & vlceribus intestinorum.

Caput III.

PP 3

Cum apostema fieri non possit in membro, nisi ex materia humora si currere per venas & arterias penetrare in spongiositatem membri debilis, & solvente eius continuitatem: ut dicit Gale. in reg. ca. de apostematibus. & docet euidenter: sequitur quod intestina non possunt apostemari, nisi ex materia subtili calida, acuta, cholerica: cum sint membra solida, densa, neruosa. Signa igitur apostematis cholerici in intestinis, sunt dolor in ventre maximus cum eius inflatione, & pulsatione et fe. acuta valde, et siti, et vomitu cholere: et si dolor fortissime: cogitur æger sterius vomere, propter apostematis magnitudinem opilantem: propter quod fit eius anhelitus foetidus, & eructuatio similiter, & corpus totum: & est cum angustia & reuolutione cœtinua de latere super la tus: & appellatur hoc apostema ileos. Et siunt quandoque ista accidentia præter se. & tunc non significat ileon sed flegma grossum viscosum adhærens meatibus intestinatorum vehementer. Et curam eius diximus ca. de stypticitate ventris: & ca. de colica. para. de colica propter flegma grossum.

Methodus. Cura ileos est, ut a principio ægritudinis, id est ante quatuor primos dies ad plus fiat si eboto mia diuersiua de basilica in brachio dextro deinde de saphena pedis quæ est intra in talo: Et iniiciat clystere percussiuum, molituum factum ex aqua ordeï vel ex aqua decoctionis violæ, maluæ, bismaluæ, ordeï, lactucarum, mercurial, colando, & addendo in colatura albumen duorum ouorum & mucillaginem psylli, tepidum iniiciendo. Et si caliditas sit vehemens, potest addi se. papaueris, se. portulacæ, citruli, cucurbitæ, & similia semina, in decoct. etiam oleum violæ. Et sumat sæpe de syrupo rosæ, vel violæ, cum aqua decoct. psylli, lactucarum, & similibus infrigidantium: & venter leniatur, si sit possibile, cum 3.

1. medullæ cassiæ si dissolutæ in 3. 4. aquæ decoctionis, prunorum damascenorum, endiuæ, cucurac, lactucæ, & alteræ colando & tepidum admittendo ante diem. Sumat sæpe diapa paueris, zuccaræ rosæ, vel violæ, & tria sandali, cum aqua prædicta. Nutriatur hora illa cum cibis subtilibus lenitiuis: sicut est ius pullorum, et aqua, in qua cocta sunt malua, bismalua, attri plex, lactu. spinarch. bletæ, & olus factum ex his conditum cum lacte amygd. dulcium: Et quandoque sumat de pisana colata: & quandoque vratur cibus diureticis, ut materiæ diuertatur ab intestinis: sicut est aqua decoct. cicerum, anethi & pisorum. Bibat iulep, vel aquam ordeï, vel aquam decoct. prunorum damasc. Et si virtus sit debilis, confortetur cum esu pullorum, et iuribus eorum, in quibus sit aliquid pullaro, non acuat: sicut est cynamomum et crocus. Post diem quartum, & in augmento vngatur locus cum oleo de chamomilla, vel de anetho ad dolorem mitigandum: & emplastre tur cum mollificatiuis & resolutiuis: sicut est emplastrum factum ex rad. malua uisci & malua & se. lini: & 3. nigricæ, & violæ. coquendo omnia in aqua perfecte, & pistando & incorporando cum mucillagine scæ nigricæ & oleo chamomil. vel anethi, vel de lilio, vel de amygd. dulcibus: & calidum ponatur super locum. Et sic regatur cum cibis & medicinis per totum statum, donec apostema perfecte resoluitur. Quod si nihil prædictorum contulerit: imo se. & dolor augmentatur quacumque die: signat quoniam apostema huiusmodi neque curari potest, neque resolui, sed tendit ad collectionem gradatim: quare procedat ad emplastra maturatiua, quæ dicta sunt ca. de apate stomachi &c.

Prognosticatio. Dicit Ras. in diuisionebus quod ileos raro curatur: & si confirmatur, nequaquam curatur propter doloris intensiorem, & membri necessitatem. Confirmatur autem visus

ad primam periodum ad plus, quę termi-
natur in die quarto: quare tunc necessa-
rio interficit vlt prius: cũ sit morbus pera-
cutus: si nõ fuerit sibi rationabiliter sub-
uentum: quoniã post diem quartum ma-
teria tota vel quasi fluxa est ad locum:
quare nõ poterit apostema de cetero eui-
rari. Item si ileos terminatur ad resolutio-
nem de die in diem cum doloris & se. di-
minutione, bonum: Si vero ad sanatio-
nem, vel sclerosim, mortale. Vnde Hip.
7. part. aphori. In dolore diurno circa
ventrem sanies, malum, Item dicit Hip.
4. part. apho. In feb. acutis spasmi & cir-
ca viscera dolores fortes, malum: quoniã
apostema significat in aliquo intestino-
rum. Item in ileos frigiditas extremitatũ
cum caumate circa ventrẽ, mortale. Vn-
de Hippo. 7. part. apho. In acutis passio-
nibus frigiditas extremitatum, malum:
scilicet quia apostematis magnitudinẽ,
& materię effrenitatẽ demonstrat. Idem
in eodem. In ileo vomitus, aut singultus,
aut spasmus, aut desipientia, malum &
mortale: quoniam apostema significant
fore confirmatum. Item si in ileo primo
retineatur vrina, & post hoc sterqus &
vrina simul, mortale. Vnde Hip. 6. part.
aphori. Quibuscumq; ex stranguria ileos
innascitur, hi in 7. diebus pereunt, si non
feb. superuenerit, aut vrina multa flu-
xerit: supple vt dicit commentator, si
ileos sit de causa frigida flegmatica &
vrina alba, grossa: quoniam si sit de cho-
lera quod plus accidit: tunc feb. quanto
magis superuenerit, tãto citius interficit.
Ileos igitur frigida est proprie iliaca pas-
sio non apostema.

TRACTATUS QVIN- tus tertiz sectionis. De passi- onibus ani.



Icteris & ani sex sunt in ge-
nere passionis. Prima tena-
smone et pruritus: Secunda est
exitus siue mollificatio: Ter-
tia vermes in ano: Quarta
rhagadiz: Quinta hæmorrhoides, & eru-
ptiones venarum similes hæmorrhoidi-
bus: Sexta est apostema et vlcus in ano.
Est autem anus orificium longaonis ha-
bens musculos latitudinales & transuer-
sales, quibus clauditur & confirmatur,
ne quid ingredi possit præter voluntatẽ:
puta aqua vel puluis: quoniam laderet
intestina.

De tenasmonẽ, & pruritu in ano. Cap. I.



Tenasmon est appetitus asse-
landi frequẽs, assiduus cum
conamine & pondere sine
effectu omnino vel paucò.
Pruritus vero est mordica-
tio ani assidua, & est sicut dispositio te-
nasmonem præcedens. Fiunt autem istę
passiones, aut a vermibus natis in ano
mordicantibus, & eius signa & causam
dicemus infra suo cap. Aut ex flegmate
salso viscoso mordaci adhærẽti labijs fi-
cteris, & ea stimulari. Fit autem flegma
salsum, aut propter aduersionem flegma-
tis naturalis: et tunc est magis viscosum,
& minus mordicatum & coloris albi:
aut propter cholę permixtionem: & tunc
est magis mordicatum, & minus vi-
scosum & coloris palearis. Signa istarũ
passionum, prout fiunt ex flegmate sal-
so, sunt: quoniã æger sentit in ano stimu-
los incessanter quasi secum & egestionis
cum dolore: & q̃ in ascellando nihil egre-
ditur, aut parum quid, velut sputum aut
mulcillago: neq; est fecibus permixtum
sed purum: Et si sit passio recens, erit sine
excoriatione: Si vero antiqua apparebit
excoriatio, & sanguinis vel saniei exitus
cum tali sputo: & quoniam cum supposi

corijs & licinjs iuuatur plus q̃ a clysteribus. Et istud est certissimum signū distictium tenasmonis a dysenteria: & proprie qñ excoꝛiatio est interius in ano.

Methodus. Cura eorum est, vt digeratur materia cū syrupo acetoso composito, vel cū syrupo de fumo terræ, quē ponemus ea. de scabie & pruritu cutis lib. 2. Post hoc purgetur cum hierapiera Gale. vel hiera. Ruffini, dādo ex eis. 3. f. vel. 3. 6. ante diem cum aqua calida, vel cum hoc apozimate. ℞. myrobalarum indorum. 3. i. citrinorum, emblicorum añ. 3. f. f. f. fenig. epithymi, fumi terræ. añ. 3. f. f. feniculi, anethi, ameos, añ. 3. i. prunorum numero 10. pistentur myrobalani grosso modo, & omnia bulliantur in 3. 8. aquæ fontanæ, donec mediætas consumatur: tū in fine addatur fenæ, epithymū & fumi terræ: bulliātur parumper: quoniam virtus eorum resolveretur per fortem decoctionē: Coletur & in colatura ponātur. 3. 2. vel iij. zuccari: & iterum bulliātur ad ignem lentum, donec zuccarum resoluatur: tū coletur totum, & detur post mediam noctem: quoniam soluendo materias flegmaticas adustas vel non adustas stringit fluxum, & confortat longaonem. Sedit æger bis in die in aqua calida decoctionis florum chamomillæ, meliloti, anethi, lentium ex corticatarum: vel in aqua decoct. fumiteræ, ameos & sulphuris, vel fomentetur cum petijs infusis in eisdem aquis, vel in aqua mellis: quoniā est plurimum abstersiua & styptica. Post balneū, vel fomentationē vngat locus cū oleo ro. et oleo de mastice: in qbus sit aliqd sulphuris dissolutū. Clysterisetur frequenter cum clysteri facto ex aqua decoctionis lērium ex corticatarum. & ordeī depilati, sumendo ex eo lib. i. colando, & addendo. 3. 2. olei ros. & 3. i. sepi hircini, tepide inq̃iendō: qm̃ lauando intestina, & abstergēdo flegma mitigat dolorē, et stringit fluxū, Im-

ponat etiā intra anū & supra semper post fomentationē vel balneū vel post emissionē clysteris immediate tale restrictiū. ℞. thuris, litargiriū, gummi arabici, boli armenici, san. dra. myrrhæ. añ. 3. i. opij. 3. f. dissoluat opium in vino pōtico, v' lucē plantaginis, vel sepo hircino liquefacto ad ignē, & cōficiant aliæ res cū illo liquore, vel inuoluātur in eo licinia longa ex pannis lineis mollibus, vel bōbace cōstricta & ligata cū filo circūcirca: et imponat hora p̃dicta. Et si dolor fortior fuerit: ponātur de opio. 3. 2. et si. sicut prius: qm̃ dolorē abijcit, et somnū inducit, q̃ est maximū remediū huius passionis. Si autē dolor magis fortificaret, et vigilie ægrū ad defectionē p̃ducerēt: imponat tale liciniū. ℞. opij, iusqami, papaueris, corticis mandrag. cortic. granatorū, myrrhæ, croci, musci, cymini, añ. 3. i. cōficiantur cū succo plātaginis, vel vino rubeo pōtico, sicut prius: qm̃ ilico dolorē tollit, et sensum obtūdit: & sic vicicissim p̃ balnea et suppositoria regatur, donec liberetur omnino. Si autē tenasmon fuerit antiquus, & san. & sanies visa sint: fiant clysteria dicta capitulo de fluxu ventris. parag. de dysenteria propter corrosionem: & omnia quę ibi dicuntur. Vtatur frequenter tali puluere. ℞. se. iusquiami. 3. 2. se. anethi, semi. seū. añ. 3. 4. ameos. 3. iij. apij. 3. 10. Dentur ex eo ante cibum. 3. 2. vel. i. cum syrupo ros. vel vino pontico: quoniam materias incidit, & postea cōstringit. Diateter hic patiens carnibus laudabilibus hœdorum vel pullorum, & iuribus eorū, & pulmento facto ex farina ordeī vel auenæ. Bibat vinum diureticum & bene lymphatum: abstineat a pipere, alijis, cepis, sinapi, & omnibus acutis, vel salis: quoniam acumina omnia habent materias pruritivæ generate.

Emperica. Ad tenasmonem sine excoꝛiatione cōfert sedere super asserem abietis vel pini recētis calcfactū

ad ignem, super quo linitum fuerit sepū ceruinum, vel hircinum in causa calida, sed colofonia, vel terebēntina in causa frigida. Confert etiā sessio super latere igni ro asperso ex aceto vel vino pōrico atq; pānis lincis inuoluto. Confert etiam vngere anum cum eodem sepo ad ignē, & fomentare cum pānis lincis infusus in eodem sepo dissoluto ad ignem: et subfumi gare cum thure, vel mastice, vel gummi arabici, vel terebentina posita super car bones ignitos, & facere encasima, id est balneum infra vmbilicū ex aqua decocti, siccarum, plāraginis, balauftiæ, corticis granatorū, myrtillorum, spicæ nardi, nucis cypressi, cupularum glandium, mēspilorum, sumach, sorborum, costi, et similibus: vel fomentare cum aqua decoctionis acatiæ, mastice, thuris dragagāni, galbani, & simillum ad dēdo aliquid opij, vñ seminis iusquiami: vel saccellare cum riso, milio, spelta torrefactis in facculo: vel sedere super caules & lentes bene coctas, & diligēter expressas actu calidas, faciēdo ex eis emplastrum calidū super anum: quoniam substātia istarum rerum est styptica, succus vero mordificatiuus, pōpter partes quasdam acutas subtiles quæ cum decoctione exprimuntur. ¶ Ad tenasmonem vero, qui est cū excoarctatione longaonis nihil melius reperis, q̄ licinium bombacinum longum atq; solidum linitum cum vnguento albo, vel citrino Nicolai, & assidue gestatum actu frigidum intra corpus: quoniā dolore mitigat, & vlcus consolidat pfecte. Quod si fortificare volueris vnguenta p̄dicta, incorporē cū eis pul. litargiæ, vel cerusæ, vel rhuris albißimi, vñ masticeis, vel corallorū subtiliter cribellatus. Et si plus fortificare volueris in stypticitate, extingatur litarg. bis vñ ter in aceto, vel aqua ro. postq̄ fuerit integrum vehementer ignitū super carbonēs, & ablucur cerusa totiens in aqua ros, donec per

ipsam amplius nō inficiatur. Et ex remedijs sublimibus cum presto non est aliud, est pul. corticis falicis combusti, incorporatus cum sepo ceruino, vel hircino liquefacto ad ignem in formam vnguenti, & cum licinio gestatus in ano: similiter & linitus circumquaq̄.

Prognosticatio. Solicitandum in cura tenasmonis: quoniā si ad corrosionem anideuenerit, longaonem vlcerabit, & sic dysenteria inducet tumoresam. Verum quomodo cūq; res se habuerit dolor virtutē deiciet, et feb. hectica accēdet, calorē & spiritus ignendo. Item Hippo. 6. parr. apho. Mulieri in vtero habēti tenasmon superueniēs abortum facit.

De exitu & mollificatione ani. Cap. II.

EXitus ani siue eius mollificatio fit propter aliquā ex causis quinque. Prima est humiditas flegmatica plurima, mollificans longaonem fistecrim atq; laceros eius. Secūda est paraly sis lacertorum fistecris. Tertia est apostema in interioribus longaonis. Quarta est casus & percussio facta super spondilia dorsi. Quinta est propter fistulam infiltratam in ano. Signa eius propter humiditates flegmaticas plurimas, sunt: quoniam patiens sentit in ano dolorem grauium cum mordicatione, & assellandi appetitu cōtinue, quasi sit tenasmon: & apparent in egestionē vel post musculag. albæ viscosæ: et quādo redit anus ad interiora, si manibus vehementer impellat. Signa eius propter paraly sim, sunt si gna eadē, sed alio mō: qm̄ si sint propter paraly sim, subito fit hæc passio: & fit cū paraly si in altero latere corporis a vertice capitis vsq; ad plantā pedis, vel a collo infra capite stante sano: & raro fit paraly sis in vno solo mēbro: & egreditur stercus et vterilitas sine volūtate propter

Tractatus quintus

ablationem virtutis retentiuæ lacertorū ani. Signa eius propter apostema, sunt: quoniam anus non ingreditur, licet manibus fortiter impellatur: & est cum rubore, calore & dolore acuto: & fortasse cū feb. Signa eius propter casum vel percussionem, patent ex relatione infirmi. Nam propter casum et percussione spon diluū dorsi leditur & contunditur nucha, a qua oriuntur nervi lacertorū, cum ipsa sit vicaria cerebri in propagatiōe nervorum. Signa eius propter fistulam, sunt an recessio fistulæ diuturna cū continua stil latione humiditatis pessimæ vel sanioisæ & induratione labiorum eius.

Methodus. Cura eius propter humidi tates flegmaticas est, vt a principio digeratur flegma cum syrupo proprio, sicut est oxymel compositum, vel mel ro. & quos dicam ca. de fe. quoti diana lib. 2. Post hoc purgetur cum hiera picra Gale. vel medicamine de turbit, dicto ca. de soda, vel cū apozimate my robal. kebullorum & emblicorum dicto ca. de debilitate digestiōis stomachi. Bal neetur frequēter infra vmbilicū in aqua calida decoc. florū chamo. melilo. ane thi, ros. siccarū, balaustiarum, granorū myrri, & foliorum eius, vitis, cupullarū glandium gallarum corticis granatorū, costi, spicæ, nardi, myrrhæ, mespilorum, sorb. plantag. sumach. citoniorum, ma lorum poixi. q. omnium stypticorum cū additione resolutiuorum aliorum: vel fomentetur anus cum petijs lineis molli bus vel bōbacinis infusis in eisdē aquis. Clysterisetur quādoq. cum aqua ros. & aqua decoc. iam dicta. añ. lib. 8. inſciēdo, cum est tepida sape in die, & proprie post affellationē ilico repellat anum ad interiora cū manibus frequēter, & inun gatur cū oleo cōmuni vel oleo ro. vl' nar dino, vel anethino, vel chamomilino, vel myrrino, vel cum aqua ros. actu ca lida. Et super tale linimentum spargatur

pul. iste. 1℥. karabe, thuris, mastice, ba lausticæ, lixargiri, cupullarū glandium, ematilis: sang. dra. antimonij, aluminis, acatiæ gallarum, cyprassi, plidig, cerusæ, lotæ, boli arme. mūmiz. añ. 3. x. terantur omnia vel quædam subtilissime, & cribel lentur: vel ex oleis prædictis & scpo hir cino & pulvere fiat vnguentū addendo ceræ quod sufficit. Et post linitionem fir metur anus ad interiora cum plumaceo lo molli bombacino calefacto ad ignē pfecte & fascia: & faciat quotiescumq. in die egreditur post affellationē vel si ne affellatione donec perfecte interius fir metur. Nutriatur carnibus assis vel eli xis cum petro. & fœniculo conditis cum speciebus calidis aromaticis. Vtatur riso & milio conditis cum lacte amygdala rum, vel adipe renuncaprarum. Bibat vinum rubeum ponticum lymphatum cum aqua pluuiali. Et sic regatur per sty ptica: quoniam fluxus ventris, & fre quens affellatio curā eius retardant, vta tur sape, diureticis, vt materiæ dirimanē ad vias vřinales: sicut est vinū albū cla rum aquosum vel adaequatum parum per & sc. anisi, fœniculi, & petros. Et si sit cum tenasimone, curetur prout diximus ca. suo. Cura eius propter paralyſim, est eadem cum ista: & vt vnguantur spondi lia a collo vsq. ad caudam cum oleis & vnguētis calidis dictis cap. de paralyſi. parag. de causa paralyſ. factæ humorū vitio. Cura ei⁹ propter apostema, est vt a principio fiat flebotomia diuersiua, si atas & virtus consenserint de. saphena, quæ est intus in talo, vel de basilica pe dis, quæ est inter anularem & auricularē: Et purgetur si sit possibile cū aliqua me dicinarum prædictarū: Et ponatur ager sape in aqua tepida decocti. malux, bis malux, viol. florū chamomillæ, meli loti, anethi, ros. añ. quoniam apostema repercutit, materias fluxas resoluit, & do lorem mitigat. Et vngatur cū oleo cha

momillino, vel nardino, vel ros. mixtis, & incorporatis cum cera, quod sufficit: Et sic regatur, donec tumor resideat: tunc impellatur anus ad interiora: Et si omnia supradicta de causa stegmatica tã in me dicinis, quam in diæta. Cura eius quæ sit propter casum & percussionem est cura paralytis factæ propter casum & percussionem. Curã eius quæ sit propter fistulã chirurgicis derelinquo.

Emperica. Ad exitum ani, qui sit propter humoris vitiũ, confert calefacere manus ad ignem lentum, & ablueri cum vino claro potẽti, & sic manibus calidis aromaticis reducere anum ad interiora perfecte, & locum obstruere cum massa ceræ calidæ tractabilis habẽte figuram spherę leuiter cõpressę. Quod si cũ cera incorporetur mastix, vel thus dissoluta in vino styptico, melius confert, & firmetur cũ fascia perfecte, & sic reiteretur, donec anus confortetur perfecte. Idem facit glomicellus bombacin9 infusus oleo cõmuni, vel masticeo, vel nardino feruenti, & super locum firmatus. Confert præterea sedere in aqua frigida: vsque ad vmbilicum sine mora in ipsa: quoniam frigidum per se constituit, & propter antiparistalim confortat.

Canones. Exitus ani cõtingit plurimũ cum chronicam: quare dicta illic suffragantur præsentia. Et vniuersaliter confortant restrictiua propter mēbhorum cõfortationem, & materiæ exiccationem, & remediorum fixationem super loco, qd non potest fieri in fluxu ventris.

Prognosticatio. Exitus ani sit cum fluxu ventris, vel renascone forti, malum: quoniam causam multiplicat, & operationem remediorum localium re ardat. Item exitus vel mollificatio ani facta propter paralytim aut fistulam, aut casum, aut percussionem nõ curatur: licet cum blanditijs tales susten-

tari possint tempore aliquo. Si autem cũ hoc mollificentur pedes, & fiat hoc subtilo, magis malum: quoniam læsionẽ significat profundatam fore vsq; ad neruos: quare nullatenus curari potest: sicut necq; paralytis facta in casu, vel p̃cussioẽ fortis: prout scripsimus suo ca. Itẽ in senibus difficilius curatur hæc passio, q̃ in iuuenibus, licet piculosior est in iuuenibus: q̃niam fortiorẽ causam significat. Est ergo in senibus difficilior curando, in iuuenibus causando. Itẽ in mollificatione ani se, superueniens tollit ægritudinẽ. Itẽ si remedia rationaliter exhibita non contulerint, & corpus de die in diem extenuari cõeperit, & discolorari, mortale: quoniam paralytim spondiliũ dorsii, & neruorum significat vltimatam.

De vermibus in ano. Cap. III.

Vermes generantur in ano ex materia putrida, marcida, stegmatica, viscosa, in quã calor solaris et naturalis & putredinalis agũt. Signa eis sunt pruritus ani frequens, & forte si aspi ciatur, apparẽt res viua: sicut thieæ quæ nascuntur in caseo: Et forte non apparẽt nisi anus inuersetur cum ventosa: Et licet sint parui oēs: sunt tamẽ colorũ & figurarũ diuersarũ secundũ materiæ diuersitatẽ, ex qua fiunt. Et si repertiũr similes seminibus cucurbitæ, non sunt geniti in ano, sed in colo & lōgaone, quæ descẽdũt ad anũ: quorũ curã diximus in ca. de colica. para. de cura colicæ. ex vermib9.

Methodus. Cura eius est, vt primo interficiantur vermes: qd fit si lana mollis vel bombix inuoluatur i felle taurino, vel oleo de absinthio, vel de ruta, vel de nucleis persicorum, & supponatur frequẽter in d̃e: vel si vngatur cum oleo cõmuni, vel oleo aliquo prædictorũ, in quo dissoluta sit aloes. 3. f. vel pul. agaf. vel colloquint. añ. 3. i. Confert etiã fomẽratio ani, & eius positio in vi-

Tractatus quintus

no decoctionis absynthij, tutæ, foliorum persicorum, polij montani, colloquintidæ, sticados, arabicæ & similia: Vell initio ani cum succis earundem rerum incorporatis cum aceto forti, & aloë, & hierapicra: Et quodcumq; prædictorum administretur, sit actu calidum. Cōfert etiam ablutio ani cum aqua salsa actu calida frequenter: quoniam omne amarum vermes interficit: sicut dulce fouet, & generat. Præterea mundificetur anus cum stypticis absterisuiis: sicut est aqua mellis in qua sit aliquid aloës dissolutum si cum lana vel coto intrinseco abstergatur, & fricetur cū petijs in ea infusis. Purgetur cum hierapicra Gal. vel hiera. Ruffini, dando ex eis. 3. f. cū aqua calida ante diem. Postea mundificetur locus cū vnguento viridi, dicto ca. de surditate, aut cū oxymelle squillitico, & modico foliorū grīs, aut cū vrina pueri, & modico mellis aut cum vino & melle, aut cū aceto, vel aqua mellis & hyssopi si sit cum fe. Balneetur frequenter in aqua calida decoctionis ros. meliloti, flos chamomillæ, & hyssop. fœnigraci, maluæ, bismaluæ, vici. foliorū populi, & similia: quoniam materia mollificat, & dolorem lenit. Et post balneū iterū mundificetur cū vnguento viridi: & sic si, vicissim, donec locus perfecte exiccetur. Et si dolor quādoq; intēderet, ponat super anū emplastrū anodinū factum ex vitellis ouorum, farina ordei, et melle ros. incorporatis adinuicē: & potest addi semen lini, farina scenigraci, flos chamomillæ, & similia: decoquant in aqua, & incorporando cū eisdem, & tepidū ponendo super locū: quoniam materias resoluit, tumore sedat, dolorē mitigat. Vltimo consolidetur cū vnguento albo: & si nō suffecerit, fortificetur cum puluere litargiri incorporato in ipso: quia magis stypticū, vel cerusa lora. Subsumigetur cum thure, mastice, vel bdellio. Vnguentū bonū consolidās rhagadias ani & fissuras labiorū oris, vlcera in aurlibus & naribus, & in quocūq; loco corporis, Et postq; mundificata fuerint cū sty-

suræ labiorum ani, ex quibus forte nihil emanat: Et quādoq; emanat res viridis, vel nigra, vel liuida, vel citrina foetens cum dolore & ardore & tumore alii quali: & est quādoq; cum fe. & sit semper ex materia adusta cinerosa, vel flegmate salso vlcicante, & apostemate loca ista dicta. Et signa parent ex re dicta.

Methodus. Cura eius est, vt digeratur materia cum sytypo de fumo terræ, qui dicitur ca. de scabie & pruritu corporis lib. 2. Purgetur post hoc cū hierap. Gal. vel hiera. Ruffini, dando ex eis. 3. f. cū aqua calida ante diem. Postea mundificetur locus cū vnguento viridi, dicto ca. de surditate, aut cū oxymelle squillitico, & modico foliorū grīs, aut cū vrina pueri, & modico mellis aut cum vino & melle, aut cū aceto, vel aqua mellis & hyssopi si sit cum fe. Balneetur frequenter in aqua calida decoctionis ros. meliloti, flos chamomillæ, & hyssop. fœnigraci, maluæ, bismaluæ, vici. foliorū populi, & similia: quoniam materia mollificat, & dolorem lenit. Et post balneū iterū mundificetur cū vnguento viridi: & sic si, vicissim, donec locus perfecte exiccetur. Et si dolor quādoq; intēderet, ponat super anū emplastrū anodinū factum ex vitellis ouorum, farina ordei, et melle ros. incorporatis adinuicē: & potest addi semen lini, farina scenigraci, flos chamomillæ, & similia: decoquant in aqua, & incorporando cū eisdem, & tepidū ponendo super locū: quoniam materias resoluit, tumore sedat, dolorē mitigat. Vltimo consolidetur cū vnguento albo: & si nō suffecerit, fortificetur cum puluere litargiri incorporato in ipso: quia magis stypticū, vel cerusa lora. Subsumigetur cum thure, mastice, vel bdellio. Vnguentū bonū consolidās rhagadias ani & fissuras labiorū oris, vlcera in aurlibus & naribus, & in quocūq; loco corporis, Et postq; mundificata fuerint cū sty-

Prognosticatio. Soliciendum in cura vermiū in ano, quoniam perducit ad tenasmonem cum excoitatione, & forte ad rhagadias ani & vlcera corrosiua fistulosa: & forte ad dysenteriam perniciosam: & forte labor & dolor febrem excitabunt.

De rhagadijs & fissuris ani.

Cap. III.

DE rhagadijs & fissuris in ano pauca dicemus, quoniam ad chirurgi cum spectat earum cura completa: cum feri non possit sine omni operatione manuali. Sunt autem rhagadiæ fis-

piscis prædictis, sic fiat autoritate Mes.
in suo de appropriatis cap. de fissura la-
bijs oris. *℞.* gall. cerus. ancim. litargi.
añ. partē vnā: amil. dragag. mulcil. se. cl
tonioꝝ. añ. *℞.* terant oia, vt alcohol, et
conficiant cū adipe gal. vel anat. vel cū
terebentina & adipe, vel cū cera & oleo
mastictino: vel cū mastice & melle. Et si
niatur ex eo locus frequenter post vicissi-
tudine stypticorū alternatim. Et empla-
stra scripsimus autoritate eiusdē ca. de
vlcere in aure. Si aut ex rhagadijs conti-
nue fluat virus aut sanies lædens & mor-
dicans, fomētē sæpe locus cū aqua deco-
ctiois sumach, plāra myrti. balaust. me-
spil. & similiū. Post hoc excicetur cū pan-
no lineo molli, & emplastre cū empla-
stro facto ex farina volatica molendini,
& pul. granorū vuꝝ. boli armenici, sang.
drac. incorporatis cum albumine oui. Et
post excicationē redeatur ad consolidati-
onē p̄dictam ex vnguento al. vel ex vñ-
guento Mes. p̄dicto. donec rhagadiæ per
fecle cutētur. Nutriatur carnibus lauda-
bilibus & proprie assis. Abstineat a legu-
minibus, & sina. & omnibus acutis; bi-
bat vinum album.

Prognosticatio. Sollicitādū ī cura rha-
gadiarum, ne forte in
vltus corrosiuū cōuertātur, seu fistulā pe-
netrantē & mitigetur dolor & curetur te-
nasmon; ne forte feb. hectica accendant.

**De hæmorrhoidibus, & ver-
rucis in ano. Cap. V.**

HÆmorrhoids est quandoq; nomen
venæ magnæ procedētis a splene
ad longaonem ramificatæ in ra-
mos quin q;: quorum orificia terminant
ad longaonē, qd anus dicitur, ad deferen-
dū & purgādū sanguinē melancholicum
grossum aduultū vel nō aduultū superflu-
entē in splene: Quandoq; est nomē passi-
onū earundē venarū. s. quando inflātur,
& apostemātur cū dolore plurimo circa

anū. Et licet in corpore sint venę p̄dictę,
nō tamē passio hæc cōuenit omnibus sed
solū illis quorū splen exuberat sangui-
ne grosso aduultū vel nō aduultū consueto
purgari p̄ talē regionē proprie tamē ad-
uultū: qm vt dic. Ras. in diuisionibus hæ-
morrhoidis, nō generat nisi ex aduultio &
acuitate in sanguine: & ideo oēs hæmor-
roidici sunt spleneticī, licet nō ecōuerso:
In alijs aut corporibus sufficit purgatio
eius p̄ resolutionē insensibilē, & p̄ venā
mulgētē melancholiā ad os stomachi gēa
prouocatiois appetitus: qm talis melan-
cholia trāsīt cū superfluitate primæ dige-
stionis ad secessum. Et ex hoc apparet,
qd in corpore cōsuetū hæmorrhoides sunt
naturales, & p̄seruantes a multis malis
passiōib; vt lepra, phthisi, dēmonio lupi-
no, cancro: si melancholia fuerit aduultā, vñ
hydropis. scabiz, morphea: si fuerit non
aduultā, sicut mēstrua in mulieribus: qua-
propter neq; cura indigēt, nisi qd restrin-
gūtur, cum superflue fluūt aut cursu im-
moderato. Iuxta illud Hip. 6. par. apho.
Hæmorrhoidas antiq̄s sanāti si nō vna
relictā fuerit, piculū est hydroꝝ. aut ma-
niā, aut phthisim fieri. Hæmorrhoidas
qdā sunt exteriores & apparētēs: qdā in-
teriores, & nō apperentes, nisi forte anus
inuerse cū vētosa vñre alia. Et q̄lescūq;
fuerint, & proprie si sint apparētēs, sunt
triū generū: qm aut sunt duræ siccæ, ex
qbus nihil emanat, & sunt cū tumore &
dolore in ano: & nominātē verrucæ. Aut
sunt molles fistulosæ emittentes continue
vel periodice rem citrinā vel nigram vel
albam, & nominantur mora: Aut sunt
apertæ omnino emittentes continue vel
periodice sanguinē purum, vel grossum
melancholicū: & sic ficus appellātur. Ca-
ue tamen, ne omnem sanguinis egestio-
nē ficum appelles: quoniā potest esse flu-
xus sanguinis epatici aut mēbralis, por-
ut ī ca. de fluxu vētris plen⁹ distinxi⁹.
para. de cura dysen. Signa hæmorrhoida

Tractatus quintus

rum in cōmuni sunt dolor circa locū ani
vehemens cū feb. vel sine fe. Si autē sint
exteriores, apparēt videnti tumores plu
res eminētes, aut vna. Si vero interiores:
sentitur dolor intra anum, & sit difficul
tas egerendi & emanat cū egestione sem
per, aut periodice sanguis vel humor niger,
aut viridis foetidus v^l ante egestionē
vel post. Et quoniam ista fiunt etiam in
tenasme cum excoriatione longaonis
& in dysenteria: ideo certius signum est
inuersatio longaonis, & aspectus ad inte
riora, si sit ibi tumor vel excoriatio sola.
Signa autē distinctiua inter verrucas, &
ficus, & mora, patēt sufficiēter ex dictis.

Methodus. Cura hæmorrhoidarum ex
trinsecarum duplex est: sci
licet completa & blanditiua. Completa
quidem morbum & eius causam perfe
cte eradicās est, vt a principio fiat flebo
tomia diuersiua, si ætas & virtus consen
serint, de basilica brachij sinistri. Postea
fiat flebotomia diuersiua & euacuatiua
de saluarella pedis sinistri, quæ est inter di
gitum auricularem & anularem: & post
flebotomiam, si possibile fuerit digerāt
& purgetur melancholia: sicut diximus
cap. de perturbatione sensitiuarum vir
tutū interiorū. para. de cura melācholia.
Deinde post remedia vniuersalia proce
datur ad localia. Abscindatur ergo radi
ces omnium hæmorrhoidarū: quanto pro
fundius fieri poterit, cum ferro ignito vel
non ignito, tenendo eas cum vncis &
extrahendo: vt melius fiat abscissio, aut
valeat profundari: Et dimittāt sanguis
copiose fluere, & si fluxus cessauerit: con
solidentur orificia incisa cum medicami
ne, quod sic fit. ℞. mastice, thuris, dra
gaganti, gummi arabici, boli armenici,
acatiæ, hypocistid, litargiri, coriand, tor
refacti, añ. 3. i. mummiæ. 3. 2. puluerisen
tur subtiliter, & aspergantur super loca
incisa. & cum albumine oui incorporen
tur, & emplastreter super ea firmādo cū

fascia: quoniā vulnus cōsolidat & inear
nat, & dolorem contingentem propter
incisionem mitigat euidenter: Et ex rebus
bonis ad idem valet pulvis corticis sali
cis combusti: quoniam omnem vlcera
tione cōsolidat, cū spargitur super ipsam:
& regatur sic, donec hæmorrhoides per
fecte cicatrizētur. Si autē sanguis post
incisionem prædictam non satis fluxerit,
vel diminute, ponantur medicamina acu
ta super locum, sicut est succus cepæ pista
ta incorporatus cum puluere anacardi,
vel euforbij, vel piperis, v^l sinapis, & si
cut est fel tauri per se, vel incorporatum
cum eisdem rebus: & sicut est vnguentum
viride, dictum ca. de febre nati. Et sup
istas vnctiones ponatur emplastrum fa
ctum ex cepis crudis contulis & incorpo
ratis cū modico aceti squillitici vel oxy
mellis squillitici: & cū bene adhaferint,
postea remoueat cū violētia, quia ista
habent ora hæmorrhoid, fortiter aperire
& sanguinem grossum educere. Vel si
aliud non sit præsto, ponantur sanguisu
gæ super orificia, & dimittantur, donec
fluxerint completæ & ceciderint: & si su
perfluant in sugendo, vel virtus ægri sit
debilis: aspergantur sale vel cinere: & ca
dēt dictæ sanguisugæ: & post consoliden
tur dicta orificia, sicut dictum est. Si ve
ro post incisionem prædictā, vel etiā an
te incisionē sanguis hæmorrhoidis ni
mis fluxerit & virtutem ægri deſiceret:
ponatur super locum istud vnguentū re
strictiuium. ℞. terræ sigillatæ, sang. dra
conis, balauſtiæ, acatiæ. añ. 3. 2. terantur,
& incorporentur cum farina molendini,
vel cum tela araneæ, & aspergantur su
per loca, vel misceantur cum albumine
oui: & fiat emplastrum super locum fir
mando cum plumaceolo & fascia: & cū
volueris remouere: mollifica cum aqua
repida, vel oleo viol. & leuiter moue si
ne violentiā, & cum restricta fuerint oīa
ora: post consolidentur, sicut prius. Si ve

ro post incisionem, locus apostemetur & fiat dolor fortis, quod quidem fit quando sanguis non currit sufficiens propter viæ strictitudinem, vel humoris grossitatem: tunc sūt remedia anodina, quæ iam dicentur in cura blanditiua. Accidit namque ex apostemate & dolore, vt forte retineatur stercus & vrina propter opilati onem: quare minuatur hora illa cibus & potus, ne multiplicetur vrina & egestio tribus diebus, donec sedetur apostema, & aperiantur hæmorrhoides cum medicinis acutis, sicut dixim⁹. Cura vero blanditiua, quæ solum remouet tumorem hora illa, est vt ponatur æger in balneo resolutiuo & mollificatiuo: sicut est aqua tepida decoctionis maluæ, altheæ, rosæ chamomillæ, meliloti, seminis lini, foliorum caulium, anethi, & similibus. Vel fomententur hæmorrhoides cum petijs infusis in ea de aqua: vñ fiat emplastrum super eas ex eisdē rebus pistatis & incorporatis cum oleo chamomillino, vñ nardino: & si suffecerit, bene erit. Sin autem fiat vnguētum stupefactiuum: quod sic fit. ℞. iusquiami albi & nigri ana. ʒ. i. opij. ʒ. f. papaueris albi & nigri. añ. ʒ. 2. ceruſæ, litargiri. añ. ʒ. f. olei ro. ʒ. iij. ceræ. ʒ. f. dissoluatur cera & oleum perfecte ad ignem: deinde deponantur ab igne: & cū tepefacta fuerint: incorporetur pul. aliarum rerum continue agitando cum spatula: & in fine addatur modicum aceti, hoc namq; dolorem remouet prohibēdo sensum. Deinde reitenter medicina resolutiua iam dicta, donec tumor recesserit, & dolor cessauerit omnino. Quod si tumor & apostema hæmorrhoidarū durum fuerit & difficilis resolutionis, requiritur apertio earum cum sanguisugis, vñ medicamine acuto prædicto: donec materia minorata fuerit, præmissa flebotomia prædicta. Deinde procedatur ad resolutiua & anodina: sicut iā scripsimus: sic namq; curabitur, donec alia materia

regeneretur. Cura hæmorrhoidarum intrinsecas est, vt præmissa flebotomia et farmacia supradictis, ponantur ventosa supra ipsum anum: vt inuerſetur, & hæmorrhoides appareant: tunc fiat cura cōpleta, vel blanditiua: sicut dictū est. Dicitur etiam omnis hæmorrhoidicus cibo generare sanguinem subtilem temperatum: sicut est caro hœdorū vel pullorum elixa cū feniculo & lactucis spinarum, vel borragi, buglossa. Et iura carniū earundē, & olus factum ex bletis & lactucis conditis cum butyro & sale. Bibat vinū album & clarum, subtile lymphatū cum aqua fontis viui. Caueat ab omni cibo & potu generante melancholiam naturalem vel non naturalem. Et cibi quidē generantes melacholiam naturalē sunt lentes, caules, caro vaccina, vel bouina, caro ferina, milium, risum, fabæ, vinum rubeum, pōticum turbidū, panis aszymus, & res omēs assæ vel frixæ. Cibi vero generantes melancholiam non naturalem per adustionē, & isti sunt pessimi in hoc casu: sunt cibi valde saliti antiqui, piper, allium, sinap, cep. vinū vetus amas, & similia. Cibi vero generantes melacholiā non naturalem per congelationem: sunt cancri, pasta, tortellæ, pisces grossi de aq̃ foetida habentes carnes non frangibiles neq; squamosas, aqua frigida turbida, & similia.

Emperica. Sciēdum, qd modus abscedendi hæmorrhoidas est duplex in gñe: vnus cū ferro ignito, qd cauterium dicitur: vel non ignito, vt putra sorio, vel sorpice, siue vncino. Secundus est cum medicina: & iste est triplex. Primus est cū aqua vrente: & sic fit. ℞. tartari vini veteris acutissimi. lib. 2. frangē minutim, & pone super laminam ferreā ignitam, donec in cinerem album cōuertatur, & cribelletur subtiliter, atq; suspēda ē in sacculo lineo valde denso per dies aliquot sub aëre frigido humido vapo-

Tractatus quintus

roso: qualis est in locis subterraneis, & sit figura sacculi pyramidalis eversa: ga-
 fluet liquor inde, qui colligatur in va-
 se vitreo stricti orificij, & omni die li-
 niatur cum pēna tribus vicibus super lo-
 cum: quoniam post diem, & diem exie-
 cabit verrucam, atq; cadere faciet paula-
 tim. Durat autem virtus huius aquæ per
 annum vnū, aut amplius, in loco tēpera-
 to: & eidem cōparatur aqua fragariæ,
 & propriè fructus eius, quando distillat,
 sicut faciendo aquā ros. Aqua vero for-
 tior p̄dictis, & q̄ carnē corrodit tubero-
 sam ilico, cū apponitur, sic fit. ℞. cineris
 vitis albæ, cineris fagi, calcis viuæ. añ.
 lib. 4. salis gemmæ, lib. 1. dissoluantur o-
 mnia cum 20. lib. aquæ claræ, atq; bulli-
 antur, donec tertia pars consumatur, cū
 spatula assidue agitando: tunc igitur ab
 igne deponatur, & residere permittatur,
 deinde quod seculentum est, abijciatur,
 sed quod optimum est, iterum bulliatur
 donec tertia pars consumatur: postea ab
 igne dependatur, & cum instigdatum fu-
 erit, iterum bulliatur, donec ex toto sola
 quarta pars remaneat, aut minus. Quod
 si scire velis, quādo sufficiat bullitio ter-
 tia, mitte pēnam aut petlām in aquam,
 & quando demolietur, tunc vsui reser-
 uetur, sicut aqua prior. Cum autem ope-
 rari volueris, cum ipsa misce aliquid ra-
 suræ calcis viuæ: donec fiat sicut puls, ne
 forte fluat super locū sanum. Aqua etiā
 omnium fortissima sic fit. Recipe arseni-
 ci, citrini, viridis æris, calcis viuæ, argen-
 ti viui, alkahal, vel loco eius salis gem-
 mæ. añ. lib. 6. salis armoniaci, salis nitrī,
 sulphuris viui, añ. vncias quatuor: teran-
 tur omnia subtilissime, & infundantur
 per tres dies naturales in 3. 12. lixiij acu-
 tissimi, vel aquæ dissolutionis calcis vi-
 uæ omni die agitādo ter vel quater cum
 spatula: quarto vero die addatur argen-
 tum viuum, & misceatur cum rebus
 p̄dictis, donec fuerit extinctum. Postea

formantur magdaleones, & exsiccantur
 in vmbra: deinde iterum terantur, & in-
 fundantur in eodem liquore magis &
 magis acuatō ex calce viua in ipso disso-
 luta: & sic per diem dimittantur, donec
 perfecte dissoluantur: tunc formæ fiant
 molles, sicut pasta tractabilis, quæ po-
 nantur in alembico, & distellentur, sicut
 aqua ros. quoniam ista aqua vrit lo-
 cum, quem tetigerit, & ipsum mortifi-
 cat, atque denigrat de die in diem. Post-
 quam igitur hæmorrhoides fuerint deni-
 gratæ, & sensu carentes, emplastre-
 tur cū emplastro putrefaciente ipsas, & cadere
 faciente, sicut sunt caules elixati & pi-
 ssiati & incorporati cum butyro recenti,
 vel axungia porci: & postquam cecide-
 rint, consolidentur loca, sicut dictum est.
 Secundus modus est cum vnguento cau-
 stico, quod fit ex arsenico sublimato, vel
 realgal, vel calce viua tritis & incorpo-
 ratis cum flore æris, & succo affodil: sed
 liniatur locus circumcirca cum popu-
 leon, vel albumine oui, vel oleo ros. &
 cera, ne forte corrosio dilatetur. Et huius-
 modi est vnguentum viride, & vnguen-
 tum de tartaro: quod scripsimus capitulo *supra 61*
 de surditate: & post corrosionem hæ-
 morrhoidarum, & earum casum, conso-
 lidentur loca cum vnguento apostolo-
 rum, dicto capitulo de vlcere in aure: vel
 cum vnguento de cerusa quod sic fit. ℞.
 olei ros. vncias quatuor, ceræ, vnciam
 vnam, dissoluantur ambo simul ad ignē
 in casola: tunc deponatur ab igne, & in
 corporetur pul. istarum rerum. ℞. litar-
 giri abluti in aqua, camphoræ, ana, drag-
 mam vnam, opij grana duodecim, semi-
 nis iusquiami. xxiiij. grana, corticis man-
 dragoræ dragmam vnam, cerusa quod
 sufficit ad inspissandum omnia. Et in si-
 ne addantur duo albumina ouium dili-
 genter & incorporentur cum spatula, do-
 nec omnino redeatur ad formam vngue-
 ti. Tertius modus est cū filo sericeo forti

supra 61
Re Tan
7

sub: fili, vel cum pilis equinis faciendo laqueum circa singulas radices hæmorrhoidarum: & omni die ipsum bis magis ac magis angustando, donec ceciderint omnia, deinde consolidentur, sicut prius. Sed omnium modorum meliorem reputo & faciliorem: quoniam alij propter moram diuturnam suæ operationis inducunt dolorem intolerabilem in loco & apostemant adeo, ut sterqus & vrina retineantur: Et adhuc securior est & nobilior, qui fit cum ferro ignito: quoniam cauterium facit escarâ super labia prohibentem sanguinem hæmorrhoidicum superfluentem. In hoc exiimus aliquantulum a nostro proposito: quoniam materia præfens ad chirurgicum pertinet.

Dicunt præterea experti, quod sterqus gallinarum recens, & proprie pars illa alba, cum sinitur hæmorrhoidem, dolorem mitigat, & inflammationem resoluit a proprietate. Sed sterqus columbarum id operatur a qualitate calida ouredinali euaporare faciente, præmissa tamen flebotomia diuersa: quâ diximus in methodo, ne fortassis materia augmentetur.

Canones. Non absceindantur omnes hæmorrhoides simul vna hora, ne forte dolor augmēteretur, & inducat apostema. Remoueantur ergo gradatim, vna post aliam de die in diem: nisi virtus fuerit fortis, & patiens abhorreat secundationem. Item non consolidentur omnes, sed relinquatur vna: sicut est sine omni cura completa: sed solum fiat circa ipsam cura biadiciua: vel si omnes consolidentur, denuo aperiatur vna earum cum sangui fuga, vel cum medicinis prædictis acutis. In cura cōpleta ut ait Hip. Hæmorrhoidas antiquas sananti. &c. Dicit autem antiquas: quia recentes, vel non multo tempore consuetas possumus omnes consolidare sine timore omnino, & proprie, si splen rectificetur, & sanguis diuertatur ad loca alia cum flebotomia

frequentata basilicâ sinistrâ.

Prognosticatio. Si in corpore consuetudo hæmorrhoides plurimum fluxerint, vel periodum accelerauerint plus debito: significat, quoniam corpus indiget euacuatione humorû subditiu acutorum calidorû: Si vero restrictæ fuerint omnino, vel periodum tardauerint, significat: quoniam corpus indiget euacuatione humorû grossorû frigidorû de flegmate vel melancholia, sicut in mēstruis hoc contingit. Vnde Hip. 4. parti. apho. Mulieri menstrua haberi sine colore proprio, & non secundū se semper facta purgatione indigere significat. Item si fluxus hæmorrhoidarû fuerit lucidus, subtilis, dominiū cholæræ significat. Si vero albus vel pallidus, dominiū flegmatis. Si niger aut plumbeus, melācholia prædominantem significat: purgetur ergo humor peccans. Item hæmorrhoidas antiquas omnino restringere per se, vel per artem, malū: quoniam hydropisim, vel ptisim, vel leprâ, vel mania, vel cancerum: vel aliud apostema perambulans inducit. Econtrario etiam hæmorrhoidas vltra modum fluere, malum: quoniam marasmus, vel hecticam, vel hydropisim præfigurat: sicut et in mēstruis. Vnde Hip. parti. apho. Menstruis pluribus aduenientibus, accidunt ægritudines, & non euenientibus a matrice, accidunt ægritudines, & primæ quidē ægritudines sunt de inanitione, secundæ vero de repletione. Purgetur igitur humor peccans, & postea rectificentur hæmorrhoides. Item maniacis, & habentibus dolorem renum, hæmorrhoidibus superuenientibus tollunt ægritudines. Vnde Hip. 6. parti. apho. Melancholicis & freneticis hæmorrhoides innatæ, bonum, s. per se, vel per artem. Et paræ post. Maniacis varicibus, aut hæmorrhoidibus innatis, solutio fit mania.

De apate & vlcere ani. Cap. VI.

Tractatus sextus

Apostematum anus, et eius lacertus, aut interius aut exterius. Et cura & signa dicta sunt cap. de exitu ani propter apostema: hoc vero addendum, qd si terminetur hoc apostema ad collectionem, quod scies: quoniam propter applicationem resolutiuorum non diminuitur dolor tumor & febris, sed potius intenduntur: vtendum in maturatiuis dictis ca. de apostematibus stomachi vsq; ad tempus rupturæ: quæ si fiat per se, vtendum ripticis abstergiuis, mundificatiuis vlcus, & post hoc consolidantibus dictis ca. de rhagadibus ani. Si vero vlcus rupturam per se tardauerit: aperiatur cum ferro. Sciendum præterea, qd hoc apostema si fuerit interius, difficilioris est curæ, & prauorum accidentium: potest namq; ex hoc stragutia & ileos innasci & proprie si saniet. Si vero exterius, facilis est curæ, et accidentiū nō prauorum, si methodo curēt.

TRACTATUS SE- xtus tertie sectionis. De pas- sionibus renum.

Renum passionibus sunt septē. Prima debilitas: Secunda mixtus sanguinis: Tertia calculus vel lapis: Quarta diabetes: Quinta macies: Sexta opilatio siue durities: Septima apostema. Cū autē dico renes, intelligo alcatim, id est locū renū in dorso, atq; poros vritides, q̄ sūt duæ venæ strictæ procedentes a renibus, et descendentes p̄ inguina, et ab utroq; duorum laterum tendunt in vesicā.

De debilitate siue malitia complexionis renum. Ca. I.

Debilitantur renes ex omni causa prohibente vel dimi-
nuente ipsorum operationē,
quæ est aquosam partem siue
serosam a massa sangui-
nis nuper in epate geniti, segregare, qua

nō indiget nutrimentū cōmune corporis totius. Hæc autē segregatio tribus modis perficitur. Primus est attractio sanguinis aquosia vena Kili, & hoc fit per venas mulgētes. Secundus est diuisio sanguinis attracti in partem aquosam nutritiuam substantiæ renum, & partem subtilem superfluentem: & hoc fit per panniculum colatorium porosum in concauitate renum contentū: per cuius poros angustissimos transire potest aqua subtilis grossa premanente. Tertius est expulsio partis aquosæ subtilis ad vesicā, & de-
nuo ad extra corpus, quod fit per poros vritides, q̄ sunt meatus longi stricti procedentes a concauitate renum in conue-
xum vesicæ, & demum se obliquantes inter tunicam & tunicam in concuum eiusdem. Causæ igitur diminuentes operationem, prohibentes, vel corrupten-
tes sunt tres in genere: scilicet mala com-
plexio, mala compositio, & continui so-
lutio, quemadmodum eisdē bene se ha-
bētibus, renum operatio, similiter & cu-
iuscumq; particula nostri corporis debite regular. Mala autē complexio, licet sit nouem modorum, fieri videtur tamē
maximē in renibus secundū tres modos
qui sunt caliditas: & de ipsa dicitur cap.
de diabete. 2. siccitas, & de ipsa dicitur
ca. de macie renum. 3. humiditas, & hæc
raro stat sine frigiditate: & de ipsa dicitur
ca. præsentī vbi de mala complexio-
ne loquimur: & ca. de opilatione & duri-
tie renum. Mala vero compositio est opi-
latio renum ex mucillagine opprimen-
te: aut est laxitas substantiæ, quæ raritas
nuncupatur rexpura. Solutio vero conti-
nui est vulnus, vel apostema, vel vlcus
in renibus: & de ipsis dicemus ca. de mi-
ctu sang. vel saniei.

Methodus. Signa malæ compositionis
propter mucillaginē opi-
lantē, sunt dolor grauius ex a'katim,
vrina alba, grossa, humorosa, ampullo

sa cum residētis viscosis et diminutio appetitus comedendi, vnde Hippo. 6. part. aphor. Quibus cumq; ampullæ in vrinis narrant, nefrētis, significat & longam egritudinem nefreticā fore. Et cura eius est, vtumat omni die i ieiunio de puluere vrinatiuo, qui dicitur ea, de calculo in renibus cum vino albo subtili aquoso. Purgetur cum 3. iij. vel 4. benedictæ laxatiuæ, dando in sero cum vino calido, pmissa digestione cū oxymelle. Vtatur quoad coitu in ieiunio: quoniā purgat renes, si fiat vsu moderato. Vngatur alkatum dextrum et sinistrum cum vnguento agrippa, marciaton, & aragon ad ignē bis in die ante prandium & ante cenā. Vtatur electuarijs vrinatiuis stypticis: si cut est diocymino & dianison & similia. Nutriat iuribus pullorū & hœdorū conditis cum petro, & speciebus aromaticis. Bibat vinū album clarum: vitet grossa, sicut est vinum rubeum turbidum, panis azymus, extrema porcellorū vel vitulorum. Signa malæ compositionis propter laxitatem corpulentia renum, sunt vrina sicut lotura carnis cum dolore alkatim, & debilitate dorsi, & prostratiōe appetitus coitus. Et cura eius est, vt vngantur loca renum cum vnguento facto ex oleo masticino, myrtino & oleo rosæ. ana. partes æquales, ceræ, masticis. ana. quod suffecerit, ad ignē vel solē calidū: & ponatur desuper emplastrū stypticum confortatiuū renū factū ex lentibus ex corticatis, rosæ, bolo armenico, gūmi arabici, mastice, summitatibus rubi, & absynthij, nucæ, cypressi, balaustij sandalis, & similibus coctis, & dissolutis & incorporatis cum oleo rosæ, quod suffecerit & modico aceti. Conferunt ad hoc etiā oia styptica tēperata in calido & frigido cū aliquali declinatione ad frigidū: sicut est syrupus. Iſs. rosæ, plātaginis, anis. 2 meos, acor. ciperi, hypocist. teneriatū rubi, petro. se. cōmuniū frigidorū. añ. 3. s. ma-

sticis, thuris, dragaganti, spicæ, xilaloones, solij indi. sand. ana. 3. iij. cinamo. 22. añ. 3. 2. zuccari. 3. 8. fiat syrupus bene coctus, & clarificetur de quo bibat omni die in aurora. 3. i. cū aqua myrti: & sicut sunt trochisci de Karabe mixti cū trochis. de comphora, quos dicemus ca. de phrhisi. parag. de empericis. Nutriatur carnibus laudabilibus assis, vel elixis cū petro. conditis cū succo herberis vel cydoniorū inspissatis cū vitellis ouorū, impinguatīs cū adipe renū caprarū vel hœdorū aromatatis cum puluere cynamomi, gariofil. 22. myrtillorū. Bibat vinū stypticum, lymphatum cū aqua myrti. Euitet coitum pro posse, & resupinationem super dorsum, & vsum diureticorū immoderatū & viscosorū: diligat styptica mediocriter grossa, si opilatio epatis & meseraicarum non prohibeat. Vtatur ergo modo stypticis, modo appetitiuis ne alterutrū mēbrox noceatur. Et si corpus sit carnosum, fiat a principio flebotomia diuersiua ex basilica in brachio vel pede lateris oppositi: & postea in latere eodē. Et si non suffecerit: dentur oēs medicina conferentes mictui sang. quas dicemus suo ca. & sic regatur, donec vrina visa fuerit rectificata, & dolor sedatus omnino.

Canones. Oportet, quod medicina ex hibita p̄ interioribus sint subtilis substantia, anteq̄ ad renes puenire valeat p̄ vias lōgas angustas. Si igitur sunt syrupi, colētur pāno duplici: si pulueres, cribellentur vt alcohol. Si vero p̄ interioribus addatur aliquid aceti acutissimi gratia penetrationis. Bonū est etiā, vt medicinis addatur digerētia aliqua, vt citius ad mēbra pueniant, sicut sunt se. diuretica, & se. vrinatiua, vt milū solū & saxifra. Sciendū p̄terea qđ in regimine diætæ nihil est, qđ adeo renes debilitet, vt grossum viscosum opilās, vel stypticum, similiter & coitus: quoniā vasa duo spect

matica proprie venas mulgentes oriuntur: quare ipsas nutrimento priuant, atque macerant ex forti suctione sang. purissimi, quo egent testiculi coitu superfluo angustiat ad restaurationem spermatis agnitiui: propter, quod dictum est expertis, quod vltus diasatirion frequens confert omni renum debilitati.

Prognosticatio. Solicitandum in confortatione renum & viarum eius: quoniam per eorum repletionem fit causa hydropisis & lapidis, per ipsorum vero inanitiōem surgit causa feb. hectica, vel marasmi.

De mictu sanguinis & saniei, & vlcere in renibus, & poris vritidibus. Cap. II.

Mictus sanguinis fit propter aliquod trium causarum. Prima causa est casus & percussio super aliquid rumpens venam Kilis, vel venam mulgentem, vel colatorium renum. Secunda est humor acutus subtilis corrodens loca supradicta, vel orificia eorum aperiens. Tertia est exercitium vehemens, vel coitus superfluous loca praedicta vel orificia lacerans refractioni frequentata, & prope in cholerico corpore, & tempore calido. Mictus vero saniei fit propter aliquam trium causarum. Prima est antecessio mictus sanguinis antiquata: propter quod sang. extra venas stans, quæ sunt loca sibi proprii, in saniem vel visum nitrosum conuertitur. Vt dicit Hipp. Secunda est vlcus siue corrosio locorum praedictorum ab humoribus calidis adustis, vel falsis nitrosis. Tertia est apostema saniosum in renibus terminatum ad rupturam, vnde mictus san. & saniei, et vlcera in renibus sunt sibi inuicem causa: vt dictum est: vnde & eodem modo curantur scilicet per styptica, infrigidatiua cum lenitate aliquali: ideo de ipsis vno dicemus cap. Veruntamen aduertendum est,

quod istae passionες quandoque accidunt in renibus, quandoque in vesica & collo eius quod virga in viris dicitur. vnde Hipp. 4. part. apho. Si sanguinem aut pus minxerit, renem aut vesicæ vlcerationem significat. Signa igitur distinctiua mictus san. prout venit a renibus, sunt: quia sang. exit plurimus, & proprie si sit ex ruptura alii cuius venæ circa renes, & est globosus: et quandoque subtilis, vt san. flebotomatus. vnde Hipp. 4. part. aphor. Quibus in vena grossa quasi carni frusta, vel sicut pili de renibus exeunt, &c. Et statim subdit. Qui enim sponte sanguinem mingit: his de renibus venarum rupturam significat: & intellige sponte id est subito & copiose non praecedentibus accidentibus quibuscumque: & sentit æger dolorem circa aliam, & forte antecessio casus & percussio super dorsi spondiles, vel vsus ciborum acutorum: vt sinapis, piperis, veteris vini: vel exercitium, vel coitus in tempore æstuoso. Si vero venerit a vesica vel collo eius, exit sanguis paucus, cum sint membra spermatica, & egreditur ante vrinam vel non bene permixtus vrinæ: & sentit patiens dolorem circa pectinem & virgam: & habet straguriam dolorosam. Signa vero distinctiua super mictu saniei sunt: quia si venit a renibus, & poris vritidibus, antecessit apostema saniosum in renibus apertum vel mictus sanguinis, & exit cum vrina sicut paruū frustum carnis vel sicut pili: & sentitur paruus dolor pungitius circa loca renū. Si vero sit a vesica: antecessit scabies visicæ, & sanies egreditur ante vrinam, & apparent squamæ in vrina, & dolor est fortior.

Methodus. Cura mictus sang. prout venit a renibus, & locis vicinis: quoniam de eo qui venit a vesica & collo eius, dicemus de scabie, & vlcere in vesica: est eadem a quacumque trium causarum euenerit. Fiat igitur a principio flebotomia diuersiua de basilica dextra

in brachio vel manu. Et imponatur em
plastrū stypticum frigidum super alka-
tim factū ex rosis, plātagine, balauſtia,
lentibus excorticatis, virga pastoris, te-
neritatis vitis, & rubi coctis in aqua,
& pistatis, & incorporatis cum puluere
boli armenici, san. dra. acariæ, licij, addē
do aliquid aloes, & aceti acutissimi pro-
pter penetratiōem: vel fiat epithyma su-
per locum ex aqua decoctionis earundē
rerum, & aqua ros. & modico aceti. Et
fiat vnguentum. ℞. populeon, muscil-
laginis psyllij, & sc. citonior. añ. 3. f. gū-
mi arab. adusti. carab. adusti, dragagan-
ti. añ. 3. 2. liquefiant gūmæ in aqua ros.
& modico aceti: Deinde addatur aliqd
de oleo ros. & ceræ quod sufficit, & oīa
simul incorporentur perfecte. Et si volu-
eris: adde ex anodinis, sicut est adeps an-
seris, anatis vel gallinæ: & proprie in mi-
ctu saniei. Sumat omni die de syrupo. ℞.
syrupi ros. syrupi myrtini, oxyzaccari,
añ. 3. 2. misceantur, & addatur gratia di-
sectionis. 3. f. oxymellis cōpositi, vel sy-
rupi aceti, & detur cum aqua decoctiōis
masticis, & myrtillorum. Purgetur post
hoc cum medicina soluente humores
acutos, & proprie in qua sunt myrobala-
ni: sicut est ista. ℞. myrobalano. citrino-
rum, emblicorum, ana. 3. 2. turbith boni
3. 1. ameos, se. feniculi, zinzibaris, añ. 3.
f. terantur, & misceantur cum aqua de-
coctionis prunorū, vel addatur zuccari
3. f. & fiat tragea, quæ detur cū aqua ca-
lida sero cum itur dormitum: Vel purge-
tur cum. 3. 2. reubarbari dissoluti cum ta-
marind. in aqua calida, vel cum electua-
rio de succo ros. laxatiuo: neq; permitta-
tur venter aliqua die constypari, imo le-
niatur cū suppositorio, vel clysteri: quo-
niā materias diuertit a vijs vrinæ: Vta-
tur omni die ante cibū tali mixtura. ℞.
diarodon abbatis, rosaræ nouellæ, tria-
fand. añ. 3. 2. dianisi, 3. 1. Sumat omni die
vnum ex trochiscis de carabe cum aqua

decoctiōis sumach, vel myrtill. quorum
descriptio secundum Mesuem, quæ est
melior descriptio, talis est. ℞. cara-
bæ aũ. 6. cornu cerui adusti, dragagati,
acariz, hypocist, balauſtiæ, lactu, masti-
cis, papaueris nigri, assij. añ. aũ. iij. thu-
ris, croci, ana. aũ. 1. & f. fac trochisc. de
muscillagine psyllij, vel succo berberis,
vel succo pirorum immaturorū, vel me-
spilorum, vel citoniorum, vel plantagi-
nis, vel vino rubeo pōtico, vel aqua plu-
uiali: quorū quilibet sit. 3. 2. & detur vñus
in aurora, & vñus ante cœnam cum eis-
dem liquoribus. Et si velles, vt a porpi-
etate respiceret renes & vesicam, adde-
res in descriptione sem. apij aũ. f. Vel su-
mat aliquos ex trochiscis de camphora,
vel de spodio dictis capitulo de phthisi.
Nutriatur farre, riso, ordeo conditis cū
adipe renum caprarum & chœdorum, si-
militer & carnibus assis conditis cū suc-
co berberis vel citoniotum, similiter car-
nibus elixis cum aqua pluuiali & far. su-
mach vel myrtill. Bibat vinum rubeum
stypticum lymphatum cū eisdem aquis.
Deiſet cibos & pot9 acutos, aperitiuos
& vrinatiuos: sicut sunt iura carniū cō-
dita cum petro. feniculo, saluia, & colera
omnia, prater caules, & vinum album
aquosum: Sed regatur per grossa stypti-
camissi opilatio epatis quandoque prohi-
beat: quare tunc aperitiua cum stypticis
alterentur. Cura mictus saniei, prout ve-
nit a renibus, est eadem cum prædicta.
Sed quando est cum ardore vrinæ, & do-
lore in virga, vtatur omni mane trochi-
scis de alke Kengi, qui sic fiunt secundum
Mesuem, recipe. granorum alke Kengi
drachmas tres, semin. portulacæ, cucur-
bi, citrullis mūdatorum, ana. drachmas
tres, & semi. boli armenici, gummi ara-
bici, thuris, sang. drac. papaueris albi
amygdalarum amaranū excorticatæ,
succu liquirit, dragag. amili, gran. solat,
añ. 3. 6. apij, carabæ, iusquiam, opij, ana,

Tractatus sextus

3.2. si. trochisc. cum muscillagine psyllij: detur vnus mane & sero cum iulep vel hydromelle: quoniam dolorem mitigat, saniem abstergunt, & vlcera consolidat, si deus voluerit. Et fiant omnia, quæ dicentur cap. de vlcere in vesica.

Emperica. Dicunt experti: Mictum sanguinis ex renibus quandoque prouenire ex multitudine sang. in corpore: sicut fit & vomitus sanguis. & fluxus ventris, & proprie in corpore sanguineo otio gaudente ac quiete. Et cura eius est eadem cum prædicta, præter quod magis insistendum est euacuationi cum flebotomia, & prouocatione menstruum & hæmorrhoidarum in corpore, vt diuertatur sang. ad loca alia: & minorati cibi & potus, & rectificationi epatis & splenis: vt scripsimus suis capitulis: & additioni in exercitio & labore. Affirmant præterea, quod ad mictum sang. ex renibus & proprie exuberantis quatuor consueuerunt superuenire accidentia timorosa, quæ curam ad se trahunt. Primum est sanguinis coagulatio in vesica: propter quod retinetur vrina, & fit dysuria vel suria dolorosa. Vnde Hippo. 4. parti. apho. Quibus in vrina grossa quasi carniū frustra, vel sicut pili sunt: his de renibus exeunt. Et cura eius est, vt vngatur pecten cum vnguento calido mollificationis: quod sic fit. lxx. marciaton, dialtheæ. añ. 3. i. butyri recentis. 3. f. croci. 3. i. misceantur per se et ad ignem vel solem calidum, & post mollificationem. sumat aliquid ex diureticis, si non timueris vlcus: quæ dicuntur ca. de calculo. & ca. de dysuria. Et si per hoc non educerentur frustra de sanguine, & adhuc retineretur vrina: iniiciantur collyria dissolutiua, & lubricatiua per virgam cum syringa, quæ dicuntur ca. de suria & dysuria. Secundum est ulceratio vesicæ propter sanguinem in ea longo tempore retentum & in saniem conuersum. Et cura eius est, cura vlceris in vesica.

Tertium est hydropisis, & infrigidatio epatis propter euacuationem san. chole-rici influentis calorem. Et cura eius est rectificatio epatis & splenis cum electuarijs & emplastris calidis & stypticis dictis cap. de debilitate epatis & cap. de hydropisi ascite. Quartum, quod & frequenter euenit, est tabes & consumptio corporis propter inanitionem venarum & membrorum, quæ feb. hecticam accendunt. Et cura eius est composita ex cura maciei, quæ dicitur, & cura mictus san. quæ nunc dicta est, et cura fe. hecticæ, quæ dicitur lib. 2. si deus voluerit.

Canones. Remedia exhibita per inferius scilicet clysteria & collyria parum vel nihil proficiunt in passionibus renum: quoniam virtus eorum ad locum non pertingit: conferre tamen videntur per accides, scilicet gratia præseruationis vesicæ ab vlcere. Inijciantur ergo frequenter collyria lauatiua cum syringa, quæ dicuntur cap. de debilitate renum conuenientia, & necessaria præsentis capitulo: & toti tractatui præsentis.

Prognosticatio. Mictus sanguinis puri peridice proueniens, & cum alleuiatione infirmi, nullatenus restringatur: nisi superfluat, & virtutem deiciat: quoniam naturalis est et creticus. Consuevit namque talis fluxus, quæ admodum & vomitus sanguinis, & fluxus veteris sanguineus in quibusdam corporibus certis vicibus salubriter euenire, et ipsa a multis præseruare passionibus: scilicet scissura venarum, synocha, hydropisi, lepra, & similibus: & proprie in corpore otioso crapuloso, vel post restrictionem menstruum & hæmorrhoidarum in corpore consueto. Item mictus sang. exuberans antiquatus, qui neque per se, neque per artem curatur aut restringitur: hydropisim vel marasimum, et finaliter mortem inducit. Item ad mictum sanguinis chronicum sequi consuevit mictus saniei, & per con-

sequens vlceraſio in renibus & veſica cū ardore et dolore in vrinādo: quare a principio ſuccurratur: quoniam vlcus difficilius conſolidatur q̃ vulnus propter intentionem in curando. Vnde Hippo. 7. particu. aphoriſmorum: In ſanguinis ſputo, ſancti ſputum malum.

De calculo & arena rubea vel alba. Cap. III.

Lapis, calculus & arena generantur ex materia groſſa cineroſa terreſtri a calore naturali aſſante: ſicut lare res in camino. Si igitur tali materiæ cineroſæ aliquid adueniat ex humore viſcoſo glutinoſo congregāte partes, fit lapis. Si vero nihil viſcoſitatis aduenerit: fit arena: propter quod & ſabulum nequaquam in petram conuertitur, neq̃ a calore adrente, neq̃ a frigido conſtringente qualiſcunq̃. Si vero medio modo ſe habuerit verbi gratia, quia pars quadā parti cōmiſcetur, & parti alteri nō conuiſcatur, fit calculus. Eſt enim calculus lapis paruiſſimus ſeu principiaſtus: arena vero eſt puluis, ex q̃ fit lapis atq̃ calculus. Et licet lapis mineralis fieri poſſit a frigido cōſtringēte partē cineroſā cū parte argilloſa: lapis tñ in corpore aialis nequaquam: qm̃ vita nō ſuſtineret tantā frigiditatē. Piuunt autem iſtæ paſſiones ſolummodo in membris deſeruientibus receptioni, & expulſioni ſupſiuitatis digeſtionis ſecundæ, quæ ſunt renes & veſica: quoniā ad ipſa propellunt vitute regulāte totū ſuperfluittis ſtegmaticæ muſcillaginoſæ generatæ in epate propter indigeſtionem: quare ſtantes inter loca anguſta figuntur, donec aſſentur, vnde Hippoc. 4. apho. Quibuſcunq̃ in vrinis arenola ſubſtāt ſedimina his veſica aut renes lithiaſim habēt. i. patiuntur lapidem, vel eius diſſolutionem. Signa autem diſtinctiua ſunt: quoniam ſi ſunt a renibus, eſt color ipſorū rubeus: & forte egrediuntur cum vrina fila lon-

ga, ſicut pili. Vnde Hippo. 4. parti. apho. Quibus in vrina groſſa quaſi carnum fruſta, vel ſicut pili ſunt: his de renibus exeunt: & ſentit æger dolorem ſimilem colicæ. Et illud ideo: quoniam venter & vrina reſtringuntur & mouētur nauſea: & fit dolor in ilijs, ſicut in paſſione colica. Et hoc quidem fit propter viciniam iſtorum membrorum et compaſſionem. Sed oportet, vt diſtinguatur inter ipſam & colicā per vrinam, verbi gratia. quoniam quando eſt in fundo eius reſidens, ſicut arena rubea: aut de conſuetudine ægri eſt, vt mingat poſt huiuſmodi dolorem lapidem aut arenam rubeam: aut iam minxit ante illud per aliquot mēſes vrinam nigram, cum qua fuit dolor in alkatim, qui eſt locus ſpondiliū, ſub quibus ſituati ſunt renes. Tunc ſcies, q̃ eſt lapis in renibus, & proprie, ſi dolor deſcenderit per inguina, et peſtinē, donec peruenerit ad teſticulos & veſicam: & forte retinetur vrina, vel parum ex ea egreditur: quoniam pori vritides extant opilati. Si vero non adſuerit aliquod prædictorum ſignorum: tunc dolor prædictus poſt ſatietatem nauſeatiuam antiquā vel recentē, eſt ſignificatio colicæ, & nauſea plus eſt q̃ colica: & locus doloris ventris in colica latior eſt, & ad anteriora decliuor verſus vmbilicum: In lapide vero q̃ eſt in renibus, eſt locus doloris minor, et verſus ſpōdilia doſſi decliuor. Et iterum dolor colicæ permutatur de loco ad locum: quoniam eius cauſa eſt ventroſitas & ſteigma: Dolor renum vero ſtat fixus ſicut clauus: quoniam eius cauſa eſt lapis: Et ſi lapis iam renes exierit, & ad poros vritides deſcēderit: ſentitur dolor quaſi ab alkatim ad inguina deſcēdens, quaſi ſit in eis aliquid ſuſpenſum. Et ſi lapis iam propinquus veſicæ fuerit: ſentitur dolor in eius concauitate, quæ eſt ſuper anum, & ſub ſpondilibus caudæ. Signa vero lapidis, calculi vel arene in veſica, ſunt al-

Tractatus sextus

bedo vrinx & subtilitas eius, & residens
tia alba in fundo vrinæ, postq̃ fuerit a
medico circumcirca conuassata: & ere
ctio virgæ propter retentionem vrinx, et
difficultas exitus eius cum dolore vehe
menti: & q̃ patiens scalpit virgā, & cir
ca ipsam laborat manibus tractando.
Et q̃ncq̃ accidit exitus ani propter vrinx
multitudinē, & plurimū conamen expel
lendi: & sentit patiens dolorē sub pectine
& pudendis. Et scias, q̃ lapis in renibus
(vt plurimum) accidit adultis: infantib⁹
vero in vesica: quoniam in adultis est ca
lor affans p̃optior, q̃ virtus expulsiua:
In infantibus vero fortes sunt omnes vir
tutes naturales, sed in eis est gulositas:
quare multiplicat superfluitates argillo
sas: quæ licet renes pertranseant ad vesti
cam, tamē currētes eius frigiditate natu
rali primo cōdensantur, & in puerorum
inguinibus diutius retinentur, donec a ca
lore naturali frixentur: sicut cremum in
frixorio. Scias præterea, q̃ lapis in reni
bus vñ vesica duarum est specier⁹. Vnus
nanq̃ est, qui frāgi potest per medicinas:
vtpura quia recēs, mollis, paruus. Alius
autem, qui nequaq̃ frangi se permittit:
vt quia antiquus, lenis, planus, solidus,
grossus: quare incisione indiget cum fer
ro & extractione: quæ tamen facienda
non est, nisi post desperationem medici
narum. Signa autē distinctiua sunt quo
niam si post vsum medicinarum appa
ruerint arenulæ in fundo vrinæ magis
solito multiplicatæ & facilitas emissio
nis vrinx cum mitigatione doloris circa
alkatim pectinem atque virgam: tunc
scire debes, q̃ lapis frāgitur: quare vsum
medicinarum assidua. Si vero econuerso
res se habuerint: scire oportet, q̃ manua
li operatione indiget. Ista tamen opera
tio locum non habet, nisi de lapide in ve
sica, vel de lapide renium, postq̃ transiuit
per poros virides ad vesicam: quoniā
ad renes & poros est multa profunditas:

in cuius incisione est indubitata despera
tio ad salutem.

Methodus. Cura lapidis in renibus est
duplex. Vna curatiua, qua
indigemus hora doloris & paroxysmi.
Alia præseruariua, qua indigemus hora
quietis ante & post paroxysmū: quoniā
sicut ait Auic. 3. cau. feñ. 18. Renalis pas
sio in quibusdam corporibus periodice
resoluit: quemadmodū & hamorrhoid.
& epilepsia & dolor iuncturarum. Et ni
mirum: quoniam omnis morbus a mate
ria dependens, successione participat &
periodo: vt ait Galenus secundo de febrī
bus. Actus curatiuus huiusmodi est, vt
ager ilico post sensationem doloris inun
gat alkatim totum, inguina, pectinem
& virgam cum oleo de lilio, vel chamomil
le, vel anethino, vel cum oleo de scor
pionibus, quod dicemus. parag. emperi
ca. Post hoc euacuetur intestina cum sup
positorijs, vel clysteri lenitiuo, dicto ca
pitulo de frenesi: & capitulo de bolismo:
quia per hoc renes & pori minus angus
tiantur. Post hoc intret ager tinam aquæ
dulcis vel tepidæ, vel aquæ decoctionis
maluæ, violarum, chamomillæ, melilo
ti, fœnigraci, feminis lini, folior⁹ popu
li, & salicis, vngulæ cabalinæ, caulium
recentium, anethi, apij lactucæ, dauci,
pastinacæ, endiuicæ & ordei: quoniam du
ritiam mollificat, & materias colliquat,
vias elargat, vrinam prouocat, atq̃ do
lorem sedat. Et ex eisdem rebus fiat em
plastrum cum oleo anethino, vel chamo
millino, quod suffecerit: & ponatur te
pid. super locum. Et ante emplastrum, &
post hoc vngatur loca prædicta cum vn
guento arrogō & agrippa. ana. vñcias
duas, dialtheæ partem vnam, butyri re
cētis, partem semi. Et sumat postquam
per duas horas in balneo sededit, & via
diatari corperint, de medicamine fran
gentelapidem, & prouocante vrinam,
quod infra dicemus. para. emperica. Et

bibat super ipsum aliquid vini albi subri-
lis aquosi: & cum balneum exierit, stet
erectus sup pede vno, & salter, vel de-
scēdat cliuos vel scalas velociter vs̄ equi-
ter equum duriter ambulantem, vel po-
nat ventosas siccās super locum doloris
gradatim descendendo cū ipsis per ingui-
na & pectinem vsq; ad principium colli
vesicæ. Sic nanque lapis exibat cum vri-
na, deo volēte. Si autem lapis ad vesicā
descenderit, & in eius collo fixus steterit
propter sui magnitudinem et lateris obli-
quitate: tunc educatur: sicut iam dice-
tur. Si autem post exitum lapidis cū vri-
na non sequatur mictus sang, tunc est in-
colume, & plurimum illud fit, cum lapis
est parvus & planus. Si vero sequatur mi-
ctus san, propter magnitudinē vel tube-
rositatem lapidis, lacerātis vias, per quas
transit: tunc curetur per flebotomiam di-
uersiua basilicæ, et medicinis typicis
dictis capitulo de mictu sangui. & quæ
dicētur cap. de vlcere in vesica. Sic igitur
regatur alternatim cum medicinis dictis,
donec lapis totus expellatur, & dolor se-
detur. Confert præterea, vt vtā frequen-
ter medicinis soluentibus leniendo: sicut
est cassia fistula, & tamarindi, māna, pru-
na, viol. quoniam intestina euacuant, &
vias vrinales mollificant, & dilatant.
Neq; vtatur hora illa farmacijs acutis:
ne forte materiæ ad interiora declinent:
imo vtatur vomitu si fuerit possibile,
gratia eradicationis & diuersionis. Si au-
tem post hæc omnia dolor nō cessauerit,
imo lapis fixus steterit in renibus vel po-
ris: tunc narcotica donabis, quæ doloris
sensum auferant in frigidando atq; mori-
tificando: quoniam melius est aliquod
malum ægris gignere, quā sinere eos
in mortem cadere: vt dicit Galenus vn-
decimo de ingenio sanitatis. Et huiusmo-
di sunt philoniū recēs, vel theriaca infra.
6. menses confecta: vel theriaca, 3. duas,
opij grana, 6. in posu da cū vino calido.

Actus præseruatius est vt abstineat a ci-
bis & potibus viscosis: sicut sunt, caseus,
panis azymus, vinū rubeum grossum,
& a grossis dulcibus: vt sunt ficus, dacty-
li, carnes porcorum, extrema animalū,
triticum, pasta & frixa omnia in oleo vs̄
butyro: sed vtatur penetratiuis subtili-
bus: vt sunt carnes laudabiles elixæ, &
iura earum condita cum petrosil. & spe-
ciebus aromaticis. Bibat vinum album,
clarum, purum, lymphatum cum aqua
fontis viui. Vtatur quandoq; coitu, &
proprie in ieiunio: quoniam renes poten-
ter euacuat, similiter & fortificat si fiat
vsu moderato. Vtatur purgationibus in
principio veris & autumnū educentibus
humores grossos frigidos, vs̄ adustos præ-
paratis cū suis proprijs digestiuis, prout
dicemus capitulo de passiōe arterica, deo
dante. Veruntamen ne sub silentio præ-
tercutramus pillulas sublimes educentes
arenulas, & eaz̄ materiā ex renibus adu-
stā, vel non adustā: q̄ sic fiāt. ℞. seminis
erucæ syluestris, milij folis, saxifragiæ,
anisi, carui, ameos, maratri. añ. 3. i. se. fri-
gidoꝝ communium mundatorum. 3. 2.
cassia lignæ, castorei, capparīs, cinamo-
mi, ciperi. añ. 3. vnam spicæ. 3. vnum. se.
armel. 3. 8. serapini bdellij, oppoponaci.
añ. 3. 2. reubarba. boni agarici. 3. iij. aloes
optimi ad pondus omnium, masticis. 3.
vnam: dissoluantur gummx in vino al-
bo claro, et reliqua puluerisata confician-
tur cum eo, & fiant pillulæ minimæ, vt
cicer, & detur ex eis sero sine cœna a. 3.
i. vsq; ad. 3. 2. cū vino calido. Abstineat
a somno ilico sup cibū & somno sup dor-
so, & strictura cinguli plurima & egra-
tione superflua, & fatigatione dorsi, vel
tractionibus, vel substitutionibus, vel
coitu supfluo: nō pmittat ventrē siccari,
sed ipsū leniat cū suppositorio vel clyste-
ri. Non permittat etiā flegma acuari in
vijs vrinilibz: imo ipsū omī die euacuet
cū pulue, & sy up. diuretico, q̄ sic fit. ℞.

Tractatus sextus

seminum communium calidorum, quæ sunt anisi, fœniculi, petro. apij, sparagi, brusci, radicum communium calidorum, quæ sunt radices rerum earundem seminum communium frigidorum maiorum, quæ sunt cucurbitæ, cucumeris, melonis, citruli. seminum communium frigidorum minorum, quæ sunt se. end, lactuca, sca riola, portulacæ, ameos, amomi, carui, cymini, dauci, milij solis, faxifragæ, graminis lactu. maiorang, valerianæ, rub. tinctorum. añ. fiat syrupus cum libra. i. zuccari: & detur in aurora omni die cum vino albo aquoso. Et si vis aromatizare: pone zinzibe, cinamomi, ligni aloes, folij gariofilorum: baccæ lauri. añ. 3. 2. terantur grosso modo, & ligentur in panno lineo, & suspēdatur in syrupo aquæ decoctionis secundæ. Si autem volueris ipsum acuire: adde cipari, capparisi, acori, azari, granorū iuniperi, cantharidis sine alis & capitibus. ana. 3. i. vel fiat ex omnibus prædictis seu pluribus pul. subtili. vel ut acohol, vel electuariū prout maxime sapuerit egrotanti. Vel utatur electuarijs diureticis famosis, quæ dianisi, diacimini, litontripon, methridatum, diacasti. bibēdo post ipsum aliquid vini albi clari. Cōfert præterea sumere in ieiunio amygdalas amaras, vel theriacæ. 3. 2. cum vino eodem semel vel bis in hebdomada.

¶ Cura lapidis in vesica est, ut fiant oīa supradicta in cura lapidis in renibus per ordinem cum reiteratione frequētata vīcibus alternatis, donec exierit cum vrina. Si autem omnia ista non contulerint, imo lapis in meatu virgæ steterit, & vias opilauerit, & vrinæ retentionē induxerit dolorosam: tunc iniiciatur per orificiū virgæ aliquid ex oleis supradictis. vel muscillaginis althææ, vel psyllij, vel oleum violarum cum syringa vel sine syringa donec via mollescitur, & dilatetur: & ponatur virga in aqua calidapradicta, vel embrocet cū aqua &

oleo cōmuni mixtis & calefactis, infundendo in eis petias, & inuoluendo virgā totam, & sumen vētris, & fricetur locus in quo lapis est, & ad anteriora expellatū vna vice post aliam, donec egrediatur. Si vero in medio virgæ steterit, neq; aliquid prædictorū contulerit, & locus apertus vel tumescat: tūc incidatur virga inferius sub ea, & extrahatur. Si vero in radice virgæ lapis constiterit in loco, qui est principium colli vesicæ, & vrinæ exitum prohibuerit: tunc scias, qd lapis est durus, planus, magnus non obediens ad frangendum vel educendum: quare oportet, ut incidatur collum vesicæ in loco eodem cum obliquatione virgæ super latus oppositum, & extrahatur, & post hoc consolidetur. Et si extrahi non poterit: dimittatur locus apertus per totū residuum vitæ suæ: & cum necesse fuerit vrinare, immittatū canula & egrediatur vrina, & non incidatur substantia vesicæ: quoniam est neruosa spermatica: quare sequeretur dolor & partium distractio spasmodica: collum autem est carnosum musculosum facile consolidabile. Quod si incisionem facere noluerit: ut puta quia patiens est adultus, in cuius incisione cadit timor mortis magis, q̃ in pueris propter sensus acuitatem & membrorū duritiem: tunc fiat sibi cura blāditia, qua vrina educatur omni hora, cum necesse fuerit, & vita conseruet, quæ est ut ager ponatur in balneo prædicto: vel fomentetur eius virga cum aqua & oleo tepido tempore longo. Postea resupinetur, & eleuetur virga, & per eius orificiū intromittatur syringa ad lōgitudinem virgæ vel plus: in cuius concauitate sint tenta vel filum extensum de extremo in extremum: & cum descenderit syringa in cōcauum vesicæ, & lapidem opilantem propulerit: extrahatur tenta, vel filum subito, & minget per syringam: & post expulsionē vrinæ completam iniiciatur per syringā

lliquor abstersiuus: vt est aqua decoctionis mellis, (e. apij, se. endiuæ, fœniculi, & similia: vel sicut est oxymel compositum, quoniam vrinam: prouocabit, & humores viscosos, qui sunt causa & materia augmentationis lapidis, absterget. Et sunt, qui per solam resupinationē vrinam expellunt sine impositione syringæ. Est autem syringa canna ex auro vltimo argento fabricata quantitate viæ vrinæ, simul & eius longitudinem continēs vel parum plus grossior in parte qua retinetur, & subtilior in arpte qua intromittitur: per cuius concauitatē transeat de extremo in extremum virgula ferrea vel seta porcina vel filum de lana vel pilus equi triplacus, vel aliud simile: & sic regatur per dies residuos vitæ suæ, quotiescumq; difficultas euenerit vrinæ di. Et si ante iniectionem syringæ euacuetur venter cum clysteri lubricatio & vinctuosus plus solito, vtile reperiet.

Emperica. Medicamen completū adhibens & vesica, si per medicinas frangi poterit, & educendum cum vrinā, sicut fiat: Recipe cinerum scorpionum viuorū adustorum in olla terrea noua sicca perfecte obturata, lapidis iudaici, lapid. spōgiæ, lapid. renalis hominis, nitri adusti, lazuli, lapidis hæmatitis, ossis sepiæ, sanguinis leporis exsiccati, pilorum leporis adustorum, cicadarum adustarum, canerorum adustorum, sanguinis hirci antiqui nutriti tempore longo ex herbis diureticis, mactati in diebus canicularibus, exsiccati perfecte super prunas ardentes aspersi cum sale costo sufficienti, ne putrescat, cretæ marinæ, saxifragæ, omnium. añ. partem vnam: seminum diureticorum: seminum communium frigidorum maiorum & minorum mundatorū, radicū diureticarum, agarici, reubarbari. añ. part. s. teratur omnia subtilissime vt alcohol, & cum zuccaro, fiat pul. vel

electuarium de quo sumat omni die in ieiunio. 3. s. vel .3.2. cum vino albo aquoso. Quod si descriptionem augmentare volueris, adde aliquid ex quolibet eorū, q̄ sunt sicut semen erucæ, semen vruca se, nigellæ, se. cuscucæ, se. rutæ, semen raphani, semen dauci, semen genistæ, semē enulæ campanæ, squinanti, scolopendriæ, gentianæ, piperis, aristologiæ longæ & rotundæ, salis nitri adusti, granorū faminiæ, cassiæ lignæ, iuniperi, cymini, rubæ tinctorum. Quod si descriptionem adhuc magis fortificare volueris, adde aliquid ex gūmis calidis: velut sunt galbanum, oppoponacum, aromonicum, bdellium, serapinum: similiter & ex rebus menstrua prouocantibus: velut est myrrha, acorus, azarum. Quod si cum prædictis ponere vis diureticum fortissimū virtutis vltimatæ, adde cantharid. abclis capitibus & alis, (quæ sunt partes venenosæ) sextam partem vnius. 3. Cantharides namq; tāta proprietate vias vrinæ respiciunt: vt plerūq; vesicam vlcèrent, & ardorem efficiant in vrinā: Quapropter cauendum est ab ipsis, similiter & a myrrha, & a gummis prædictis, cū adest mictus sanguinis, & dysenteria, aut fluxus menstruorum aut hæmorrhoidarum. Vt autem medicina iam dicta sit delectabilior sumēti, aromatizetur cum zinzibere, cynamomo, garofis, spica, calamo, mace, & similibus. Et quidam addunt ameos, amomi, ciperi, capparis, costi, amygdalarum amararum, nucleorū persicorum, & ceraforū, mlij solis macedonici, & leuistici, marathri, xilobalsami, carpobalsami, & puluerem auiculæ, quæ dicitur apud gallicos cauda tremula: & bene faciunt. Est namq; continens oēs medicinas simplices vrinatiuas, & lapid. fractiuas. Itē experimentū ad hoc est, vt accipiarur lepus viuus, & extrahatur ab eo intestina, & stercus & cū pilis & sanguine & carne tota, sicut est, ponat

tur in olla terrea noua vitriata, & fundatur sup ipsum sang. hirci antiqui non castrati, donec totus fuerit coopertus: De inde cooperiatur os ollæ diligēter cū terra sigillata, & ponatur ad ignē rēpore lōgo, donec totū aggregatum in cinerē cōuertatur, vel rem adustam: tunc extrahatur & puluerifetur, vt alcohol: & deī de hoc puluere omni die .3. r. vel .2. cū vīno diuretico. Itē liquor, qui potatur ad idē sic fit. ℞. nucleorum persicorum, & cerasorum mundatorum, amygdalarū amararū mundatarū. añ. terantur & imbibantur cū aqua clara dulci, vel cum vīno diuretico, & exprimatur lac ex hoc mixto, quod potetur in ieiunio. Ad idem cōfert aqua distillationis faxifragæ, milij solis, foliorum & se. apij: senecionis perforatæ, tribuli marini, polij, chamepitescos, rutæ, agrestis, teneritæ vītis albæ, cardi, radicum rubi, corticis genestæ, capilli venetis, petro. macedonicis, graminis pētafilon, scolopendriæ, tamarisci, acori, azaari, squinanti, lupuli, eupatoriij, endiuiz, lactucæ, fileris montani, pullegij, hyssop. feniculi, enulæ, radicem quincij communij oīm. añ. M. r. si sint recentia, ponantur in alēbico, & distillantur: sicut fit aq̃ rosarū: de qua bibat patiens aliquid omī die in ieiunio: & cum ipsa inungat renes, & vesicā atq̃ alkatriā totā. Si vero res omnes haberi non possint recentes, verbi gratia, vt in hyeme: tunc infundantur res siccæ per diem & noctem vel amplius in vīno albo clāro: postea distillantur sicut prius. Hic namq̃ liquor potēter vri nam prouocat, flegma viscosum subtilizat, arenulas dissipat, vias elargat, & renes purgat. Oleum de scorpionibus, qđ inunctū super renes & infra vesicam iniectum per syringā lapidē frangit & expellit, sic fit secundum Ioan. Heberme, in suo antidotario. ℞. scorpiones viginti numero plus vel minus iuxta ipsorum quantitatem: & pone in vase vitrio, & pone

super eos olei amygdalarum amararū lib. 2. & stringe caput vasis, & dimitte in sole diebus triginta: tunc cola & vtire. Alius modus elus secundum ipsum. ℞. aristologia totundæ, gentianæ, ciperi, corticum radicis, capparis. añ. 3. r. funde super ipsa olei amygdalarū amararū. kist. .i. & dimitatur in sole diebus viginti: deinde projice super ea scorpiones a decē vsq̃ ad quindecim iuxta ipsorum quantitatem, & iterum stringe orificiū, & pone in sole, 30. diebus: deinde cola & reponne. Est enim mirabile, si de ipso patiens inungatur postq̃ tina egredit, & de ipso inijciatur aliquid per syringam. Oleum autem de amygdalis amaris ad idē conferens sic fit. ℞. amygdalarum amararum mundatarū ab vitroq̃ cortice, quantum vis: terantur contritione vltima, & fac pastam ex eis, & dimitte in loco calido per quinque horas: tunc iterum tere, & pone in torculari, & exprime, & emanabit oleum. Si autem in vase duplici de coxeris sicur per horæ spacium, & deinde expresseris in torculari, manabit abundantius: Aut si amygdal. contritis sacculos impleueris, & sub cinere calido, aut arena calida inter pannos sepelieris, & postea expresseris: abundabit. Est namq̃ hoc oleum apertiuum opilationum, catminantiū ventosiratum, lenitiū asperitatum, mollificatiū duriclerum, deco ratiū coloris: & plurimum conferens dolori aurium atque surditati, & tinnitui si de ipso fundatur in aurem. Et eodem modo fit oleum de amygdalis dulcibus, sed non est tamen conferens in hoc casu. Est tamen magis lenitiū & humectatiū partium siccarum durarum vel asperarum: quare confert rauedini, & tussi, phthisi, &c.

Non est conueniens, vt negligatur cura doloris renum & vesicæ etiam cum anodinis & stupefactiuis. Et si non aliter: quoniam post mē

Item vñ perducit ægrum ad hecticā cū
affiduatione doloris: & quandoq; vulne-
rat vesicam, & inducit vrinæ ardorem,
et forte si dolor vltimetur, perniciem. Itē
prouocat etiam hæmorrhoid. vel men-
strua, in corpore consueto, confert: quoni-
am materias grossas adustas vel nō adu-
stas euacuat, & diuertit: vnde Hippocra-
tes quinta particula aphorismorum. Me-
lancholicis & nefreticis hæmorrhoides
innatæ, bonum.

Prognosticatio. Si lapis in renibus vñ
poris siterit, & vri-
nam prohibuerit, & dolorem fortem in-
duxerit, neq; per se neq; per artem exie-
rit, mortale. Item lapis, calculus & arena
in renib; & vesica, similiter & viscera in
ipsis, raro perfecte curantur, & proprie si
fuerint antiquata: quod quidem contin-
git propter materiæ grassiciem vel ad-
herentia, viæ angustationē & membro-
rum profunditatem. Et si corpus fuerit
senex, nunq; curatur propter causæ for-
titudinem & virtutis defectionem: vnde
Hip. 6. par. apho. Nefretici et circa vesicā
dolētes laboriose sanāf in senibus. Et in-
tellige senes oēs q sunt vltra. 40. annos.

De diabete siue diarria vrinæ. Cap. III.

Diabetes est multiplicatio vrinæ
superflua ex renū caliditate pro-
ueniens cum nocumento virtutis
attractiuæ atq; digestiuæ, quæ in eis sunt
propter quod ab antiquis nuncupata est
diarria vrinæ. Signa eius, sunt sitis fortis
affidua: & quando post potum aquæ vñ
alterius liquoris sit ilico mixtura pluri-
ma replens vrinale, neque humectan-
tur os & labia propter potum hora ali-
qua: Et est vrina alba subtilis, sicut aq
propter simplicitatem eius atque crudi-
tatem, & extenuatur cum ea corpus de
die in diem,

Methodus. Cura eius est infrigidatio
renum proposse, & debili-
tatio virtutis attractiuæ in eis: quod fit
cum emplastro facto ex ros. terra sigilla-
ta, sang. drac. psyllio, sandalis pslariis, et
cōcassatis cum aceto & aqua ros. infun-
dendo petias in ipsis, & actu frigidās po-
nendo super loca renum: vel cum em-
plastro facto ex summitatib; rubi & vi-
tis albæ, & fol. solarii & sempiuig & plā-
taginis coctis in aqua & aceto, & pista-
tis & incorporatis cum farina ordeī vel
cum vnguento, quod. 17. populon, olei
ros. olei violæ, olei nenuph. añ. part. equa-
les. muscillaginis psyllij part. 2. ceræ qd
suffecerit. Et si vis fortificare magis, ad-
de dragaganti, karabe, gummi arabici,
aquæ ros. & camphoræ: & cum eadem
inungatur pectus & spina rota, si corpus
plurimum extenuet: quoniā marasmū
prohibet, vel retardat. Sit in aere frigido
humido omni hora, & ingrediatur aquā
frigidam ter in die vsq; ad vmbilicum,
si corpus sit carnosum aliq̃lter: Et dor-
miat supinus super terra vel lecto strā-
to violæ, ros. salicibus, & herbis frigidis:
Vtatur trochiscis de karabe dictis capi,
de mictu sanguinis: & trochiscis de alke-
kengi dictis ibidem: quoniam san-
guinem ingrossant, calorem reprimūt,
attractiuam diminuunt, & sitim extin-
guunt. Fiant oīa dicta ca. de macie renū,
viret omnia diuretica atq; vrinatiua, &
coitum omnino. Et vtatur lenitiuis, do-
nec materiæ diuerantur: sicut sunt pul-
mēta ordeī vel farris vel auenæ condita
cū amylo, penedjs, amygdalis dulci-
bus, & zuccaro, vtatur stypticis alterna-
tim, sicut sunt lentes, caules, carnes assæ
vel elixæ cū myrtillis & sumach condi-
tæ cū sumach & berb. vel suc. gran. vel
agreste, vtatur cibis vt plurimū nutriēti-
bus: sicut sunt testiculi gallorum non-
dum coeuntium, vitelli ouorum recentiu-
um, extrema porcellon; vñ alteratib;

sicut sunt cancri fluuiales, pisces petrosi, lac recens vstulatum. Bibat aqua ordei, vel prunorum damascenorum, vel vinu rubeum ponticum lymphatu cum aqua pluuiali. Sumat omni die in ieiunio de hac mixtura. *℞.* rosata nouella, diarodon abbatris, zuccari ro, zuccari viol. triasandali. ana. partem. i. dianisi. par. f. gratia directionis.

Emperica. Communiter operantes faciunt laminam plumbeam laram, valde subtilem, spissam, perforatam, sicut cribrum, quam patiens deferat super renes firmata cum fascia omni tempore.

Prognosticatio. Solicitandum in cura passiois statim a principio: quoniam si perdurauerit, calorem inflammat, humiditates exiccat, & feb. hectica inducit. Item si diabetes superuenit in se, acuta vel non acuta post signa digestionis & in die cretica: nullatenus restringat, imo fortificetur cum aqua cicerum vel pisorum, si natura pigritauerit: quoniam creticus est, & naturalis. Si vero ante signa digestionis & in die non cretica, & cum debilitate virtutis assidua, & corporis arefactione, restringatur: quoniam symptomaticus est, & corporis colliquatione significat, & proprie si superficies urinae apparuerit oleaginea.

De macie renum. Ca. V.

Macies renum est consumptio ad ipsas stantis circa renes cum exicatione humiditatis, quae est in eis. Stat namque pinguedo quaedam condensata circa renum partem concavam: quemadmodum & circa basin cordis, non frustra generata, sicut & in alijs membris nostri corporis, sed industria naturae regulatis totum potius fabricata, gratia defendendi ipsa a marasmo: quoniam ad eorum arefactionem sequitur arefactio corporis totius. Fit autem macies aut propter coltum superfluum, aut propter do-

minantem calorem, qui in ipsis est: aut propter famem, & priuationem nutrimenti. Signa eius communia sunt paucitas appetitus coitus, vel impotentia ad illud, & si appetitus fuerit aliquantulum lassatus: & multitudo urinae cum albedine ipsius & vinctuositate et extenuatio corporis plus solito: sitis assidua, dolor in dorso non fortis: quoniam substantia renum non sentit. Est ergo non dolor proprie, sed virtutis defectio partis eiusdem, sicut post exercitium et laborem. Si autem fuerit propter coltum, vel famem superfluum: patet ex relatione infirmi. Si propter malam complexionem siccam innatam vel fluxam: patebit ex priuatione causarum primitiuarum iam dictarum.

Methodus. Cura eius ex qua cumque causa acciderit: eadem est, ut scilicet habeatur intentio ad impinguationem renum & corporis totius: quod fit ex esu multum & subito nutrientium: sicut sunt pisces petrosi recentes, & proprie assati: & iura carnijum laudabilium inspissata cum vitellis ouorum, condita cum cinamomo, cardamomo, liquiritia & creco & pulvis ex similia conditi cum amylo, penidij, lacte recenti caprae, vel amygdalis dulcibus: & sicut sunt oua sorbilia, testiculi gallorum, vel arietum & haedorum: auellanae, ficus siccae pingues, fistici, pineae, dactyli, & vinum rub. dulce, & lac calidum ex mamillis mixtum cum zuccaro & mica similia: & sicut est balneum aquae dulcis tepidum post 2. duas horas sine mora in ipso, & cum exire voluerit: vngatur corpus totum ex oleo ro. vel viol. vel nenuph. & post victionem spargatur aqua frigida super ipsum: quoniam calorem naturalem adiuuat: & tunc dormiat super lecto molli in aere frigido humido vel temperato. Et si fuerit aqua decoctionis maluarum viol. salicis, populi, magis confert: vtraque somno longo post ipsum, otio gaudeat & quiete. Abstineat pro-

posse a coitu & flebotomia & solutione ventris: quia vbi indigētia, non oportet laborare: similiter & a prouocātibus vli nam, & proprie diureticis: quoniam addunt in exiccatione vehementer. Sinapi vel aceto, non vtatur nec acuminibus, nisi forte gratia prouocatiōis appetitus: vtatur multiplicātibus spermā: sicut est diaphorion, diadragāti, & omnia quæ dicemus ea, de diminutiōe coitus. Vnguentur renes et spina dorsi tota cum vnguento, quod sic fit. ℞. olei ros. viol. añ. 3. i. butyri recētis sine sale. 3. 2. adipis anseris, anatis, gallinæ, añ. 3. i. adipis renum, hoc doræ & arietū. añ. 3. duas, ceræ. 3. i. dissoluantur omnia in casola, & colētur, & reseruentur: vel cum vnguento tali. ℞. croci. 3. i. populeon, dialtheæ. añ. 3. i. muscilaginīs psyllij, butyri recentis, añ. 3. 2. misceantur: & si vis resistere magis calefactioni, adde camphoræ. 3. i.

Emperica. Cura huius aegritudinis tri-bus inrētionibus perficitur. Prima in extinctiōe caloris affantis: Secūda in alteratiōe siccitatis marasman-tis: Tertia in multiplicatiōe spermatis renes confortātis: prima colligitur ex ea, de phthisi, & ea, de feb. hectica: secunda ex cap. de debilitate stomachi, parag. de complexionē mala & sicca: & ea, de diabete: tertia vero ex cap. de diminutione coitus. Item sciendum est, qd si scripta in capitulo de spasmō, & proprie de inanitione, & scripta ea, de phthisi, & de debilitate stomachi sicci, & de duricie renū, & ea, de feb. hectica simul aggregentur: integrabit perfecte renū humectatio, & impingatio, prout est fieri possibile per artem: quoniam siccum humectare de numero difficillimorum est, propter humiditatem esse caliditatem modicū actiuā.

Canones. Hæc passio fortibus indiget medicinis, atq; penetrātibus & adhærētib; quoniam in facilius est humidum exicare, q̄ siccū humectare, vt

dicat Gale. 7. de ingenio 2. ca. & proprie, vbi siccitas stat cū caliditate: quoniam tūc est opus duplici intentione. Siccitas nāq; est lima caloris & calor quoq; est fornax siccitatis: vt di. ibidem.

Prognosticatio. Sollicitudum in cura huius passiois statim a principio: quoniam si antiquetur, & cōfirmetur non curat: ergo perducit corpus ad rabē & fe. hectica & demū ad mortē.

De opilatione & duritie renū. Cap. VI.

Fit autē propter flegma grossum viscosum adhærēs renibus et poris vridibus, aut propter apostema conuersum in sclerosim. Signa eius propter flegma grossum, vel melancholiam, vel compositum ex ijs: sunt paucitas vrinæ amplior debito vel solito cum albedine & subrilitate ipsius: & dolor grauatiuus in spondilibus dorsi circa locum renū: Et si in illa passio prolongēt: incipit venter inflari, & vrina magis ac magis retineri, & sequitur hydropisis ascites. Signa eius propter apostema scleroticum: sunt antecessio apostematis in renibus cum signis proprijs: propter quod dū antiquatum fuerit, non sequetur resolutio, & doloris grauatiui cessatio, neq; saniei visio in vrina, imo remansit grauitas in alkatim, & cū hoc minoratur vrina, & venter inflatur.

Methodus. Cura eius propter flegma grossum, vř melācholicā, vel compositū ex ipsis est, vt educat materia: & digeratur: sicut dicemus cap. de arthetica, parag. de causa frigida. Conferat etiā pillulæ dictæ ea, de lapide in renibus, para. de actu pseruatuo: qm educūt materias grossas, et frangūt lapidē. Conferat etiā pro digestiuo oxymel cōpositū datū cū aq̄ decoct. se. diureticorū post purgationis aliq̄. Vt aq̄ pul. & syrupo diureticis, di. ca. de calculo in renib; & vesica.

Et plura dicemus ea, de surta et dyssuria. Item vtatur dianisi, diacastorei &c. fiat emplastrum super renes ex malua, bist-malua, & milij dictis ibidē: vngatur cū vnguento facto ex adipibus, dicto cap. de macie renum. Et si ipsum magis fortificare volueris in mollificando & penetrando, adde medullam cruris vituli, vel cerui, vel tauri, & aliquid aceti acutissimi. Cura eius propter apostemā scleroticum, licet sit difficilis, est. Sumat omni die bis hora maioris inanitionis stomachi de syrupo mollificatio et resolutiuo: sicut est oxymel compositum datū cum aqua decoc. ordeī et meliloti, vel se. mal uauisci. Purgetur vicibus alternatis par post parum cum benedicta laxatiua, vel cū oxymelle acuatō cū. 3. 2. reub. boni. In vnguentis & emplastris si, sicut prius.

Emperica. Electuarium bonum mollificatiuum lenitiuum resolutiuum & vrinatiuum sic fit. ℞. pinearum mund. amygd. mund. auellanaū, succi ligritix, peni. amyli, dra. se. altheæ, se. li. se. mal. capilli veneris. añ. 3. f. manna, ramarind. añ. 3. 2. laxifraga, milijsolis macedonici, pullegij, anisi, se. fileris mōtani rad. enulæ. añ. 3. iij. se. apij. se. se. anisi, se. petrosil. semi. ameos, amomi. añ. 3. 2. lapidis spongiæ, lap. iudaici, cicadæ, san. hirci antiquissimi, armoniaci, serapini, oppoponaci, bdellij. añ. 3. 1. reubar. optimi. 3. f. zuccari vel mellis quod suffecerit. Et si vis aromatizare, adde zz. gariofil. cinamomi, cardamomi, calamī aromatici. añ. 3. 2. terantur: deur ex ipso mane & sero. 3. 1. cū vino al. aquoso i causa slegmatica, vñ melācholia, sed cū aqua decoc. se. altheæ & mellis i sclerosi.

Canones. Non sis præceptis in vsu diureticorum vel resolutiuorum, sed vicibus alternatis interfere mollificatiua, ita vt mollificatiua dominantur in proportionē sesquialtera, vel dupla, qd securius est: quoniam in timore mollifi-

cationis raro contingit excedere in mollificando, vt plurimū vero in resoluēdo.

Prognosticatio. Opilatio recēs curationis est facilis: Antequa vero, quæ durities dicitur: difficilis. Sclerotificatio autem curationis est impossibilis propter inobediētiā, & morbi profunditatem, & viarum longitudinem immensam. Item opilatio renum inducit primo stranguriam: secundo dyssuriam: tertio hydropisum perniciosam, cuius causa remoueri non potest.

De apostematibus renum & pororum & vritidium. Cap. VII.

Apostemantur renes, sicut & membra aliā ex cōgestionē humorum peccantium in quanto & quali in venis, & arterijs ipsorum, vel decursu ipsorum humorum per ipsas. Et sit ex omni genere quatuor humores, vel vt plurimum tamen ex commixtione slegmatis. Signa eius, sunt febris continua permixta, & cum horripilatione non habēs paroxysmum, & sensatio doloris grauius alkatim: quasi esset aliquid in eo su spensum, cum præcipitur agro vt ceat supinus: & minoratio vrinx omni die: Et si apostema sit magnum, superuenit stranguria, & surgit tumor circa epa propter vring regurgitationem. Et scias, quod licet ad quodlibet apostema membrorū interiorū sequatur feb. propter cōtinuam transpirationem fumorum capnorum ad cor ipsum inflammantium: at tamen si membrum propinquum fuerit: vt pulmo, pleura, stomachus, epa, splen: sit feb. continua acuta. Si vero remotum fuerit, vt renes, surget se. continua permixta, id est non acuta, nisi membrū fuerit neruofum: sensitiuū: vt vesica, vel matrix, vel principale, et nobile: vt cerebrū, & testiculi: vel materia acuta calida: tūc namq; fiet feb. inflammationis intensæ.

Methodus. In principio huius apostemati fiat Aeboto, diuersa ex

basilica partis eiusdē, deinde ex basilica
brachij dextri. Et si corpus fuerit sangui-
neū, & virtus confās: ex: rhañ sang. plu-
rimus vt diuersio pringat ad renes. Post
flebotomiā fiat emplastrū repercuttiū
ex ros. sanda. . semperuiua, solatro, extre-
mitatibus rubi & vitis albæ coctis, & pl
statis, & incorporatis cum farina ordeī
& plantagine ponēdo tepidum super lo-
cum, & addatur aliquid aceti fortissimi
propter penetrationē. Epithymetur cum
sandal. ros. bolo. ar. terra sigillata iussis
in aqua ros. & aceto vel succis res præ-
dictarū. Nutriatur hora illa cucurbitis, cu-
cumeribus, melon. citrul. farina ordeī vel
auenæ coctis cum lacte amygdalarum
dulcium & aceto. Bibat aquam ordeī,
vel prunorum siccorum, vel seminum fri-
gidorum. Sumat in aurora syrupum de
nucupha. vel ros. cum eisdem rebus: &
sic regatur, donec apostema euitetur, si
fuerit possibile. In augmento vero, quod
est post dies quatuor, addatur in empla-
stro aliquid ex anodinis resoluentibus re-
liquias fluxus, quæ sunt flor. chamomil-
læ, mellitorum, semen lini, farina foeni-
græci, anethi et similia. Et si videris in eis
profectum, fortifica ipsa versus statum,
& adhuc plus in declinatione, donec per-
fecte liberetur. Si vero non videris in re-
percuttiuis profectum vsq; ad diem se-
ptimum vel octauū: imo tunc febris acu-
tur, & dolor: quia tunc sanies generatur,
tunc incipe aliam curam, scilicet digesti-
uam & maturatiuam per interius & ex-
terius. Fiat igitur emplastrū ex malua,
althea coctis et incorporatis cū oleo ane-
chino & chamomillino. Et si vis ipsum
fortificare: adde exungiam recentē porc.
vel butyrum, vel adipem anseris & gal-
ling. Et si vis ipsum magis fortificare in-
maturādo et sanie generādo, adde amy-
gdalæ amaras, dragag. gūmi arab. sc. na-
sturcā: qm sanies gñatur ex humorib; p-
aductionē: sicut cinis ex lignis viridibus,

vt dicit Gal. in cōmen. illius apho. 22. pa-
ti. Circa gñationē saniei. Et plura matu-
ratiua diximus ca. de apostemate roma-
chi, parag. Methodus. Et si times fe. in-
flammationē, pone in emplastro farinā
ordeī et tritici. Bibat hora illa aquam de
coctionis ordeī, & seminis altheæ, mal-
uæ, et endiuæ, et lini: quoniam maturat
et lenit: & non dimittatur venter restrin-
gi, sed leniat cū clysteri lenitiuo dicto ca.
de bolismo, & ca. de frenesi. Purget etiā
quandocūq; cum medicina lenitiua nō acu-
ta, sicut est cassia fist. tamarindi, manna
dissoluēdo ex aliquo ipsorum. 3. 1. vel. 2.
in aqua calida decoctionis lactuæ, pru-
norum & silium. Et potest addi zuccarū
vil. vel syrū viol. Si autē vis acuerē me-
dicinam, adde reubarb. boni. 3. 1. in pul.
vel purgetur cum 3. 4. benedictæ laxati-
uæ vel hierapicræ Gale, dando in sero cū
aqua calida: & sic fac donec ad statum
& maturatiuam perfectam saniei deue-
nerit: quod scies, qd se. lentescit, & super-
ueniunt rigores, & remanet grauitas in
dorso. Tunc fiat ruptura per artē, si per
se non euenerit, nec sanies in vrina visa
fuerit. Conquassetur ergo corpus infirmi
& tractetur manibus comprimendo: &
si non sufficit, erigatur, & præcipiatur
vt saltet. Et cum visa fuerit sanies, den-
tur primo styptica lauatiua in potu: si-
cut est aqua decoctionis mell. & semi-
nis apij, vel oxymellis compositi. Post
dies vero duos ā ruptura dentur vicissim
consolidatiua: sicut sunt trochisci de ka-
rabe, vel alkekengi dicti capitulo de mi-
ctu sanguinis, & saniei. Vtatur hora il-
la lacte calido ex mamillis mixto cum
melle & zuccaro. Confortetur hora il-
la cum carnibus laudabilibus conditis
cum sinapi & melle, vel pulte ex amy-
lo & penidijs & farina similæ cōditis cū
lacte amygdalarum amararū: quoniam
omnia ista confortant, & mundificant
vltus. Bibat hydromel, vel vinū album

lymphatum cum hydromelle. In fine vero fiat emplastra cōsolidatiua dicta ca. eodem: vel emplastrū, quod sic fit, *℞*. thuris, masticeis, mummiæ, myrrhæ, boli armenici, gummi arabici, dragaganti, sang. drac. gallarum, ciperi, mutila. & cetera quod sufficit. Terantur gumme vt alcohōl, & dissoluantur in oleo & cera ad ignem in casola, & fiat cerotum vel vnguentum. Et scias, quod vnguētum magis penetrat propter subtilitatē suā subtilitatis. Si autem omnia a principio dicta non contulerint, & grauitas de die in diē augmentata fuerit, & vrinæ difficultas sine feb. vel modica: tunc apostema tendit ad sclerosim: quare tunc procedatur, vt diximus ca. de opilatione & duritie renum.

Canones. Hoc apostema, sicut & quodcumq; aliud, aut permutat ad locum alium nobilem magis, & ignobilem, aut stat: Et si stat aut terminatur ad resolutionem, & est salubre: aut ad saniositatem, & est difficile: aut ad sclerosim, & est mortale. Et ex hoc trahitur canō vtilis in opere, scilicet qđ post vsum percussiuorum per dies quatuor, debet medicus primam habere intentionē ad resoluendum. Et si non proficit in eis vsque ad dies septem vel circa id, transseat coactus ad maturandum. Et si non proficit per id vsq; ad dies quadraginta vel quinquaginta vel sexaginta, procedat desperatus ad mollificandum. Item ad apostema renū, matricis & ani, sequitur stranguria propter vesicæ cōpositionē. Hæc tamen stranguria curari non potest medicinis circa vesicam exhibitis: quoniā ibidem non est eius causa. Vnde Hipp. 4. part. aphor. In ano flegmonem patienti, & matrice flegmonem habenti stranguria superuenit, & in renibus habentibus saniem stranguria superuenit.

Prognosticatio. Apostema renū si terminetur ad resolutionem

salubre: si ad dubellati & rupturæ timorolum propter morbi lēgitudinem, & doloris & feb. intensionem, & vlceris difficilem consolidationem, & vrinæ nitrositatem præterfluentis præpedientem, vnde Hipp. 6. part. aphor. Nefretici & circa vesicam dolentes laboriose sanantur in lenibus. Si autem terminetur ad lapidificationem, mortale. Item si ad apostema renum sequatur tumor ventris magnus: hydropisim minatur perniciosam, sicut est hydropisis, quæ fit propter apostema durum epatis vel splenis. Item si in apostemate renū superuenerit fluxus hæmorrhoidarum, vel menstruorum in corpore consueto per se vel per artē, salubre, & proprie si sit cum alleviatiōe fe. & doloris, vnde Hipp. ibidem. Melancholicis & nefreticis hæmorrhoides innatae bonum. Est enim nefresis nomen generale ad omnem renum passionem, sicut nefreticum est nomen ad medelam omnium passionū in renibus quicumq; & c.

TRACTATUS SEPTIMUS DE PASSIONIBUS VESICÆ.



Esicæ passionēs sunt sex in genere. Prima scabies siue vlcus: Secunda ardor vrinæ: Tertia stranguria: Quarta dysflura: Quinta exitus vrinæ insensibilis: Sexta apostema: Nā de lapide & arena dixim⁹ in vesica: vbi de renibus loquebamur. Cū autem dico vesicā, intelligo eius duas tunicas, ex quibus componitur, & collum ipsius, quod in viro virga dicitur, & in femella collum matricis, modo tamen perverso. Nā in masculo collum vesicæ est via principalis: vasa autem spermatica a testiculis ascendunt circa medium virgæ lateraliter cum ipso cōcurrunt, vnum a dextris, aliud a sinistris. In femella vero

collum vesicæ est equitās collum matri-
cis: ita ut apud vuluā vnica via efficiat̃.

**¶ De scabie & vlcere in vesica
& virga virili. Cap. 1.**

Scabies in vesica vel virga fit ex vl-
cere: vlcus autem fit aut post apo-
stema saniosum eruptum: & de ipso
dicemus cā. de apostemate in vesica &
virga: aut propter materias calidas ni-
trofas corrodetes partes quas diu ibi per-
transcunt vel morantur, sicut est flegma
salsum, & cholera. Signa eius sunt: quo-
niam si sint istæ passiones in vesica: sen-
tit æger dolorem circa lumen & pectinē
cū extenuatione corporis totius, & egre-
ditur sanies mixta aliquid cum vri-
na: licet non adeo perfecte, sicut apud vl-
cus in renibus: de quo diximus cā. de mi-
ctu sang. & saniei: quoniam quanto via
longior fuerit, tanto melius res viaticæ
cōmīscetur, & inest ei fœtor: & si antequā
rur. egrediuntur cum vrina & sanie squa-
mæ subtiles albæ, vel cortices parui si-
miles furfuribus: vnde Hip. 4. par. apho.
Quibus vrina pingui existente, furfurea
minguntur, ijs vesica scabit statim post.
Si sangu. aut pus mingunt & squamas,
odor grauis, sic vlceratiōes vesicæ signi-
ficat. Si autem prædictæ passiones sint
in collo vesicæ: sentit æger dolorem in ra-
dice vel medio vel capite vesicæ, vel a-
pud labia vuluæ vel circa id, quādo min-
git, & vrina labitur super vlcus, & egre-
ditur sanies ante vrinam. Et scias, quod
dolor est fortior in vlcerib⁹ vesicæ & col-
lieius, quam in vlceribus renum & po-
rorum vriditur propter istorum mem-
brorum maiorem sensationem.

Methodus. Cura amborū est eadem.
Perficitur autē duabus in-
tentionibus: vna in curatione morbi, q̃
est vlcerum mundificatio, & post hoc cō-
solidatio: Alia in curatione accidentis, q̃
est doloris & ardoris vrinæ mitigatio.

Cura morbi est, ut a principio digeratur
materiz acutæ cum syrupo de fumo ter-
ræ, & post hoc euacuentur, prout dicem⁹
cā. de scabie & pruritu corporis lib. 2. si
deus voluerit. Post hoc procedatur ad re-
media localia. Bibat igitur patiens om̃i
die in aurora. 3. iij. vel circa id, de potu li-
nitiuo: sicut est aqua decoctiōis ordeī, se.
althææ, se. maluæ, liquiritiæ bene colata.
Et si vis, adde ex vrinatiuis lenibus se.
cōmunia frigida maiora, vel minora: vť
sumat eadem hora aliquid ex cibis leni-
bus (sicut sunt iura gallinarum pinguia,
vel pulres ex amyio, penedijs, farina si-
milæ) conditis cū lacte amygdalarū dul-
cium, vel cum oleo earū. Post ista vero
per duas horas intret balneum leue: sicut
est aqua decoctiōis maluæ, althææ, violæ
populi, salicis, brancæ, vrsinæ, vngulæ
cabalinæ, siclē, atriplicis, mercurialis, et
mingat in balneo: quoniam vlcus mun-
dificat cū lenitate. Et ex eisdem rebus fi-
at emplastrum cū oleo chamomillino,
quod tepidum ponatur super lumen &
virgam post exitū a balneo: & vngatur
cum dialtheæ, & populeon mixtis. Post q̃
hoc feceris per dies aliquot, erit ad mūdī
ficatiua fortiora procedendū. Bibat igit̃
patiēs hora prædicta hydromel cū vino
albo subtili, vel aqua decoctiōis ficuum
siccarum pinguiū. Et fortius est illud oxy-
mel cōpositum, si non timeris ampliari
onem vlceris: debilius autem illo est lac
asinæ vel capræ, si bibatur calidū ex ma-
millis, post q̃ in eo extinct⁹ fuerit calybs,
vel lapis ignitus tribus vicibus, addito
post hoc aliquantulo mellis vel zuceari.
Et simile huic est vinum album subtile
lymphatū cū aqua decoctionis ordeī, vť
se. frigidorum: deinde gradatim perueni-
endum est ad localia proxima. Inijciat̃
ergo cum syringa primo hydromel pu-
rum, vel aqua decoctionis cicetum & pi-
sorum: quoniam omnia ista saniem ab-
stergūt. Et cū æger minxerit ista, inijciat̃

ilico cum syringa vnus ex trochiscis de akekengi dictis ca. de mictu sang. & lani ei dissolutis in aqua liquorum eorundem: quoniam mundificat, mitigat, & consolidat, & cum minxerit: alternent iterum lauatiua. Deinde in fine addatur consolidatiua fortiora: sicut sunt trochisci de karabe dicti ibidem dissoluti cum eisdem. Et si sumeret istos trochiscos cum iside liquibus per supius in aurora, conferrent: vel inijciatur collyrium album Ras in suo antidoratio, cum lacte quide: quado dolor est vehemens, cum aqua vero mellis & sicuū, cum est sordities plurima in vesica: quod sic fit. ℞. ceruſa, sarcocolla, thuris, gummi arabici, opi, sang. drac. añ. ʒ. i. hāt sieff in forma, sicut auel Janæ cum muscillagine seminis altheæ, vel psyllij, vel se. citoniorū cum lacte asinæ, seu mulieris: & sic vicissitudinentur mūdificatiua, donec patiens liberetur perfecte. Cura accidentis dicitur proximo sequente ca. Conferat præterea iniectio cum syringa rerū frigidarum leuium, sicut est muscillago se. citoniorum, se. psyllij, se. altheæ: & sicut est oleum ros. mixtū cum lacte mulieris, & instillatio olei ros. mixti cum populeon. & proprie, si dolor sit in parte colli anteriori.

Emperica. Coltus vsu moderato factus, & proprie in ieiunio confert, vias mundificando: immoderatus autē, vel inordinatus nocet, materias attrahendo, & mēbra debilitando: nocet vsus acuminū: sicut est sal, cepe, allia, sinapi, acetū. Nocēt etiā diuretica acuta: sicut est se. apiij, brusci, sparagi. Conferūt in principio cibi lenitui: vt pulres ex amylo, vel farina ordeī, vel auenæ. Similiter & medicina leues, vt tamarindi, cassia, vio. pruna. In fine veroglutinosa viscosa, si epar non impediatur: vt est caro porcorū recēs, sine fale vel modico, & extrema animalium, & pulmentum ex rīso vel tritico conditum cum butyro, vel adipe renū caprarum. Conferunt præ

terea vnguenta incarnatiua exterius super locum, & proprie si vlcus sit in vinga: sicut sunt vnguentum album, & vnguentum fuscū Nicolai, & proprie in declinatione morbi. Vtatur sepe in ieiunio hac mixtura. ℞. dragagati, zuccari ros. rosarū nouellæ, diarrædon abbatris. ana, partē vnam: dianisi partē m. f.

Canones. Licet in vlceribus vesicæ & renū conferant medicina exhibita per superius & inferius, per interiorius & exterius, tam lenitiua, q̄ consolidatiua: nulli tamē dubium medicinas tanto melius operari, quanto melius & viciniū accesserint ad particulā læsam. Et idcirco in passionibus renū magis confertur exhibita per supius q̄ inferius: in passionibus vero vesicæ, e conuerso.

Prognosticatio. Istæ passiones si perdurant, raro curantur & proprie in senibus: vnde Hip. 6. part. aphor. Nefretici & circa vesicam dolentes, laboriose sanantur in senibus. Et intellige per senes tertiam & quartam aetates: quoniam vesica cum sit membrum spermaticum frigidum naturaliter, magis fiet frigidum per aetatem: vlceribus autē frigidū est mordax, vt dicit Hipp. 4. part. aphor. Ad hoc etiā facit trāsitus vrinæ assidua corrodentis. Itē in scabie vesicæ si cortices grossi exierint cum scortore vrinæ plurimo, difficillime curatur. Sicut igitur tale signū in vlcibus intestinorū minatur, quia æger ex eo moritur: ita in vlcere vesicæ certificat, quod passio ægro commoritur. Vnde Hippocr. 6. part. aphor. Vesicam incisam, aut cerebrū, aut cor, aut diafragma, aut epar, aut renes, aut intestinorū aliquod graciliū aut stomachū, mortale: & hoc verū est vt in pluribus, & proprie in substantia vesicæ. Itē vrina hæsticos & vrina scabiētū in vesica sunt similes vniuersitate suipsi ei, & cōtētis s̄q̄mōsis. Caue ergo ne decipiant te, vt dicit Hippocrates secundum prognostic, distingue ergo per scortorem

& dolorem, quæ non sunt in feb: hectica.

De ardore vrinæ. Cap. II.

Ardor vrinæ est mordicatio partis vlcerosæ a re nitrosa proueniens, currente super ipsam simul cū vrina, siue sit vesica, siue collū eius, siue caput virgæ, siue vulua, siue renes & pori eius: propter quod sentitur dolor acutus in parte eadem, & proprie in fine exitus vrinæ. Fit autē ab humoribus acutis: vt sunt flegma salsum, & chol. aut a sanie. Et scias istud accidēs stare posse cū morbis diuersis. verbi grā, cum vlcere in renibus, cū scabie in vesica, cum vlcere in virga: cum stranguria: propter quod eius cura singulis earundē passionū capitulis sublimiter suffragatur. Signa eis patent ex relatione patientis cū antecessiōe signorū prædictorū, & sensatione doloris in loco læso.

Methodus. Cura eius perficitur duabus intensiōibus: vna est cura morbi, cuius est accidēs. Alia est cura sut, q̄ dicemus. Digerat igitur a principio humor acutus cū syrupo de fumo terræ. Et purgetur post hoc cum pillulis similibus, prout dicemus ca. de pruritu corporis lib. 2. Deinde procedatur ad localia cōmunia: quare ingrediatur eger tinā (cum patitur) aq̄ dulcistepidē vel aque decoctionis maluæ, altheæ, populi, salicis, se. lini, psyllij, & cōmniū infrigidantium cum lenitare: & ante balneum, vel in balneo sumat, 1. ex trochiscis vrinatiuis lenitiuis: sicut sunt trochi, alkekēgi dicti ca. de mictu sang. & saniei cum syrupo. vial. 3. 1. & aquæ frigidæ. 3. 2. vel cū vino albo aquoso, vel cum aqua decoctionis seminum communium frigidorum mundatorum maiorum. Vel sumat in aurora & ante cenam. 1. ex trochiscis de feminibus frigidis: qui, 188. seminum cōmuniū frigidorū maiorū: q̄ sunt se. lactuæ, portulacæ, endiuiz, scariolæ

añ. 3. 1. se. iusquiami, se. altheæ, se. papaueris, se. solatri. añ. 3. 8. se. apij. 3. 2. amygdalarum dulcium excorticatarum, draganti, amyli, succi liquiritiæ, boli armeni, acatiæ, añ. 3. 1. incorporentur cū muscillagine psyllij: & detur cum eisdē liquoribus, vel cum aqua ordeī, vel cum aqua decoctionis prunorum damasc, & viol. vel cum iure pullorum & agnorū pinguium: quoniā sanguis leniter abstergendo, & cū vrina educendo, causam doloris remouet gradati. Nutriat carnibus laudabilibus, & iuribus earū cōditis cum lacte amygdalarū dulcium, & proprie agnorū, porcorū iuuenū, pullorū & hororum coctis cum cucurbitis, cucu. malua, bletis & portu. Ex fructibus vratur cerasis, persicis, ficibus, vuis maturis, prunis & pomis aquosis: si stomachus non prohibeat. Bibat iulep vel hydromel aquosum, vel aquam ordeī, vel vinum albū lymphatum aquosum cum aqua decoctionis seminum communium frigidorum maiorum mundatorum. Et cum eisdem liquoribus sumat omni die in aurora de syrupo ros. vel viol. vel nenuphar. si dolor superfluat. Verumamen dū medicatur hic patiens, bonum videretur, q̄ abstinere ab omni potu pro posse per quinque vel sex dies: ita vt deficeret vrina: quoniam dum superfluit, vlcus elargat, & medicinas in loco suo stare nō permittit. Quod si pot9 sit ei necessari9, aut propter sitū intolerabilē, aut propter saniei abstersiōē mordicantis vlcus vehemēter: abstineat pro posse ab acuminib9 vt sunt acetū, agrest. ber. pira pōti. mala aust. Similiter & ab acutis, vt sunt pip. sisnā. sal. all. cepe, nast. petro. api. vinū vetus, amarū, purū: nisi forte grā digestio nis stomachi vlp appetitus. Vrať qñq; coitu sed raro: ga sperma vias lenit & purgat. Si vero frequenter materius attrahit, & in partib9 suis angustiam inducit. Consequenter veniendum ad localia

Proxima. Inungatur ergo caput virgæ cum lacte mulieris calido ex mamillis, vel lacte papaueris, vel muscillagine psyllij & seminis citoniorū, vel oleo ros. vel oleo viol. vel populeon dissoluto cū aliquo prædictorum. Et insulletur ex eis aliquid in vuluam, & caput virgæ, si sit ibi dolor. Et si nō sufficit: injiciatur cum syringa collyrium dictum cap. de scabie in vesica, vel trochis. 1. ex prædictis, dissolutis cum lacte mulieris, vel cum lacte papaueris, si dolor est fortis, vel cū aqua mellis, si intēdit abstersioni. Et si talis aq̃ primo immitteretur cum syringa gratia lotionis vesicæ & virgæ, & post eius micturam ilico præd. anodina immitterentur, melior fieret operatio. In fine vero doloris & mundificationis injiciantur consolidatiua dicta cap. de scabie in vesica, si necesse videatur.

Emperica. Collyrium sublime qđ immittitur cum syringa ad ardorem vrinæ mitigandum, sic fit. ℞. papaueris albi. 3. iij. pistetur, & exprimatur eius humidum in modum olei, viol. 3. i. opij boni. 3. i. calefiant ad ignem continue commiscendo cum spatula: Deinde colētur per pannū densum fortiter exprimendo, sicut in torculari, & referuetur: et si vis fortificare: adde olei nenuphar. 3. f. populeon. 3. 2. muscillaginis psyllij quantum volueris. Item ad idem confert oleū factū de granis papaueris recentis, exprimendo cum torculari, sicut fit oleum de nucibus, vel seminis lini. Ad idem cōfert lac factū ex seminibus frigidis communibus maioribus pistatis in mortario, & distemperatis cum aqua frigida, & coloris. Confectio syrup. nobilis ad idem, sic fit. ℞. adianti. 3. 8. polytrichi, capilli veneris, scolopendrig, foliorum lactucæ, endiuia, linguæ bouinæ, boraginis, violæ, aii. 3. 4. myrtil. liquiritiæ. aii. 3. i. pistentur grosso modo, et bulliātur in lib. 3. aquæ. et lib. duabus vini albi aquosi, donec lib.

2. consumantur, tunc coletur & addantur zuccari. 3. 6. & iterum bulliatur parum, & coletur, & referuetur. Dentur de hoc syrupo aquoso omni die in aurora & ante coenam. 3. 4. sine alio liquore. Valer in vlcere renum & scabie vesicæ, & ardore vrinæ potenter siue poterit, siue injiciatur: quando lenit & infrigidat & incarnat. Item vaporatio sublimis ad idem, sic fiat. Decoquantur herbæ frigidæ in aqua pura, scilicet solatrum, & semperuiua, populus, salix, violaria cum viol. ro. maiua, althea, vngula cabalina, capilli veneris, folia nenuphar. lactu. endiuia: portul. & melon. citrul. papauer, iusquiamus, & aliqua anodina, vt flores chamomillæ, melior: & ponatur ager nudus in vreo bene cooperto, & ordinetur canna procedens a loco in vreo, & applicet vuluam vel virgam quāto vicinius poterit: quoniā hic vapor materias acutas resoluit, loca læsa confortat, dolorem mitigat. Et potest addi fumus terræ, si necesse videatur, & proprie recens: quoniā humores acutos rectificat cum virtute. Aut fomentetur particula cum pannis lineis molliibus infusus in eadem decoctione. Aut fomētur cū latete ignito asperso ex aceto vel vino rubeo styptico in pannis lineis inuoluto: quoniā hic vapor materias acutas reprimat, & membra debilia confortat. Confert præterea vsus talis iragæ qualibet die in ieiunio cum potu vini albi aquosi lymphati cum aqua pura. ℞. seminum communium frigidorum maiorum mundatorum, vncias duas, seminis portulacæ, seminis papaueris albi. aii. vncias 6. seminis iusquiami. 3. 2. zuccari albiissimi ad pondus omnium: terantur grosso modo: vel fiat eis puluis terendo subtiliter: vel fiat ex eis electuarium addendo cynamomi, macis. aii. 3. duas. Ad idem confert hæc mixtura. ℞. dragaganti, zuccari, vel diapapaueris, aii. partes æquales.

Canones. Scias, q̄ cura ardoris vrinæ siue cura vlceris, ad quod cōsequitur, est cura blanditiua sine cura eradicatoria, vel sicut aura tēporalis sine duratione perpetua: quoniam impossibile est accidens curari sine suo morbo: cum ipsum sequatur, sicut vmbra corpus, & sicut morbus suā causam: propter qd ait Gal. 12. de inge. sanita. q̄ triplex est genus medicorū. Primum adulantium, scilicet qui accidentibus intēdunt: de quibus infirmi cōquerunt neglectis morbis, quos non cognoscunt. Secundū ministrorum, scilicet q̄ morbo & eius causæ vehementer insistant adeo, vt morbum & virtutē interimant. Tertium rationabilem: qui morbo & suæ causæ obuiant cum remedijs gradatim a leuibus ad fortiora scandendo, vt sic morbum deiciant, & virtutem obseruent: qui est principalissimus iudex in actu curatio: accidentia nihilominus non prateruendo, & proprie diffilia, quæ curam ad se trahunt.

Prognosticatio. Solicitandum in cura huius doloris, & suæ causæ statim a principio: ne forte antiquetur, & corpus exiccet vigilijs atque doloribus superfluis, & sic febrem hectica accēdat. Itē ardor vrinæ sine sanie facillius est curationis: cū sanie vero difficilis.

De stranguria. Cap. III.

STranguria licet apud cōmuniter loquentes ad extraneas trahatur significationes: vtpote ad omnem actionem læsam acciderem circa expulsionē vrinæ, siue sit ablata, siue diminuta, siue corrupta: nos tamen res & nomina proprie pro posse distinguentes stranguriam soli actioni corruptæ appropriamus, dysuriam vero actioni diminutę: suriam autem actioni ablatae copulamus. Est igitur straguria vt dicit Gal. in cōmento illius apho. 7. p̄ straguriā & dysuriam &c. cū vrinā guttatim emittit, & mingitur omni ho-

ra, neq̄ reservatur ad vnicā expulsionē, sed exit velociter, postq̄ recepta est in vesica, & hoc totum præter voluntatem: et est duas specierum, aut cum ardore vrinæ, aut sine. Fit autē stranguria, quæ est cum ardore, aut ex acumine vrinæ: propter quod ilico cū in vesicā guttatim per poros stillat vritides, excitat expulsuā: aut ex vlcere in vesica: propter quod sentiens mordicationē ipsam eijcit extra se. Stranguria vero, quæ est sine ardore, fit aut propter debilitatē vesicæ in sua corpulētia: quod nihil aliud est, q̄ raritas cōpositionis suæ texturæ: aut propter mollificationem et paralytim in collo vesicæ: propter quod musculi ipsius trāsuer sales retentiuz, virtuti deseruiētes, laxantur. Et ista paralytis nihil aliud est, q̄ mala cōplexio diuersa humida, dominans super ipsam: aut propter causam primitiuā, vt partū difficilē, vel casum et percussione. Signa eius in cōmuni, siue sit cum ardore vrinæ, siue non: patēt ex relatione infirmi. Si vero sit propter acuitatē vrinæ, apparet vrina citrina v̄l rubea intensa subtilis valde cū priuatione signorum vlceris. Si vero sit ex ardore vrinæ, apparent omnia signa dicta ca. de vlcere in vesica & virga: Si autem propter debilitatem vesicæ: apparet, q̄ vrina non egreditur copiose, nisi cum desuper manibus cōprimatur vehemētē. Si aut propter mollificationē, apparet vrina alba, grossa, lactea cum cōtētis flegmatis pluribus, nisi epar contradicar.

Methodus. Cura stranguriæ dolorosæ propter acuitatem vrinæ est, vt a principio fiant purgationes vniuersales humorum acutorum: & postea balnea lenitiua, & remedia lauatiua viarum vrinæ cum infrigidatione sufficienti: vt plene docuimus cap. de ardore vrinæ, parag. Methodus. Et non negligatur alteratio epatis cum cibis & medicinis frigidis: vt diximus cap. de debilita-

Tractatus septimus

re epatis. parag. de causa calida. Deinde ablata causa, perueniendum est ad curā accidentis. Dentur ergo trochisci frigidi styptici, vt confortetur virtus retentiuā vesicæ: sicut sunt trochis. de karabe, & trochisc. de alkekengi dicti cap. de mictu sanguinis per superius & inferius cum styptico: & sicut sunt trochis. de bolo arme. qui sic fit. ℞. boli armenici, karabe. añ. 3. 5. acatiæ, balauistiæ, gummi arabici, hypocistidis. añ. 3. 1. & f. apij, seminis iusquiami. añ. 3. 1. conficiantur cum succo berberis, vel myrtill. vel sumach, v℞ mu scillag. psyllij: quoniam ardorem reprimunt, & vlcerationem prohibent, & retentiuam confortant: vel sicut trochisci de glandibus. qui. ℞. glandium. 3. 5. & myrtillorum siccorum, & ro. añ. 3. 1. & f. acatiæ. 3. 1. amyli, gummi arab. boli armenici. añ. 3. 5. lentium excorticarum, 3. 4. conficiantur cum aqua ro. vel succo cydoniorum, vel succo mespilorum vel sorborum, vel prunorum immaturorum. Vngatur peccē & virga cum vnguento styptico, quod. ℞. gummi arab. opij. añ. 3. 5. myrtill. cerusæ. bo. ar. añ. 3. 2. acetis. 3. f. olei. ro. 3. iij. ceræ. 3. f. teratur, & incorporetur ad ignem in casola, vel cum vngueto tali, si aliud præsto nō sit. ℞. populeon, vnguēt albi. añ. 3. 1. puluerisentur subtilissime, & incorporentur simul perfecte. Vel epithymē cū petijs infusus in aqua ro. part. 2. acetis, par. f. postq̃ i eis dissoluta fuerint terra sigillata, bolus ar. san. drac. myrtill. acatia, gummi arabici, hypocistidis, masticeis, thuris. añ. par. æquales. Nutriatur carnibus assis vel elixis cum herbis frigidis, conditis cum succo berberis, vel granatorum v℞ agrestis. Vtatur etiā riso, farre, ordeo conditis cū lacte amygdalarum dulcium, & lentibus excorticatis vel bis coctis cū reiectione primæ aquæ. Bibat vinū rubrū stypticū lymphatū cū aq̃ pluui ali, vel cū aqua decoctionis plantaginis, sumach, myrtillorum: si stomachus et epar

non radicāt. Sitim pro posse toleret per dies plurimos, donec vrina restringatur: qm̃ dū supfluit, virtutē medicinarum in loco suo non permittit: verū si potus sit necessarius, abstineat ab oibis diureticis et acutis: qm̃ hæc passio nō est defectus, sed excessus in mingendo. Cura eius propter vlcus in vesica est, vt a principio fiat cura vlceris dicta suo ca. Post hoc & nō prius pueniat ad localia remedia iā dicta. Cura eius propter mollificationē vesicæ est, vt digeratur slegma crudū, & purge tur vehemēter: sicut diximus ca. de paralyti: & sicut diximus ca. de arthetica. parag. de causa frigida. Et balneet in aqua stypticis calidis: sicut est aqua tinarum, vel aqua decoc. saluæ, absynthij, rutæ, arthemisiæ, sauinæ, iuniperi, mentæ, mētastrij, calamēti, origani, serpylli, costi & siliū. Vel fiat fomentatio peccinis assidua cū eisdē rebus bullitis in vino & oleo pfecte: deinde pistatis & incorporatis cū pul. rissi et lentium excorticatarum & cupullarū glandium, & karabe, atq̃ hypocistidis. subtiliter cribellatis. Cōfert etiā subfumigium ex thure, mastice, bdellio, cornu cerui, gummi arabico dragaganto tritis, & incorporatis cum pice, vel laudano, vel terebentina, donec fiat velut forma pillularum, ex quibus vna ponatur super carbones: Et si patiēs sit mulier, fumus in vuluam capiatur mediāte canna. Cōfert etiā licinium bombacinum assidue gestatum intra vuluam, postquam inunctum fuerit ex vnguento martiaton, vel aragon, vel ex oleo de castoreo, vel de costo: cum quibus, pul. olibani, masticeis, gummi arabici, subtiliter cribellatus fuerit incorporatus. Vngantur præterea peccen & virga cum vnguentis eisdem calefactis ad ignem. Quod si mollificationem magis timueris, q̃ stranguriam: adde castorei, mynthæ assæ, mummie, quātum volueris de vnoquoq̃. Vtatur per superius in aurora & ante cœnam trochis. de corian

dro, qui sic fiunt. *℞.* se. coriandri, ciperi, iuniperi, myrthæ, gallangæ, cynamomi, enulæ, acori, añ. 3. 2. glandium, thuris, añ. 3. 1. conficiantur cum vino rubeo: & de vno cum eodē, vel cū vino albo veteri claro: vel sumat eisdē horis, 1. ex trochis. de mastice qui sic fiūt. *℞.* mastice, myrthæ, thuris, mūmiæ, añ. 3. 2. cōficiātur cū succo plantaginis, vel cydoniæ, vel sorborū, vel melpilotū, vel prunoū immaturorū: & dentur sicut priores. Nutriatur carnibus laudabilibus assis vel elixis cōditis cū speciebus aro. & iuribus eorū aliteratis cū mēra, & plāragine & agrestia. Comedat etiā vitel, ouorū assorū, & pulres ex triso, vel similia cōditos cū lacte caprarū. Bibat vinū vetus amarū, vel vinū rubeū stypticū, lympharū cum aqua decoc. cynamomi, & piperis longi. Aut bibat hydromel conditū cū speciebus calidis: verumtamen conferens videretur, vt patiens abstineret ab omni potu p quinque vel sex dies. Quod si non sit possibile: abstineat a diureticis, nisi cōsolatis cū stypticis excellēt. Cura ei⁹ propter debilitatē ex raritate corpis vesicæ, aut propter causam primitiuā est, vt vtatur in ieiunio frequenter & assidue electuarijs calidis stypticis cū aromaticitate: vt sunt diagallā, diatrion pipe, diacarda, electuarium ducis philantropos, & similia: Vn gatur pecten & virga cum vnguento marciaton vel oleo de costo, vel de mastice, quibus incorporata sint spica, castoreum, mastix, olibanum, cynamomum, gallia musca, gar. addendo ceræ, quod suffecerit. Et si patiens sit mulier, inungātur licinia de hombace ex eodem vnguento ad ignem: & actu calida gestentur assidue intra vuluam. Et fiant omnia localia super pectinem & virgā, quæ diximus cap. de debilitate digestionis stomachi in sua substantia. Diætetur sicut in stranguria propter mollificasijonem,

Emperica. Dicit Hippo. 7. parti. apho. Stranguriam & dysuriam vini potatio & flebotomia soluit. Incidere vero venam, quæ intus in talo est, bonum: quod verificans commentator dicit, qd verū est quinque cōditionibus obseruatis: prima, vt sit de causa frigida: secūda, vt vinū bibitum sit plurimā quantitatis: tertia, vt sit vetus purum, vel parumper adequatū: quarta, vt corpus nō sit plethoricū: quinta, vt si sit plethoricū de sanguine vel omnibus humoribus simul, fiat flebotomia prædicta: si vero cōnetur humor alius, fiat farmacia.

Canones. Strāguriā sim oēs eius modos reducitur ad diabete: qm est fluxus vrinæ superfluus, peccās in modo exeundi: propter qd concluditur manifeste, qd dicta ibidē suffragātur pñri ca. & proprie, quantū ad strāguriā cū ardore.

Prognosticatio. Stranguria raro curatur in senibus. i. q vltra 40. annos sunt, et proprie si fuerit perdurans: vnde Hip. 6. parti. apho. Nefrecti & circa vesicam dolentes, laboriose sanantur in senibus. Itē strāguria de causa calida est periculosior in senibus, sed de causa frigida in iuuenibus: qm fortitudinē causæ significat: vñ Gal. in cōmento illius apho. 2. part. In morbis minus perclitant ægrotantes. Fortis est ignis, qui in aqua non exstinguitur &c. In stranguria propter vlcus quantū ad causam calidā: vel propter debilitatē vesicæ, quantū ad frigidā, oim sunt difficillimæ curationis,

De suria & dysuria. Ca. III.

Suria siue scuria dicitur, qn quis nō pōt oīno vrinā expellere: dysuria vero, qn ipsā expellit, sed cu difficultate, & insufficiētia, & guttatim solū, siue hoc accidat periodice, siue tpe oīni. Et sic patet, qd suria significat actionē læsā ablatā cōtingentē in virtute expulsiva vrinæ. Dysuria vero actionē læsā diminutā

Neque differunt, nisi secundum magis & minus, quare ipsorum eadem sunt signa causæ, & cura, Et hæc omnia testificant per Gal. in cōmento illius aphor. 7. part. Stranguria & dysuria, &c. Et 6, de acci denti ait: quod dysuria, vel suria signat defectum expulsiuæ: Stranguria defectū retentiuæ: vt supra tetigimus ca. de Strā guria. Fiunt suria & dysuria, aut propter ægritudinem in vesica, aut propter ægritudinē in collo vesicæ, & virga: aut propter ægritudinem in renibus & poris vritidibus. Si propter ægritudinē in renibus & poris: tunc hæc ægritudo aut est lapis opilans, aut apostema, aut verruca, aut caro dura. Si propter ægritudinem in vesica: aut est mollificatio, aut extēsiō post vehementem vrinæ retentionē, aut san. coagulatus purus, vel cum sanie permixtus. Si vero in collo vesicæ vel virga, aut est lapis stās in radice vel medio eius aut apostema, vel verruca.

Methodus. Signa eius propter lapidē in renib9 & poris, sunt gra uitas in dorso, & inanitiō vesicæ ex vrina, quæ ad ipsam descendere non potest: & dolor circa epar cum inflatione ventris & hydropisi, & antecessio lapidis, vñ arena in vrināli. Et cura eius est, sumere in potu medicinas, quæ frangāt lapidē, & prouocent vrinam, quas suo diximus ca. Signa eius propter apostema in renibus, similiter & cura sunt dicta capit. de apostemate in renibus. Signa eius propter verrucam ortam in renibus vel poris, sunt: quod sit secundum plurimū post vlcera accedentia in hoc meatu, propter quod fuit antecessio vrinæ permixtæ cū sanie & sanguine, & dolor grauatiuus atque pungitiuus in dorso & inguinibus cum feb. continua, & quandoq; acuta, et nō prohibet in exitura totam vrinam, sed modicam post partem. Et curā eradicatiuam non habet: quoniam medici næ corrosiuæ per exterius exhibitæ non

penetrant: per interius vero nocumētum inferret maximū scilicet stomachi, epatis, & venarum corrosionem. Sed medicī na eius blanditiua est cum balneo aquæ dulcis tepidæ decoctiōis maluæ, altheæ, caulium recētium, se. lini, fenigræci, populi, viol. salicis, vngulæ cabalinæ, mercurialis, atriplicis, & omnium mollificā tium, & hæc mediātiū cum lenitate: quoniam vias mollificāt, dolorem mitigāt, & vrinam prouocant: & emplastris & vnguentis lenificantibus, quæ diximus ca. de opilatione & duritie in renibus. Signa eius propter mollificationem & paraly sim vesicæ & lacertorum colli eius, sunt quoniam habens eam mingit cum facilitate, quando super vesicam sit cōpressio cum manibus: & tumor, & repletiō vesicæ ex vrina. Et cura eius est inunctio pectinis & virgæ totius cū vnguentis calidis stypticis aromaticis: sicut sunt vnguenta mariatōn, aragon. & agripa ad ignem vel solem calidum: & cum oleis similibus: sicut sunt oleū nardinū, costinum, castoreum, oleum de scorpionibus dictum cap. de lapide in renibus. parag. Emperica. Et si in aliquo istorū oleorum dissoluta fuerint gummx calidæ, scilicet opponacum, bdellium, armoniacum, storax, melius operabuntur circa membrum frigidum. Vtatur electuarijs calidis sæpius in ieiunio cum vino albo claro veteri: sicut sunt diamargaritō, diacastoreon, theriaca. Et in fine rei viæ diureticis: sicut sunt filantropos, nescrotaf. Balneetur præterea in balneis calidis: sicut sunt aquæ tinnarum: vel fudet in stuphis siccis, & proprie apud inanitionem vesicæ. Signa eius propter extēsiōnem vesicæ post retentionem vrinæ superfluam sunt: quoniam vt plurimum accidit pueris stolidis cum ignauia vel adultis stantibus in præsentia magnatū vel loco honesto: propter quod replentur eorum vesicæ, & instantur vehementer

adeo, vt constringi non possint, neq; expellere, nisi fortiter manibus exprimantur. Et cura eius est, introitus in balneū diureticum, & proprie post compressionem & vrinationem: sicut est aqua decoctionis apij, ebuli, lupuli, meliloti, caulium recētū, sicli, arrami, & similiū. Et si nō suffecerit: fiant oia dicta de dysuria propter mollificationem. Signa eius propter sangu. vel sanie[m] coagulatum in vesica, sunt antecessio mictus sang. & saniei, post hoc retinetur vrina, & inflatur vesica. Et cura eius est, vt a principio iniiciatur cum syringa medicamen dissoluens illud: sicut est hydromel, & forti9 illo est hydromel mixtū cū vino albo, vel aqua decoctionis sicūi liccarum, & apij: & fortius est hydromel compositum: & iterū fortius est oxymel scylliticum: & adhuc fortius est vinum albū vetus, in quo dissoluta sint armoniacum, bdellium, serapinū ad ignem in cascila, si non timueris vlcus in vesica. Et vngatur locus cū vnguento dissolutiuo, mollificatiuo: quod fit ex mariaton & agrippa ana. part. x. dialtheæ, butyri recentis. part. f. In fine vero vtatur medicina frangente lapidem, & prouocante vrinam: sicut diximus ca. de lapide in renibus & vesica: et tam plura dicemus. Signa eius propter lapidem stantē in radice virgæ, vel medio, sunt dolor in loco, in quo stat lapis, & repletio vesicæ, & eius inflatio: quæ si comprimitur, nihil egreditur, sed dolor fortificatur. Et si proieceris infirmum super dorsum suū, & leuaueris pedes eius ad superiora, & vehementer eum cōmoveris: egrediet vrina. Et cura eius est, vt vtatur medicinis frangentibus lapidē su prad, donec frangatur, & exeat cum vrina: Et si frāgi non potest: fiat talis eleuatio omni hora, qua necesse fuerit: vel extrahatur lapis incisione facta in collo vesicæ: vt docuimus capite de lapide in renibus & vesica. Signa eius propter apo-

stema in virga, similiter & curam dicemus ca. de apostemate in vesica. Signa eius propter verrucam in collo vesicæ & virga, sunt dolor acutus in virga: & quoniam fit secundum plurimum post vlcera accidentia in hoc meatu: quare antecessit mictus sang. vel saniei, & proprie ante exitum vrinæ: Deinde post dies aliquot impeditur exitus vrinæ sed non totus, imo pars post partem: quoniam perfectē nō oppilatur, nec replet vesica nec inflatur. Et cura eius est, vt si sit in capite virgæ, corrodatur & mundificetur cum vnguento viridi dicto capite de surditate aurium: post hoc cōsolidetur, sicut ibidem diximus. Et sublime consolidatiū est vnguentum fuscum, & vnguentū album. Si autem fuerit in radice interiori, dentur medicina frangentes lapidem p superius & inferius: quoniam quandoq; cum eis sanatur, & proprie in principio. Si vero non suffecerit, & caro fuerit indurata: fiat incisio virgæ secundum longum vsq; ad locum verrucæ, & abscindatur cum rasorio, & cōsolidetur verruca & virga.

Emperica. Scripsimus medicinas compleras ad frangendum lapidem, & prouocandum vrinam in ca. de lapide: quibus nihil potest adijci in materialibus simplicibus: sed solum in modo descriptionū, quæ nunc penemus. Aqua sublimis diuretica sic fit. ℞. radicū quinque cōmuniū, cicoreæ. añ. M. .i. fenicū. saxifragæ, milij sol. pentaphillon, volubilis, ma. & mi. scolopendriæ, tamaris, eupatoriij, squinantij, om̃ium añ. M. .i. seminum communium calidorum & triglorum. ana. 3. 6. nucleorum persicorum, & amygdalarum amararum. ana 3. iij. oia perfecte terantur, & in lib. 8. vini albi subtilis aquosi veteris bulliantur parumper: deinde ponatur totum in alem-bico, & distilletur simul cū istis rebus. ℞. acori, azari, spicæ, cala. aroma. apij, pe-

Tractatus septimus.

tro: cassia ligna, ciperi, costi, añ. 3. f. corti-
cis cicerum vel pisorum rub. 3. iij. cineris
scorpionum adusto, vel loco eius eicada-
rum 3. 2. sanguinis hircini macerati in au-
gusto exsiccati, sanguinis leporis, & vul-
pi collecti & exsiccati. añ. 3. 2. cancrorum
cōbustorū, 3. 1. pip. 3. f. corticis, radices,
capparidis, lapidis iudaici, lapidis spong.
liquiritiæ, papaueris albi, seminis portul.
se, vrticæ, se, rutæ, seminis nigellæ, semi-
cicutæ. añ. 3. 2. hæc omnia terantur, & cū
vino prædicto & rebus alijs misceantur
& distillantur. Pulvis ad idem. ℞. brusce.
sparagi, sumi terræ, mentæ, pullegij, my-
lij, sol. saxifragæ, marathri, anisi, dauci,
carui, cymini, anethi, ana. 3. f. cardamo.
folij gar. macis, nucis mulcar. añ. 3. 1. &
f. turbir. 3. iij. liquiritiæ 3. 1. & freub. 3. f.
philipendulæ, enulæ, se. nasturtij, spicæ,
nardi, seminis per. feniculi, apij. añ. 3. f.
sizeleos. 3. iij. zuccari albissimi. 3. 4. teran-
tur omnia subtilissime, & misceantur, et
sumat cum vino albo claro aquoso. Et
si vis ipsum fortificare: adde cantharid.
capitibus & alis ablatis. 3. f. azari, sem.
ameos. añ. 3. 4. Et si times ipsarum cali-
ditatem, vel vlcus in renibus & vesica,
dimitte ipsas cantharidas, & pone pro
eis seminum communium frigidorum 3. 1.
Si autē velis ex ipsis facere trochisc. ad-
de armonia. 3. 2. dissoluti in vino albo,
& alia species conficiantur cū ipso: quo-
nia m oppilationem omnem & lapidē re-
mouent, si sit possibile per medicinam re-
moueri, & cū vrina expellitur.

Canones. Dicit Rasis in diuisionibus
cap. de retentione vrinæ, qd
pluribus modis difficultati vrinæ
conuenit introitus in aqua calida, in qua de-
cocta sint folia caulium recentium, &
cartamum, & scœnum græcum, & crubea
tinctorum, & capiū & eupatorium: & si-
militer emplastro ex eis super alkatim
& pectinem: quoniam aperit, molli-
cat, & prouocat: similiter & vsus medici-

narum prouocantium vrinam per interi-
us: sed in hoc obseruanda est cautela;
quonia m etiam si prosint, quando vesi-
ca est vacua, nocēt tamen vehementer,
quando est plena: quoniā extendunt, &
forte scindunt replēdo. ¶ Sciendū pte-
rea, quod differēt medicina diuretica &
vrinatiua. Dicitur nanq; res diuretica, q
sua caliditate & siccitate vehemēti san-
in epate & venis colligat, subtiliat, &
dissoluit: quare parcius plurima attra-
hi potest per renes, & sequestrari: sicut
docet Galen. de inge. de medicinis simpli-
cibus, cuiusmodi sunt vinum album ve-
tus clarū amarum, radices quinq; cōmu-
nes, & semina calida omnia. Vrinatiua
vero dicitur, omnis res frigida humida:
quoniā eaz pars plurima trāsit p vrinā,
& parū cedit in corporis nutrimentū: sicut
sunt vinū albū aq̄sum, & iura carniū, &
pruna, & cerasa, & se. cōmunia frigida.
Cōmune autē ad vtrūq; eoz ē vrinæ pro-
uocatiū, & sic intellige scripta authorū.
Conferunt ergo diuretica in causa frigi-
da & lapide & opilatione: vrinatiua ve-
ro, in causa calida, scabie, vlcere, mictū
sanguinis, macie renum, & eorum debi-
litate ex sua substantia. In causa vero mi-
xta conferunt vrinæ prouocatiua.

Prognosticatio. Istæ passioēs raro cu-
rantur in his, qui sunt
vltra quadraginta annos, & proprie si
perdurant. Vnde Hippoc. 6. part. aphor.
Nefretici & circa vesicam dolentes, &c.
Item si fuerint propter apostema durū
in renibus, vel carnem verrucosam, vel
lapidem, qui se frangi non permittit: aut
cito interficiunt ex dolore, aut hydropi-
sim ascitem inducunt perniciosam. Item
si fuerit propter sanguinem coagulātū
in vesica, scabiem & vlcus faciunt in ea:
nisi infra 20. dies vel 40. ad plus expella-
tur: quoniam in ventre calido sanguis
conuertitur in sanie in 20. diebus vel
circa id, cum sanies solummodo per ad-

uisionem generetur in intestinis: sicut cōtingit in matrice & vesica. Vnde Hipp. septima part. aphorismorum. Catarrhi in superiori ventre, in sanien conuertuntur in viginti diebus: & merito vt dicit commētor: quoniam vt dicit sicut .20. dies est terminus primæ periodi vniuersalis, ita .40. secundæ. Item dysuria ex mollificatione vesicæ proueniens in senibus vt plurimum commoritur eis: sicut est paralyfis atq; epilepsia: quoniā complexio ætatiua tunc infrigidatur.

De insensibili exitu vrinæ & mingentibus per somnium in lecto. Cap. V.

Accidunt quibusdam, & proprie pueris, vt mingant nescienter in somno: & quandoq; tempore vigiliarum: quoniā & si in eis virtutes naturales sint fortes: virtutes tamē animales sunt debiles: vt dicit Auic. 2. cān. fēn. 2. cap. de causis spāsmi, ex quibus fit virtus sensitua & retentua debilis in vesica. Fit igitur passio propter aliquā quatuor causarum: aut propter complexionem calidam & humidam in renibus & vesica: aut frigidam & humidam: aut ex mollificatione lacertorū vesicæ: aut propter potum superfluum.

Methodus. Signa eius propter complexionem calidam & humidam, sunt habitudo corporis carnosā, vniuersa suis plurima, vrina citrina vel rubra: & forte sentit patiens dolorem aliquē in eius exitu, & fit maxime in pueris: quare cū resoluūt se super latera, excitatur virtus expulsiua, & proprie si superueniat imaginatio stādi in loco, in q̄ consueuerunt homines vrinare. Et cura eius est, si sit puer, vt incutiatu ei timor ex verberibus & verbis rigidis: quoniā species eorum remanebunt in memoria, & regulabūt fantasiā hora somni. Si vero sit iuuenis vel adultus, alteremur renes et

vesica cū emplastris & vnguentis frigidis stypticis dictis ca. de diabete. Similiter & cū puluere, quem ponit Rasis in diuisionibus præsentī ca. 178. se. coriandri assati: & postea infusi in aceto vini per diem & noctem: quia fiet magis stypticū, part. 1. myrobalanorū, emblicorū, sticad. boli armenici, glandiū siccārum karabe, lentium excorticatarum part. æqua. cū coriando terantur oīa simul, & de ē ex eo. 3. f. vel. 3. iij. cū aqua pluuiali, vel vino rubeo pōtico. Ad hoc etiā cōferūt trochis, de karabe, & trochis de alkeken gi dicti. ca. de mictu sang. Fiat quandoque fleboto mia basilicē in brachio, vel saphenē in pede: quoniā confert. Dieta eius sit frigida sicca in cibo & potu & cōdimētis, si stomachus & intestina nō prohibeant. Signa eius propter complexionem frigidā, sunt habitudo corporis flegmatica, vrina alba, grossa exiens sine mordicatione omnino, & profundatio somni plurima, & priuatio sitis omnino: Et cura eius est vt si sit adultus, detur de hoc puluere calido styptico, quē ponit Rasis ibidem, 178. glandium siccārum. 3. 4. thuris. 3. 30. myrrhæ. 3. 6. coriandri assati, ciperi, capparis, acori, omniū. añ. 3. 10. terātur omnia simul vt alcohol: dētur ex eo mane & sero. 3. iij. cū vino rub. pōtico, vel vino veteri amaro. Vngatur peritēn & virga cū oleo masticino, vel ruta ceo: postq̄ in eis dissoluta fuerint euforb. cast. & myrr. Emplastrei cū herb. calid. sic. sicut sunt mēta, mētaf. salui, ruta, absynth. serpil. postq̄ cocta fuerint, & pīstata, & incorpata cū mast. & bdell. dissolutis cū vino vet. ama. vñace. acutis, ad ignē in casola. Cōferūt p̄terea bals. tinar. vñsup. sic. & proprie post purgatiōes flegmatis frequenter si sit cum materia. Dietetur cibis & potibus & condimentis calidis siccis, si epar non contradicat. Signa eius propter mollificationē sunt: quia & rēpore vigiliæ egreditur vrina

Insensibiliter, & fit maxime in senibus et decrepitis. Et cura eius est eadem cum cura stranguis propter mollificationē vesicæ & eius, quæ fit propter debilitatem vesicæ. Signa eius propter potum superfluum sunt narratio infirmi: & quoniam fit solummodo per inebriationē vel crapulam. Et cura eius est cura omnium passionum contingentium a causa primitiua immediate, quam ponit Hippo. vbi dicit: In omni morione corporis &c.

Canones. In cura istius passionis administrare conuenit medicinas locales, non tām cura membrum generans vrinā, quod est epar, & sequens, quod est renes, sed etiam circa expellens, quod est vesica si methodo procedatur. Medicinæ igitur bibitæ sint subtiliter puluerisatæ, & cribellatæ, vt cito ad renes & vesicam peruenire valeant cum virtute: verumtamen sciendum q̄ renes magis alterari possunt p̄ interius, vesica vero per exterius: nisi forte interiora iniiciantur per inferius cum syringa.

Prognosticatio. Istæ passiones si fuerint in pueris, per se rectificatur ex eorum complexione, quando exiccatur, quod fit vsq̄ ad 30. annos ad plus: q̄ si post hoc remāserint, plerūq̄ commoriuntur: vnde Hippo. 3. par apho. Quæcunq̄ vero permanēt pueris, & nō soluantur circa iuuentutem, & feminis: aut circa menstruum eruptionem, veterascere consueverunt. Item ista passio superueniēs in senio, non curatur: quoniā eius causa magis ac magis fortificatur: vnde Hippo. 6. parti, apho. Nefretici & circa vesicam dolentes, laboriose sanantur in senibus.

De apostemate in vesica & collo eius. Cap. VI.

Hoc apostema licet ex natura sui generis possit fieri ex omni genere quatuor humorum: illud tamen

quod fit, vt plurimum est apostema calidum: vt dicit Ras. & proprie de cholera vel sanguine cholerico: quoniam in vesicam penetrare nō potest: nisi humor acutus subtilis: cū sit membrum neruosum & exangue. Et signa eius sunt se. acuta, et dolor vehemēs cū punctura in vesica, & alienatio mentis, & nigredo linguæ, sicut in frenesi: quod totū accidit propter huius membri plurimam sensationem & materiæ caliditatem: & si magnificetur, retinentur stercus & vrina.

Methodus. Cura eius est, vt omnis cura frenesis. Fiat igitur a principio flebotomia diuersiua ex basilica extra in brachio vel manu, & non emplastretr cum frigidis stypticis: sicut fit in percussionibus aliorū apostematū: sed cum frigidis leuibus: quoniam inducetur in vesicam frigiditas vltimata: cum sit membrum ex natura frigidū: & prohiberetur materiæ resolutio. Leniatur ergo peccē & virga tota vsq̄ ad dies quatuor a principio, cum oleo viol. vel ros. vel de nenuph. vel de papauere, & emplastretr cum malua, violaria, & sicla coctis, & pistatis, & incorporatis cum eisdem ponendo tepidum super locum. Die vero quarta vel circa id fiat flebotomia eradicatiua de saphena pedis sinistri quæ est intus in talo: & tūc leniatur locus cū resolutiuis leuibus sine attractione: sicut est oleum chamomillinum calefi. in vase duplici, vel anethinum: quoniā mitigat dolorem. Emplastretr cum farina se. lini. & se. scenigraci, et se. anethi, et floribus chamomillæ, et melliloti, & althea coctis in aqua, & pistatis & incorporatis cum mucillagine se. altheæ, & butyro recens, sine sale sufficienti: & potest ad di. farina fabarum gratia abstersionis et apertionis pororum, et proprie in processu. Hoc namq̄ emplastrum dolorem mitigat, tumorem & extensionem remollit, & materiam insensibiliter resoluit, si sit

possibile: Et sic regatur per totum statū:
sed in declinatione confortetur cū resolu-
tiuis fortioribus, sicut sunt se. apij & ane-
thi. Nutriatur hora illa ex ordeo vel aue-
na conditis cum lacte amygd. dulcium,
vel cum iuribus carniū alteratis cum
lactu. portula. cucu. cucur. Bibat aquam
decoctionis ordei, & prunorum siccorū.
Si autem non videris profectum ex resol-
utiuis vsq; ad diem 7. vel circa id: imo
tunc feb. & dolor exacuuntur, (quia sa-
nies incipit generari) procede ad matura-
tiua, quā diximus cap. de apostemate in
renibus: & sic procede vsq; ad perfectā
maturationem, & per rupturam & exi-
turam sicut diximus illic. Si vero neq; in
illis videris profectum vsq; ad diem 14.
vel ad plus, imo extunc dolor & fe. mi-
norantur, & apparet tactui tumor cū du-
ritie post commissuram, quā est in-
ter testiculos & anum, & augmentatur
retentio vrinæ & stercoreis: tunc scias qd
subtile ex materia calida exhalauit, &
grossum residuum induratur: quare tunc
confortetur virtus cum carnis bonis
& vino, vt longum morbum valeat to-
lerare: & procede ad molliciem prius per
interius. Detur ergo in auro. 3. i. vel 2. cas-
siaxi. dissolutę cum aqua calida, vel cum
aqua decoct. seminū cōmuniū frigidorū
mundatorum: qm̄ euacuat & molliciat:
Deinde acuat cū seminibus calid. vt est
semen feñ. apij, & capilli veneris. Purget
etiā qñq; cū tamarind. & manna coctis.
& dissolutis cū eis dē. Ista namq; tria far-
maca. s. cassiaxi. māna, et tamarindi, plu-
rimū conferūt in omni duritie, fist. & viol.
ēditā: & emplastreē locus apostematus
si apparet: Et si non apparet: emplastreē
commissura & pecten & virga cū empla-
stro, qd diximus ea. de apacibus renum.
parag. de cura apacis duri. & vngaē sem-
per cū oleis calidis p̄dictis: & cōfert plu-
rimū in molliēdo & resoluēdo materias
duras balneū aquæ dulcis, vel aquæ de-

coc. malux, alchez, caulū recentū, viol.
cucurbi, melonē. & radicum capparīs.

Canores. Idē est & canon aparis renū
& vesicæ: qre videat illic 2c.

Prognosticatio. Apostema in vesica
cū dolore & duritie
in ea & se. continua acuta, malū pronun-
tiat: vt di. Hip. 2. prognost. circa sinē: ma-
gis tamē si sit cū v̄etris strictura: quoniā
apostema magnū significat. Itē fm̄ cum
dē ibidē. Apostema vesicæ, si resoluat,
salubre: si vero confirmet, in saniem con-
uertitur, & cum pus exierit cum vrina,
salubre erit: si vero ad sclerosim processerit,
vel etiā ad saniationē tēdit, & pus nō
exierit, neq; vesica mollescat: neq; se. de-
fecerit: mors in prima periodo aderit in
die septima ad plus: qm̄ hoc apā inter pa-
cutas se. numerat. Idē ibidē: Huius mor-
bi species, s. apostematis in vesica, cū se.
acuta pueris ad plus anno septimo vsq;
15. solet euenire: quod ideo forte cōtingit:
quia nondū mēbra spermatica sunt per-
fecte exiccata, sicut post annū. 15. Quare
materiæ acutæ in ipsa possunt penetrare
& apostemata inducere.

TRACTATUS OCTA- uus sectionis terciæ de passio- nibus virgæ & testiculorū.



Embry generationis in ma-
tulis sunt tria, s. testiculi, &
vasa spermatica, & virga.
Sunt autē vasa spermatica
duæ venæ alba strictæ lōgæ
valde ortæ prope renes, dextra qdē a ve-
na kilis super renes, sinistra vero a vena
mulgēte infra renes, deinde procedētes deor-
sū sup̄ spōdiles dorsī proueniūt ad osche-
um vel bursā testiculorū, vbi resoluūt cir-
ca testiculos, singula circa propriū reuo-
lutionibus intricatis, præter qd earū sub-
stantiam ingrediātur: post hoc ascendēs
inter cutem & os pectinis habēt sua ori-

sicia terminata in viam virgæ, quæ est collum vesicæ, dextra quidem a dextris, sinistra a sinistris: ita vt hæc tres viæ in vnicam apud virgæ radicem transfor-
mētur. Et dicuntur vasa spermatica: quoniam sanguinem nobilissimum superfluentem in nutrimento communi totius corporis in quanto non in quali generatum quidem in epate secundum medicos, in corde vero secundum philosophos, sugunt a locis prædictis, & vehunt ad testiculos, vt eorū caliditate digeratur & eorū albedine dealbetur sicut lac in mamillis, & sic finaliter in sperma conuertatur, propter quod accidit, vt ij qui excesserunt in coitu, sanguinem loco spermatis effundant. Consuevit autem prædictis membris quadruplex genus morborum euenire. Primum est ablatio vbi diminutio coitus. Secundū corruptio coitus, quod nihil aliud intelligitur, quod excessus in desiderio coeundi. Tertiū gonorrhœa, id est emissio spermatis inuoluntaria. Quantum morbus communis omni mēbro, & est apostema. Nam de malicia spermatis dicemus, cū de ablatione coitus, & causis eius loquemur.

De diminutione coitus. Cap. I.



Vt fertur vel diminuitur potentia coeundi quatuor ex causis. Prima est appetitus debilitas. Secunda est erectionis virgæ frigiditas. Tertia spermatis modicitas & frigiditas. Quarta corporis virgæ breuitas, atque gracilitas: de quibus per ordinem differemus.

Methodus. Debilitatur appetitus propter duas causas: prima est corporis totius debilitas, vtpote quia est siccum & extenuatū naturaliter vel decrepitu, vbi fame plurima exhaustum, vel ægritudine chronica consumptū, vel maceratione & labore fatigatum, Cura

eius est, confortatio corporis & impinguitio cum regimine conualescentium: & additio in cibo & potu laudabili ex multum & subito nutritibus: vt sunt pisces recentes petrosi, & proprie assi, & caro pullorum, & hœdorum, agnorum, & porcorum iuuenū, & iura eorum inspissata cū vitellis ouorum condita cum speciebus aromaticis dulcibus: vt sunt cinamomū, cardamomū, liquiritia, crocus, macis, & similia, oua sorbilia, & lac capræ & vacæ calidum ex mamillis, & testiculi galorum, & hircorum, & arietum annaliū, vinum dulce, claretum, & panis de similia, & omnia quæ dicuntur ea, de fe, hœctica, & ea, de impinguatione corporis macerata, deo dante: & confortatio cordis & cerebri cum aromaticis: & additio in somno, otio, & quiete, & dimissio coitus omnino, & laboris vsque ad perfectam reumptionem, debitam vel consuetam. Secunda causa est animi debilitas, vtpote quia passionibus pluribus anxietur: propter quod virga mollescit, & spermatis prurigo quietatur, vt accidit monachis, pœnitentibus & continētibus. Sed cura eius est talium postpositio, & additio in gaudijs & solatijs & tripudijs & præsentia puellarū & verbis dissolutis prouocantibus. Erectionis autem virgæ frigiditas fit propter alterā duarū causarum: vna est ventositatis inflatiuæ paucitas: cuius signum est paucitas erectionis cū priuatione inflationis. & virtute corporis bene se habente. Et cura eius est vsus assiduus ciborum inflantium: quæ tamen inflatio non resoluitur penes digestionem primam: quo nisi cruda inflant solū intestina: vt pira, & poma cruda commissa: sed quorum ventositas est remanens in ventris post digestionem secundam, & conuersionem eorum in sanguinem: vt sunt fabæ, pisa, & cicera, fæcoli, quando comeduntur recentes vel semicocti conditi cum sale & cardamomo, & rapæ coctæ

eum carnibus, vel affæ in igne: & lac recens mixtum cum melle, & pisces sumpti cum cepis crudis: & tractatio virgæ assida cum leui fricatione attrahere non resoluente. Alia est paralyfis, id est frigiditas in nervis virgæ: Cuius signum est, qd sperma est abundans subtile, & facile egrediens, & desiderium constans, sed erectio in semetipsa debilis. Et cura eius est, vltus electuarius: vt sunt diatrion pipe, diagal lan, theodoricum anacardium, & similia, & inunctio virgæ assida cum oleis & vnguentis calidis dictis in ca. de paralyfi. Et assiduatio in cibis & potibus calidis, si epar non contradicat: & exercitatio in ieiunio, & fricatio frequens virgæ, & coitus vsu moderato. Spermatism autem modicitas fit propter siccitatem dominantem super testiculos, vel corpus totum. Et signum eius est paucitas exitus spermatis apud coitum, & eius paucitas & diminutio in quantitate continua & discreta. Et cura eius est humectatio corporis, & impinguatio præd. quoniam omne impinguans corpus est multiplicans spermam & humiditates influentes. Et in hoc conferens est a proprietate medicamentorum tereniabini: vt di. Ras. & lactis vaccini vel ouini (quoniam omnium sunt maxime butyrosa) lib. 2. vini granatorum dulcium. 3. 2. coquantur vsq; ad spissitudinem mellis: dentur ex eo omni die in ieiunio. 3. iij. vel. 4. & post ipsum comedat pisces recentes assos cum cepis crudis, vel elixos conditos cum speciebus aromaticis dulcibus prædictis. Cōfert præterea balneum aquæ dulcis tepidæ, & proprie post cibum per duas horas sine mora in ipso: & multiplicatio somni post ipsum, et otij & quietis. Spermatis vero frigiditas significatur per hoc quod est paucitas pruritus, vel desiderij ad ipsum: & qd egreditur apud coitum sperma plurimum subtile aquosum, sed est tardus coitus post fricationem plurimam. Et cura eius est omne quod cale-

facit ex cibis & medicinis, & assiduatio vsq; coediti, & diatrion pipe, & diasatirion. Et quicquid aggregatur multæ dispositiones in spermate, scilicet frigiditas et siccitas: & signa eius sunt habitudo corporis melancholica, scilicet macra, nigra, gracilis, mollis, & laxæ carnis: paucitas sanguinis & spermatis, & tarditas egressionis eius apud coitum. Et cura eius est aggregatio intentionum duarum simul prædictarum, & assiduatio ciborum grossorum calidorum instatiuorum, si stomachus obediat: sicut cicer, & caro pinguis elixa in aqua cum cepis, & pulvis ex tritico: et cerebella assa coedita cum vsq; pipere, & proprie cerebella autem paruarum syluestrium non aquaticarum: vt sunt passeris, faliani, & perdicis: ac fabæ coctæ cum carne porcorum salita coedita cum pulvere assæ dulcis, vel cinamomo, cardamomi. & pipe: & oia multiplicantia sperma, quæ dicuntur, parag. Emperlica. Virgæ autem breuitas atq; gracilitas coitum diminit & proprie gignitiuum: quoniam sperma non deducitur in concavum matricis, qui est locus ei proprius: quare stans in collo matricis resoluitur, et colligitur a frigido continente, et sic effluit saluati. Et cura eius, si haberi potest aliquo modo, & proprie ante tempus consistetia, & cum adhuc membra crescunt: est vt abluiat virga tota omni die cum aqua calida decocti piperis, vel sinapi, vel thymali fricando, donec coeperit rubere & inflari. Post hoc statim vngatur cum oleis calidis attractiuis: sicut est oleum de costo, vel de spica, & vnguentum marciaton, dialthea, arrogon vel agrippa. Super vncione vero ponat ilico emplastrum factum ex pice calida, liquida, alba, munda & armoniaco mixtis aequaliter & extensum super corium album molle: & fiat hoc in omni die bis vel ter vsq; ad 40. dies vel plus. Et per tale modum impinguatur membrum quodlibet, & corpus totum, de quo dicemus lib. 2. Cōfert præterea assidua tra-

Etatio vsqꝫ cum manibus, cum dilata-
tione & extensione, & frequentatio co-
itus cum fricatione leui perdurante.

Empetica. Electuariũ diasatyriõ cõ-
fortans coitum ex omni cau-
sa diminutum. ℞. satyriõ recentium, q
abscinduntur a patre suo. 3. iij. pascinaci.
corticis eringiorũ. añ. 3. sex radic. rapha-
ni. 3. 2. lufplani. 3. f. terantur & infundan-
tur in aqua cicerum, vel fabarum, quæ
abiecla fuerit prima aqua per diem &
noctem: postea exprimantur, & ponantur
in lacte vaccino, vel ouino quod super-
eminet radicibus duobus digitis: postea
addatur butyri vaccini recentis. 3. iij. &
excoquantur cum facilitate vsqꝫ ad spif-
situdinem. Et si adhuc radices non bene
coctæ sint: fundatur iterum super eas ex
lacte & butyro, vsqꝫ dum perfecte deco-
ctæ sint: postea pistetur hoc totum perfe-
cte, & addatur ei carniũ dactylorum,
pistatorum, nucleatorum, fisticatorum,
pinearum mundatarum. añ. 3. iij. mellis
albi despumati lib. 1. succi ceræ humidæ
3. iij. & omnia bulliantur insil. vsqꝫ ad p-
fectam decoctionem & spissitudinem:
postea deponantur ab igne, & addatur
pul. istarum specierum. ℞. caudæ scinci-
cum renibus & sanguine. 3. 1. sem. erucæ.
zinz. & been alb. & ru. figuæ, auis, sem.
nasturtij, cinamomi, piperis lōgi, se. bau-
tiæ sinapis, sparagi, ana. 3. 2. gallægæ, nu-
cis musc. piperis nigri, se. porri, sem. rap-
ana. 3. 1. cerebellorum passerum. 3. 2. &
dimittantur leniter bulliri continue per-
miscendo cum spatula: In fine vero aro-
matizetur cum. 3. 1. boni muschi distem-
perati cum vino optimo veteri claro. Et
sit dos. eius ab. 3. f. vsqꝫ ad. 3. 1. Et est de-
scriptio Mes. in suo antidoto: parum ab
ea differens propter familiaritatem. Ele-
ctuarium aliud sic fit. ℞. se. bautiæ, se.
rap. ceparũ, sparagi, raphani, erucæ, se.
pinearum mundatarum, cardamomi, pi-
peris, lentium, fisticorum, linguæ auis,

eringiorum, been al. & rub. satyriõ, co-
sti dulcis, zinz. piperis lōgi, nasturtij, añ.
3. f. terantur & cinbellentur, & confician-
tur cum melle: detur cum vino, dulci vel
lacte calido ex mamillis Et si corpus fu-
erit calidũ, diminue ex pipere, & rapha-
no, & nasturtio: & pro eis pone auellanas
& amygdalas dulces mund. & confice
cum zuccaro vel penedijs. Electuarium
aliud forte in vltimo, & datur ante horã
coitus immediate. ℞. scincorum recentũ,
non corruptorum. 3. iij. vel. 4. cubeb. pipe-
ris longi, linguæ auis, satyriõ, ana. 3. 1.
assæ dulcis, 3. f. terantur omnia perfecte,
& misceantur ad ignem cum melle de-
spumato cocto, & totum simul comeda-
tur. Ad idem vnguentum. ℞. olei nardi
ni vel costi. 3. iij. ceræ 3. 1. & f. muschi gra-
na. 8. dissoluatur cerã cum oleo, & in hoc
toto incorporet pul. renũ aliarum post q̃
depositæ fuerint ab igne: vngantur ex eo
renes & spina tota, femur, pectus & vir-
ga. Sed cauendum: ab eo in corpore natu-
raliter calido sicco vel accideraliter, si-
militer & in macie renum, vel diabete,

Canones. Coitum tria constituit: Pri-
mum appetitus excitans, &
hoc est a corde & epate. Secundum ven-
tositas erigens, & hoc est a carne spongi-
osa in virga. Tertium humidum semina-
le perficiens, & hoc est a testiculis & va-
sis spermaticis. Ex quo patet medicũ nõ
oportere negligere cordis & epatis con-
fortationem in coitu procurando.

Prognosticatio. Ablatio similiter &
diminutio potẽtiæ co-
eundi si fuerit ex generatiõe propter ma-
lam complexionem frigidam siccam te-
sticulorum innatam, curam non recipit.
Quoniam deficiẽte domina natura, de-
ficere oportet medicũ ministrũ. Item
ablatio difficilior curatur, quã dimin-
utio. Item ista passio difficillime curatur
in senibus primis & secundis.

De satyriasi, & priapismo, desiderio coeundi. Cap. II.

Satyriasis est erectio virgæ assidua cum desiderio coeundi: priapismus vero est inflatio virgæ continua sine desiderio coeundi vel paucio: sic ut accidit pueris, & quibusdam impotētibz: desiderium vero est, sicut cōmune ad virum que. Et sic patet quomodo istæ tres passionēs differant forma, non tamen subiecto vel efficiente: propter quod ipsarū eadem sunt signa, causa & cura: præterquā q̄ in mulieribus satyriosis cum pruritu forti labiorum vulvæ loco erectiōis.

Methodus. Fiunt autem hæ passiones quatuor ex causis. Prima est sanguis, & spermatis multitudo. Et signa eius sunt, habitudo carnosa & rubicunda cum virtute corporis, & paucitas debilitatis post coitum plurimū & pollutionem, & impregnatio mulierum, cum quibus coit. Et cura eius est, minoratio sanguinis pro posse cum omni re, quæ hoc facit, & corpus extenuari: & sunt, 4. Prima flebotomia basilicæ, vel medicinarū sequentes: secunda medicinarum assiduatio ventrem soluentium: tertia fames & labor in ieiunio: quarta usus ciborum acetosorum, similiter & medicinarū: sicut lētes coctæ in aqua, conditæ cū aceto vel agrestia vel vino granatorū: & sicut potus aquæ frigidæ mixtæ cū aceto, & sumptio syrupi acetosi quacumq; die in aurora: quinta usus ciborum frigidorum actu & virtute: sicut sunt lactu, portul, comesta cruda cū aceto, vel agrestia cū abstinentia calidorum: sicut sunt carnes & vinum, vel humidiorū pinguiū: sicut sunt lac, oleum, & butyrū. Sexta assiduatio medicaminū diminuentiū sperma a proprietate, quæ dicemus, parag. Emperica. Post vniuersalia vero veniendū ad localia renes infrigidantia: cuiusmodi sunt lenimenta super alkatim, & virgam, &

testiculos ex oleo rosæ mixto cum camphora, & cera: vel ex populeo mixto cū aceto & modico argenti viui. Et si patiens dormiit vel supinus iacuerit super ea magis cōferunt: sicut sunt emplastrā ex rosæ, solatū, plantagine, semperuina, myrtillis, virga pastoris, lentibus ex corticatis coctis in aqua & aceto, pistatis, & incorporatis cū oleo rosæ, vel oleo myrtino, vel nenuph. Et sicut est epithyma ex camphora, sandalis, & rosæ, puluerisatis & infusis in aqua rosæ, & aceto. Et ad hoc multum confert, ut ager cōtinue deferat super renes laminam plumbeam subtilem spissim perforatam. Secunda res est spermatis prurigo vehementer ex acuitate & caliditate ipsius proueniens. Et signa eius sunt, fortitudo in desiderio coitus ultra modum, sed debilitas post ipsum plus alijs: & egreditur apud ipsum sperma modicum & velociter cum ardore in capite virgæ, quem forte sequitur ardor in vrina proxima: & si frequenter, inducet exiccationem & marasmū corporis torius. Et cura eius ē infrigidatio & humectatio pro posse cū cibis & medicinis, sicut est balneū aquæ tepidæ dulcis, vel aquæ decoc. malvæ, lactuicæ, populi, salicis, violæ, & proprie post potū lactis acetosi, de quo extractū sit butyrū per horas, 2. & cibus factus ex lactucis, portulacis, cucur, cucu, melon, conditis cū lacte acetoso, vel cum butyro & modico aceti: & huiusmodi sunt carnes agnorum vel procel. & chædore coctæ & alteratæ cū herbis eisdem. Similiter & gelatīa facta ex extremitatibus animalium coctis & conditis cum vino pontico & modico aceti. Potus eius sit vinū alb. vel ponticum rub. sed si corpus sit inanitum, bibat vinū dulce rub. & vræ restauratiuis dictis ca. de phthisi, & ca. de macie renum. Et si apparere ceperint signa se, hæc tica, fiant oīa q̄ dicuntur suo ca. 2. lib. Vtatur præterea assidue electu

ario diminuenſe ſperma a qualitate frigida, quod dicemus infra. parag. Emperica. Et ſiã oia localia ſuperius dicta ca. de diabete. Tertia res ẽ multitudo humi ditatũ pparatarum, vt ſi. ex eis ſperma. Et ſigna eius ſunt: quoniã paſſ debilitat in coitu plurimo, & exuberatio ſperma tis apud ipſum, ſimiliter & ſubtilitas eius, vt albedo coloris, & habitudo corporis flegmatica, & multitudo inflationis virgæ ſine deſiderio plurimo acuto. Et cura eius eſt exiccatio talium cum medicinis pro poſſe, & cũ cibis: ſicut ſunt my ſium, & pannicum, & lentes elixæ cum origano, calamento, ruta, meſtra, cymi no, allijs: & carnes aſſæ conditæ cum ſi naþ. vel pipere: Et ſicut eſt vinũ amarũ, purum: ſitum & ſamentum toleret: Sudet & laboret in ieiunio: vratur diatriopipereũ, diaciminũ, & omnibus calidis ſiccis, et proprie poſt purgationes factas cũ pillu lis cochijs, vel cum benediãta laxatiua: quoniã ante purgationem deſiderium augumentarent materias colligando, & calorem confortando. Vrgantur ho ra illa virga, renes, & teſticulti cũ vngu entis marciaton, atrogon ad ignem vel ſolem calidum vehementer: & ſiant oia quæ dicentur ca. de gonorrhœa. Quarta res eſt, multitudo ventofitatũ erigentũ virgæ. Et ſigna eius parẽt ex raliõe pa tientis. Et ſi ſit cum caliditate, apparet rubedo coloris corporis, & deſideriũ mo dicum ad coitum. Si vero ſit cum frigi ditate, apparet albedo corporis, & habi tudo ſqualida & deſiderium modicum ad coitum: licet multum coitum valeat perficere, præter quod ab ipſo noceatur. Et cura eius eſt ſi ſit a cauſa calida, flebo tomia baſilicæ, frequens inunctio renũ & virgæ cũ vnguents frigidis ſupradi ctis, & aſſiduatũ electuariorum dimnu entium ſperma propter frigiditatem, q̃ dicentur. parag. Emperica. Si vero ſit a cauſa frigida, purgetur cũ pill. cochijs: et

aſſiduet poſt hoc electuaria diminuentia ſperma propter caliditatẽ & proprietatem. Valet etiã ad hoc, omne q̃d vteroſi tates carminat: ſicut eſt diacim, diatrion pipet, & electuariũ, quod ſic ſit. 78. car ui, cymini, orig. meũ, ſerpiſ. ruta, calam; pulleg. ſalutæ. poliũ. añ. 3. 1. zz. cinamo. pipet. cardam. añ. 3. 2. ameos. amo. añ. 3. 1. zucc. lib. 6. ſiat electuariũ durũ ſicut di acimi. de q̃ ſumat in aurora ad modũ ca ſtanæ oĩũ die cũ vino al. vere. amaro. Abſtineat vterq; eorũ a cibis viſcoſis, ṽe toſis: ſicut ſunt rapæ, cepæ, eruca, & ſimi lia, & a multiplicatibus ſpma: ſicut ſunt lac recẽs, & piſces recẽtes & proprie ſcin ch: & a prouocantibus deſideriũ a propri etate, ſicut ſunt ſaty. ering. bauc. & ſiſa.

Emperica. Diminuentia coitũ, & faci entia ſeruare caſtitatẽ ſunt duorũ generũ: q̃dã em hoc faciũt a pro prietate, & q̃dã q̃litate: Et quæ a qualita te, ſunt duorũ modorũ, aut a frigiditate cõgelare & mordificare, ſicut ſunt lactu cæ, portul. acetiũ, agreſta, nix, opiũ, argẽ tũ viuũ, papau. & ſimilia: Aut a qualita re exiccãre & cõſumẽte: cuiuſmodi ſunt pip. ſinaþ. alliũ, apiũ, ſe. vrticæ, & ſimi lia: & oia diuretica calida. Quæ vero a proprietate, licet & hæc q̃litate plurima participant, propter q̃d & oĩa ſunt for tiſſima: ſicut agnus caſtus, & folia, & ra dix, & ſe. eius, ſimiliter & coriãdrũ, ruta, orig. & ſmaragd. Verũtamen operantia a caliditate, in ſene vel flegmatico, q̃nq; addantur in deſideriũ adaquando complexionẽ. Operantia vero a frigidi tate ſimiliter & proprietate, cõferũt oĩi quaq; præter quod operantia a frigiditate ſunt principijs vitæ plurimũ contraria: quare ipſorũ vſus modoretur: ne forte ad paralyſim, vel apoplexiã p̃ducant, vel hydropiſim pernicioſam vñecticã ſene ctũtis. Electuariũ frigidum ad hoc ſic ſit 78. ſe. lactu. ſe. portul. ſem. papaueris. ana. 35. pſyllj, ſeminis coriandri, ſucci

lentium excoctatarum. añ. 3. 2. balaust.
 nenuphar. añ. 3. 1. camphor. 3. 4. zuccari,
 quod suffecerit, vel dimisso zuccaro, re-
 rantur omnia, & conficiantur trochisci
 cum succo acetosæ, vel lactis, vel aqua
 rosæ, & detur vnus ex eis omni die in au-
 rora. per. 4. vel 6. dies cū syrupo rosæ. vel
 violæ. & aqua frigida. Electuarium cali-
 dum ad hoc sic fit. ʒss. origani, rutæ, pul-
 legij, serpilli, mentæ, calamenti. añ. 3. 4.
 carui, cymini, baccharum lauri, piperis lō
 gi & nigri. añ. 3. 2. ciperi, capparis, ame-
 os, cinamo. añ. 3. 1. liquiritiæ. 3. f. melilo.
 qd sufficit. Electuarium operas a proprie-
 tate, sic fit. ʒss. se. agni casti. 3. 4. foliorū
 mentastri, succi rutæ, cymini, balaustia-
 rum, ciperi. añ. 3. 1. smaragd. 3. 1. zuccari
 quod sufficit: detur ex eo in ieiunio cum
 vino albo aquoso. Item ad idem conse-
 runt trochis. de agno casto dicti capitulo
 de oppilatione splenis.

Canones. Cauendum in cura istarum
 passionū ab inductione pas-
 sionis maioris. verbū grā: vt si sit a cau-
 sa calida, ne stomachum & cor mortifi-
 cemur: Signa vero a frigida, ne par
 & splenē inflammemus. Si vero ab hu-
 mida, ne corpus & membra exiccemus.
 Cum igitur aliquid taliū apparuerit, ili-
 co cessandū est ab exhibitis p̄ iterius, sed
 intendendū eis, quæ p̄ exterius applicāt
 vt sunt emplastra & vnguenta. Item co-
 uenit, vt tales medicinae sint subtilis sub-
 stantiæ: quoniā oportet, vt sit currens pe-
 netratiuū quod ad mēbrū distās & pro-
 fund. debet procedere. Si igit̄ sint liquo-
 res, colētur: si pulueres, cribellentur: si ele-
 ctuaria vel trochis. vltime terātur: si em-
 plastra, pistenē donec ad formā axūgiæ
 educāt: si epithymata vʒ vnguenta, ad-
 dat̄ aliqd ex aceto acutis, penetratiuū.

Prognosticatio. Coitus & eius deside-
 riū si superfluāt, & du-
 rent, corpus totū, & proprie renes, & cor,
 & cerebrum, & par igniunt & exiccāt:

& sic hecticā inducunt. Item dicit Ralis
 in diuisionibus, quod satyrnalis, si p̄seue-
 ret: est nocens & pducens ad spasmū vri-
 nalē, & agritudines afflictuas, & proprie
 spasmū de inanitione, & sic. ephimeram,
 quæ demū in hecticā trāformat̄ cū igni-
 tione vltimata in spiritibus, humoribus
 & mēbris. Coitus præterea est ex rebus
 maxime nocētibus quinque particulis no-
 stri corporis, sub quibuscūq; malis iuis di-
 spositionibus existētibus. Primo qd̄ ce-
 rebro humido: quoniā catanū multipli-
 cat eius humiditates colliquādo: et sic ex-
 citatem, vel phthisim vel epilepsiā, vel
 vertiginē inducit: Secundo vero cordi sic
 co: quoniā consumptionē & hecticā in-
 ducit: Tercio epari calido: quoniā igniti-
 onem & ardorē cū oppilatione causat,
 & demū se. putridas, & apostemata itri
 seca p̄niciosa, & proprie si fiat sup̄ cibū.
 Quarto stomacho frigido, vel laxo: quo-
 niam robur eius dissoluit, digestionē im-
 pedit, cibū fluctuare facit suo motu con-
 quassando, & calorē & spiritus a centro
 corporis ad circūferentiam distrahendo.
 Quinto vero renibus macris, vel sangui-
 nē mittentibus p̄ vrinam: quoniā ipsos
 magis emacerat, & ipsos nervos dila-
 tat. Cū igitur post coitū superfluū aliqd
 taliū apparere corperit: succutrat̄ cū pro-
 prijs remedijs suo loco dictis. Itē coitus a
 principio qd̄ corpus calefacit igniēdo
 spiritus & agitando: in processu vero &
 quando superfluit, infrigidat resoluendo
 & immacerat consumendo. Qui ergo de-
 bilitari consueuerit post coitum, vtatur
 cibis & electuarijs aromaticis calidis an-
 te ipsum. Linitionibus vero frigidis post
 ipsum, vt est aspersio faciei & extremorū
 cū aq̄ rosæ. pura: vʒ in aqua dissoluta
 sint ro. & sand. tā rub. q̄ al. Et nutriat̄ ci-
 bis multū & subito nutrientibus: vt sunt
 pisces recentes, & iura carniū laudabi-
 lium inspissata cum vitellis eorum. Et
 sicut est vinū dulce purum, vel claretū,

Tractatus octauus

De gonorrhœa & pollutione nocturna. Cap. III.

Gonorrhœa est emissio spermatis inuolūtaria, qualis est pollutio nocturna: Et sit quādoq; cum erectione virgæ, & quādoq; sine: vt dicit Gal. 6. de accideri, vltimo ca. Fit autem propter debilitatem virtutis retentiuæ vasorum spermaticorum & testiculorum. Hæc autem debilitas, aut sit propter acuitatem spermatis plurimam excitantis virtutem expulsiuam: & signa eius, sunt signa satyriasis propter acuitatem spermatis: aut propter multitudinē spermatis & humiditatum præparatarum, vt ex eis fiat sperma. Et signa eius, sunt signa satyriasis propter multitudinē humiditatu: & hæc oīa diximus proxio ca.

Methodus. Cura gonorrhœæ de causa calida est, vt primosiāt oīa prædicta in cura satyriasis, propter acuitatem spermatis: flebotometur præterea basilica dextra frequenter, si virtus & ætas & habitudo consenserint: quoniam materias diuertit, & calorē reprimi potenter. In fine vero confortetur retentiua cum emplastro styptico frigido: quod sit ex ros. nenupha. myrtillis, plantagine, virga pastoris, lentibus excorticatis, vel bis coctis prima aqua reiecta: postq̃ hæc omnia vel quædam eorum cocta fuerint in aqua pluuiali & modico aceti, deinde expressa, pistata, & incorporata cū oleo. v. oleo myrti, et actu calid, posita sup virgā & testiculos. Idem facit emplastrū ex coroneis, mespil. sorb. piris immaturis, balaustris, cupul. gladium, & similibus: et balneum aque decoctionis eorundem: vel vnguentum ex oleis prædictis confectum a Idito modico aceti, & aqua nenuphar. & cera sufficenti. Et cum eisdē vngantur & emplastrentur etiam renes, & spina tora. Confert præterea, vt patiens potest omni hora super renes laminā

subtilem plumbeam cribratim perforatam. Cura gonorrhœæ propter multitudinem spermatis & humiditatum est, vt a principio fiant omnia dicta in cura satyriasis propter multitudinem humiditatum præparatarum, vt fiat sperma. Et si corpus sit carnosum, rubicundum: flebotometur basilica dextra frequenter in brachio vel in pede: quoniam euacuat materias & alleuiat vasa. Si vero vasa fuerit habitudo alba flegmatica squalida, purgationibus erit insistentum, & digestionibus flegmatis aquosi. In fine vero retentiua confortetur cum emplastris & vnguētis stypticis prædictis, additis quibuldam, verbi gratia: In emplastro adde calamentum, vinum verus amarum: In vnguēto vero addatur aromaticum, mastix, olibanum, bdellium, postq̃ dissoluta fuerint ad ignē in casola cum vino rubeo ponrico. Assiduet præterea vterque eorum electuaria diminuentia sperma prior quidem ea, quę diminuent sperma a qualitate frigida: secūsus vero ea, quę a qualitate vel proprietate, quę diximus ca. de satyriasi. para. Emperica. Caueat iacere supinus in somno: quoniam grauaret renes & eorum excitat expulsiuam.

Prognosticatio. Gonorrhœa si superfluat et perduret: perducit ad hecticā senectutis: quoniam cum spermate plurimi spiritus resoluuntur, et corpus in frigidatur. Item gonorrhœa in corpore habente stomachum frigidum, vel epar calidum mortale: quoniam addit in frigiditate & laxitate, neque remedia ministrari possunt per interius: cū ex eis stomachi malitia vltimetur.

De apostematibus virgæ & testiculorum. Ca. III.

Generatur in eis apostema sicut in membris alijs ex omni genere quatuor humorum, vt plurimum tamen ex humoribus calidis: quoniam &

hæc membra caliditate plurima participant innata adeo, vt per eorum caliditatem complexionalem perficiatur spiritus gignitiuus. Et cōtra, qui testiculis priuatur, vel eorum virtute, frigidi fiunt & flegmatici: quæ admodum accidit cunctis & impotētibz per naturam. Signa apostematis calidi in eis, sunt rubor virgæ & testiculorum cum tumore & ardore forti, & se. continua: & si sit ex cho. ardor, dolor, & calor fortificatur super ruborem & tumorem: Si vero ex san. totū fiet econuerso. Signa apostematis frigidi, sunt tumor sine rubore & dolore plurimo. Et si sit ex flegmate, appebit tumor mollis albus: si ex melæcho. durus, niger.

Methodus. Hoc apostema, quoniam exterioribus sit in mēbris cura non indiget, nisi methodo communī, quod est, vt præmissa euacuatiōe vniuersali cum flebotomia in causa calida, vel farmacia in causa frigida, admīstrentur in principio emplāstra & vnguenta repercussiuā. In augmento vero addatur aliquid ex resolutiuis. In statu vero multiplicentur resolutiua super repercussiuā: in declinatione vero pura capiātur, resolutiua. Et hæc oīa nota sunt aliqd sciēti in medicina. Verum si tibi necesse fuerit ad capitulū apostematis in stoma. cho. erit recurrendum, vbi materialia huiusmodi diximus: similiter & canones in cura cuiuscūq; apostematis congruētes.

Emperica. Emplastrum resoluens leniter omnē inflammationem virgæ vel testiculorū, & proprie post flebotomiā basilicæ in brachio primo, et post hoc in pede, sic fit. ℞. steroris colubini, v℞ vaccini, florū chamomillę, rutę recentis, se. lini, se. anethi, aī. p. i. fermenti, p. f. salis nitri, vel saponis. quartā par. vnus: bulliant in aqua modica, vel oleo ro. & pistentur. & cum lana succida applicent. Resoluit enim tumorem in omni membro exteriori, Item ad ardorem & dolo-

lorem loci, valet vnguentum factum ex populeon et dialthea, aī. part. æqualibz, mixtis. Valet etiā linimētū ex oleo ro. et oleo chamomil. aī. par. æquales. Itē ad vlcus & corrosiōem in virga, vel testicul. valet oleum vitellorum ouorū, quod sic fit. ℞. oua 12. gallinarum recentia, elixentur in aqua, donec indurentur, & deinde vitella ouorum fricentur in sarragine, donec quasi adurantur: & tunc succus qui est in eis, exprimatur cum spaurula, vel distilletur in alembico, sicut aqua ros. quod est melius, oleum istud carnem creat, vlcera consolidat, ardorem & dolo-rem reprimit: corrosiōē prohibet cū virtute. Idem facit vnguētum album & citrinum Nicolai.

Canones. Nutriatur patiēs cibis & potibus ventrem leniētibus, & materias a vijs vrinæ diuertētibus: sicut sunt aqua ordeī, aqua prunorum, & syrūp. viol. & omnia dicta in ca. de stypticitate vētris, parag. de empericis: quoniam diuretica & vrinatiua dolorē & apostema augmētarent, nisi forte in declinatiōe perfecta.

Prognosticatio. Hoc apostema facilis est curationis, si nō eretur super ægro, & maxime si terminetur per resoluētiōem, si vero per sanicem, malum: si per sclerosim, magis malum.

TRACTATVS NONVS qui est de passionibus matricis.



Membra generationis in foemellis sunt tria, quemadmodum in masculis: licet non æque principaliter, vel necessario. Primum quidē matricis cum collo eius, & duobus orificiis, scilicet orificio concauitatis matricis, qd est sicut os tunicæ, ad quod virga virilis hora coitus elongat: & orificio colli eius,

Tractatus nonus

qd vulua dicitur. Et hoc quidē membrū est in generatione necessarium: quemadmodū testiculi in viro: cum proprio agenti correspondeat suum propriū patiēs, & locus locato: vt declaratum est in superiori sciētia. Secundum vero membrū est duo testiculi fabricari intra corpus foemellae super conuexum matricis, vnus a dextris, alter a sinistris: vt patet in anatomiā: sed sunt minores & frigidiōres, q̄ in viro. Tertiū est, duo vasa spermatica: quorū vnū oritur a vena kilī prope renē dextrū, & terminat ad testiculū sinistrū. Aliud vero oritur a vena mulgēte prope renē sinistrum, et terminat ad dextrū. Et testiculi qdē atq; vasa spermatica in foemella nō sunt necessaria in gñatione, nec; sicut causa agens, nec; sicut causa patiēs: vt pulchre probat Auer. 2. collig. ca. de iuuantēis mēbroz gñationis in foemellis: cū etiā inuentae sint mulieres impregnatae sine delectatione propria, et nō delectantē nisi ex effusōe spermatis proprii ad os matricis: Sed sunt cōferētia, & vilia in gñatione: qm̄ hoc sperma vias colli matricis lenificat, & matricis cōcauitatē auidā reddit, ex qbus fit melior & perfectior spermatis virilis attractio, & eius super ipsū corrugatio cōpleta: vt nec pūctus acus posset os matricis ingredi post horam conceptionis: quemadmodum & salua famelici subseruit inglutiōi cibi, prater q̄ fit pars nutrimenti. Et si qua mulier impregnata superimpregnetur: hoc tamen fit per oris predicti apertionem ex delectatione, quam sentit in coitu: & eius de nouo perfectam restrictionem facit. Et hoc est de his, quae raro contingunt: quoniam vt plurimum mulier fit polygena per spermatis vnus distributionem per cellulas matricis diuersas: per partum vero per spermatum diuersorum suctionem. Est autem matrix membrum densum, neruosum, rugas habens plurimas in eius concauo & con-

uexo: quemadmodum si quis imaginē fungum vel spōgiam sub figura vesicae vel vitri vrinālis, & est habens duo cornua. i. duas pelliculas pyramidales neruolas: quarum vna basim habet a conuexo matricis dextro, & conum affixū inguini sinistro. Alia vero habet basim a conuexo matricis sinistro: quibus anchis & dorso alligatur: ne tempore impregnationis mole foetus oppressa decidat, & turpem figuram faciat: qualem habent qui patiuntur herniam vel rupuram. Locus vero situationis eius, est directe super spōdiles dorli & caudā, scilicet ab vmbilico infra vsque ad os pectinis: ita vt vena kilis magna descendens equitet spondiles, & arteria adorti magna descendens equitet venam kilis, & longaeon equitet arteriam aorti magnam, et matrix equitet lōgaonem, & vesica matricem & collum eius: quoniam matrix est altio locata. Et ex hoc scire potes causam, propter quam in passionibus matricis retinētur sterus & vrina: quare sentitur dolor in dorso circa renes, & in ventre circa lumen, & a latere vtroq; circa inguina. Consueuerūt igitur mēbris praedictis 11. superuenire genera passionum. Prima est fluxus menstruorū superfluous. Secunda restrictio menstruorum: Tertia mala dispositio matricis ad coitū & impregnationem: Quarta mala dispositio matricis ad partum: propter quā sequitur abortus post conceptionem, vel prohibitio conceptionis a principio: Quinta difficileas in pariēdo: Sexta exitus matricis vel vmbilici post partū: Septima desiderium ad cognoscendū impregnationē & foetus sexum: Octaua mola & inflatio matricis: Nona praefocatio vel suffocatio matricis: Decima apostema: Vndecima vlcera & rhagadix in ea.

¶ De exuberantia fluxus mēstruorum. Cap. I.



Luxus mēstruorum superfluit propter aliquam decē caulorum: vt colligitur ex dictis Gale. 6. de accidenti. vltimo cap. Prima est sanguinis multitudo in corpore toto redundare faciens venas in matrice. Secunda est multitudo cholerae in massa sanguinea acuentis ipsam, et ora venarum apertientis, quae ad concauitatē matricis terminantur, & coryledones appellantur. Tertia est multitudo flegmatis subtilis aquosi penetrare faciētis. Quarta est venarum corporis latitudo viam humoribus parulam tribuens. Quinta debilitas virtutis retentivae in matrice, cū mollificatione venarum earundem. Sexta densitas totius corporis: quare ex eo nihil resoluitur, sed aggregat. Septima haemorrhoides in matrice: quemadmodum haemorrhoides in ano. Octaua vlcera & rhagadia in matrice. Nona laesio matricis post difficultatē partus. Decima est causa primitiua, quae est casus & perculsio super ventrē, lumen & spondiles ani.

Methodus. Signa eius propter san. do minium super corpus totum, sunt habitudo carnosā, viuida, rubicunda: & q̄ non debilitatur, neq̄ discoloratur ex ipso: & vrina rub. grossa valde: & antecessio orij & quietis, & vsus ciborum sang. multiplicantium: sicut sunt carnes laudabiles, & vinum rub. dulce. Et cura eius est, vt non restringantur, nisi postq̄ superfluerint, & virtutem deſcere coeperint: quare tūc a principio fiat flebotomia diuersa de basilica dextra in brachio vel manu: vel de basilica sinistra loci eiusdē, prout materia fluere videatur. Post hoc ligetur extrema superio ra vehemēter cum fascia. Similiter & radices mamillarum, & ponantur ventose magnae cum igne sine scarificatione super pectus, eleuatis mamillis & proprie super radices mamillarū cū suctione ve-

hementi. Deinde si, encatisma & balneū ab vmbilico infra ex aqua veri frigoris, vel ex aqua frigida in qua dissoluat puluē boli ar. mirtili, balauſtiarum, corticis granatorum, cupullarum glandium: ro. galanæ, cypressi, plantaginis, acatiae, melsilorum, sorborū, virgæ pastoris, cymarū rubi: postq̄ hæc omnia, vel quædā fuerint in ea bullita & post hoc infrigidata. Vel epithymetur sumē & vulua cū petijs infusis in aqua eadē cū reiteratione ipsarū frequentata. Vel fiat ex eis dē emplastrū coctis in aqua pluuiali, & pistatū, & incorporatum cū aqua ro. & albuminibus ouorū, & modico aceti, et fiat oīa q̄ dicē cap. de empericis. In declinatione vero ligari possunt extrema inferiora, s. coxae et crura, sed non a principio. Nutriatur lentibus, riso, farre, milio, panico, & oībus stypticis, acetosis. Et si virtus fuerit debilis, vtrā carnibus assis pullorū & castrorū alteratis cū sapore ex vino granatorum, vel succo berberis, vel aceto, vel agreſta. Bibat vinum rubeū ponticum lymphatum cum aqua pluuiali, vel dissolutione niuis & glaciē. Signa eius propter multitudinem cho. acutae sunt habitudo macra, citrina cum debilitate virtutis plurimum post fluxum: & est tenuitas san. menstrualis, qñ cadit sup petiā lineā, albā: & forte sentit mulier ardorem in labijs vuluæ: & fit vrina subtilis, citrina intense: & si antecessit vsus piperis vel sinapis & allij & ceparū & porrorū & oīm acuminū, vel exercitium, vel labor: verior erit significatio. Et cura ē eadē cū prædicta, præter q̄ nullatenus flebotometur, sed purgeſ, si fuerit possibile cū electuario de succo ro. vel cum trisera saracenica acuata, & non negligatur alteratio epatis & eius confortatio cum frigidis stypticis, sicut est hoc emplastrum. *℞. sandal. ru. ro. mirtili. balauſtiarum. aū. ʒ. i. masticis. thuris. sang. drac. mummiae,*

Tractatus nonus

dragagari, holi ar. añ. ʒ. f. puluerisuntur, & cribellentur, & conficiantur cum oleo masticino, vel oleo ro. vel myrtino, addito modico aceti. Et si necesse fuerit: in spissetur cum farina ordeī, & ponatur actu calī. super epar. Et sicut est vnguentum factum ex populeon, & oleo ros. Similiter & epithyma ex aqua ro. & aceto, in quibus dissolutus sit pul. ro. sandal. terrea sigillata, san. dra. & similia. Et hoc idem epithyma fiat sup. sumē & intra vuluā, Sumat omni die in aurora & ante coenā de syrupo ros. vel oxyzaccaro cū aqua decoc. sumach, plantaginis, mirtillor, et cicoreæ: vel de syrupo myrtino dicto ca. de fluxu ventris, parag. Emperica, cum aqua decoc. milij sol. Non negligat etiā alteratio splenis, et proprie si materia sit nigra, adusta, cinerola: quare tunc fiant purgationes, & fomentationes splenis dictæ ca. de fluxu vērri. parag. de cura dyssen. propter melancholiā adustā. & ca. de debilitate sple. ca. de eius debilit. propter causam calidam. Et in tali casu vratur cibus viscosis, lenitiuis: sicut sunt pulues ex simila & amylo conditi cum penid. vel zuc. Et sicut sunt extrema porcellor, & vitulorum cocta in aqua pluuiali, vel aqua decoctionis scorix, ferri & alterata cum agresta, vel succo berberis: & sicut sunt cydonia assa, et pira & sumach. Sed abstineat ab aceto posse, nisi forte gratia prouocationis appetitus. Signa eius propter multitudinē flegmatis subtilis, aquosi, et humiditatum preparatarum, vt fiat sang. menstruus, sunt habitudo squalida, flegmatici. alba, vel plūbea, & multitudo mēstruorū plurima sine corporis extenuatione, & subtilitas eius, qd egredit cū colore albo, vl sicut lotura carnis. Et qñq est grossum & viscosum, qd egredit sed raro: & vrina alb. lactea, vel katopos. Et si antecessit otium & quies assidua, & vsus ciborū flegmaticorū cū subtilitate: sicut sunt iura carniū, et olera

omnia, pter citonia, mēspila, sorba & pira: et sicut sunt lac, casei recēs & pisces: verior erit tua significatio. Et cura eius est, vt non restringatur hic fluxus a principio, sed cū superfluxerit, et virtutem deijcit: Tuncgitur ordinetur diæta in contrarium, & subtilietur regimē, & digeratur flegma cum syrupo quem diximus. parag. Emperica. Et purgetur corpus cū pillulis cochijs vñ bened. laxatiua: & vratur post purgationes electuarijs calidis stypticis: sicut est electuarium ducis, & diatrion pipereon, & similia. Et confortetur epar cum emplastris & vnguentis calidis dictis ca. de debilitate epatis, para. de causa frigida: Similiter & stomachus cū suis remedijs dict. ca. de debilitate stomachi. parag. de causa frigida. Bibat vinum vetus, amarum, purum, vsu tamē moderato. Famē & sitim toleret pro posse, & balneetur, & sudet in ieiunio in stuphis, vel aquis tinarum, vel aqua decoctionis absynthij, rutæ, mentæ, calamenti, artemisæ, pullegij, saluiæ, serpyll. mēstrastri, & similitum. In fine vero fiant oīa localia dicta de fluxu mēstruorum propter sanguinem, & quæ dicuntur. parag. Emperica. Signa eius propter amplitudinem venarum, sunt habitudo gracilis cum apparentia, & inflatiōe venarum in manibus & pedibus & facie tota et colore rubicundo: & si fuerit cum hoc priuatio signorum alterius, tunc verior fiet significatio. Et cura eius, est regimē grossum, viscosum ex pasta, & extremitatibus animalium, & caseo, & pluitibus ex farina similæ, & vino rubeo dulci, & pane azymo: si stomachus non cōtradicat: quoniam hoc corpus securum est ab opilatione. Fiar præterea flebotomia diuersiua de basilica in manibus frequenter, & omnia dicta in causa sanguinea vsu tamen moderato: quoniā hoc corpus licet habeat sanguinem plurimum: hoc tamen plus verificatur secundū con

tenens q̄ contentum. Fiant etiam balnea subleuia, resolutiua: sicut est aqua decoctionis florum chamomillæ, melilori, & fursi, cum fricatione leui sine mora in ipso, ita vt sufficiat ad attrahendum, nō ad inanendum. Signa eius propter densitatem corporis totius repellentē omnes materias ad interiora, sunt corpus durū, densum, compactū, musculosum, quādo tangitur manibus medici, licet raro sit hæc causa. Et si sit cum priuatione alterius cuiuscumq̄, & multiplicatione cibi & potus, & ocio & quiete sub ymbro so loco: verior erit tua significatio. Et cura eius est cura fluxus ventris dicta cap. de fluxu ventris, parag. Methodus lienteriz. Signa eius propter hæmorrhoidas sunt, vt dicit Rasis in diuisionibus: quia venit cum periodis alijs a periodis menstruorum, & cū corpus est repletū humoribus. Et cura eius est, vt a principio fiat flebotomia diuersiua prædicta: deinde vtatur trochiscis & electuarijs stypticis, quæ dicuntur, parag. Emperica. Et fiant clysteria & suppositoria intra vuluā, q̄ dicuntur. Et ad hoc etiam conferunt plurimum dicta ca. de hæmorrhoidibus peritorum, si pro ano vuluam capiamus. Signa eius propter vlcera & rhagadias in matrice, similiter & curam suo capite dicemus. Signa eius propter debilitatem virtutis retentiuæ, in matrice, & mollificationem venarū eius, sunt assidua vuluæ lubricitas cum sterilitate: Et si conceperit: paritur abortiū, & omnia signa fluxus propter multitudinem flegmatis aquosi. Et cura eius est cura fluxus menstruorum propter multitudinē flegmatis: quoniam hæc cura non differt ab alia, nisi quia in ista supponitur dominari flegma in matrice sola, in illa vero super corporis. Signa eius propter lationem matricis post difficultatem partus, sunt antecessio partus cum hæmorrhoidis sanguinis, plurima, & laceratione vuluæ, &

dolore vehementi, postq̄ menstrua non restringuntur: quoniā rupturā venæ in matrice significat. Et cura eius est, duplex: vna quidē ad ingrossationē sanguinis, vt in cholerica loquebamur. Alia ad consolidationē partis solutæ: & hæc colligitur ex ca. de vlcerib. & rhagad. in matrice: & ex ca. de hernia & ruptura suphac: & ex ca. de fluxu vētris, parag. de cura dynteriz propter corrosionē intestinorum si ex clysteribus pessaria formetur. Signa eius propter casum & percussione patēt ex relatione patiētis. Cura eius est sex res: Prima est diuersio sanguinis, a particula læsa, quod fit cum flebotomia statim a principio facta ex basilica brachij vel manus: Secunda repercurssio & confortatio eius, ne apostemetur: quod fit cū emplastro ex ros. plantagine, semina, solatro & similibus coctis in aqua, & incorporatis cū oleo ros. vel myrtino, & cum epithymate facto ex aqua ros. & aqua plantaginis, in quibus dissolutus sit pul. boli ar. sang. drac. terræ sigillatæ, & similitum. Tertia mitigatio doloris cum emplastro anodino: quod fit, si superioribus addamus flores chamomillæ, melilori, se. lini, se. fenigræci, & similia. Quarta inspissatio sanguinis, per interiorius: quod fit cū trochis. de karabe, quæ iam dicuntur, & syrupo ros. vel myrtino, vel vino citoniorum. Quinta restrictio fluxus: quod fit per emplastra & suppositoria, quæ iam dicuntur. Sexta consolidatio vulneris: si quod accidit ex casu & percussione, quod fit cum licinijs incarnatiuis, quæ dicuntur ca. de vlceribus & rhagadijs in matrice.

Emperica. Huius passionis cura, quæ admodū & cuiuscūq̄ alterius, duabus perficitur intentionibus, scilicet intentione cōmuni, & propria. Intentio cōmunis cōsistit in digestionibus & purgationibus corporis. Syrupus autem bonus digerens omnes materias superfluas in corpore causantes talē fluxum,

& cum hoc matricem à proprietate respiciens, sic fit. *℞.* calamenti, pullegij, si leris, maioranæ, balsamitæ fumiteræ, añ. M. i. rof. endiuix, plantag. cicoreæ, viol. añ. m. f. granorum fol. petro. macedonici, granorum iuniperi, añ. 3. i. se. diu reticorum calidorum. 3. f. sumach myrtif. acatig. ana 3. 2. malticis, dragac. ana. 3. i. xilolo. sand. xilob. cardamomi. añ. 3. iij. zinz. cinamomi. añ. 3. 4. mellis & zuccari, añ. 3. 8. aquæ puræ fontis lib. iij. bulliantur simul, donec tertia pars consumatur: tunc coletur & syrupifetur cum melle & zuccaro: dentur ex eo omni die in aurora. 3. iij. vel. 4. per se vel cū aqua decoc. plantaginis. Et si laxatiuū facere volueris: adde hermodactyl. 3. f. sene. tur bich. agarici, añ. 3. i. myrobalanor. citri nor. & emblicorū. añ. 3. 2. in decoc. Item ad hoc conferens est syrupus myrtinus, quē diximus ca. de fluxu ventris. parag. Emperica in causa calida: vel syrupus de menta ibidem positus in causa frigida, si dentur cum suis proprijs directiuis: sicut est aqua decoc. saxifragæ, miliij, fol. granorū iuniperi, & petro. macedonici, apij & omnium diureticorum. Purgatio vero melior in hoc casu est ea, quæ fit ex myrobalanis: vt quidam dicunt, quam diximus ca. de debilitate digestionis stomachi. parag. canos: quoniam soluēdo constringit fluxum. Sed licet hoc verum sit in fluxu ventris: nō tamen hoc approbamus in fluxu menstruorū vel hamorrhoidarum propter duas causas. Prima, quia stringentia ventrē augmentāt causam fluxuum aliorū. Secunda, quia virtus medicinæ soluentis comprimēdo nō transcendit meseraicas, vt dicunt authores: sicut neq; est earum virtus, quæ solunt leniendo, vel lubricum faciēdo. Intentio vero propria localibus remedijs integratur: quorum quædam sumuntur per superius, vt electuaria, & trochisci, & syrupi styptici: quædam per inferius,

vt clysteria, suppositoria & suffumigia, quædam per exterius, vt balnea & emplastra, quæ omnia nūc dicemus. Electuarium optimum ad hoc est athanasia, si ex ea detur bis omni die. 3. f. in aurora. et ante cœnam cum succo plantaginis, vel solatri dissoluta, & cum ea miscetur aq; pluuiialis, vel aqua decoctionis myrtif. vel vinū rubeum ponticum in causa frigida. Trochisci optimi ad hoc sunt trochisci de karabe, vel de bolo armenico: quorum in superioribus diuersas diximus descriptiones, scilicet in ca. de phthisi. & ca. de spūto sanguinis, quæ est melior descriptionū. Syrupus optimus ad hoc sic fit. *℞.* succi plantaginis. succi consolid. maioris, succi myrti. añ. 3. 4. acatiz, sumach, boli armeni. lapidis ematitidis. añ. 3. 2. hypocistid. 3. i. & f. se. rof. rub. 3. i. & 3. i. pulueriscentur omnia, & fiat syrupus cum lib. i. zuccari. Et si feceris aquosum detur per se: Si vero spissum, detur actu frigidum cum aqua plantaginis. Et valet plurimū in dysenteria, & mixtu sang. Clystere ad hoc optimum sic fit. *℞.* plantaginis, cymarum rubi, cymarū absynthij corticis quereus, & piri, radicum canæ siccatum. añ. manipulum vnum, balaustiarum, cupularum glandium, risti, acatiz, hypocistid. añ. 3. f. bulliantur oīa in aqua pluuiali, & vino rub. pōtici, pōtea colentur, & addantur zuccari rof. 3. 2. & iterum bulliantur aliquantulum, & colentur, & inijciatur actu frigidum in vuluam & matricem per pessariū: quod est instrumentum simile clysteri, sed est maius & longius, quasi vergens in similitudinem virgæ virilis. Suppositorium ad idem sic fit. *℞.* karabe, gummi arab. assati. lacæ, balaustiz, hypocistid. licij. añ. 3. 4. thuris añ. 2. opij. 3. iij. terātur, & cribellentur omnia, & fiant suppositoria subtilita cum musciclagine psyllij, & deferantur in vulua omni hora: vel dissoluantur omnia cum aqua decoctionis

sumach, donec fiat in forma mellis currentis: & supponantur cum lana, vel cocto tincto in eis. Et ad hoc faciunt trochisci de karabe dissoluti in eadem aqua. Suffumigium fit ex mastice, thure, dragaganto, gummi arabico, venice, storaee sicca, & galbano factis in forma fabarum cum laudano, vel terebentina, vel pice nauali, quæ posita super carbones reddunt fumum in vulua ascendentem, corpore circum circa operto, sero cum itur dormitum. Et quidam dicunt, quod matris sursum rapitur, & constringitur ex fumo fortido: sicut est fumus ex vngulis equorum, vel caprarum proveniens: quæ admodum descendit ex aromaticis, & dilatur. Balnea sunt ex aqua decoctionis balaustiarum, absinthii, plantaginis, cymarum vitis & rubi, prunorum immaturorum, & pistorum, & sorborum & mespilorum, & malorum macianorum, virgæ pastoris, solatri, rosæ, acetosæ, cicoreæ, coriandri, lentium, & similia. & proprie ex aqua pluuiali. Fomentationes fiunt ex peritis lineis mollibus infusis in aqua eadem positis actu frigidis super sumum ventris, & infra vuluam, vel infusis in aqua sumach, & mastice, postquam in ea dissoluti fuerint duo trochisci de karabe sæpe dicti. Emplastrum sic fit. ℞. boli armenici, myrtilli, rosæ, rubi, balaustiarum, acatiz. ana. vncias quatuor: terantur per septe, & incorporentur cum aqua rosa. & albuminibus ouorum, & modico acetii, & frigidum super vuluam ponatur. Ceterum ad idem sic fit: quod cum est postum super vuluam, illico stringit exitum sanguinis in ipso. ℞. mastice vnciam vnam & semi boli armenici, sanguinis draconis, ana. drachmas quatuor: glutinis, piscium, vel glutinis albotim vnciam semis acatiz, hypocistid. añ. drachmas duas: olei rosæ, olei myrtini. añ. quod sufficit, ceræ albæ tantundem: incorporentur omnia simul ad ignem in casola,

& extendantur super corium album, molle, & ponatur super lumen & vuluam per lineo mediante frigidum actu: Et in causa calida potest addi opij. 3. i. quæ re percutit, & mitigat, & restringit. Licinium ad idem sic fit. ℞. alcannæ, boli armenici, terræ sigillatæ, sanguinis draconis, lapidis ematitici. añ. 3. 2. terantur omnia subtiliter, & cum albuminibus ouorum incorporentur in formam mellis currentis, aut cum aqua decoctionis balaustiarum, & sumach, & psidiz, aut cum succo sanguinarum, aut plantaginis: & licinium ex cocto, vel lana intrinse in ipso, & digere cum digito intra vuluam. Et potest addi alumen lamenum in causa frigida. Ventosatio præterea ad hoc utilis est, quæ fit super radices mamillarum versus inferius mamillis eleuatis: quoniam inde procedit vena lactea tendens ad matricem, vbi ibi sanguinem attrahat, & materiam lactis ad mamillas traducat. Vnde Hipp. 5. partic. aphorif. Mulieri habenti menstrua, &c. & si, hoc sine scarificatione: et si non sufficit, ponat ventosa super epas & splenem cum igne vel suctione vehementi: Et si nondum sufficit, fiat scarificatio non profunda. Item dicit Rasis in diuisionibus: quod communis cura omnis fluxus menstruum tripliciter ordinata perficitur, scilicet vt primo extrahatur chymus dominans: Secundo vt dentur stringentia sanguinem per interius: Tercio fiant localia per exterius. In quibus adhuc triplex est obseruanda cautela. Prima quidem: vt hoc non fiat subito: sed gradatim: quoniam in nullius morbi cura, & proprie in fluxibus & euacuati onibus non est precipitose festinandum: sed paulatim a leuioribus per fortiora ad vltima tendendum: donec securetur an fluxus symptomaticus sit, vel naturalis. Secundo vero, vt remedia styptica congruat virtuti, ætati, & complexionis. Quoniam vt dicit Gal. 3. de ingenio sanitatis.

Frigidiora competunt in flegmaticis & senibus in causa calida laborantibus, q̄ in cholericis vel iuuenibus. Tertia vero vt si calidis vt i oportuerit, nō capiamus, nisi ea quæ exiccat sine calefactione manifesta: vnde Hippo. 4. part. apho. Quæcunq; in frigidata sunt recalefacere oportet: exceptis his, quibus sanguinem manare futurum est. Clysteria ergo & emplastra & balnea præsentis passionis remedia administrantur actu frigida, vel saltem tepesacta.

Canones. Menstruorum quatuor sunt causæ. Prima quidem efficiens, & hæc est calor innatus, & diminutus. Materiale namq; foetus principium, si sufficiens caliditatem participasset, ex ipso natura sapiens meliorum semper factrix, nō foemellā, sed masculū generasset. Propter qd̄ ait Aristot. 2. de generatione animalium: Mulier est vir occasionalis: & primo phys. Mulier appetit virū, sicut materia formam, & turpe bonum. Secunda vero materialis, & hæc est pars massæ sanguineæ cruda flegmatica & indigesta. Tertia vero formalis, & hæc est parvis digestio diminuta, cui subuenit virtus totius regitiua cū periodica expulsiōe. Hæc autem periodus est de mense lunari, quod est tempus quatuor hebdomadarum, vel circa id: quare in tali circulo menstrua purgatur: ita vt quibuscūq; eueniat in plenilunio propter exuberantiam humorum frigidorū, quibus luna dominatur. Quibusdam vero in defectu lunæ propter malam & imperfectam talium humorum regulationem hora illa. Alijs vero in nouilunio, propter humorū agitationem per corpus post quietem diurnam. Quarta vero causa & vltima est finalis: & hæc est duplex. Vna quidē indiuidui, quæ est corporis emūdatio cū custodia sanitatis. Alia vero speciei, quæ est humorum in quanto peccantium delictio ad locū cōceptionis & nutritionis:

propter quod accidit, vt foemella non habeat menstrua ante tempus pubertatis quod est 14. annus vel circa: quoniā ante hoc tēpus calore ampliori participat innato, & nutrimento indiger plurimo pro corporis nutritiōe. Similiter neq; post annum 60. vel circa id, propter virtutū naturalium defectiōe, & proprie appetitū uæ & expulsiuæ: quare neq; ante hoc tēpus, neq; post concipiunt: Et si concipiāt: abortiūt ex omni leui causa, nisi bonitas cōplexionis, & regiminis, opus rectificet naturale: vnde Hip. 4. part. apho. Quæcunq; præter naturā renes existētes concipiunt: abortiunt, anteq̄ grossescant.

¶ Menstruorū præterea quatuor sunt partes heterogenæ diuersæ. Prima quidē purissima & nobilissima, quæ est superfluitas alimenti communis pro toto, & hoc cedit pro materia generationis foetus in matrice. Secunda post istā purior, & hæc transit in nutrimentum embrionis nuper generati. Tertia cruda, aquosa, quæ sursum per venas duas lacteas delegatur in mamillas: vt earum caliditate denuo excoquatur, & earum albedine dealbetur: cum sint caro glandosa pro educatione pueri post partum. Quarta grossa nigra, frigida, terrestris: quæ est sicut fex prædictarum, neq; conueniens alicui iuuamentorum prædictorum: & hæc reservatur hora impregnationis in matrice iuxta foetum, quem contegit secundina, ne ab ipsa inficiatur: & hora partus simul expellitur cum foetu præstans sibi facilitatem exitus in mollificatione vuluæ & lenificatione. ¶ Sciendum præterea, qd̄ ex humoribus sunt qui cursum menstruum velocitant, vt cholera: & sunt qui retardant, vt melancholia: & sunt quidā horū medij, et ipsi medij adhuc sunt duorum generum: quidā em̄ sunt per æquā distantiam perfectam, vt sang. quidam vero per indifferentiam ad utrumq; vt flegma, Flegma namq; si subtile aquosū

luerit, anticipat: Si vero grossum viscosum, retardat. Cholera igitur ex citrinitate & subtilitate & ardore menstruorum, cognoscitur. Plegma vero ex albedine mucosa subtili vel grossa. Melancholia vero ex grossitie & nigredine. Sanguis vero ex menstruum rubicunda claritate cum substantia temperata: unde Hip. 4. par. apho. Mulieri habenti menstrua sine colore proprio, & non secundum se semper facta, purgatione indigere significat. Dicit praterea Auer. 4. collect. quod omnes medicinae urinariae sunt menstruum prouocatiuae: tum quia urina & menstrua per san. colligationem intra venas & subtilitatem prouocantur: tum quia dirigentia ad renes & vesicam dirigunt ad matricem: nisi forte aliqua ex eis a proprietate operetur, ut cantharid. circa vesicam: quare in fluxu menstruum superfluo, & in praegnationibus, in quibus est timor abortus, summo opere cauendum est in cibis & medicinis ab usu diureticorum & urinariorum: & si quandoque gratia directionis uti eis conuenit, cum typicis eorum effrenitas reprimatur. Ex quibus ostenditur, quod dicta ca. de mictu san. et ca. de diabete, & ca. de striguria, praesenti ca. sublimiter suffragantur.

Prognosticatio. Fluxus exuberans menstruum fit ut plurimum in fine veris, & principio aestatis propter dominium san. In fine vero aestatis, & principio autumnatione cholerae. In fine vero autumnii, & principio hyemis ratione melancholiae adustae. In fine vero hyemis, & principio veris ratione flegmatis replentis: In qualibet tamen horarum potest ex qualibet causa euenire: cum non solum tempus anni, verum & regimen corpora transmutet. Considerentur ergo signa propria humori dominanti, in quibus adhuc utilis est attendenda una cautela, scilicet ut non tantum signis exterioribus sumptis ab habitudine & colore corporis: verum etiam interioribus sumptis ab ex-

untibus immutatis statim a principio certificemur: quoniam ut ait Gal. in commento illius apho. 1. parti. In perturbationibus ventris &c. Color corporis humorum superabundantiam ostendit: si non in profundo corporis accubuerint. Item fluxus menstruum perdurans cum debilitate virtutis, et inanitione corporis hecticam vel hydropsim, minatur per sui exiccationem plurimam, vel educationem caloris influentis immoderatam. Conetur ergo medicus talibus morbis obuiare. Item si menstrua durauerint cum constantia virtutis, & alleviatione corporis, nequaquam restringantur, & proprie in corpore sanguineo robusto vel solido, plethorico: quam agram liberat a multis passionibus. I. suffocatione matricis, lepra, phthisi, se. putrid. et apostematibus perniciosissimis: sed moderate eas regimen cum reductione ad contrarium, donec ad moderatum deueniat. Item dicit Hippo. 4. apho. Mulieri sanguinem vomenti menstruis superuenientibus, menstruum solutio fit, supple & ergo sponte vel per artem. Item ibidem: Mulieri in viro habenti, si veteri fluat, suspicio est abortiens. Item in eodem: In fluxu muliebri spasmi & ante defectio si superueniat, malum, supple & mortale. Item ibidem: Mulieri menstruis plurimis euenientibus accidunt agritudines, & non euenientibus a matrice accidunt agritudines. Item ibidem. Mulieri habenti foetum in viro si purgationes exeant, impossibile est foetum esse sanum. Et hoc verum intellige, si fuerint purgationes fortes, & plurimae & proprie post tertium mensem: quam ante hoc tempus possunt menstrua naturaliter fluere: cum adhuc foetus modico indigeat nutrimento, & proprie si mulier sit otiosa, sanguinea, robusta.

De retensione menstruum. Ca. II.
Retinentur menstrua ex causis contrariis dictis in capitulo praecedenti, quoniam qui bene diffinit, con-

craria conſignificat, vt dicūt logici. Hæ tamen omēs cauſæ ad quatuor reducuntur. Prima eſt ſang. modicitas in corpore toto: Secunda ſanguinis groſſities, vel viſcoſitas opilans. Tertia ſanguinis diuſio ad alia loca, ſcilicet ad mamillas, vt fiat lac, vel ad renes, ſiue loca alia. Quar ta eſt ſtriſtitudo venarum corporis, & proprie matricis.

Methodus. Signa eius propter paucitatem ſanguinis ſunt, ſi hæc per naturam & ex generatione, habitu do inſit ſicca, & extenuata cum citrinitate coloris in cholERICA, vel plumbeitate in melancholica: quare exiccatur matrix, & forſcificatur eius retentia præter modum. Quod ſitalis ſiccitas acquiſita fuerit ex regimine digæ, antecellit labor fortis, & ambulatio in locis calidis, & fa mes, & triſtitia, & vſus ciborum ſiccorum aſu vel virtute: ſicut patet in mulieribus ruſticanis: vel antecellit ægritudo chronica vel perdurans. Et cura eius, eſt humectatio et impinguario corporis poſſe, & delectatio in cibis & potibus dulcibus vergētibz ad caliditatem ætomatizantem in melancholico, vel ad frigiditatem in cholERICO & addentibus in ſanguine & menſtruis: ſicut plene docuimus capitulo de macie renum: & plura dicemus capitulo de febre hectica lib. 2. Signa eius propter ſanguinis groſſitiam vel viſcoſitatem opilantem, ſunt habitudo corporis ſqualida, ſlegmatica cum mollitie & multitudine pinguedinis: & ſi antecellit orium et quies plurima cum naſeatiua ſatietate ex cibis frigidis viſcoſis: ſicut ſunt piſces, & tortellæ, & caro porcina, & panis azymus, & riſum, & milium, & pulres ex ſimila, & pulres, & fabæ, verior erit tua ſignificatio. Et cura eius eſt talium poſtpoſitio omnino, & exercitium & labor in ieiuio, & regimen ſubtiliatium ex cibis & medicinis acutis calidis: ſicut ſunt omnia diuretica,

& aqua decoctionis cicerum, faſcoles, & piſorum cum petroſil. cymino & aneto: et ſicut porri, & cauſes recentes ſemicocti, & iura eorum condita cum pipere ruta, cymino: & licet ſunt carnes arietū & pulloꝝ coctæ cum origano, calameto, ſerpyl. mētaſt. & porris, ſimilibz cōditis cum ſinapi, allijs, vel ſucco rutæ, & iura eorum condita cum ſale plurimo & pipere vel cymino. Si hæc non ſufficiant: fiat flebotomia de ſaphena pedis intalo: quoniā a proprietate menſtrua pro uocat: quemadmodū flebotomia ex manu ea abſcindit: & proprie ſi fiat poſt ſeſſionem in tina perdurantē, donec humores diſſoluātur. Et ponātur ventolæ ſicca ſuper ſinum vētris vel ſumē ſub vmbilico. Et ſi hæc adhuc non ſufficiant, ſiāt omnia localia, quæ dicentur parag. Emperica, tam per interius quā per exterius: ita tamen vt a lenioribus incipiamus, & gradatim per media tendamus ad fortiora: quoniam hic eſt ordo ſapientiz perfectæ. Signa eius propter diuſionem ſanguinis ad loca alia, ſunt exuberantia lactis in mamillis cum earum inflatione plurima: quemadmodum accidit nutriticibus. Iuxta illud Hippocratis quinq. particula apho. Mulier, quæ neq. pregnās eſt &c. Si vero ſanguis ad renes diſtulerit, apparebunt ſigna diabetis, & antecellit diureticorum vſu ſuperfluo. Si vero ad caput, multiplicabitur fluxus narium ſecundum periodum menſtr. Iuxta illud Hip. 4. par. apho. Mulieri menſtruis deſicientibus, ſanguis e naribz fluit. Si vero ad epar & ſtomachum, fiet ſanguinis vomitus periodicus. Si vero ad cutim, ſuperueniet ſudor exuberans plurimus omni die, & proprie in aurora. Si vero ſang. diſtulerit ad embryonē nutriendū, antecellunt ſigna impregnationis, quæ dicent. Cura eius cōmunis eſt, vt fiat primo repercuffio ſanguinis a locis p̄dictis cū emplaftris & epithymatibus frigidis

dictis ea, de exuberantia lactis in mamillis. Secundo, ut fiat attractio ipsius ad inferiora cum flebotomia saphenæ, & vntosatione prædicta. Tertio, ut fiant omnia, quæ dicuntur, parag. Emperica. præterquam in pregnantē, circa quam nihil omnino fiat: ne prouocet abortus. Signa est propter strictitudinē venarum, sunt: quoniam si hæc insint ex generatione, apparebunt venæ graciles, subriles, velut chordæ: & multitudo pinguedinis opprimentis eas, et assiduus dolor hypochondriorum propter oppilationem epatis & splenis: & quod sanguis exiens est modicus & subtilis. Si vero talis fuerit strictitudo aduentitia, fiet propter apostema in matrice: de quo dicemus cap. proprio, vel propter flegma grossum inducens coartationē vasis. Et de hac strictitudine dictum est, ubi de sanguinosis loquebamur. Et cura strictitudinis innata, prout fieri possibile est per artem, est abstinencia a cibis & potibus grossis vel viscosis omnino, & cautela a naufragiis fatietate pro posse & somno & balneo, & potu vini plurimi super cibum: Et ut nutriatur ex cibis & potibus calidis, subtilibus, penetratiuis: sicut sunt iura carniū laudabilium condita croco & cynamomo: & olera omnia præter caules: & vinum album, subtile, aquosum, & vltus frequens brodij, & omnium diureticorum, ciccerum, pisorum, & fabarum, & fasicolorum. Fiat præterea post tale regimen frequens flebotomia saphenæ: neque extrahatur sanguis, plurimum hora vna: sed fiat secundatio potius, & assuesfactio descensus materiæ ad inferiora: Neque fiant a principio localia: fortia, ne forte agitet materias intra loca angusta, & dolorem inducat in matrice. Quod si omnia ista non contulerint, et sanguis in ventre aggregatus constiterit, & dolorem induxerit: flebotometur basilica dextra & sinistra frequenter, & extrahatur sanguis pro posse, ne forte materia venas

rumpat, & suffocationem caloris naturalis subitam inducat. Quod si sanguis exiens fuerit grossus & difficilis transitus, balneetur primo corpus in aqua tepida dulci, & post hoc fiat incisio venæ largæ cum flebotomo obruto declinante ad spissitudinem.

Emperica. Præsentis morbi cura duabus intentionibus indiget, communi videlicet & propria. Communi autem est præparatio & extractio chymi dominantis. Syrupus igitur digerens materias frigidas & grossas in matrice & renibus, & menstrua & urinam prouocans, et lapidē frangens, & oppilationē difficilē antiquā abscondens sic fit. ℞. liquir. rubræ, diptami, peoniarum, aristol. ro. valerianæ, pastinacæ, petrosil. apij, fen. cicoreæ, calamenti, origani, mētastr. serpylli, arthemisiæ, rutæ, fauinæ, pullegij, betonice, balsamitæ, ozimi, cauliculi agrestis, graminis scolopendrij, ramarisci, camedreos, chamepitesos, capill. vene, eupatorij, saturiæ, meliloti, prassij. añ. oim. vel quorundam, m. f. succi borragin. porri. añ. 3. 2. se. anisi, fen. petrosil. carui, ameos, cymini. añ. 3. f. millij solis, saxifragiæ, iuniperi, amygdal. añ. 3. 1. & f. seminum communium frigidorum nucleos, cerasos, et persicorum. añ. 3. 1. myrrhæ, galbani. añ. 3. f. si. syrup. subtilis aquosus, clarificatus cum albuminibus ouorum, addito zuccaro quod f. de quo bibatur bis omnī die in auro, & ante cenā circa. 3. 4. nullo alio addito. Extractio vero chymi grossi fit vel cum hierapic. Gale. vel cum benedicta laxatiua, vel cum pillulis dictis cap. de lapide in renibus. parag. Methodus. Et iterum fortiores sunt illis de hermodactyl. quas dicemus ea. de arthetica passione: propria vero intentio est, sanguinis subtiliatio, oppilationis apertio, & menstruum prouocatio, quæ fit per medicinas exhibitas per interioris, ut sunt trochisci, & electuaria: & per exterioris, ut sunt bal-

nea & emplastr. & p. inferio. vt sunt suffu-
migatio, suppositoria, & pessaria. Tro-
chisci meliores ad hoc sunt, trochisci de
myrrha, qui sic fiāt. ℞. myrrhē 3. i. & f.
farinā lupinorum, vel amygdalarū ama-
rarum. 3. 2. & f. foliorum rutæ siccæ, men-
taſtri, pullegij, culexæ tinctorum, aſſæ, ſe-
rapim, oppoponacis. 3. 1. diſſoluātur gū-
mā in ſucco rutæ, & cum eo conficiantur
trochiſ. quorum quilibet ſit. 3. 2. Detur
vñs omni die in aurora cum aqua de-
coctiōis iuniperi, vel ſauinæ, & proprie
per dies aliquot ante tempus menſtruorū.
Sunt enim tantæ fortitudinis, vt ſi dētur
prægnanti, faciant obſorū, & educent
foetum viuū & mortuū: Et ſi dentur
difficulter parienti, velocitabūt partū, et
educent ſecundinā. Trochiſci de gum-
mis ad idem ſic fiunt. ℞. myrrhæ, oppo-
ponacis, gallani, ſerapini. ana. 3. 1. aſſæ
ſoridæ. 3. 4. Aliqui addunt caſtorei. 3. f.
croci. 3. 1. cōficiantur cum ſucco rutæ, den-
tur vt poſtea. Confectio bona ad idē eſt
diateſſaren, q̄ ſit ex quatuor ſpeciebus
ſcilicet myrrha, gentiana, ariſtol. rotun-
da, bacci lauri. añ. par. æqualibus: confe-
ctis cū melle coctio, vel crudo lambendo
ex ea in ieiunio. Eleſtuarīa vero opti-
ma ad hoc ſunt antidotū, hæmagogū,
& neſtreccatum, & triſera magna, ſi de-
tur ex eis omni die in ieiunio cum vino
decoctionis ſauinæ, vel iuniperi, vel ſol.
lauri, vel ſumi terræ, vel rutæ, vel abſyn-
thij, vel azari, vel alterius acuti cuiuſcū-
que. Puluis ad idem. ℞. caſſiæ lingnæ. ce-
ræ caſſiæ ſiſt. ana. 3. 2. detur ad potandū
cum vino decoctiōis ſauinæ. Puluis for-
tior ſic ſit. ℞. eſulę conſolata cum lacte
vel cum oleo amygdalarum dulcium ex-
iccatarum. 3. 4. meſereō, ſerapini. 3. 4. tur-
bith. 3. 1. cinamomi, nucis muſcata, gra-
norum apij. añ. 3. 2. fiat ex omnibus pul-
uis cribellatus, de quo ſumāt in ieiunio
3. 4. omni die cum decoctione liquiritiæ,
vel ſero caprino. Alius fortior, ſi teratur

ariſtol. roſ. pipetis myrrhæ, ſe. dcutæ,
centauriæ omniū. añ. 3. 1. & ſi volueris,
forma ex eo paruas pillul. cū ſucco praſ-
lij & da ſero ſine coena, vt poſtea. Balne-
um ad idem ſit ex aqua decoctionis ſau-
inæ mentaſtri, pullegij, iuniperi, origani,
roris marini, foliorum lauri, in qua ſede-
at ab vmbilico iſtra, ſed nō ſupra. Quod
ſi poſt exitum a balneo ſeboromentur
ambę ſaphenę pedum, quæ ſunt intus in
talo cum incisione larga, beatificabitur
operatio: quia dum ſanguis ſit ſubtilis,
extrahetur facilius ad inferiora. Suppoſi-
toria ſic fiunt. ℞. rad. malę, vel malua
uiſci, vel thapſi barbari, & figure ſe-
figura ſuppositorij, & inungatur cū oleo lau-
rino, vel laterino, vel de coſto, vel de eu-
forb. vel bened. & intro mittatur in vul-
uam, & deſeratur poſt balneum aſſidue
tribus diebus. Quod ſi adhuc nō ſufficiat:
aſpergatur poſt iniectionem ex puluere
euforb. vel coſti, vel caſtorei, vel cū tri-
ſera magna acuta cū ſeamoneā, vel cū
aloe epatico magno. Suffumigiū ſit cū
trochiſ. ſupradictis poſitis ſuper carbo-
nes, & recepto fumo in vuluam cū tra-
iectorio: vel fiat ſuffumigatio cum hu-
iuſmodi. ℞. caſſiæ lignæ, coſti, cinamo-
mi, myrrhæ, anethi, cymini, flammulæ,
nepitiæ, calamenti, origani, mentæ, bal-
ſamitæ, granorum ſauinæ, iuniperi, xilo-
aloes, xilobal, thuris, aliptæ, muſcata,
ſtoracis ſiccæ omniū, vel quorundā, añ.
part. vnam, armoniāci, ſerapini, oppo-
ponacis. añ. par. f. conficiantur pillul. cū
laudano vel vino aromatico, & fiat cū
eis ſuffumigatio: quoniam vias aperit,
& ſanguinem colliquat, & matricem de-
lectat, & ad inferiora trahit. Vnde Hip.
4. part. aphoriſmorum. Muliebria edu-
cit ex aromatib9 calefactio, multotiens
vero & ad alia vtilis eſſet, ſi non capitis
grauedinem faceret. Aſpergāt igitur fa-
cies & tempora cum aqua roſacea hora
ſuffumigatiōis contra capitis dolorem.

Et si suffumigia foetida fieret circa os & nares, ex vngulis caprarum vel alinorū, melior fieret operatio: quoniā a forma specifica matrix prosequitur aromatica & fugit foetida. Sternutatio preterea conferens in hora eadem est ex cōditi & pulvere piperis, pyrethri euforb. & similitum naribus inflato. Vnde Hip. ibidē. Mulieri quæ a matrice molestat, aut difficulter generanti, sternutatio superueniēs bonum. Licinium sit fit. ℞. ciclamini, ellebori albi, calamenti, serapini, euforbij. añ. 3. 2. terantur & conficiantur cū succo rutæ, vel aqua decoctionis sauinæ, donec ad formam mellis currentis reducatur, & supponantur cū lana vel coto intincto: quoniam est in prouocando menstrua adeo forte, vt pducatur ad abortum. Idem facit pul: aloes, myrrhæ, assæ foetidæ, euforb. nitri añ. 3. 1. si cū felle vno tauri, vel canis, vel vituli contemperetur, addito succo apij, vel hyssopi, vel cicuræ, & lana carpinata imbibatur, & postea contorqueatur, donec rigescat, & supponatur. Sed debilius istis est, si candela noua lini at ex oleo nardino, vel de lilio, in quo dissoluta sint tria grana muschi, vel ambre, & cōtinue deferatur intra vuluam, vel imbibatur peria linea in oleo prædicto, & ligetur circa candelam, & imponatur: sed ei filum appēdatur, quo extra hi possit: quoniā matrix eam sugeret ad interiora. Fricatio fit, si digitus, vel peria contorta in figurā digiti imbibatur oleo eodem sic aromatizato, & cū eo fiat vehemens fricatio intra labia vuluæ. Vaporatio fit, si nigella, artemesia, aristologia, ruta, & sauiua bulliatur perfecte in aqua fontis & vino albo veteri, & cum immissione cannæ intra vuluam vapor calidissimus recipiatur, corpore vndique bene contexto: & si addideris folia lauri, pullegij, saluiam, mentastrum: & iterum si myrrham, & armoniacū, & assam foetidam, melior fiet operatio. Et

quidam addunt acorum, azarum, scolopendriam, tamariscum, sambucū, squilliticum, sinapim, baccas lauri, cyminiū, & omnia acuta penetratiua. Sed necesse est vuluam inungere cum oleis frigidis, ne calefiat superflue, vel viceretur: sicut est olium ros. vel de nenuphare, vel cepum hircinum cū populeon permixtū, vel vnguentum album. Succus præterea rutæ, vel absynthij, bibitus frequenter in ieiunio: Similiter & aq̄ decoctionis azari, nepitæ, sauinæ & iuniperi, menstrua prouocat, & abortire facit. Similiter & aqua calida valde salita, donec fiat amara.

Canones. Omnia calida acuta, similiter & amara menstrua prouocant, sua caliditate materias colliquando & sua acuitate excitando virtutem expulsiuam, sui penetratione vias elargando, & sua amaritudine humores despicabiles, & nature odiosos reddendo pro corporis nutrimento. Dicit præterea Auerro. 10. colliget, quod omnis medicina prouocans urinam, prouocat & menstrua: quæ dicta ea, de lapide in renibus, & capitulo de dysuria & suria præsentis suffragantur doctrinæ. Est etiam sciendum, quod prouocatio menstruum & abortus non differunt nisi secundum magis & minus: quare illic dicenda præsentis curæ annectantur: & proprie in fine, postquam nihil prædictorum visum fuerit conferre, Et ex his quæ plurimum cōferunt, est coitus frequens cum viro tardæ pullutionis post frictionem perdurantem, & potus vini veteris potentis. Item si mulier sæpe ponatur in balneo aquæ dulcis tepidæ ante & post consumptionem medicinarum prædictarum: ita vt sitiat vehementer, melior fiet operatio, & virtutis medicinarū per venas delatio profundata.

Prognosticatio. Mulieri si mēstrua de fecerint, vomitus san

Tractatus nonus

guinis superueniens tollit ægritudinē & ecōuerso, vnde Hippocrates quinta particula aphorismorum. Mulieri sanguinē vomenti menstruis superuenientibus solutio fit. Mulieri menstruis deficientibus sanguinem fluere e naribus bonum est. Item in eodem. Menstruis plurimis eueniētibz accidūt ægritudines, &c. Quod quidē intellige: quoniam ex fluxu mēstruorum, superfluo surgit marasmus propter caloris influentis euacuationē, item & hydropisim hys. Ex retentione vero mēstruorum surgit mola, vel hydrops ascites propter regurgitationē sanguinis frigidi mortificantis, & sua grossicie oppilātis, sua multitudine opprimētis calidum naturale. Item retentio mēstruorum cum signis alijs impregnationem certificat. Vnde Hippoc. 4. partic. aphorif. Si mulieri purgationes non exeant, neq; frigore, neq; feb. superueniēte, anxietates, abominatiōes, & defectiōes ei acciderit: reputa hāc in vtero habere.

De rectificatione matricis, & difficultate impregnationis. Cap. III.

Difficultas impregnationis & generationis, aut est ratione mulieris, aut ratione viri, aut ratiōe vtriusque. Si ratiōe mulieris habet causas sex. Prima est matricis distemperata caliditas, qua adurit menstruum & spermā immissum: Secunda est intensa frigiditas mortificans & congelans: Tertia est exuberans humiditas, qua debilitatur retentiuā: Quarta est siccitas extrema generationi materiam denegans: Quinta venarum strictitudo in matrice, similiter & oppilatio foetui pabulum necessariū non transmittens, vel vuluæ coartatio ultra modum introitum virilis virgæ non admittens: Sexta & vltima est egritudo propria matricis, scilicet apostema vel vlcus ipsam prohibens ab operatiōe

debita vel consueta. Si vero fuerit impedimentum ratione viri, causas habet quinque. Prima est sgmatis caliditas adurens: Secunda vero est frigiditas congelans: Tertia siccitas diminuens: Quarta humiditas dissoluens: Quinta virgæ breuitas vel curuitas sperma ad locum sibi proprium non perducens: Impedimentum vero ex parte vtriusq; simul proueniens, est vnicum: quod est æqualitas cōplexionis distemperatæ in vtriusque: verbi gratia: quoniam cholericus non generat ex cholerica, neque flegmatico ex flegmatica, cum ex eorum permixtione diuersa vltimetur, & operatio naturalis auferatur. Omne namq; naturale est temperatum, & omne temperatum est naturale: vt dicit Galen. prim. de accidenti. r. capite. Quapropter accidit vt masculus temperatus generet ex foemella intemperata: Similiter & masculus calidus ex foemella frigida, & e conuerso.

Methodus. Signa eius propter caliditatem matricis, sunt habitudo corporis macra citrina cum multitudine pilorum circa lumen, s. nigrorum & grossorum vel rubeorum, & paucitas mēstruorum cum nigredine & grossicie ipsorum, & ardor vuluæ cum asperitate hora coitus. Et cura eius est, impinguitio corporis, & eius alteratio cum cibis infrigidantibus, non excellentibus: ne forte distemperantia deterior inducatur. Quoniam difficile est complexionem naturalem permutari. Sit ergo maior intētio in impinguando, quam in infrigidando cū oīs humiditas cum superfluit, obtundit caliditatem. Sitim & famem non toleret & gaudeat ocio & quiete & somno. Fomentetur quandoque vulua vel vapore tur cum aqua tepida decoctionis lactuæ, portulacæ, cucurbitæ, rosæ, solatri, semperuiuæ, myrtillæ. Et potest addi aliquid iusquiami, vel mandragoræ, vsu tamen moderato: similiter & violæ, rubus, plan-

rago, malua, cicorea, acetosa, folia pauperis, & semen eius, nenuphar, & similia. Suffumigetur quandoque ex camphora, gummi arabici, vel ex sanguine draconis & holo armenico. Utatur sæpe in ieiunio triasandalis. zaccaro ros. zaccaro violarum, diarodon abbatis, rosata nouella, & similibus, si stomachus non contradicat. Signa eius propter frigiditatem matricis, sunt color faciei albus vel plumbeus, subtilitas menstruorum, & paucitas rubedinis eorum, & eorum modicitas & tarditas, & pilorum paucitas circa sumē, quorum color est flauus vel subalbidus cum eorum subtilitate: & quandoque inflatur matrix, & turget fumen ex ventositate frigida grossa intus retenta. Et cura eius est regimen calefaciens ex cibis & potibus cum virtute, & vsus assiduus diatrion: pereon, diacimini, & proprie si matrix sit turgida inflata circa fumen. Similiter diagalangæ, diacardamomi, electuarium ducis, & similia. Clysterisetur matrix quandoque cum vino rubeo, in quo bdellium vel mastix, vel thus sint dissoluta, vel cū aqua calida decoctionis carui, cymini, lizeleos, calamenti, pullegii, ameos, peonia, mentastri & origani. Vngatur vulua frequenter, & proprie post purificationem menstruum cum oleo costino, vel nardino, vel cum oleo balsami, qd melius est. Et si dissoluatur in aliquo eorum pulvere, peonia, vel lizeleos, melior fiet operatio. Utatur sæpe diambræ, diamargariton, in ieiunio. Subsumigetur ex thure, mastice, alipra muscata, gallia muscata: quoniam conferunt. Signa eius propter humiditatem matricis, sunt vuluæ lubricitas apud coitum, & omni hora, mollificatio corporis, & proprie maxillarum, & coxarum cum pignitia & tarditate ad operationes: & si cōcipiat, abortit, priusquam embryo magnificetur, & proprie mense secundo

vel tertio. Vnde Hippoc. quinta particula aphorismorum. Quæcumq; vero graciles corpus moderate habentes, abortiunt secundo mense aut tertio sine occasione manifesta, his colydones muscilaginibus pleni sunt, & non possunt tenere præ grauedine foetum, sed distumpuntur. Et cura eius est, vt digeratur flegma in matrice & corpore toto: et putget, sicut diximus capitulo de fluxu menstruum. parag. de fluxu eorū propter multitudinē flegmatis aquosi & de empericis, & proprie ante horam impergnationis, & post purificationem menstruorū: quoniam hæc est melior hora in hoc casu. Et ad hoc conferunt purgatiōes, quas dicemus capite de passione arthetica. parag. de causa frigida, si deo voluerit. Regatur diæta calida & sicca in cibis & potibus, si epas non contradicat vel splen vel accidēs aliquod. Et si fuerit possibile prouocetur vomitus semel in mense duobus diebus super se: prout dicemus capite de foetore nasi: quoniam materias euacuat & diuerit: post hoc vero fiant localia. Clysterisetur ergo matrix cum vino veteri styptico, in quo mastix vel olibanus vel bdellium fuerit dissoluta, & bulbura, vel cum aqua calida decoctionis calamēti, absynthii, betonica, balsamita, menta, mentastri, nucis cypressi. Similiter & vaporetur, & fomentetur, & balneetur cum eisdem. Et si fuerit aqua pluvialis, vel aqua in qua fabri ferrarii ferum extinguunt: fiet melius. Et si times calorem superfluum, adde ex frigidis stypticis: sicut sunt rosa, myrtill, balaustia, cupulla glandiū, & similia. Si qd autem ex aromaticis apponatur, beatificabit operatio, sicut sunt spica, xyloak, cassialing, xylobalsamū, calamus aromaticus, cinamomū, garosil, cost. & similia. Subsumigetur frequenter cum pillulis factis ex thure, myrtha, bdellio dissolutis in vino rubeo styptico, & incorpora-

Tractatus nonus

tis cum eodem, vel ex storace sicca, galbano, armoniaco, euforb. & nuce cipressi: & fiant omnia quæ dicuntur. paragi. Emperica. Signa eius propter siccitatem matricis sunt habitudo mulieris macra, & paucitas mēstruorum, & siccitas vulvæ assidua: & si antecessit fames longævua, & labor, & exercitium, vel ægritudo chronica: verior erit tua significatio. Et cura eius est impinguatio corporis & humectatio pro posse ex cibis & potib⁹, & balneis dilatatibus, quæ plenè scripsimus cap. de sp̃asmo. & ca. de phr̃isii. & ca. de macie renum. Et plura dicemus capitulo de fe, hectica, li. 2. si deus voluerit. Localia vero humectantia, quæ post prædicta conferunt: sunt coitus assiduus cum fricatione perdurante cum viro plurimi spermat⁹: quoniam talis fricatio matricem delectat a proprietate, & roborat, & impingat: quæ admodum omnis operatio naturalis membrum confortat, cuius est propria, si fuerit vsu vel modo nō disconuenienti. Similiter & linitio vulvæ assidua cum digito inuncto in oleo communi et tepido, vel adipe anatis, anseris, & gallinæ. Similiter & suppositoria ex eisdem dissolutis & inunctis ex radice altheæ vel malvæ: vel candela assidue in vulva retenta. Ad hoc etiam conferunt licinia ex lana vel coto cōtorto in formā digiti, & cum eisdem illinita, & omni hora in vulva gestata vsq; ad profundum. Similiter & clysteria ex aqua decoctionis malvæ, altheæ, scilicet foliorum, radicum, & seminum colata & condita, & commixta cum oleis & adipibus prædictis, & iterum parumper bullita & tepida iniecta frequenter. Conferunt etiam vnguentum dialtheæ. Quod si eius caliditatem timueris: adde ex oleo viol. vel vnguento populeon, quātum est terria pars ipsius. Signa eius propter strictitudinem ex opilatione venarum in matrice, sunt: quoniam si sit ex generatiōe, erit habitudo

corporis totius, pinguis, squalida: & est quādoq; cum mulier non est pinguis circa membra exteriora sed interiora tantum propter multitudinem adipis apud rete tegēs stomachū & intestina, & apud matricem, & proprie os eius: quare committit vehementer, & impeditur virtus attractiva. Et signa eius sunt, distētio ventris ultra mēsuram, & frequentia anhelitus cum mouetur: & quia læditur ex retētiōe fecū & vērōsitate plus alijs humoribus grossiorib⁹ in ambitu totius. Si vero talis strictitudo venarum & opilatio fuerit acquisita, apparet vna alba cum multitudine contentorū. Et cura amborum communis est extenuatio corporis pro posse cum ieiunio, & labore, & vgilis: & vsus ciborum subtilium, parū & leuiter nutrientium: sicut sunt olera cōmunia, & iura carniū, & vinū aquosum, & vsus acruminum: sicut sunt cibi valde saliti, & carnes siccæ conditæ cum sinapi & aceto: Et comedere omni die in ieiunio micam panis surfuracei infusi in aceto vel agresta. Conferunt etiam vsus acutorū: sicut sunt allia, cepe, porri. Et si opilatio fuerit acquisita, digerantur slegma grossum & viscosum, & euacuetur, sicut diximus capitulo de restrictione mēstruorum. Et post purgationem vratur diureticis penetratiuis dictis illic. Ad hoc etiam conferūt dicta capitulo de lapide in renibus, & capitulo de dysuria: quoniam oīa, quæ renes purgant: aperiunt, exopilāt, et mundificant etiam matricē, vt dicit Auer. quinto colliget. In fine vero fiant localia circa vuluam aperiencia, & abstergentia matricē & eius venas: quæ orificia terminātur ad concauū matricis, quare cotyledones Græce appellantur, & ad q̃ vena vmbilicalis procedens a vētre embryonis attrahit alimentū &c. Cuiusmodi remedia sunt suffumigiū ex pyrethro, ruta sicca, pulegio, costo, mēra, sarcocola: ex quorū quolibet per se vel pluribus

simul positis super carbones, & recepto fumo calidissimo in matricē mediante traiectorio posito in profundum vuluæ. Et ad hoc cōfert suffumigium ex alipta muscata & gallia muscata. Similiter & suppositoria facta ex gūmis eisdem dissolutis in veteri vino claro, et inunctis ex radice vluæ vel altheæ, vel candela ap-
pēsa cum filo, quo extrahat: Et licinum ex lana v^l coto linitum cum eisdem, vel cum vnguento aragon, marciaton & agrippa actū calidū immisum: Similiter & vaporatio ex aqua decoctionis pullegij, sauinæ, & iuniperi recepta cum traiectorio, quanto calidius est possibile. Post prædicta vero omnia, & cum matricis fuerit perfecte purgata, fiat localia facientia ad impinguationem a proprietate, quæ dicuntur, parag. Emperica. Si vero prædicta stricctudo prohibēs actū gignitiuū fuerit in vulua, oportet vt cū rasorio dilatetur, donec introitum virgæ virilis concedat. Signa eius propter ægritudines in matrice, sunt signa apostematōis & vlcēis in ea, quæ dicemus cum sua cura proprijs capitulis. Signa ei⁹ propter caliditatem superfluam spermatōis virilis, vel frigiditatē, vel humiditatē, similiter & cura sunt penitus eadem cum his, quæ dicta sunt de muliere. Conferūt præterea plurimum caliditati vel humiditati dicta ca. de satyriasi: friditati vero & siccitati subseruiunt dicta ca. de impotētia coeundi. Signa eius propter breuitatē vel curitatem virgæ, patent ex intuitu vel ægri narratione. Et cura eius est, vt si sit in ea breuitas, eligat ex mulierib⁹ curtis gracilibus: quoniā & in eis existimāt collum matricis curtum, & hora coitus eleuet anchas mulieris, et ad se trahat v^l hemēter manibus vtriusq^{ue}, & caput eius ad inferiora declinet. Si vero vlr^ga tortuosa fuerit: incidatur cum ferro ligamentum hoc faciens, & extendatur virga, et liget^{ur} inter duas tabulas leues, donec con-

solidetur. Dicit nāq^{ue} Aristoteles lib. 2. de generatione animaliu^m, q^{uod} virgæ breuitas diminuta prohibet generationē: quoniā sperma nō venit ad concauum matricis locum sibi propriū ex forma suæ speciei: quare stans in collo matricis infrigidat^{ur}, & resoluitur & exit saluatim. Similiter & hoc facit virgæ prolixitas immensa: quoniā in ea sperma moratur superflue, donec euaporet. Melior ergo in generatione est virga recta moderata. Quoniā sicut sanguis si extiterit extra venas, in saniem & rem malam conuertitur: ita sperma virile nisi sit in vasis spermaticis vel in concauo matricis locatum fuerit, necessario corrūpitur. Eligat igitur breuis ex breuibus, & longus ex longis & grossis circa coxas. Signa eius propter disconuenientiam amborum inter se, sunt: quoniā masculus ex alia generat, & femella ex alio cōcipit, licet inter se nō valeant generare. Et cura eius est, vt a principio contractus gignitiui vir cholericus eligat ex mulieribus flegmaticis, & ecōuerso: & temperatus ex temperatis cum iudicio medicorum perfectior^{um} in cognitione complexionū, licet hoc sit difficile: quoniā generatio cum sit operatio maxime naturalis, non perficitur, nisi ex temperata sanitate generantium. Quod si conuenerint sub æqualitate complexionis distemperatę, alternum ædificēt commerciu^m lege permittēte. Verum si hoc nō fuerit possibile, conueniens videt^{ur}, vt mulier ad contrariam permutetur dispositionem cum cibis & medicinis alterantibus vsu tamen moderato, & paulatino: quoniam mulier est sicut materia, & vir sicut efficiens atq^{ue} forma: quare melius est, vt mulier alteretur, & conseruetur. Istud etiam impedimentum quandoque natura per se rectificat, per mutationem complexionis ætatiuæ.

Emperica. Sicut experimentum & ratione testant^{ur}, præter causas di

Tractatus nonus

Etas in methodo, sunt & causæ quatuor alia prohibētes impregnationem: quarū prima est, modus indecēs coeundi, verbi grā. Si mulier iacuerit supius & vir inferius: vel si vir plurimum tēstinet ad opus perficiendum priusquā mulier incitetur ad libidinem, & matrix ad auiditatem: vel si mulier iacuerit capite eleuato, & coxis depressis: quare oportet, vt eorum quodlibet in cōtrarium variet: quod est, vt mulier subiiciatur capite depressio, & hora coitus lacescat palpitationibus lasciuia cū manibus circa mamillas & pendenda: & vt vir suum non compleat desiderium, donec in vulua senserit humiditatem affluentem circa vuluam & mulierem delectātem. Tunc namq; sperma proprium effundat natibus diligenter fir maris super anchas mulieris. Talis namq; modus mulierem delectat, & opus beatificat: quod sagax natura p̄gnosces ab æterno deus vtriq; sexui delectationem atq; libidinem ingessit, ne dolorem patiens & laborem nutrientis horrescens, opus negligeret gignitium. Fecit igitur eos delectari, quoniam sperma vnicuiq; propriū lene ac mulcebre trāsit sup mēbrum neruofum sensitium titillosum, quod in viro est caput virgæ, & in muliere os matricis, simile rostro tenchæ. Et licet sperma mulieris non sit ad generationem necessarium, neq; sicut efficiēs, neque sicut materia, prout superius in anatomia matricis ostēdimus: est tamen vt plurimum ad generationem iuuamentum ferens. Secunda vero causa est indebitus modus se regendi post coitum, verbi gratia: Si mulier ilico se erexerit, & steterit, vel saltauerit: quare cadit ab ea sperma. Ordinatur igitur, vt remaneat sub eodem situ post coitum per tempus aliquod, quod diximus in coeundo, scilicet resupinata & capite depressio, & natibus exaltatis, & si possibile fuerit: dormiat sic iacens. Et in hoc casu multum

conferunt ventosæ latæ capaces positæ super sumē cum igne sine scarificatione: quoniam adiuuant attractiuā & retentiuam. Confortant similiter & emplastra calida styptica in methodo iam dicta. Tertia causa est colli matricis & vuluæ spaciositas immensa: quare ingreditur aēr frigidus congelans. Cui subuenitur cum balneis & fomentationibus calidis & stypticis: sicut est aqua decoctionis gallarum, nucis cypressi, gummi arabici, myrrhæ, ciperi, mastice, olibani, aluminis, sulphur. squinanti, artemesie, calamenti, & similia, in qua frequenter sedeat: & cum petijs lineis mollibus in ea infusis actu calidis loca prædicta fomententur intus & exterius, & in fine rei ipsa cum linteo diligēter exiccet. Ad hoc etiam confert suppositio lanæ vel coti intincti in hac mixtura. Recipe galliæ muscæ, drachmas tres, garioli, drachmā vnam, musch, drachmā, semis, terantur, & dissoluantur in drachma vna vini rubei pontici, & aliquantulum ad ignem calefiant. Aliud ad idem fortius. Gummi arabici, mastice, gallarum, aluminis, nucis cypressi, ana, vnciam semis, terantur, & cribellentur, & bulliantur in libris quatuor vini rubei, & vnciis quatuor aceti, donec vnciæ quatuor consumantur. Et ex hoc liquore calido frequentetur vulua, abluatur vsq; ad profundum, quo digitus possit elongari. Et post abluitionem singulis diebus factam locus aspergatur alternatim intus & exterius cum puluere styptico subtilissimo facto ex bolo armenico, mastice, gummi arabico, mumia, armoniaco, thure. añ. vnciam semis, tritis & cribellatis. Et post asperisionem epithymetur cum pannis lineis, infusis in liquore prædicto, vel vino rubeo styptico claro. Hæc namque remedium vicissitudo tantam stypticitatem & coartationem inducit, vt corrupta, vīquæ peperit virgo videatur.

Quarta causa est hora non competens coeundi. Oportet namq; vt vir & mulier abstineant a coitu per tempus longū: quoniam hoc vuluam exiccat, & eius retentiuam roborat, & sperma in testiculis decoquit, & maturat: propter qd accidit, vt mulieres se commiscētes pluribus non concipiant: lubricitate vuluæ simul, & menstruorum confusione prohibente. Oportet etiā, vt hora qua voluerint coire, caueant a tristitia & crapula, & ebrietate, & ira, & alijs animi passionib; . Hora præterea vniuersalis ad hoc conuenientior est post menstruorum purgationem completā: quare tunc balneetur in aqua decoctionis chamomillæ, meliloti, spicæ, celticæ, polij, sizeleos: & post hoc balneum, vuluam diligenter exiccet linteo, & subfumiget cum carpobalsamo, vel oppoponace, vel spica, vlp costo, vel alio aromatico: & tūc nubat. Hora præterea particularis ad hoc conuenientiōr est in ieiunio, et circa auroram, postq; somnus et certia digestio perfecte fuerit celebrata. Tunc namq; vir & mulier vrinam & feces emittant, & inter se colludant, & ad actum generatiuum procedant. Et dicūt qdā, qd imaginatio figuræ pulchræ hora coitus prolem pulchram reddit, & turpis turpem. Remedia præterea ad impregnationem facientia sunt duorum generum: quædam namq; hoc faciunt a proprietate, quædam a qualitate: Et quæ a qualitate: sunt duplicia: quoniam quædam delectationē faciunt in matrice hora coitus, & eius attractiuā excitāt: & quædam stypticitatem in ea conferunt, & retentiuam consonant: de quibus per ordinem dicamus. A proprietate conferens est balsamus, cortex mandragoræ, peonia, agnus castus, moschus, sizeleos, ambra, baucia, ameos, coagulū leporis, stercus vulpis, & medulla ossis cerui, vel vituli, si ante horā coitus applicent vuluæ quocunq; modo. Fit igitur suppositorium ex

ipsis hoc modo. ℞. xylobalsami, carpobalsami, radic. peoniæ, sizeleos, storacis, calamitæ, bistortæ. añ. 3. i. terātur, & cribellētur cum oleo balsami, vel cum oleo rosæ, in quo dissolutus sit muschus, donec ad formā mellis currētis reducat, & in ea lana vel corum vehementer contortū in figuram digiti infundatur, & supponatur frequenter ante coitum. Trochisci ad idem fieri possunt ex eisdem, quorum vnum mulier recipiat omī die in ieiunio cum vino veteri, alb. aromatico. Suppositorium aliud ex eisdem sic fit. ℞. balsami. 3. f. xylobalsami, carpobalsami. añ. 3. vnum, seminis sizeleos, peoniæ. ana. drachmam vnam, terantur & cribellantur, & conficiantur cum oleo rosæ. sufficienti, in quo dissolutus sit muschus, & fiat formæ, sicut ossa dactylorum, & supponantur. Suffumigium fit ex carpobalsamo, spica nardi, vel galliæ musc. vel alia præ muscata: & proprie ante horam coitus frequenter. Liqueor ad idem bibendus, fit ex semine hautig, croco, distemperatis cum vino albo veteri claro. Similiter & vinum de corticibus mandragoræ & agni casti in ieiunio. Confectio ad idē quæ comedī in ieiunio, fit ex radice vel semine bautiæ per se, vel quando coquū in vino aromatico cum spica & peonia & gariofil, & pistētur, & incorporantur cū eodem. Suppositorium aliud sic fiat. ℞. ameos, spicæ. añ. partes æquales: terantur, & incorporantur cum medulla ossis cerui, vel vituli, & supponantur cum lana ante horam coitus frequenter. Et similiter coagulū leporis, quando permiscetur cum butyro cocto, & supponātur cum lana: vel stercus vulpis distemperatum cum oleo rosæ. & suppositum cum lana ante horam coitus frequenter: quoniam hæc omnia conferunt a proprietate: vt dicit Ras. in diuisionibus ca. præfenti. A qualitate vero conferens matricem delectando & eius attractiuam

Tractatus nonus

excitando, est cinamomum, & cubebe & aromaticū qñq. Masticetur igit cubebe in ore viri, & cū salua inungatur vir ga tora, & proprie caput: quoniā apud coitum fortem inducit delectationem in muliere, Similiter & pyrethrū eodē modo masticatum, sub minori tamen quantitate, q̄ cubebe: quia faceret pruritū. Similiter & pillulæ factæ ex cinamomo, cubebe, zinzī. spica, gummi arabico, ana. dragmam vnam, ambra, muschi, ana. granum vnum, tritis & incorporatis cū vino aromatico, vel aqua, in qua gummi arab. fuerit dissolutū. Ipsæ nāq; masticatę in ieiunio, et inunctæ super virgam hora coitus fortem inducunt in muliere delectationem. Idem facit oleum de lilio, vel de spica, in quo pos. cubebe, aut cinamomū fuerit dissolutus & per dies aliquot repositus, donec olea virtutem rerū assumpserint, si cum eis apud coitum virga liniatur. A qualitate vero confectis masticæ exiccando, & eius retentiā roborādo, est omne calidū siccū cū aromaticitate non mordicāte: sicut sunt balnea styptica, & fomētationes, quas diximus in methodo et empericis euidenter. A qualitate vero & proprietate conferens atq; omnium vltimum est, succus peonię masculi vel foemellæ mixtus cum puluere seminis eiusdem: & supponatur continue diebus quinque post menstruum purgationem: & post hoc fiat coitus modo & ordine supradictis. Experimentum completum est, vt mulier purgetur ante tempus menstruum cum apozimate quod sic fit. ℞. myrobalanorum inderum, kebulorum, emblicorum. añ. 3. vnam ros. rub. 3. f. decoquantur omnia in lib. tribus aquæ, donec medietas consumatur: tunc coletur, & in colatura addatur zuccari ros. 3. i. detur totum ante diem cum reite ratione dupla vel trina ante purgationē menstruum post purgationem balneetur mulier quinque diebus vel sex in aquis

stypticis: sicut est aqua decoctionis ros. balastiarum, gallarum, myrtillorum, pecniæ, & similiū: & hora qualibet post balneum exiccetur vulua cum lintheo: Et supponatur lana infusa in balsamo, in quo dissolutus sit succus peoniæ, vel puluis seminis peoniæ: vel in oleo rosar. in quo dissoluta sint grana, 12. muschi. & grana 12. ambra: vel supponatur aliud ex predictis. Et sumat per superius omni die in ieiunio per mensem integrū, vnum ex trochiscis supradictis: vel sumat 3. duas pulueris facti ex semine sizeleos & ameos. añ. par. æquales. Et post hæc omnia coeat hora cōperenti, & modo, & ordine supradictis, & concipiet si per artem fuerit possibile quocunq; modo, & filium generabit.

Canones. Remedia localia in empericis iam dicta melius operantur, si post menstruum purgationem completam exhibeātur, & proprie quatuor vel quinque diebus primis: quoniam tunc natura corpus mūdauit, & ad opus naturale præparauit: licet omni alio tempore videātur aliquantulum conferre. Affirmat Rasis in diuisionibus, q̄ mala complexio humida spermatis vel sicca non potest prohibere generationē, nisi parem inueniat in menstruo mulieris: tunc enim fortis fit atq; vltimata eius malitia: propter quod ait Galenus in commento illius aphorismi secunda particula: Quibuscumque iuuenibus existentibus &c. q̄ omnis mala complexio quando vltimatur, destruit actum propriæ virtutis. Afferit etiam eodem lib. ca. de sterilitate: q̄ quandoq; generatio prohibet in viris & mulieribus absq; aliqua causā: hucusq; dictarū, primo ex proprietate, quæ est in spermate vel menstruo: sicut est disposicio arboris non fructificantis. Vbi sciendum, q̄ proprietates siue forma specifica est duos generis: vt docet Auic. 1. cañ. scñ. 2. ca. de eo qd comeditur & bibir. Et

enim in quibusdam forma substantialis, ut in quibus operatio ab ipsa proveniens, omnibus inest individuis, verbi gratia. Omnis adamas attrahit ferrū: & omnis salix est sterilis. Nullum namq; accidēs inest omnibus individuis, nisi propria passio: quia accidentia communia materiam consequuntur: quæ diversificatur in diuiduis, passio vero formā. In quibusdā vero proprietas est forma accidentalis, utpote in quibus operatio ex ipsa proveniens quibusdam inest individuis sue speciei: quibusdam vero mimi me, ut quidam homines abhorrent caſeum, qdam vinum. Et si quidē sit forma substantialis, non est forma quæcumq;, quia nō est forma animati secundum q; animatum, sed est forma mixti, in eo q; mixtū. Similiter si sit accidēs, nō est quātitas vel relatio, sed quantitas, & non quæcumq;, sed vel complexio naturalis vel dispositio consequens complexionē innatam: Et hoc secundū est verius, quoniam est naturalis potentia aliquid faciēdi vel patiēdi de specie qualitatis: propter quod ait Avicē. lib. suo de virtutibus materialibus tractatu. i. capite. proprietas est virtus quædam mixtis reperiata corporibus, quate agit operationes in suetas, & de quibus miramur.

Prognosticatio. Sterilitas non recipit curationem, quoniam proprietatis non habet cōtrarium. Item si sterilitas aut difficultas impregnatiōis fuerit propter verrucam, vel apostema durum vel cancerum in matrice, non curatur: quia causa remoueri non potest. Item si fuerit propter fluxum menstruorum assiduū, vel retentionem, curatur per eorum curam. Item si sperma viri fuerit proiectum in aquam claram & superpernatet, non fructificabit, similiter neque si liqueſcat: quoniam sperma gigniū oportet ut sit densum, grossum, gibbosum, ut dicit Hippo. in libello de natu

ra ſætus. Item si vulua fuerit ſemper tumida, lubrica, mucosa, difficiliter cōcipiet, propter cōtentiā defectū. Quod si conceperit, ex omni leui causa abortiet: ideo caueat a ſtatione multa & a ſaltu & vociferatiōe forti, & a cibis vniuersis, & rectificet cum exiccantibus. Itē si matrix fuerit frigida, deſa, compacta non concipiet. Vnde Hippo. 2. particul. apho. Quæcumq; frigidas & denſas habent matricēs, non concipiunt. Itē si frigida & nimis rara, non concipit. Item in eodem: Si non conceperit in vtero, & velis ſcire ſi, concipere poſſit: cōtegās eā veſtimentis, fumiga deorſum cum aromaticis, & si quidem tranſierit odor per corpus ad os & nares, cognosces, quod per ſe non generat. Eſt ergo culpa viri: quod quidem verum intellige. quantū ad impedimentum, quod fit ex oppilatiōe vel ſtrictitudine venarum in matrice, ſed ne quāq; ex mala complexionē vel proprietate. Item dicunt alij, quod si vterq; cōiugum minxerit ſuper lactucam recentem, ex illo fit ſterilitas, cuius vrina exicauerit lactucam: quia in ipſo eſt mala complexio parens.

De impediētib; impregnationem & facientibus abſorſum. Cap. III.

Istud capitulum licet repugnet omni legi, eſt tamen neceſſarium ad artem complēdam, & vtile propter debilitatem pregnantium. Mulier namq; si ante tempus pubertatis quod eſt annus. 14. vel circa id, conceperit vel debilitata fuerit chronicis agilitudinibus, vel gracilis, vel viro non proportionata: aut abortiet, aut hora partus ſuccumbet, & morietur cum ſætu. Vnde Hippoc. 4. particul. aphor. Quæ propter naturā tenues exiſtētes cōcipiūt, abortiūt, ante q; craſceſcāt.

Methodus. Iſtud prohibet erectio mulieris poſt coitū velociter,

Tractatus nonus

& saltus eius ad posteriora frequens & fortis curibus dispassis, & descendens a gradibus velox, donec in vuluam descēderit humiditas: & exaltatio capitis hora coitus cum depressione coxarum, vel eius positio super virum, & vir festinet in coitu, & anchas eleuet hora illa, priusquam mulier spermatifet. Conferūt præterea bibita & suppositoria, quod est: quia si mulier ante coitū assiduet per dies plurimos in ieiunio sumere ex se, sauinæ vel iuniperi, verutæ, vel sinapis, vel piperis, vel cepæ, vel alterius acuti, donec odor sentiatur in vrina, non cōcipiet: & si cōceperit, abortiet. Similiter si ante coitum & post supponat oleū de iunipero, vel de salice, vel laterinū, vel laurinū, vel fel vaccinum, vel succū rutæ, vel ab synth, vel sauinæ, vel iuniperi, vel salicis cū lana vel coto infusus in aliquo eorum, & in vuluam bene profundato. Similiter etiam confert hora illa supponere aquam decoctionis azari, vel colloquintidæ, rubæ tinctorum, aloes, scolopendriæ, tamarisci omnium simul, vel quorundam. Confert præterea suffumigatio post coitū immediate ex myrrhâ, serapino, nuce cypressi, posito quolibet eorum super carbones, & recepto fumo calidissimo per trajectorium intra profundū vuluæ, donec senserit lassionē. Similiter & impositio salis gēmæ, vel niri, vel aluminis lameni, factis ex eis formis oblongis tanq̃ digitorum. Confert etiam omni die in ieiunio potare p̃ dies plurimos ante coitum succū rutæ, vel iuniperi, vel sauinæ, vel salicis, vel aq̃ decoctionis azari, apij radic. leuistici, sauinæ, ireos, granorum iuniperi, rub. tinctorum, & similibum: vel aquam salitā plurimam. Valet etiam, si vir vnixerit apud coitum virgam totam, & proprie caput eius ex succo iuniperi, vel rutæ, vel ex aliquo prædictorū: & cum eis dirigat virgā in vuluam

Emperica. Electuarium sublime, quo similiter vtatur omni die in ieiunio per mensem vnum ante coitum, & non concipiet, vel abortiet secūdo mēse vel tertio. ℞. granorum iuniperi, granorum sauinæ, piperis nigri, añ. 3. i. rutæ sicca, pullegij, mētastris sicci, añ. 3. 6. acori, azari, scolopendriæ, tamarisci rub. tinctorum. añ. 3. 2. apij, carui, ireos, añ. 3. i. terantur omnia, & conficiantur cū succo caricarum coctarum, & expressarū, vel cum melle: detur ex eis ad modum auellana cum vino decoctionis saluæ, vel alio liquorum supradictorum. Pillulæ ad idē. ℞. myrrhæ, piperis, pyrethri, aristologiæ rotundæ, seminis cicutæ, centaureæ, añ. part. eguales: informentur pillulæ sicut cicer cum succo prassij, vel mētastris: & dentur omni die tres vel quinque in ieiunio. Sciēdum præterea, quod licet oīa remedia dicta sint fortiora & in arte humana completa: cautijs tamen est cū talibus non coire, vel in eas sperma non proijcere, q̃ prætextu talium periculum incurrere. Quia est possibile aliquod sperma tantæ virtutis reperiri, vt a nullo prædictorum valeat impediri adeo: vt et sperma proiectum in balneum aquæ dulcis tepidæ a malis hominibus reperiū sit mulierem impregnasse, quæ sedebat in eo: vt dicit Auerr. 2. colliget, quoniam a proprietate matrix attrahit sperma, cui difficile est repugnare.

Canones. Omne calidū acutum mor dicatiū confert in hoc casu qualitercumq̃ fuerit applicatum: quoniam sanguinē amaricat menstrualement, & naturæ odiosum reddit, & eius operationibus displicentem, si per interius sumatur: & sperma gignitiū inficit, si per inferius ponatur. Sciēdū etiam, quod ista quatuor: vrinæ prouocatio, menstruorūeductio: conceptionis prohibitio, & abortus inductio: non differūt nisi secundum magis & minus ordine iam notato, Ideo

dicta in ea cuiuslibet eorū subseruitur cui
libet ipsorū. Solicitandū etiā in vsu præ
dictorū: quoniam si per superi⁹ exhibita
fuerint, epar fortassis & splenem inflā
mahunt, & si per inferius, vuluam vlce
rarent. Cum ergo aliquid eorū appa
rare coperit, vsus moderet̃, & ilico acci
dētibus succurratur. Flebotomia etiā
fortis post conceptionem, & proprie de
saphena pedis, vel de basilica donec ex
ea mulier debilitet̃, facit abortum, quia
nutrimentum subtrahit embryoni: qua
re debilitatur & moritur, & matrici red
ditur onerosus, ita vt adieus cōsurgat ex
pulsionem. Vnde Hippoc. 4. part. apho.
Mulier in vtero habēs flebotomata ab
ortiet: sed magis, cuius maior est fetus.
Farmacia similiter fortis & acuta pri
mo vel secundo vel. 3. vel. 8. vel. 9. men
se exhibita abortire facit: ligamenta foe
tus dissipādo. & sanguinē cōquassando.

Prognosticatio.

Dicit Hippoc. 4. par.
aphor. Mulieri in vte
ro habenti ab aliqua acutarum ægritu
dinū accipi, mortale, supple vt plurimū,
& proprie, si feb. sit fortis, aliter vero mi
nime. Idem in eodem. Mulieri in vtero
habenti si multum venter fluat, suspitio
est abortiēdi, quod intellige de q̃libet flu
xu forti durante & proprie in corpore sic
eo. Itē in eod. mulieri in vtero habētī si
subito mamillæ graciles fiant: abortit.
Itē, Mulieri in vtero habētī si altera ma
millæ gracilis fuerit geminos habētī, al
terū abortit: & si quidē dextra gracilis fi
at, masculū: si vero sinistra fiat, fœmi
nā. Itē ibid. quæcūq; corp⁹ moderate ha
bentes abortiūt secundo aut. 3. mēse ips
eolydones muscillaginibus plenæ sunt,
& nō possunt retinere p̃ grauedine fœtū,
sed abruptuntur. Item mulieri in vtero
habenti tenasmon innatus abortum fac
it. Itē idē in eod. Mulieri in vtero habē
ti lac ex mamillis multū fluens, fœtū si
gnificat debile: si ¶o ybera dura fuerint,

sanū significat fœtū. Itē mulieri in vtero
habētī si purgationes exeāt, impossibile
est fœtum esse sanū, quod vtr̃q; intellige
tribus saluis cōditionibus. Prima, vt flu
xus menstruorum sit plurimus. Secunda,
vt mulier sit gracilis macra, nō robusta:
Tertia, vt sit post tertiu mensem: qm̃ pri
mo & secundo mēse possunt adhuc men
strua periodice fluere: qm̃ fœtus parvus
existens adhuc modico indiget nutrimen
to. Mulier præterea q̃ semel passa est ab
ortum & proprie difficile, timorofum: se
cundo non concipit, si conceperit ex omī
leui causa denuo abortit: velut sunt salu⁹,
vociferatio, aut frequens statio: similiter
& vsus ciborum lubricorum.

De facilitantibus partum & edus centibus secundinā. Cap. V.

Residet fœtus in matrice cruribus
attractis versus vmbilicum, & fa
cie velata manibus suis, quasi in
figura spheræ cōpressæ, ita vt caput ere
ctum habeat versus caput mulieris, &
faciem ad anteriora mulieris. Extat autē
tribus panniculis inuolutus, quorum pri
mus est totum fœtum, & alios duos pan
niculos inuoluens ad defendendum a su
perfluitatibus pessimis sanguinis men
strui, quæ neq; pro materia generatiōis,
neq; augmentationis, neque nutritionis
aptæ fuerint, sed stantes inter matricem
& panniculum expurgantur hora par
tus, simul cum fœtu. Et hic pāniculus di
citur secundina: quoniam est necesse, vt
apud horam partus scindatur, vt exitū
fœtus assequatur. Secundus vero panni
culus est velamen fœtum cooperiens ab
vmbilico infra, quo vrina colligitur, &
vsq; ad horam partus retinetur, ne sua
nitrositate corrodat embryonem, & no
minatur bilis, neq; indiguat panniculo cō
gregante feces: quoniam fœtus quādiu stat
in aluo ventris, non nutritur cibo solum
digesto in stomacho matris, imo sola

Tractatus nonus

digestione secunda & tertia preparato, quæ est epatis et venarum: & hæc fit per venam umbilicalem ortam ab umbilico foetus, & transeuntem per secundinam ad circumferentiam matricis omniquaque, ubi ramis eius cum ramis venarum ab epate mulieris procedentibus habent orificia colligata, quibus sanguinem purissimum ab epate mulieris ad epar embryonis cursu recto traducunt: verum & si superfluitates primæ digestionis aliquæ congregentur in embryone, ipsæ tamen cum sint modicæ, cum diriguntur industria naturæ ad instantinam embryonis, ut ex ipsis assuescant. Et per hoc accidit, ut foetus quandoque illico post partum feces egerat liquidas citrinæ. Tertius autem panniculus, qui altus dicitur, est partes embryonis super umbilicum curvum voluens, mollis atque tenuis: ut membra foetus fragilia non opprimat, sed a duritie secundinæ defendat, & ne sudores sordidos imbibat embryonis. Appropinquante vero hora partus, & perfectio embryone, sentit ex ipso matrix dolorem gravatium ordine naturæ totum regulantis: quare ipsum obvoluit, ita ut caput ad os matricis decidat, & facies embryonis ad dorsum mulieris convertatur: quoniam hic est modus leuior foetum educendi, scilicet capite primo ad exteriora propulso, & omnis alter difficilis est & innaturalis.

Methodus. Hanc igitur parienti horam, cum mulier ex 40. septimanarum numero nouerit partum vicinari, intret omni die aliquoties ante horam partus per mensem integrum, balneum aquæ dulcis, ut in qua decocta sunt mollicatua: sicut sunt malvæ, violæ, & althea: non tamen prologetur in eo sessio. Iste namque mensis est tempus parienti secundum suam totalitatem: quoniam in ipso est embryo completus, proprie tamen circa finem. Et semper cum balneum exierit: ungat spinales dorsum atque ventrem totum

ex oleo nardino, vel chamomillino, vel de lilio. Et nutriatur hora illa cibus mollioribus: sicut sunt pulres sorbiles, & iura pinguis. Cum autem hora partus iam aduenierit, non multiplicet reuolutiones de latere super latus, sed super lecto eleuato sedens extendat pedes suos, deinde erigatur subito aliquoties super eos: & tunc humectetur os matricis omniquaque ex oleis tepidis prædictis, vel ex adipe anatis, anferis, & gallinæ: vel ex muscillag. fenigræ. se. lini, altheæ, quoniam omnia ista dolorem rupturæ mitigant leniendo. Et si difficilis fuerit scissionis secundina, scindat eam obstetrix ungibus suis, aut cunctello paruo. Quod si partus sit difficilis propter virtutis expulsiuæ debilitatem, vel embryonis grossitiem lacerantem in quibusdam aluum, ut anus & vulua efficiantur vna via: dentur in potu trochisci de myrrha cum aqua decoctæ rutæ, iuniperi, & sauinæ: quos diximus de restrictione menstruum. parag. Empetrica. Vel detur in potu aur. i. myrrhæ cū. 3. 4. aquæ decoction. rutæ: vel detur in potu aqua decoction. rutæ, iuniperi, fenigræci, dactylorum, & carica, quoniam prouocant et humectant. Et si virtus sit debilis ex dolore, detur in potu galliæ musc. 6. par. 3. i. dissoluta in vino aromatico vna vice post aliam: vel detur aqua carnis, vel vinum purum, prout maxime delectatur. Et suffumigetur cum myrrha, opponace, vel castoreo recipiendo fumum cum trajectorio in profundum vuluæ, quanto calidiorem poterit sufferre. Et fiat sternutatio cum condisi, vel pisere, vel euforbio: quoniam statim eiciet foetum & secundinam. Si vero partus adhuc magis fuerit difficilis, & foetus moriatur ex strictura, vel a principio mortuus fuerit: quod cognoscet: quia mulier non sentit eius motum: & dum reuoluitur a latere super latus, sentit quasi casum lapidis de loco ad locum: tunc fortioribus indigemus: quam non

solum virtus expulsiva, quæ est in matrice, verberia leuitas embryonis viui partum facili efficit: quare datur in potu trochis, de gumis positis ibidē, et suffumigetur mulier ex eis. Ipsi namq̃ statim foetum siciunt viuū, & mortuū, & expellunt se cundina. Et sedet mulier quasi continue postq̃ foetum nouerit mortuum in aqua decoctionis mentastri, sauinæ, ruta, calamenti.

Emperica. Dicit Auicē. 3. canō. scē. 21. de educatione foetus & secundinæ: q̃ suffumigium foetum ad os & nares exhibitum, aromaticum vero apud vuluā a proprietate matricē deorsum trahunt, & foetum educunt: præter solas ungulas asinorum, quorū licet fumus sit foetidus: a proprietate tamen habet, vt vuluæ applicatus foetū extrahat, & secundinā: quare confert suffocationi matricis. Item dicit Ras. in diuisionibus præsentia. c. q̃ radix bothormariæ, i. cicla minis a proprietate partū efficit facili, si sicca ligetur hora partus super coxā mulieris. Sed dicunt alij, q̃ si collo appendat̃ hora coitus prohibet conceptionem: qm̃ matricem ad se trahit omniuaq̃. Item si post partum fiat exuberās san. hæmorhosaia, restringat̃: vt docuim⁹ de fluxu menstruoꝝ. Si vero menstrū retinere, vt diminute purgaretur: tūc prouocetur, vt suo scrib. ea. Si vero dolor fortificetur: dentur in potu vicibus pluribus. 3. 2. triseræ magnæ cū vino calido, vel aqua decoctionis athanasie: & ex ea fomentetur vulua cū lana vel coto imbibito frequenter. Quod si non suffecerit, narcoticon donabis: sicut trisera magna data cū aqua deco. mādragoræ vel iusquiami: ne forte dolor prosternat virtutem.

Canones. Omnia prouocantia fluxum menstruorum cum fortitudine, conferentia sunt præsentia. quoniam virtutem retētiuam debilitant, & expulsuam confortant in matrice.

Prognosticatio. Dicit Hippoc. 4. par. aphorif. Mulieri quæ a matrice molestat̃, aut difficulter generat̃ sternutatio supueniēs, soluit ægritudinem siue per se, siue partē. Apostema accidens in matrice tempore impregnationis, est mortale. Si manus vel pes primo exierit vuluum, malum. Oportet enim in partu salubri caput embryonis, vt primo egrediaf̃, vel man⁹ ambæ super caput extensa: quare cum obstrictrix sitū eius peruersum cognouerit, manibus vtriq̃ pro posse transformer. Itē si retineatur secundina post partum, neque p se, neq̃ per artē exierit: vel si partus ultra. 40. septimanas se tardauerit, fiet vt plurimum mortale. Item si menstruum retentū fuerit, vel diminute purgatum, hydropisim, vel molam, vel suffocationem matricis inducit. Item si sanguinis fluxus exuberans fuerit, neq̃ restringi possit, mortale. Item si dolor rupturæ intolerabilis fuerit, mortale. Item partus est difficilior in foetu mortuo q̃ viuo: propter qd̃ abortus est difficilior, cum in eo neq̃ matrix, neq̃ foetus, neq̃ tempus regulariter operentur. Item dicit Auicenna. 3. canō. ca. de generatione embryonis: quod si partus fuerit in mense se primo: possibile est foetum saluari in esse viuo: Si vero in mense octauo, necesse est, vt moriatur, quod est: quia sicut inter dies, sunt dies septimus & nonus cretici & beneuoli: dies vero sextus & octauus perniciosi. Similiter & in mēlibus reperitur: quod totū sit ex influentia corporū supercoelestium: vt paret. 3. de creticis diebus, & proprie planetarum.

De exitu matricis vel vmbilici. Cap. VI.

Accidit quādoq̃ in mulieribus, vt earū matrix inferiora petat, adeo vt extra vuluam pendeat, euidenter: similiter & vmbilic⁹, & proprie post

Tractatus nonus

partum: quoniam a cōcauo matricis originatur. Fit autē ex aliqua quatuor causarum, Prima est apostema in matrice. Et signa eius atq; curam dicemus suo capi. Secunda est partus lacerans vulvam: ita vt quādoq; anus & vulua coniungantur, & debilitent matricē. Tertia est mollificatio matricis & ligamentorum atq; carniū eius ex mala complexione frigida & humida proueniens. Quarta vero est causa primitiua, scilicet casus et percussio super dorsi spondiles aut sumē: Similiter et coitus cum viro, cuius virga grossa & longa est & lædens fuit: Et hic exitus a quibusdam appellatus est precipitatio matricis. Signa eius patet ex re ipsa atq; infirmi relatione super causa.

Methodus. Cura eius eadem & cōmunis est ad oēs causas: quæ est, vt a principio si necesse fuerit, & proprie in causa humoralī digeratur, & purgetur flegma: prout docuimus cā. de fluxu menstruorum. Et confert ad hoc bene dicta laxatiua cum virtute & proprie apud necessitatem: post hoc vero balneetur, & vaporetur, & fomentetur ex aq; calidis stypticis, qualis est aqua cisternæ, quæ sic fit secundum Ras. ℞. nucis cypressi, costi, spicæ, celticæ, spicæ nardi, myrtihæ, ro. mentæ, balaustiar, corticum granator, cupullar, gladiū, sumach, añ. 3. i. mēspilor, sorbor, prunor, immaturos, si tēpus fuerit, añ. li. f. pistentē grosso modo, & conquassent, & bulliāt in aq; pluuiali sufficenti, & fiat encatisma. i. balneū ab vmbilico infra in aq; calida: & cū exierit vuluā, diligenter exciet cū panno albo lineo molli: & spergat super eam puluere cribellatū. ℞. olibani, gallass, balaustiar, antimoni, acatix, aluminis, nucis cypressi, añ. par. æquales. & si volueris: adde boli ar. mīmīx, cupullar, glandiū, ceruse, masticis dragagati, añ. quantū ex p̄dictis: & cū p̄anis calidis firmiter fasciet. Si vero matrix egressa fu-

erit, reducatur primo manibus calidis ad interiora, Quod si propter duritiē nō introierit: mollificet cū vino arc matico tepido, in quo butyr fuerit dissolutū: dein de reducat, & ponātur vētosæ duæ, siccæ super duo inguina: & iaceat mulier capite depresso, et anchis exaltatis p̄ dies plurimos: & emplastre loci cū puluere iā dicto donec confirmet. Quod si laceratū fuerit institiē, qd est inter anū & vuluā, cōsuatur cū filo sericeo forti quatuor vel quinq; foraminibus, vt eporter. Si vero vmbilicus solus exierit post partū, sumatur rēta gracilis dura, & inuoluatur pannus lineus mollis sup ipsam, & accipiat pulcritellatus thuris, & conficiat cū albumine oui in modum mellis curtētis, & impleatur ex eo vmbilicus interius, & liniatur exterius, & sic intromittatur. Valet etiā ad hoc puluis supradictus: in alijs fiat, sicut prius.

Emperica. Cōmuniter operātes præter p̄dicta, faciunt suffumigia aromatica superius ex thymiamate gallica mus, alijsa muscata. & similib: Fecunda vero p̄ inferi⁹ ex assasce, pice ligda, capillis capitis, fimo, & similibus. Quoniam a proprietate matrix prosequitur odorifera & fugit horribilia: præterq; suffumigiū ex vngulis asinor, cuius est specialis proprietate matricē ad se trahere, et foetum mortuum educere: licet sit de maxime foetentibus, vt dicit Auicē. 3. cān. fēñ. 21. cap. de educatione foetus vel secundina. In quibusdam etiā & proprie carnositas faciunt encatismata ex aqua frigida sine mora: qm̄ & si frigida necet matrici & ano & oibus nervosis particulis: brevis tamen in eis mora plus est iuamēti p̄ antipistalim constringēdo, q̄ nocuenti p̄ se alterādo: quē admodū & in tetano. Itē ordinē dixit stypticā ex carnibus laudabilibus assis, & piris, cotoñ. & ovis asf, & tortellis, & etiam ex vino ru. pontico in causa frigid, a vel cū aqua

extinctionis calyblis vel lapid. igniti in
causa calida: & regimen subtilietur, q̃a
frequens motus ad affellationē & vrinā
plurimum retardat curā. Ex electuarijs
conferunt diacytoniten, diamargariton,
trifera magna, in causa frigida, sed dia-
draganti, & diarhodon abbatīs, zuccari-
ros, in causa calida. Vnguentum stypti-
cū sic fiat. ℞. mūmix, balau. alu. nucis
cypressi, boli arm. thuris, lithar. galbani,
bdellij, sarcocollæ, masticis, san. dra. añ.
3. 2. terantur & dissoluantur oīa ad ignē
in calida cum oleo ro. vel myrtino, & ce-
ra sufficienti, & incorporentur perfecte:
& pōt addi cerussa, si dolor fuerit fortis.

Canones. Quoniam anus & vulua ex
natura sua sunt frigida, &
orificia viarum expulsio. per naturam
ad opus hoc fabricata, consequens est vt
dicta cap. de exitu ani præsenti ca. sub-
limiter suffragetur. Similiter & cum vtri-
usque exitus sit per essentiam mollifica-
tio, necesse videtur, vt cura paralytis cō-
ferat iuuamentum.

Prognosticatio. Est eadē cū progno-
sticatione exitus ani.

**De signis impregnationis &
sexus foetus. Cap. VII.**

Signa impregnatiōis certa, prout est
possibile in arte humana, sunt octo:
vt dicunt Raf. & Auic. ca. præsenti.
Primum est vehemens adhærētia vuluæ
sup virgā, & eius corrugatio apud coitū
gignitiū. Secundū est siccitas vuluæ post
talē coitū maior debito et solito: ita q̃ in
ea non reperitur humiditas: quēadmodū
accidit labijs oris & linguæ post cibum
comestū in fame plurima. Et si 4. die vel
5. antecessit purgatio mēstruorum regu-
laris atq; cōpleta, verior erit tua signifi-
catio: quoniā talis purgatio disponit plu-
rimum ad cōceptionem. Tertium est, q̃
accidit mulieri pigris, & tarditas, et de-
clinatio ad somnum. Quartum est, vt si

obstetrix immiserit in vuluā digitum lō-
gum, reperit os matricis adeo constructū:
vt neq; stylus ingredi posset sine læsione:
vt dicit Gal. in de virtutibus naturalib.
Quintū est, quādo post dies aliq̃t & pro-
prie post duos mēses, vel circa id, retinen-
tur mēstrua, & incipiūt mamillæ ingros-
sari, & papillæ earū denigrari: licet retentiō
mēstruorū quibuscūq; accidat statim a prin-
cipio, & proprie mulierib; siccis & exan-
guib;. Sextū ē, q̃ post duos mēses vltres
aduenit appetitus corruptus & nauſea. Se-
primū est, q̃ post mēses illos fit scoba &
pānus i facie, q̃ ē coloris mutatio: quēad-
modū a sole vel igne. Octauū est vrina
subtilis propter viarū oppilationē alba
aquosa in mulieribus frigidis, & proprie
in principio subcitrina i calid. & proprie
in processu cōceptiōis in sūmitate, cuius
est nebula: & est eius liq̃r diuersi coloris,
sicut iris. In medio eius est sicut corū car-
minatū, et cū cōmouet, turbat minie: sed
q̃to magis processerit impgnatio, magis
rubescūt et turbant. Et est q̃ncp, cū in vtri-
nis pgnantiū appebūt q̃dā granula ascē-
dētia & descētia alba, gracilia: sicut ato-
mi: vt dī, Auic. cañ. feni. 2. ca. de signis im-
pregnationis ex vrina. Et prima q̃dē si-
gna quatuor sunt propria, certa atq; effi-
cacia, q̃ nō faciūt errare, cū siml' fuerint:
reliqua vero dubia sunt cōmunia et pro-
babilia. Signa foetus masculi sunt: vt dī.
Hīp. 4. par. apho. bonitas coloris in facie
mulieris iuxta debitu et solitum, & par-
uitas appetitus coitus: licet omni mulieri
accidit ardor, & pruritus titillosus in vul-
ua post impgnationē ex caliditate foeto,
& siccitate vuluæ: q̃d impieri credūt desi-
deriū, simul & ingrossatio mamillæ de-
extræ amplior, & papillæ eiusdē rubifica-
tio, & sensatio grauitatis i latere dextro,
& oculos rubor, & leuitas ad motū. Si-
gna foetus fœmini sūt, signa cōtraria, q̃ sūt
pānus faciei plūmus, vlt color pallidus seu
plūbeus, et appetitū ad coitū, et iustatio ma-

millæ sinistræ amplior cum denigratiõe papillæ suæ, & multitudo desideriorum malorum & fastidij & grauitatis in latere sinistro, & fluxus sanguinis ex nare sinistra, & plumbeitas oculorum cum pigritia ad motum. Signa gemellorū sunt complicatio signorum omnium cum per mixtione granorum.

Emperica. Si mulieri dentur ad potandum sero post cœnam cum vadit dormitum. 3. 2. hydromellis cum. 3. 2. aquæ pluuialis, & senserit per noctem torsionem circa ventrē, & proprie infra vmbilicum, tunc cœcepit: si vero nō, tūc non concepit. Et opoter, vt hydromel cōficiatur ex part. 4. aquæ dulcis & part. 1. mellis crudi mixtis, neq; bullitis: vt dicit Galen. Istæ nāq; torsiones proueniūt ex eo, quod matrix corrugata super sperma minoratur secundum longum, & in: grossatur secundum profundum: quare comprimit longaonem, ne ventositates egredi valeant, qui surgūt ab hydromelle: nec sit mulier famelica, quando bibit melicratum: ne forte calor inflammatus carminet ventositates. Vnde Hippoc. 5. part. aphorif. Mulierē si vis scire, an conceperit, melicraton cum vadit dormitū, da ei bibere: Et siquidem torsiones habeat circa ventrem, concepit, si vero non, non cœcepit. Istud tamen intellige salua tribus conditionibus. Prima ne sit apostema in intestinis, vel vlcus, vel humor acutus: secunda vero, ne sit venter constipatus & stercore plenus: tertia, ne mulier exercitata fuerit per diem, sed tempe rate viuens: tunc nanq; somnus & quies prædictam ventositatem eleuabunt a ciborum multitudine, & mellis cruditate, & verificat ibidem cōmentator. Dicunt experti, qd purgare mulierē ante tempus menstruorum per. 10. dies, & matricem cum hoc præparare cum emplastris, suffumigijs, balneis & suppositorijs stypticis aromaticis post menstruorū purgati

onem, & tunc cum ea coire, & ordine cōuenienti, & apud effusionem spermatis anchas mulieris ad se firmare cum inclinatione quadam super laus dextrum, facit ad masculi generationem, super sinistrum ad foemellæ: Et hæc omnia scripsimus pro posse cap. de facientibus ad impregnationem.

Canones. Affirmat Galenus in commento illius aphor. 5. part. mulier siquidem masculū &c, quod nulum singulare signorum prædictorū est omniquaq; certum. Potest nanq; splen mulieris esse calidus magis quam epæ quare natura, quæ reliqua ibidem. Cōcluditur ergo qd hæc signa pro certis non sunt habenda, sed soli deo est certum signum notum: quare medicus in huiusmodi retineat suum præsagium, donec signorum certitudo cum multitudine clarescat. ¶ Sciendum præterea, quod gemellorum conceptio fit hora vna vt plurimum coit apud coitum, in quo spermatis fortitudo, & multitudo gradatim impellitur ad matricem: velut buccella in glutitur post buccellam: & proprie cum recipitur in cellulis diuersis, in qbus abundantiam reperit mēstrui sanguinis at trahendi. Impregnationem fieri super impregnationem est possibile, licet raro, & hoc a prima die conceptionis vsq; ad diem, 40. ad plus: quare & talis fiet ipsorum exitus apud partum, si alterum ipsorum non acciderit orbari. Gemellorum autem multiplicatio spermum numerū non transcendit: quoniam & plures non reperiuntur cellulae seu interceptiões matricis notabiliter distinctæ, quarum tres sunt in latere dextro, & tres in sinistro, vna vero in medio: verumtamē licet hoc mo sit animal polygonum, est tamen vt plurimum vnū foetum generans ex nobilitate suæ complexionis, quandoq; vel 2. vel tres præter quod orbantur. Quod si hunc numerum transcendit: perparum

est, quin omnes vel plures orbentur vel moriantur.

Prognosticatio. Huius capituli, est prognosticatio cap. de abortu.

De mola & inflatione matricis. Cap. VIII.

Accidit quandoq; mulieribus post retentionem menstruorum plurimā, vel aggregationem spermatis, & castitatem longam: ut ipsarū vētres magnificentur, & surgunt dispositiones omnes, quæ sunt in pregnante. Et siquidem hoc fuerit a materia humoralis mola dicitur. Si vero a ventosa, nuncupatur inflatio matricis: Signa aut ipsius sunt signa discernētia inter ipsam & impregnationem, quæ sunt: quoniā in hac passione est magnificētia ventris cum mollificatiōe mamillarum: & quoniam post menses quatuor non sentitur motus embryonis omnino, vel si sentit aliquid, sentit quasi casum lapidis de la. ere super latus: & quoniam ventris grauitas est in directo lūminis, magis quam apud aliquod laterum: quorum omnium contraria dispositio reperitur in pregnante. Certius autem signum est ex post apparentibus: ut quia post menses nouem nō parit, sed remanet sicut est: vel si parit, parit post laborem plurimum frustum carnis durissimū, cui non est forma generationis ex coagulatione vehemēti materiarum prædictarum: vel forte emittit sanguis niger grossus, vel ventositate quāritas immensa: & tunc residet venter & sanatur.

Methodus. Curā eius est cura retentio nis menstruorum, quā diximus: & si non suffecerit, gradatim perueniatur ad illa, quæ prouocat abortum quē etiā iam diximus ea. proprio supra. quoniam hæc passio sanatur, non nisi calidis acutis subriliantibus & penetrantibus cū

prouocatione. Quod si materia vntosa cognoscatur ex loci motione, & sonorū raucorū multitudine, ministrentur pinterius & exterioris carminatiua dicta cap. de coli. parag. de coli. ventosa, &c.

Emperica. Accidit plerūq; mola post mulieris sanguineq; coitum cū viro frigidi spermatis: quare attrahitur sanguis menstruus plurimus ad locū generationis, & in rem duram carnosam cōdensatur, pter qd a spermate valeat regulari: & sic deficit virtus informatiua spermatis eiusdē: & apud horā partus, vel prius egreditur fœtus orbatus. Accidit præterea mulieribus frigidis frequenter inflatio matricis post impregnationē & partum: quoniā cū matrix & mirach fuerit p totum tēpus impregnationis ex pāsa, remanet post partū dura & inflata, sicut prius: nisi cū emplastris calidis & vaporantibus succurratur, quæ fiūt ex ruta, origano, sinap. nigella, cymino, saluia, serpyllo & similibus.

Canones. In cura huius passiois oportet, ut obseruetur ordo: primo namq; exhibeātur calida subriliatiua p superius in potu. Post dies vero. 14. vlt circa id, applicētur calida mollificatiua in emplastris: Deinde post dies. 4. vel circa id, fiat flebotomia de saphena pedis, si corpus sit carnosum, & exhibeant acuta prouocatiua p inferius: & hæc oīa scripsimus ea, de retentiōe mēstruorum. Quod si pdicta oīa nō suffecerint: balnetur mulier diebus plurimis ab vmbilico infra in aqua decoc. malua, altheæ, fœnigræci, rutæ, sauinæ, iuniperi, mentastri, nasturcij, & ante introitum balnei per duas horas detur vnus ex trochiscis de myrrha, vel de gummis, quos diximus capite eodem. paragrapho. Emperica. vel puluis dictus ibidem cum vino albo veteri amaro, & egredietur quod intus est, si deus voluerit.

Prognosticatio. Mola si antiquata fuerit, vel post remediorum rationabilium administrationē nihil exierit: materiā grossā, difficilē portendit. Mola præterea si antiquetur, hydropisim ascitē inducit mortalem. Post molam præterea rarum est, ut mulier impregnetur: & si conceperit, vel abortum, vel morbum foetum parit, propter debilitatem matricis vehementem. Mola difficilioris est curationis quā inflatio: verumtamen inflatio si perduret, curam non recipit, sed remanet per totā vitā. Quod si ipsius malitia vltimetur, hydropisim inducit tympaniten timorofam.

De præfocatione matricis.

Cap. IX.

Accidit quādoque mulieri post retentionē mēstruorū diuturnā, vel abstinētiā a coitu, & proprie si fuerit multi sang., & spermatis, & nubere cōsueta, ut eius matrix gravitatē et lēSIONē percipiēs sensu quodā naturali, quo et omne membrum spermaticū siue carniforme sentit sibi nociua: & si plerumque sensu careat animali: ut patet in pulmone, cerebro, & epatē, & renibus, atque splene: quæ quidem substantia non sentit, sed nisi mediantibus panniculis eorū substantiam & copulentiā inuoluentibus: similiter neque adeps, neque pinguedo, neque aliquid membrū carniforme sentit sensu animali. Matrix autē cum sit membrum nervosum, vitæ rationis sensationū prædictarū nocuementū percipiens in se cōstringitur, & cum materias per deorsum expellere nequeat oppilatione prohibente, conatur sursum eijcere: quare sentit mulier quādam eleuari a summe ventris usque ad os stomachi, comprimitur diaphragma, & prohibetur anhelitus, & fit syncope, & cadit quasi mortua: & tunc non sentitur eius pulsus: neque anhelitus, vel difficile percipit coto subtrili naribus applicato: & quādoque suffo-

catur & moritur: & quāque sanatur post laborem et desperationē: & hanc passionē vocamus matricis præfocationē. Signa eius, sunt signa epilepsia: præter quod mulieri non deficit ratio sua, neque egreditur spuma ex ore, sicut in epilepsia: verum accidit hæc passio subito, & contorquentur membra, sicut in epilepsia. Et omnia signa distinctiua passionum, quibus priuatur corpus sensu & motu, iam diximus cap. de epilepsia: Et certior significatio est, quam ex relatione astantium percipies: scilicet quoniam antecessit retentio mēstruorum difficilis, vel abstinētia a coitu post desiderium intentum.

Methodus. Cura eius est duplex: una est hora paroxysmi, quæ est, ut fricentur plantæ pedum vehementer cum sale & aceto acutissimo, & ligentur coxæ ligatura forti, & fricentur labia vulvæ vehementer cum digito vel candela noua habēte figurā vulvæ inuoluta panis lineo imbibito in oleo nardino, vel de lilio, in quo dissoluta sint tria grana muschi, vel ambra, vel in oleo balsami, & profundentur hæc fricationes, ut tangerent os matricis, & assidue, donec mulier sentiat: Et si non sufficit, sternutatio fiat cum conditi vel pipere: & ponat ventosa magna sine scarificatione super pectine, & vociferetur in aure eius: Et suffumigentur os & nares cum assa foetida, vel pilis adustis: vulva vero cum gallia muscara, vel thymianate. Cura vero alia est ante paroxysmum & post, quæ est, ut prouocent mēstrua pro posse sicut docuimus, & coeat frequenter. Quod si coire noluerit: utatur omni die electuariis & pulueribus sperma diminuentibus: sicut est 3. i. & 5. agni casti sumpta omni die in aqua calida, vel vino lymphato: & alia quæ diximus cap. de satyricali parag. Emperica: et regimē subtiliter in quili & quito pro posse.

Emperica. Dicunt experti quod apud paroxysmū nihil melius repe-

ries: q̄ vt vir cum muliere coeat, & fricationem prolōget, donec resurgat, & moueatur. Afferit præterea Auic. 3. cañ. feñ. 21. ca. de educatione foetus & secundinæ: q̄ proprium est foetidorum sustinēgiorū per superius appositorum, & aromaticorum per inferius hora paroxysmi, matricem deorsum trahere, & eius superfluitates educere, præter q̄ ex vngulis asinorum, quorū specialis est proprietates omniū quacūq; matricē deorsum trahere, & eius superfluitates trahere & mēstrua prouocare, siue per inferius, siue per exterius superius applicentur.

Canones. Non festinetur ad sepulturā talium, nisi post duos dies, vt di. Ras. quoniā potest calor naturalis tanto tēpore in interioribus corporis occultari, & a materiabus frigidis euentari præter q̄ suffocetur, licet exterius anhelitu & pulsu minime valeat deprehendi: post hoc vero tempus nulla visa est suscitari.

Prognosticatio. Mulier si per sternutatoria moueatur, v̄ sternutet: bonum. Vnde Hippo. 4. parti. apho. Mulieri quæ a matrice molestatur, aut difficulter generāti sternutatio superueniēs, bonum. Item si post fricationem vuluæ cum rebus odoriferis, sanguis, vel mucositas effluerit: salubre. Item si nihil phlegmaticum remedium contulerit post diem primum, ipsam derelinquas. Item quantomagis retentio mēstruorū, vel spermatis præcesserit antiquata, tanto periculosior afflictio fiet. Item magis accidit hæc passio mulierib; sanguineis, vel flegmaticis ex multitudine materiarum: cholericis vero ex sensus bonitate: melancholicis ex debilitate: & hoc magis in vere vel hyeme, minus aut in æstate aut autumnō. Fit præterea magis corporibus delicatis & otiosis strictas venas habentibus, quā laborātib; cum amplitudine venarum,

¶ De apostematibus & cancro matricis. Cap. X.

Apostema omne fit ex decursu superfluitatum per venas capillares & arterias in spongiosiores membris debiliū, quæ sua quantitate soluant eorum continuum, & sua caliditate alterant eorum complexionem naturalem, & sua substantia virtutem & operationē mēbris desiciunt cum putrescent: verum quoniam matrix est mēbrum solidum, neruosum: raram est, vt materiæ grossæ, frigide in ipsam penetrant, vt plurimum aut subriles, acutæ: quare fit hoc apostema magis ex cholera, vel sanguine, q̄ flegmate vel melancholia. Causa vero antecedens est retentio mēstruorū, vel plethoria corporis totius: causa vero primitiua est quādoq; casus & percussio super alkatim & lumen ventris, vel difficultas partū. Signa apostematis in matrice sunt, feb. continua acuta valde, & pulsus velox, spissus, similiter & anhelitus, & vrina pauca, rubea, vel citrina, et nigredo linguæ cū dolore capitis, & alienatione velut in frenesi: quoniā matrix extat neruis plurimis cerebro colligata. Et certior significatio est ex dolore circa lumen & alkatim dorsi, & ex difficultate egestionis & vrinæ. Ista nanque sunt propria signa apostematis matricis, velicæ, renum & ani: vt dicit Hippocrates quinq; particula aphorismorum: In ano flegmonem patiē. &c. verum quanto calidior materia fuerit, signa fient fortiora: quanto vero frigidior, remissiora. Terminatur autem hoc apostema, quēadmodum vel stomachi vel epatis aliquo trium modorum: aut enim resoluitur, aut sanitur, aut induratur: Et si induratur, aut per congelationem, & hoc est per patum: aut per aduersionem, & hoc est vt multum. Si per aduersionem, aut antiquatur aduasio, & vltimatur,

Tractatus nonus

& cancer appellatur: Aut non antiquatur, neq; vltimatur adustio, & sit apostema durum, vel sclerosis nominatur. Est namq; sclerosis apostema durum, cuius subtile resolutum est, & grossum remanet non adustum vel parum adustū. Cancer vero est apostema calidum, durum, cuius subtile exhalauit, & grossum adustum est in cinerem melancholiam nitrosam conuersum. Et cancer quidem curationem non recipit perfectam, nisi cum abscissione membri totalis, si fuerit membrum possibile truncari: sin autem, membra vicina putrefaciet, & mortem finaliter inducet. Et sic apparet, qd cancer consequitur apostema calidum induratum, verum frequentius sit per se incipiendo ex congestione melācholix non naturalis adustæ in membro quocūq;. Signa autem terminationum omnium istarū prædictarum, & tempus mensurans plene iā diximus ca. de apostematibus stomachi & epatis, præter qd signa canceri sunt hic dicēda. Signa ergo canceri in matrice, seu alio membro sunt: quoniam siue fiat consequēdo, siue per se incipiēdo atq; a principio rei est, quoniam incipit res nigra, liuida, dura, velut faba vel cicer, habens circa radices venas nigras vlt̄ liuidas circunquaq; membro vehemēter insertas, per quas melancholia adusta fluit ad locum cum ardore & pulsatione & pruritu: & hæ venæ sunt causa, quare cancer non curatur perfecte, nisi cum membri mutilatione. Cum autem cancer confirmatur & antiquatur: aperitur & vlceratur, & virus fœdum, plumbeum, subtile, fetidum, corrosiuum emittit: quare gradatim non subito circūiucinas circunquaq; corrodit, & sic membrum & eius operationem destruit, & demum aliorum, donec finaliter membra destruat nobilia, et mortem inducat. Sunt autem eius labia nō alba mollia, velut vlcis saniosi, sed dura, liuida, tuberosa, velut vlcis fistu-

losi. Et non differt hoc apostema a lepra per aliquam causarum essentialium, sed solo subiecto: quoniam vt ait Auicē. 4. cañ. fēñ. 7. ca. de significationibus lepræ, cancer est lepra particularis, lepra vero est cancer vniuersalis corporis totius. Et hic quidem cancer, si sit in capite, dicitur a modernis noli me tãgere: Si vero in pectore seu ventre, dicitur herpestiomenus: Si vero in extremitatibus, & proprie in cruribus, dicitur lupus: vnde versus: In facie noli, medijs in partibus herpes: Si sit in extremis, dicit̄ esse lupus. Et licet cancer accidere possit om̄i mēbro: sermo tamen est de ipso p̄senti ca. p̄cipue propter matricem esse receptaculum superfluitatū pessimarū, ex q̄bus & cancer gñatur.

Methodus. Cura apostematis in matrice est, vt a principio fiat flebotomia diuersiua de basilica dextra vel sinistra in brachio: prout dolor ad alterūq; laterū magis declinabit: & extrahat̄ san. plurimus, si virtus toleret, & corpus sit carnosum. Sequenti vero die flebotometur saphena pedis, & adhibeantur repercussiuæ per interius & exterius frequēter. Inijciatur ergo per vuluā cū clyster aqua decoc. plantaginis, solatri, semperuiuæ, lentiuū ex corticatarū vel bis coctarum, prima aqua deiecta, postq̄ in ea dissolutum fuerit aliquid olei ros. & muscilagin. p̄syllij, vel camphoræ. Inungatur etiam lumen ventris, & vulua tota vsq; ad profundum ex vnguento populeon subtiliato cum oleo ros. vel lacte papaueris, in quo camphora, & p̄sillum fuerint dissoluta. Emplastretr ex ros. viol. plāragine, extremitatibus rubi, solatro, semperuiua, malua, coctis in aqua perfecte, & incorporatis cum oleo ros. & fari na ordeī. Epithymetur etiam locus intus & extra cum aqua ros. in qua dissoluta fuit camphora, & pul. sandalorū. Sumat illis diebus in aurora syrūpū ro. vel viol. cū aqua frigida. Vtrut per diē zuccaro

ros, vel vio. triasandalis rosata nouella, & similibus. Nutriatur lactucis, portula eis, pulmēto auenæ vel ordeī cum aceto. Sorbeat ius cæsei: bibat aquā ordeī, vel aquam decoctionis prunorum damasce norum siccorum, vel pomorum sapidorum: verum aqua frigida pura crudificat apostema: et sic regatur cum frigidis per dies quatuor, donec calor & febris mitigetur, & apostema euitetur, si fuerit possibile. Si vero dolor capitis, & insomnietas affuerit: succurratur, vt suis dicemus capitulis. Et si non aliter, saltem cum narcoticis, vt scripsimus cū de frenesi loquebamur. Si vero per hæc oīa non euitetur apostema, imo p hoc dolor & fe. augmētari cœperint: tūc post diem quartum, et cōfirmato iam apostemate, intendendū est resolutiuis modo & ordine, quos scripsimus de apostemate stomachi. Cum vero dies aliquot transierunt neq; dolor cessauerit ex resolutiuis: scias, q; apostema tendit ad collectionem: quare procedendum erit ad maturatiua, & saniei generatiua, prout diximus ibidē. Et facta sanie atq; dubellati, sollicitandum est de vlcere & ruptura, si apostema per se ruptum nō fuerit, neq; sanguis, neq; sanies visa sint egredi per vuluam, & vlcera: procedendum ad absterfuiua & mundificatiua vlceris: sicut est aqua mellis iniecta cum clysteri: deinde ad exiccatiua, et consolidatiua, quæ dicuntur ca. de vlceribus in matrice. Si vero fe. & dolor minorari cœperit, præter q; visa sit euacuatio sensibilis omnino, & remaneat tumor, & grauitas circa fumen, quæ quandoq; tactu percipitur, si sit magna: tunc ad mollificatiua te transferas: quoniam apostema sclerotisatur: et hæc oīa scripsimus plene ca. dicto. Quod si sit tibi notū apostema indurātū esse cancrū ex signis, quæ docuimus: tunc cum matrice abscondi non possit propter eius in interioribus latitantia, agrum desolatū derelinquas:

quoniam vt ait Hip. 6. parti. apho. Quibuscumq; cancri absconditi fuerint, non curare melius est. Curati namq; citius pereunt, non curati multum tempus perficiunt. Verum si ægro placuerit, curam facies blanditiua atq; mortis dilatiatiua, quæ est, vt ægrū dormire non permittas, quantum sit possibile, & ab omni re calefaciente defendas, & corpus eius mundifices semel in mense vel bis cū medicinis lenibus euacuatiuis melancholiā aduētā vt sunt senæ epithimum, & similia, quæ diximus ca. de melancholia. Et vnguatur locus cū vnguento albo de caphora facto ex cerussa & c. vel cum vnguento citrino Nicolai per se vlt permixto cū populeon & lacte papaueris, & similibus frigidis reperiuiuis. Et balneetur quandoq; & proprie apud dorē in aqua dulci, decoctionis se. lini, fenigræci, maluæ, violæ, rosæ, psyllij & altheæ, & prohibeatur a rebus melancholiam generatiuis, vt sunt caro salita, caseus antiquus, lentes, caules, acetum, agrestia, piper sinapi, allia, vinum album, aquosum, carnes elixæ cū lactucis & cucurbitis. Cum autem cancer vlcerari cœperit: est in vltimo malitia, tunc igitur vti conuenit litionibus prædictis frigidioribus: quoniā dolor fiet fortior. Addatur ergo in vnguentis prædictis aliquid opij vel iusquiami vel mandragoræ. Et si addatur aliquid croci, prohibetur mēbri mortificatione ex stupefactiuis, & beatificabitur operatio. Et in hoc casu multū confert injectio collyrij albi cum lacte mulieris, quod scripsimus auctoritate Ras, cap. de ophthalmia: quoniam vlcerationem retardat & dolorē mitigat euidenter. Quod si cancer huiusmodi in aliquo mēbro exteriori cōuenit vt in finibus ei: labia circūquaq; cauterisēt cū ferro ignito: qm̄ escharam faciet, & ambulationē eius refrenabit.

In apate matricis consuevit **Emperica** superuenire accidēs timoro

Tractatus nonus

sum, scilicet retentio stercoris & vrinæ, cui succurrimus cum positione ægri in balneum aquæ dulcis vel aquæ decoctionis viol. altheæ chamomillæ, fœnigræci, se. lini: quoniam ventrem lenificat, vias elargat, & dolorem sedat: Et prohibetur æger hora illa a potu donec egestio & vrina egredi videantur. Et eodem balneo uti conuenit in cura resolutionis, & proprie ab vmbilico infra: in cura vero percussionis, similiter & in causa maturationis nequaq̃. Vnguentum quod inunctū circa lumen & alkatum & iuppositum cum lana vel coto intra vuluā, duriciem omnē matricis mollificat est hoc. ℞. adipis anseris, anatis, & gallinæ. añ. 3. i. butyri recentis. 3. iij. armoniaci, bdellij. añ. 3. f. olei de. se. lini, vel chamomillæ. 3. 2. dissoluantur gūmæ in oleo, & liquefiant cū adipe & butyro ad ignē in casola: præterea coletur, & reseruetur, Et si vis acuire: adde galbani, oppoponaci, añ. 3. f. Item vnguentum mollificatiuum, si aliud præsto non sit, conficitur ex dialthea. p. i. populeon. p. f. dissoluen do butyrum & adipem in casola simul ad ignem: postea deponendo ab igne, et dialthea & populeon cum eisdem perfecte miscēdo. Et si volueris acuire, dissolue prædictas gūmas in butyro & adipe ad ignem, & fiat sicut prius. Emplastrū mollificatiuū conficitur ex mal. bismal. althea, absinthio. añ. manipulus vnus semini. lini, farina fœnigræci, semini. altheæ. añ. p. i. farinæ ordeï, quantū volueris, coctis omnib⁹ in aq̃, & pistatis pfecte & incorporatis cum oleis & adipibus iā dictis, & acuatīs cum gummis eisdem & actu tepidum extensum super petiam applicetur ventri ab vmbilico infra cū renouatione ipsius frequenter, postquā incoeperit infrigidari. Fomentatio seu balneum refrenans malitiam cancri nondum vlcerati tempore longo, sit ex aqua decoctionis nenupharis, viol. papa-

ueris, psyllij, foliorum populi, salicis, ex trematum vitis & rubi, etc. plantaginis, se. altheæ, faciendo ex eo encatisma, aut infundendo in eo petias lineas molles & actu tepidas frequenter ponendo super cancerum: quoniam matricem mollificat, ardorē reprimat, dolorem mitigat, & vlcerationem retardat, licet cancer perfecte curari nequeat, nisi cum refectione totius membri. Vnguentum album de camphora & cerussa malitiam cancri iam vlcerati, sic fit, nec est in hoc ei simile. ℞. viol. ro. 3. 4. ceræ. 3. i. dissoluantur ambo in casola simul ad ignē, deinde ab igne penātur & in paropside mūda ponāt, & cū eis puluiste incorporēt ℞. cerussæ, plumbi vsti. añ. 3. 5. liturgyri. 3. 2. scoriz argenti aure. vn. draganti, camphoræ. añ. 3. i. continue misce cū spatula, donec fuerit inspissatum & infrigidatum, deinde cum eis duo albumina ouorum bene cōquassata & incorporata. Hoc namq̃ vnguentum mirabiliter ardorem reprimat, vlcerationem diminuit, & si non fuerit vlcus corrosiū, consolidat perfecte, & si fortificare velis infringēdo cancerum, & dolorem mitigādo, adde opij grana. 12. sem. hyosciami grana. 24. mandragoræ. 3. i. & tunc vltimatur eius bonitas in imprimendo cancerum vlcerosum, & mentē hoīs differūt.

Canones. Cum matrix, vesica & stomachus sint mēbra spemati ca, nervosa, truncosa, dilatabilia & constringibilia, concava materietum collectiua, frigida per naturā, atq̃ acuta sententia: consequens est, ut cura apostematis vnus multū sit vtilis curæ apostematis alterius, si propria proprijs applicent. Verū in hoc videt̃ differentia: quia stomacho magis conferunt intrinseca remedia p̃ superius, matrixi vero & vesicæ p̃ inferius: quia via breuitas virtutē custodit viatori. Et est differentia alia: quia stomachus cū sit mēbrum nobilius in eius em-

plastris magis sollicitari oportet de virtutis custodia cū typicis. In matrice vero & vesica resolutius vici cōuenit fortioribus: cum eorum situs sit in profundo corporis per distantiam longā ab epate & corde, aut mēbris nobilib⁹ qbuscūq.

Prognosticatio. Apostema matricis si terminetur p resolutionem, sa lubre: si p saniationem, diffideli: si p indurationem, mortale. Item cancer in matrice vel mēbro aliq intrinseco, siue recens sit, siue antiqua, mortale. Si in brachio vel crure superuenerit, mors effugitur non nisi per membrum truncationem. Si sterus & vrina retineantur & color vltimatur, neq p se, neq p artem subito minoretur: mortale. In apostemate matricis frigiditas extremitatū, vel sudor frigidus circa frontē & tempora, mortale: quoniam apostematis magnitudinem, & virtutis naturalis angustia significat. Itē alienatio fortis cum insātia vigilarum, q per artem remoueri non possunt, infra diem quatū, mortale: quoniam apostematis confirmatiōe & virtutis animalis lāssione cōsignat. Item apostema accidens in matrice tempore impregnationis interficit matrem vel foetū, vel vtrūq & proprie si fuerit confirmatū: vt dicit Hip. 4. part. aphor. Si mulieri pregnanti erysipelas in matrice fiat, mortale.

De vlcibus & rhagadijs matricis. Cap. XI.

Vlcera sunt in matrice aut per se incipiendo, & tunc sunt ex materia calida acuta, corrosiua, vel sunt hegma falsum, & humores adusti: aut consequēdo ad apostemata in matrice: & tunc sunt post terminationem apostematis ad saniationem & rupturam. Signa vlcis in matrice sunt, ardor in vulua cum oritur, primo quidem titilloso: quemadmodum & in satyriasi: post hoc

verodum fortificatur acuto pungitiuo: & forte nihil egreditur: & tunc appellatur rhagadia vel fissura: & forte egreditur sanies nigra, viridis, liuida, cenola foetens: & tūc vlcus appellatur: & forte sanguis niger, grossus, & tunc hæmorrhoides matricis appellantur. Et si quidem fiunt per se incipiendo, apparebit priuatio signorum apostematis in matrice: Si vero consequendo fiunt: antecessit significatio apostematis saniosi in matrice dicta ca. precedenti. Et signa quædam distinctiua vlcis matricis, & vesicę sunt: quoniam si sint in matrice apparebunt exuentia separata ab vrina, & dolor sentitur in profundo pectinis, & minorabitur color albus: Si vero in vesica, apparebunt exuentia mixta cum vrina, & dolor sentitur magis apud anteriora vuluę, & multiplicabitur color albus in tebus exuentibus, & alia accidentia diximus ca. de scabie in vesica.

Methodus. Cura vlcis in matrice, quod fit per se incipiendo, est vt digeratur a principio materia acuta cum syrupo de fumo terre, quem dicit muscap. de pruritu & scabie, lib. 1. Post hoc purgetur his vel ter de septimo die in septimum cum apozimare, quod sic fit. ℞. senę, epithymi, myrobalanorum citrinorum, vel indorum, añ 3. f. bulliantur in aqua dulci, deinde manibus fricentur diligenter, & aqua coletur, & detur ex ea 3. 4. vel 5. in aurora, postquam dulcorata fuerint cum zaccaro, vel ramarindis, vel melle ros. Remota causa antecedente, remoueatut coniuncta. Mēdi ficetur ergo locus cum clysteri, quod. ℞. ros. siccarum, flos chamomili la, sanienæ ordeī. ana. part. i. senę. fum. terre. añ. 3. f. bulliantur in aqua p̄uiali, & modico vini rub. pontici, coletur, & in colatura dissoluatur alig. 3. mēdi. & terebentinz iterum parum bulliendo, & colando, & repidum frequenter inijciendo per

vulvam, donec sanies & sanguis minoretur. Si autem dolor & mordicatio vlcis fuerint aggregata: adde in decoctione prima seminis iusquiami, & foliorum eius, & papaveris, & plidix. añ. M. f. In colatura vero, adde duo vel tria vitella ovorum, & cum eadem aqua fiat encastisma, ita vt in ipsa sedeatur, & moretur hora doloris vehementis. Vel mundificetur cum vnguento, quod sic fit. ℞. sarco colla. 3. f. dissoluatur in aqua mellis ad ignem in casola, & incorporentur cum eis farina fœnigræci, & farina ordeï, donec fiat sicut mel currens, in eo inuoluas liciniam, & contenta immittantur in profundum vulvæ, & tunc circumcirca latera fricentur, & postea extrahantur, & quæ doq; cum bombace extinguantur, & sic successiue fiat, donec perfecte locus exicetur: Deinde consolidetur cum vnguento styptico, quod sic fit. ℞. thuris, lapidis hæmatitis, aloes, pulueris, chartæ cōbustæ. añ. 3. f. terantur omnia & cribellentur. Et si vlcus apparuerit exterius, aspergatur de hoc puluere super ipsum omni die bis: Et si ipsum fortificare volueris: adde boli armenici, sang. droc. thuris, aristologiæ, & similia. Si vero fuerit profundatum, conficiantur cum succo planraginis vel consolidæ maioris in modum vnguenti, & imponatur cum licinia: vel conficiantur cum aqua decoctionis corticis granatorum balust. & glandium, et risi in modum clysteris, & tepidum injiciatur omni die bis: & in ipso mulier sapius balneetur. Abstineat a coitu pro posse donec consolidatio cōpleatur: similiter & a rebus vrinam prouocantibus acutis. Cura vlcis in matrice, quod sit consequendo ad apostema saniosum in ea est, vt postquam ruptum fuerit apostema per se vel per artem, vtpote per compressiōnem & motum corporis, & descensum vel locem graduum, vel saltum, donec visa fuerit sanies egredi per vulvam & san-


guis: & tunc in potu sumat aquam decoctionis seminum diureticorum calidiorum vel frigidorum, prout feb. & virtus consentiunt: quoniam mundificant vlcus cū virtute, & hoc fiat tot diebus, donec sanies & sanguis minoretur. Deinde consolidetur cum incarnatiuis prædictis, & de tur omni die in aurora vnus ex trochiscis de karabe dictis cap. de mictu sanguinis, & aqua decoctionis acatiæ vel vino rub. in q̄ zucarū ro. fuerit dissolutū.

Emperica. Medicamina bona mundi ficatiua vlcis, similiter et incarnatiua scripsimus iam capitulis diuersis scilicet ea, de vlcere in aure. & cap. de fissura labiorum oris, & ea, de rhagadibus in ano: hic ergo dicta cū illi alterentur.

Canones. Cura communis vlcis duplici intentione perficitur, Prima scilicet mundificandi cū calidis acutis ripticis abstergentibus: Secūda vero incarnandi cum temperatis stypticis conglutinatīs. Et intentio tertia lateralis, quæ est doloris mitigatio cum resoluētibus debilibus anodinis. Et hæc omnia plene iam diximus cap. prædictis.

Prognosticatio. Vlcera in matrice raro fiunt consequendo, vt plurimum vero per se incipiendo: Sollicitandum in moderatione & cura vlcis: quoniam si perdurauerit, feb. hecica inducet: & si antiquetur, fistulam parietimotosam: similiter & vlcera matricis a principio prohibet cōceptionem. Si vero pregnantī superuenerint: facient abortum, nisi ilico succurratur: quoniam virtutem expulsiuam stimulant: quemadmodum & tenasmon.

Sectionis tertiæ finis.

SECVITVR QVARTA.
 Erueniendū videtur ad curam passionum contingentium circa ramos corporis humani, postq̄ earum, quæ circa stipitem accidunt, & ra

dicem,descripsimus remedia pro posse. Vocamus autem ramos corporis, manus & brachia & crura atq; coxas & pedes: verum quoniam diuinum auxilium cognouimus presentis laboris iniunctum fore atq; productuum hucusq;, deuoto demum precamine gratia eius poscimus: quatenus scribentis calamum dignetur ad finem volitum dirigere, verbum Auerrois scriptum septimo colliget orantis: Et deus nos ab errore eximat, & oculos nostros illuminare dignetur.

TRACTATUS VNICVS quartz sectionis.

TRactatus iste vltimus, prout in libri istius proemio diximus, concors est sen. vltimæ tertij can. Aul. Cuius quidem rationem nobis per hunc primum librum placuit obseruare. Passiones autem, de quibus in ipso dicemus, sunt quæ accidunt in extremitatibus membrorum: & sunt numero sex. Prima quidem est ramex & hernia. Secunda arthetica: Tertia varex & elephantiæ. Quarta dolores spondilium dorsi: Quinta gibbositas eorundem: Sexta labores spontanei currentes per musculos, qui sunt in ambitu corporis totius.

De ruptura siphac, & ramice, & hernia. Cap. I.

Siphac est panniculus magnus totius duci stomachum, epas, atq; splenem atq; intestina omnia totaliter amplectens: & ob hoc natura ipsum fabricauit solidum, quem Aulcen. periteron nuncupauit. Ab hoc igitur pāniculo circa duo inguina, duo alij oriuntur panniculi, in corporibus virorum, figuram duorum cornuum habentes, quæ didymi nuncupant: ita vt conus eorum panniculo siphac affigatur, & basis per inguina descendens de testiculis ambobus circundata osculum conſtruat, id est bursam testiculorum.

Accidit autem plerumq; & proprie pueris & humidam complexionem habentibus siue per naturam, siue per diatam imprægnanti: vt siphac prædictum dilatetur, vel etiam rumpatur in locis prædictis: et materiæ descendant per didymum in osculum, & malam complexionem faciant cum tumore & inflatione inguinum & testiculorum. Et si quidem siphac dilatetur præter quod rumpatur, sic ramex ergo vel hernia nuncupatur. Si vero rumpatur, tunc id quod descendit, aut est intestinum gracile, aut zirbus adipinus. Est autem zirbus panniculus vinctuosus, latus, extensus super stomachum & intestina, vt eorum congreget calorem naturalem, & ad interiora reuerberet, & a frigidityte aeris continetur descendat: cum sint membra naturalia modicum calorem ex se habentia, licet non nisi per calorem operentur. Si vero dilatetur, præter quod rumpatur: tunc res quæ descendit, aut est aquositas, & tunc hernia aqua dicitur: aut est humor frigidus, qui si antiquetur, convertitur in carnem & duriciem per assationem & condensationem, & tunc hernia dicitur verrucosa. Signa distinguuntia inter herniam & rupturam sunt: quoniam in hernia non fit dolor, quando res manibus sursum ducitur per didymum in ventrem, vel quolibet contractetur: in ruptura vero fit dolor: & adhuc magis, si res quæ descendit fuerit intestinum: quoniam membra nervosa habent sensum acutum. Et certior significatio est ex re, quæ descendit: prout nunc dicemus. Similiter & ex figura: quoniam in ruptura siphac apparet tumor, & inflatio circa inguina, cum patiens stat erectus. In hernia vero non apparet tumor nec inflatio, nisi circa bursam testiculorum. Signa vero propria rupturæ sunt: quoniam si ægrum resupinatū iacere præceperis, anthesis exaltatis, atq; capite depresso, & re in osculum contentam duxeris sursum per

didymum manibus comprimendo, redi-
bit, aut tota, aut pars eius cum difficul-
te multa, & sine rugitu omnino vel pau-
co: ita tamē vt si zirbus fuerit, tumor te-
sticuli, & inflatio fiet mollior, & sub-
tilior ante reductionem, & dolor & rugi-
tus minor. Si vero intestinū fuerit, tumor
& inflatio fiet tangibilior & grossior, &
apud reductionem dolor & rugitus maior.
Signa vero propria herniæ sunt: quoniā
si ægrū resupinaueris, sicut prius, & rem-
dlexeris, redibit tota aut pars eius cum
facilitate & rugitu plurimo vel medio-
cri, ita tamen: si ventositas fuerit, fiet ru-
gitus plurimus apud reductionem, & tu-
mor & inflatio testiculorum dura, quæ
tactui vix cedit, & sonat cum tangitur
ante reductionem, si vero aquositas: fiet
rugitus mediocris, & inflatio testiculorū
impressa valde & mollis, splendens, si-
cut facies hydro. & vrina quæ mingitur,
fiet pauca. Si vero fuerit humor frigidus
conuersus in carnem, ad tactum percipi-
etur res dura inter testiculos & osculum
mobilis hinc inde, neq; reducitur quan-
tumcūq; cōprimatur.

Methodus. Cura rupturæ duplex est:
vna cum incisione & cau-
terio didymū penetranti, & proprie si fu-
erit difficilis, antiquata: & hanc chirurgi
corelinquo. Alia vero cū medicinis sty-
pticis cōstrictiuis, & proprie, si fuerit par-
ua recens, facilis curationis: & hanc pro-
posse dicemus. Euacuent igitur a princi-
pio intestina & oia pfecte cū supposito-
rio vel clysteri lenituo iniecto his die-
bus: postea ponat æger in aq̃ dulci tepi-
da tēpore lōgo: donec didymus & intesti-
na fuerint cōplete mollificata: Deinde re-
supineat super lecto suo anchis eleuatis,
& capite depresso & reducat medicus zir-
bum vel intestinū sursum per didymum
in ventrem paulatim parum post parū,
donec totū reducat: Deinde ponat sup-
I cū rupturæ emplastrum stypticū, quod

thuris, mastice, gūmi arab. dragag.
añ. 3. 2. boli arm. sang. drac. aloes, myr-
tis, añ. 3. iij. acatix, gallarū, cyressi, glā-
dium, psidia, añ. 3. 6. aristol. lōgā, bdelliū,
galbani, sarcocol. resinæ, picis naualis in-
duratæ, añ. 3. 5. coloph. mūmiæ, visci cō-
fecti ex chartis, añ. 3. 1. Conface sic. Infun-
dantur bdelliū & viscus & galbanū &
sarcocolla in aceto vini rubei per horas
duas, postq̃ frustatim fuerit incisa: Dein-
de extrahantur, & cum resina & pice na-
uali colophonia dissoluantur simul ad
ignem in casol a, & post calefactionem
omnium deponantur ab igne, & incor-
poretur cum eis puluis aliarum rerum
subtiliter cribellatus, & fiant magdaleo-
nes, sicut in emplastro apostolicon: quo-
rum vnus mollificetur ad ignem lentum
& extendatur super petia linea molli &
actu calidus firmetur super locum, & plu-
maceolo duplici supposito cum facia la-
ta fortiter alligetur: & sit plumaceolum
latum, ne faciat rupturam dilatarī: & sic
dimittatur per, 10 dies, & æger omni tē-
pore iaceat supinus in lecto: post dies ve-
ro decem dissoluatur, & iterum remove-
atur, sicut prius: & per dies 5, dimittatur,
& tunc iterum removeatur, & sic fiat, do-
nec ruptura perfecte consolidetur. Diate-
tur cibus & potibus stypticis famosis, &
quandoq; medullis & oleribus ventrem
lenificantibus, vel suppositorio, vel cly-
steri: prout docuimus cap. de stypticitate
ventris, parag. Emperica. Et cum sana-
tus fuerit: abstineat a crapula pro posse,
neq; ster, neq; moveatur super cibum vř
potum, imo sedeat vel resupineat, donec
fuerit cibus in stomacho semidigestus:
Abstineat a iuribus pinguibus, & balneo
aquæ dulcis tepidæ, & omnibus mollifi-
cantibus: Abstineat a leguminibus, rapis,
& omnibus ventosis, a coitu, saltu, & vo-
ciferatione forti, & cursu veloci per gra-
dus: quoniam omnis labor, cum quo re-
tinetur anhelitus, & intestina cōquassant

tur: dilatat rupturam, si est: & facit, si nō est: quare si quandoq; coire voluerit: fiat non nisi in ieiunio, & fecibus expurgatis & ventre vndiquaq; cincto fascia lata. Cura herniæ aquosæ est, si sit parua recens facilis: Emplastrentur testiculi cum emplastris calidis resolutiuis dictis cap. de hydropisi aſcite. Si vero fuerit multa, antiqua, difficilis: perforetur bursa testiculorū in loco commissuræ duorum testiculorum perforatiōe penetrante ex vitro que cum rentra aurea vel ferrea ignita: quoniam si fiat cum flebotomo, redibit hernia post dies aliquot: nisi subsequatur cauterizatio, & extrahatur aqua paulatim de die in diem, sed non tōta subito: ne forte accidat lyncop. atq; mors: Neq; consolidetur donec aqua perfecte euacuetur. Retinetur etiam quādoq; (cum eadit timor recidiuæ) vulnus apertum cū filo laneo vel serico traducto cum acu, & omni die bis de extremo in extremū refricato: diatē sicut hydropicis oīquaue. Cura herniæ ventosæ est, vt si sit recens, facilis: emplastrētur testiculi cum emplastris carminatiuis dictis ca. de colica ventosa: & diatē sicut dictum est illic: Si vero fuerit antiqua, difficilis: curretur cū perforatione iam dicta: quoniā sicut in aquosa dominatur aqua super vētum, sic in ventosa dominatur ventus super aquam, Neq; estimandum est in corpore hominis alterum sine altero reperiri: eorum sit idem efficiens, scilicet calor diminutus, eademq; materia, scilicet humor frigidus: vt dicitur. 6. de accidenti & morbo. Cura herniæ verrucosæ est vt si sit parua mollis, & facilis: emplastrētur cum emplastris mollientibus simul & resoluentibus dictis de apostemate stomachi duro: Si vero fuerit magna, dura, difficilis: excoriet verruca circūquaq; & extrahat, & labia cutis cōsuant, & cū vnguentis cicatrizatiuis cōsolidentur dictis capitulo de vlceribus in

aure, & capitulo de scissura labiorū oris, & capitulo de rhagadīs in ano.

Emperica. Emplastrum ad rupturam ^{exper. ū, sic fit. 175.} picis naturalis, aloes, mastice, gallarum. añ. 3. 2. boli armenici. 3. 3. lithargyri, ceræ. añ. li. 1. resinæ colophoniz, galbani. añ. 3. 4. vi sci quercini, vel succi eius, si tempus fuerit 3 6. gipsi. drachmas duas, aristologie longæ & rotundæ, drachmā semī, myrrhæ, thuris. añ. 3. 6. terebentinæ. 3. vnam, sanguinis hominis lib. vnam. Confice sic: decoquatur vellus arietis cum pilis, sicut abstractū est ab ariete, in aqua pluuiali: deinde colat, & in colatura coquantur res suprascriptæ & bene & fortiter continue miscendo, & agitando cum spatula, ne comburantur: deinde colentur: Et fiat ex rebus emplastrum, & ex liquore epithyma cum lana prædicta infusa in eo, & expressa vehementer, donec sicca perfecte fuerit, et calida firmet super locum. Emplastrum expertum ad herniā aquosam & ventosam scripsimus cap. de apostematibus virgæ & testiculorū, 175. 1. 2. parag. Emperica. Illuc recurratur.

Canones. Est quādoq; siphac apud di dymū fortis ac solidæ texturæ: quare accidit in huiusmodi corporib; ruptura vlt dilatatio apud vmbilicū, & proprie si mori laborio: us, aut casus, aut percussio antecedit: & talis ruptura vt plurimum periculosa est & mortalis. Scindendum præterea, qd in corpore debili vel delicato, & proprie cum ruptura fuerit magna, antiqua, difficilis: sufficit cura blanditiua, quæ est, vt patiens locum rupturæ fasciet cum plumaceolis duobus, inferiori quidem molliori ex bombace, superiori vero duriore ex lana vel pilis cum cingulo brachiali omni tempore firmando per dies residuos vitæ suæ.

Prognosticatio. Ruptura siphac ī pu
eris & mulieribus &
CCC 2

omnibus humidam complexionem habentibus per naturam, & proprie sanguineis, & carnosus, est facilis curationis: In adultis vero, & senibus, vel ficiis per naturam, difficilis. Item ruptura recens & parua, & in qua nihil descendit in oscheum, sed tumor solum in inguinibus nuper accidit, facilis est curationis: Antiqua vero & magna, & in qua testiculi sunt inflati atq; inguina, difficilis. Itē hernia aquosa præmonstrat hydropisim asciten: ventosa vero tympaniten. Et ex hoc consequitur, q̃ aquosa deterior est ventosa: sicut & ascites deterior tympani. Concluditur etiā, q̃ in hernia aquosa peccat secunda digestio, in ventosa prima digestio: quare sicut in aquosa oportet, vt rectificetur epar cum vnguentis & emplastris calidis stypticis: ita in vērosa romachus cū eisdem: & ista quidem plene docuimus suis locis. Itē hernia aquosa magna valde cum vrina pauca rub. vel diuersos colores habente secundum regionem infimā & supremā, mortale. Item prognosticatio hydropisis plurimū deferuit cap. præsentis:

De passione arthetica & speciebus eius. Cap. II.

Dolor articulorum communi nomine a medicis arthetica nuncupatur. Quod si in manibus vel brachijs extiterit, chiragra proprie vocatur: Si vero in iunctura vertebra seu coxarū, dolor ancha dicitur. Si vero in iunctura genuali, ischiatica nuncupabitur, licet & dolor ancha; plerūq; ischiatica nuncupetur. Si vero in calcaneo, ṽl digitis pedum: tunc podagra nominatur: vt colligitur ex mente Ras. in diuisionibus cap. præsentis, & ex mente Auicennæ 3. canonicis scñ. 22. capitulo præsentis. Fit autem hic dolor ex humore superfluo corrente per venas capillares atq; membrorum porositates, donec perueniat inter os &

os iuncturæ, & ibi stans inducat alienam complexionem in ligamento coniungente ossa prædicta: & sua quātitate ipsum extendat: & sua putredine substantiam ipsius destruat & corrumpat: & sic apostema faciat: & demum operationē mēbri prohibeat, & forte ossa iuncturæ dislocet, si perduret. Sicut enim spasmus & tetanus fuit ex humore superfluo nervos, chordas & musculos occupāte: ita dolor arthetice ex humore iuncturas & ligamenta lædente: propter quod neq; in aliquo dolore arthetico spasmus accidere potest: vt dicit Galeñ. in commento illius apho. 6. par. Quicūq; podagrici sūt ac. Fit igitur apostema iuncturæ ex omni genere quatuor humorum simplicium, primorum, similiter & ex commixtione eorum adinuiç: verum quod maxime accidit, est ex humore crudo flegmatico viscoso, cui aliqd cholera; vel sanguinis acuti fuerit additum, vt ipsum veheret in loca profunda. Neq; potest hoc apostema, quemadmodum reliqua terminari per sanationem: quoniā materiæ grossities, & membrorū frigiditas, & loci profunditas illud non admittunt: sed vel terminatur per resolutionem, vel lapidificationem. Istud etiā apostema certas habet periodos in quibusdam corporibus, quibus aduenit & recedit, scilicet de quarta in quartam. Et dicit Hip. q̃ tempus resolutionis ipsius cui accidit est quadraginta dierum, plus tamē vel minus secundū materiæ multitudinem & frigiditatem: vnde Hip. ait 6. par. apho. Quibuscūq; podagricæ ægritudines fiunt, hæ in 40. diebus deferuescentes residēt. Hoc etiā apostema in quacūq; iuncturarum acciderit, tumorem facit & ruborem, & calorem, plus tamen vel minus secundū naturæ multitudinem & caliditatem, possit in ancha, in qua tumor & calor & rubor apparere nō possunt exterius, carnis multitudine & loci profunditate prohibente.

Signa humorum calidiorum sunt loci rubedo, & caliditas apud tactum fortis, & dolor pulsatiuus immensus cum tumore & inflatiōe & vrina ignita. Quod si materia fuerit cholericā, fiet dolor acutior, & rubor & tumor minor, & vrina subtilis citrina: & si antecessit vsus sinapis v^l piperis, allij, vel vini veteris amari: & ætas & complexio & tempus anni cholericā fuerint, verior erit significatio. Si vero materia fuerit sanguinea, fiet dolor grauior, tumor & rubor maior, vrina grossa, rubea, et si antecessit vsus carniū laudabilium, & ouorum sordilium, & vini rubri, dulcis, et ætas, et cōsuetudo & tēpus anni fuerint sanguinea, verior fiet significatio. Signa humorū frigidiorū sunt loci rubedo, modica tñ vergēs ad albū, vel plumbum, & caliditas moderata, vel nulla, tumor magnus, et vrina remissa, & dolor non multum acutus. Quod si materia flegmatica fuerit, tumor & albedo fortificabūtur cum mollicie, & fiet vrina alba, grossa: nisi fortassis epar inflāmetur ex dolore: & si antecessit nauseatiua satietas assidua, & potus vini plurimi in ieiunio, & sumptio piscium, & olerum frigidiorum, & ætas & complexio & tempus anni fuerint flegmatica: verior erit significatio. Si vero materia fuerit melancholica, tumor & plumbetas fortificabuntur cū duritie, & fiet vrina subtilis, subcitrina: & si p^rsentia, præterita, & futura concordauerint, verior erit significatio. Signa humorū compositorum, sunt cōmixtio, & alteratio signorum omnium prædictorū secundum gradum proportionatum commixtioni. Scindendum tamen, q^d in passionibus mēbrorum profundorū nō semper oportet colori exteriori credere: Potest em̄ humor contrarius interius latitare: propter quod ait Gal. in cōmento illius apho. i. par. In perturbationibus vētris &c. Et Hip. qdē testatur est, q^d color corporis humorū abun-

dantiam ostendit, si non in profunditate accubuerint: quare pri^{us} inuestigare oportet consuetudinem, tempus, ætatem & regionem, atque morbi naturam, & ex vrina agnoscere, cum quibus humoribus dominetur.

Methodus. Cura passiōis arthetice duplex est. Vna quidē apud paroxysmum & afflictionem, quæ proprie curatiua dicitur: Alia vero est & ante & post paroxysmū, quæ proprie præfertiua dicitur. Et de ipsis ordinatim scribemus tam in calida q̄ in frigida vel cōmixta. Cura ergo ipsius hora doloris & paroxysmi, prout fit a causa calida siue cholericā, siue sanguinea, siue composita ex his est, vt a principio fiat flebotomia diuersiua de basilica sinistra si dolor est in brachio dextro, vel de basilica dextra, si dolor est in sinistro: & extrahatur sanguis sufficiens totus simul, vel cum secundatione: neq^{ue} negligatur a principio flebotomia talis, etiā si paucio tempore flebotomauerit patiens: quoniā est ex rebus maxime necessarijs in methodo curatiua: cum sine ipsa neque repercussio, neq^{ue} resolutio conferēs videat. Et si corpus sit plethoricum, flebotometur a principio saluatella pedis dextri, si dolor est in manu dextra: v^l pedis sinistri, si dolor est in manu sinistra: & e conuerso fiat, si dolor est in cruribus aut pedibus. Et post istam flebotomiam, fiat flebotomia prædicta: qm̄ vt ait Auic. i. cañ. fēñ. 4. de flebotomia diuersiua, q^d flebotomia fieri potest per diametrum vnum, nequa q̄ vero per duas simul. Et post flebotomiā soluat venter cū medicina leniter educente cholera, & humores acutos: sicut est stomaticum laxatiuum, vel electuariū de succo ros. vel alia ex eis, quas iam diximus in cura præseruatiua. Fortis nāq^{ue} medicina humores agitaret, & dolore augmentaret & prosterneret forte virtutem. Fiant post euacuationes remedia lo-

Tractatus vnicus

calia, primo quidem percussiva: quare ponatur membrum patiens in aquam frigidam, vel fomentetur ex aqua frigida & aqua ros. añ. par. x. aceti. par. f. vel ex succo solatri & semperuiæ. añ. par. x. aceti. par. f. vel aqua ros. agrestæ. ana. par. semi. & modico aceti, vel epithymetur ex pulvere ros. sandal. infuso in aqua ros. & agrestæ & modico aceti. vel liniatur ex oleo ros. vel nenuphar: quoniam omnis dolor iuncturarum sine vlcere mitigatur in principio ex rebus frigidis actu & virtute, licet earum vsus superfluus materiam ingrosset, & fortior rem faciat sequi dolorem. Vnde Hippocrates secunda particula aphorismorum. In articulis dolores & tumores sine vlceratione podagram & spasmus, & horum plurima, frigida, aqua infusa refrigerat & attenuat, & dolorem soluit: stupor enim medicis dolorem minuit. Emplastrum etiam ex ros. solatro, semperuiæ, nenupha, plantagine, extremitatibus rubi, coctis in aqua pluuiæ, vel ferrata, deinde pistatis, & incorporatis cum farina ordeï, pulvere mirrallorũ, acaciæ, lentibus his coctis aqua prima reiecta, addito oleo ros. vel nenuphar, quod sufficit, & modico aceti vel agrestæ. Et si per ista dolor non cessauerit, neque minoretur: addatur aliqd ex folijs, & le. iusquiami: & fortius illis, est cortex mædragoræ & iterum fortius, est opium: moderetur tamen vsu narcoticorum: quoniam membra iuncturalia sunt ex natura frigida, & ad paralytissimam inclinata. Si vero per applicationem percussiuorum dolor fortificetur, vel non minoretur, vel tumor induretur: nequaquam super locum ponatur sed circumcirca: & situetur membrum illud hora illa taliter, vt sit eleuatum: ne fluxus ad ipsum transeat nocitius. In augmento vero, & cum cessat aggregatio fluxus & tumoris: fiat emplastrum ex stypticis permixtis cum resolutiuis sine attracti-

one: sicut est emplastrum ex folijs ros. floribus chamomillæ, farina scenigræci & ordeï, radicibus althææ coctis, & mundatis, ac pistatis perfecte, & incorporatis cum oleo chamomillino, vel nardino sufficienti, & tepidum applicetur. Confert etiã fomentatio membri ex aqua decoctionis rerum earundem, & linitio sine scarificatione ex oleis eisdem. In statu vero, & cum securatus fueris a fluxu materiæ, adde plus ex resolutiuis in emplastro iam dicto: sicut est semen anethi, cribellatum, semen lini, & oleum anethinum, folia & radices apij, & ultra id non transcendas. In declinatione autem perfecta, & cum tumor coeperit rescidere, & rubor pallefcere & dolor mitigari: fiat emplastrum ex puris resoluentibus sine stypticitate omnino: sicut est sterqus bouinum calidum, vel equinum, vel porcinum recens, & fortius illis est sterqus columbinum. Et si in lib. x. stercores cuiuscunque incorporetur, vncia vna, pulueris euforb. vel saponis, vel medicum fermenti, fortior fiet operatio. Cavendum tamen in vsu resolutiuorum immoderato, ne resoluatur ex materia subtili, & lapidificetur grossum. Illud namque frequenter accidit in apostematibus iuncturarum calidis, et proprie sanguineis: quare postquam illud cognoueris ex paruitate caloris, & liuiditate coloris, & duritie tumoris, & insensibilitate doloris: postpone resolutiua, & vrere mollificatiuis cum caliditate temperata: sicut est adeps vulpis, vel canis iuuenis, vel mustelæ, vel gallinæ, vel anatis, vel anseris: & sicut sunt muscillagines scenigræci, seminis lini, seminis althææ, si cum prædictis resoluentibus misceantur in emplastro. Et iterum fortius est in mollificando atque resoluendo, si addideris aliquid ex gummis calidis, sicut sunt serapinum, galba, armoniacum, oppoponacum. Et non negligas studium in mollificantibus

a principio: quoniam si remanserit in apostemate durities, disrumpentur fortassis iuncturæ, & exibunt velut margaritæ, & periclitabitur membrum, & spasmitur, & fortassis dislocabitur os iuncturæ, & inducetur claudicatio perdurans omni tempore, & proprie, si passio sit in ancha. Artem vero mollificandi, & resoluendi apostemata dura plene scripsimus capitulo de apostemate stomachi. In fine vero declinationis conferunt balnea calida styptica confortatiua: sicut est aqua tinarum, vel aqua decoctionis aluminis, sulphuris, & salis communis: vel aqua decoctionis absynthij, arthemisiæ, saluæ calamenci, mentastri, sauinæ, in qua dissoluatur aliquid salis gemmæ, vel salis nitri. Et si supercalefactionem ex eis timueris: adde ex stypticis frigidis in decoctione: sicut est plantago mitillii, balauistiæ, glandes, rosæ, lentes bis coctæ & similia. Confert etiam hora illa fomētatio facta ex aqua ferrata, & modo dico vini rubei, pontici, vel succi citoniorum, vel berberis, vel ex aqua pluuiali postquam in ea cocta sint risum, milium, acacia, & gallæ cypressi, quoniam confortant iuncturas, ne alias recipiant superfluitates. Si vero post omnia prædicta tumor cum rubedine vel duritie remanserit aliqualis, apponatur sanguisuga, quæ cum ceciderit, ponatur super eius morsum folia sambuci, & permittatur materia fluere pluribus diebus: postea cum locus exsiccatu fuerit, & tumor applanatus, ponantur folia quercus: quoniam indurant & cicatrificant. Quod si nihil physicalium remediorum contulerit, ad manuales operationem vltimo recurredum cum sit omnium fortissima. Fiat igitur cauterium cum ferro ignito sub iunctura dolente, vel supra in loco maxime conuenienti, ita scilicet vt chordæ, vel nervi non tangerentur, & profundetur

vsq; ad os: neq; permittatur consolidari tempore longo: sed ponatur super ea pilula ex cera, & pilis leporis, vel pilis lanæ constructa, & materia permittatur effluere per annum vel amplius: donec membrum ab arthetica securetur. Et istud cauterium est maximi iuuamenti in dolore anchæ: cum in eo medicinæ parum conferant propter loci profunditatem: Nutriatur igitur patiens cum rebus frigidis, sicut sunt pulres ordeï vel auenæ conditæ cum lacte amygdalarum dulcium, & lentes & risum, & iura casei recentis, & olus factum ex lactucis, cucurbitis vlt portulacis. Abstineat a carnibus, nisi alteratis cum oleribus eisdem vel seminibus eorum. Vtatur saporibus ex aqua rosæ, & agrestis, & vino citoniorum, vel berberis, vel succo acetosæ, vel succo trifolij confectis, sed non ex aceto vel sinapi. Bibat aquam frigidam, vel quod melius est, iulep, vel aquam decoctionis prunorum dulcoratam cum zuccaro. Abstineat a vino pro posse, & vtatur melicrato. Quod si vino necesse sit vti ex debilitate vel consuetudine, bibat vinum lymphatum ad medietatem cum aqua extinctioni. calybis igniti, vel cum aqua prædicta. Cura præseruatiua arthetice de causa calida, est vt ante horam paroxysmi per dies plurimos, similiter & in principio veris & autumnii fiat flebotomia basilicæ vel medianæ, modo & ordine, quem diximus in actu curatiuo. Post flebotomiam vero digeratur humor acutus cum syrupo respiciente iuncturas a proprietate: qui sic fit. Iste. endiuia, absynthij, plantaginis, arthemisæ, epaticæ, scolopëdriæ, fumiteræ, violæ, cicoreæ, añ. M. x. radicem quinq; communium, añ. vnciâ vnâ sem. communium frigidorum maiorum & minorum. añ. 3. f. sandalorum, berberis, seminis feniculi, seminis anethi, añ. 3. quatuor: fiat syrupus est

lib. vna. zuccari & aceto citoniorum: & detur ex eo in aurora per dies septem cū aqua decoctionis prunorum siccorum. Et sunt qui digestionem faciunt cum syrupo rosaceo, vel violaceo, sed eius virtus ad loca profunda non pertingit. Sunt alij, qui hoc faciunt cum syrupo acetoso quod etiam non placet: quoniam si simplex fuerit, materias perducit ad iuncturas, neruos, atq; ossa vehementer congelat: cum illud insit aceto per naturam, et proprie acuto. Si vero compositum fuerit, vrinam prouocabit vehementer, & humores colligabit. Purgetur post hoc cum pillulis de hermodactylis minoribus Ioannis Hebemelue in suo antidotario: quoniam sunt omnibus meliores. ℞. hermodactylorum alborum & munda torū. 3. 4. scamoneæ. 3. 2. & 6. rosæ. 3. 2. myrobal. citrinorum. 3. iij. aloes. 3. 10. conficiantur cum syrupo rosaceo: dentur. 3. 2. sero cum stur dormitum sine cena: vel cum pillulis de aloe expertis, quæ sic fiūt ℞. aloes, succocitrini tertiam partem. 3. vnus, myrobalanorum citrinorum. 3. 1. scamoneæ. 3. 2. fiāt pillul. cū succo citoniorum vel macianorum, vel vino, vel cū aqua decoctionis eorum, & sint omnes vna dosis si corpus fuerit compactum, carnosum, difficilis solutiōis: Si vero macrum fuerit, laxæ carnis, & facilis solutiōnis, medientur. Pillulæ vero de hermodactyl. minoribus secundum excellentiā sic fiunt. ℞. hermodactyl. aloes. añ. 3. 1. scamoneæ. 3. 1. rosarum, seminis apij. 2. 3. 6. informant pillulæ cum vino decoctionis hermodactylorum: detur ex eis. añ. 3. 1. vsq; ad. 3. 1. & 6. vel si aliud præsto non fuerit: purgetur cum. 3. 6. benedictæ laxatiuæ acuatæ cum. 3. 1. myrobalanorum citrinorum, vel cum. 3. 6. electuarij de succo ro. laxatiui acuatī cum eodē: & dentur electuaria post mediā noctem. Et sunt qui purgationem faciunt cum decoctione ramarindorum, mānæ,

castigisistulæ, senæ, epithymi, prunorum. & omnium educētium humores acutos cum leuitate: sed illud non conuenit nisi corpori delicato: quoniam virtus apozimatum non attrahit a remotis: quare pillulæ sunt præ cæteris eligendæ. Et reiteretur purgatio de hebdomada in hebdomadam, donec corpus fuerit mundatum. Neq; permittatur venter exiccari sub regimine diætæ, sed leniatur cum medicinis, & cibis conuenientibus non acutis. Et iarem illam plene scripsimus: ca. de stypticitate ventris. parag. de empericis. Nutriatur cibus humidis temperatis in calido & frigido, vel parum tendentibus ad frigiditatem, præter quod calidū naturale noceatur: sicut sunt pulres ex farina ordeī vel auenę conditi cum lacte recēti capræ vel vaccæ: Et sicut sunt carnes laudabiles elixæ, cum bleta, sicla, vř lactuca & pisces petrosi cum speciebus aromaticis dulcibus preparati: Et pisces squamosi frangibilē atq; albam habentes carnem. Bibat vinum aquosum perse, vel per artem. Faciat vomitum omni mense semel duobus diebus cōtinuis: vt docuimus ca. de bolismo. parag. de empericis. Abstineat a potu vini plurimi, & proprie in ieiunio: similiter & a nauseatiua satietate assidua, & coitu frequēti, & proprie super cibum, & labore iuncturarum debiliū, & proprie cum tempus paroxysmi fuerit ante vel post eius propinquum. Caueat ab excellētia qualitatum aeris continentis: quoniam si calidus fuerit, colliquat: si frigidus, mortificat: si siccus, indurat: si humidus, relaxat. Propter quod ab omnibus dictum est: quod frequens ablutio membrorum cum aqua calida mollificat mēbra neruosa. Vnde Hippoc. 4. patt. aphorif. Calidū nocet hoc frequēter vtentibus, carniq; um effeminationem facit, neruorum incontinentiam, mentis stuporem, fluxus sanguinis, deferens spiritus facit, quibus

dam vero mors sequitur : & postea subdit. Frigidum vero inimicum nervis, ossibus, dentibus, cerebro, spinali medullæ: calidum vero amicum & vtile. Ex quibus colligitur, quod oportet, quod exteriores res non naturales sint omniquaque temporatæ cum declinatione quadam ad caliditatem & siccitatem moderatam. Sint eorum vestimenta larga, longa, mollia: quoniam strictitudo cum duritie debilitat iuncturas. Confortentur quandoque iuncturæ debiles cum ablutione earum ex vino rubeo styptico, vel vino citoniorum, in quibus bulliæ sint rosæ: plantago, malaustia, gland. gallæ, pira pontica, mala maciana, melpila, et sissa: vel ex aqua decoctionis lentium his coctarum (aqua prima reiecta) extremitatum rubi, foliorum vitis, postquam ferrum fuerit in ea aliquoties extinctum, & lapides igniti: & in ea quoadque balneetur, & proprie post purgationem perfectam. Confert præterea apud sanitatem exercitium temporatum in ieiunio, sed non hora paroxysmi vicinante, nec corpore repleto, similiter & fricationes in membro isto perdurantes: quoniam materias diuertit. Cura passionis arthetica de causa frigida apud horam paroxysmi siue sit de flegmate, siue de melancholia, siue ex aggregato ex his, est ut a principio fiat flebotomia, sicut in causa frigida: quoniam & si non euacuat qualiteratem, tollit tamen multitudinem. Post flebotomiam purgetur cum 3. f. benedictæ laxatiuæ, & prouocetur vomitus cum oxymelle & aqua decoctionis raphani, vel feminis anethi vel atriplicis & sinapis, & ceparum super repletionem ciborum diuersorum vicibus frequenter. Et si vomitus fuerit facilis: ponatur cum decoctione, 3. i. vel, 3. 2. ellebori albi suspensi in petia alba lineæ, hora bullitionis. Post purgationes applicentur super locum & circumcirca repussiuæ dicta in causa calida: sed mo-

deretur eorum usus magis quam illic: quoniam maior est in ea timor de lapidificatione materiæ, quam in causa calida. In augmento vero misceantur resolutiuæ prædictæ. In statu vero & declinatione magis ac magis applicentur resolutiuæ pura primo quidem debilia, deinde fortia, donec ad gūmas perueniatur: ut supra docuimus. Verum quoniam materia est frigida, addendum est in emplastris ex vitellis ouorum & croco: Et cum sit grossa viscosa, addendum erit incessanter ex molificationis prædictis, amplius quam in causa calida: quoniam si tumor ceperit indurari, & color offuscari, & membrum infrigidari: raro sit eius resolutio completa: & ad hoc satis cōferre videtur inunctio partis ad ignem vel solem calidum cum vnguento marciaton vel agrippæ. Diætetur subtiliter ex cibis temperatis vergentibus ad caliditatem: ut sunt carnes laudabiles non suffumigatæ, sed elixæ cum sceniculo & petro. & oua sorbilia, & vinum album, clarum, lymphatum. Leniatur venter cum suppositorio vel clysteri frequenter vna vice acuto & alia non acuto: ut diximus ea, de stypticitate ventris, parag. de empericis: & dentur in potu liquores urinae prouocantes alternatim, modo hoc, modo illud, donec auferatur vel minoretur materiæ multitudo, præter quod ingrossetur. Caveat a potu aquæ frigida omnino, & aere frigido cum pelliculis vulpinis, & ouinis, & vestibus largis, mollibus, rarificantibus poros membri cum euaporatione. Bibat melicaria aromatisata cum pipere & cinamomo, & proprie apud declinationem. Famem & sitim toleret pro posse. In fine vero declinationis fiat balnea calida styptica prædicta, similiter & cauteria dicta illic. Cura præseruatiua arthetica de causa frigida, est vt ante horam paroxysmi diebus pluribus, similiter & in principio veris et autumnii dige-

Tractatus vnicus

150. 2
ratur materia frigida grossa viscosa cū
syropo dicto capitulo de restrictione mē
struorum. parag. de empericis: vel cum
isto syrupo: recipe, pullegij, calamenti,
saluiaz, ruta, betonica, balsamita, primu
la veris, ozimi, origani, fileris, mōni. añ.
M. r. florū boraginis, sambuci, scolopen
dria, tamarisci, foliōz salicis, añmanip.
sem. ameos, anomi, ciperi, capp. acori,
squilla, polij, ana. vnciam sem. zz. cina
momi, ana. drachmas duas, piperis, bac
carum lauri, ana. drachmas tres, fiat sy
rupus cum lib. r. mellis, aut zuccari: de
tur omni die in aurora cum aqua cali
da decoctionis radicum vel seminum
diureticorum. Et si laxatiuum face
re volueris: adde in decoctione pri
ma, senæ, turbith, agarici, ana. vnciam
sem. myrobalanorum emblicorum, esu
læ, ana. vnciam sem. masticis drachmā
vnam: & detur ex eo per dies septem in
aurora. Et sunt, qui materias frigidas in
iuncturis digerunt cum oxymelle com
posito, vel squillitico: verum vsus aceti
frequens debilitat iuncturas: quare mul
tiplicetur in eis mel, & minoretur aceti.
Et post hoc purgetur cum pillulis de her
modactylis maioribus Ioannis hebem.
quoniam alijs sunt meliores. ℞. hermo
dactyl. albor. mūdatorum a cortice ex
teriori, aloes epaticæ, myrobalanorum
citrinorum, turbith albiſſim. colloquin
tidæ, bdellij, serapini. añ. drachmas tres,
castorei, sarcocollæ, euforb. harmel, apij,
añ. 3. 2. croci. 3. 1. & ꝑ. fac pillulas cum suc
co porri: & da ex eis a 3. vna ad aureum
vnum. Vel cum pillulis de oppoponaci
eiufdem, quæ a proprietate extrahūt ma
teriam paralyſ. torturæ, arthetice frigi
dæ difficult. eradicationis. ℞. oppopona
cis, hermodactylorum, serapini, bdellij,
armoniaci, colloquintide. añ. drachmas
quinq. croci, castorei, myrrihæ. zz. pipē
ris, macropiperis, cassiæ, myrobalano
rum citrinorum indorum, emblicorum,

bellericorum. añ. drachmam vnam, sca
moneæ, drachmas 2. turbith, drachmas
quatuor, aloes, drachmas septem. Infun
dantur gumme in aqua caulium, & fiat
ex eis pillulæ: dentur sicut priores: vel si
præsto aliud non sit, purgetur cum pillu
lis cochij, vel foetidis, vel aureis, vel cū
vncia semis benedictæ laxatiuæ acuatæ
cum drachma vna pulue. myrobalano
rum emblicorum, Nutriatur cibus subti
libus calidis ad siccitatem tendentibus:
vt sunt carnes laudabiles asinæ, & oua
recentia, & carnes elixæ cum petrosil,
conditæ cum pipere & sinapi. Vtatur iu
ribus cicerum, & pisorum, & omnium
prouocantium vrinam, reſeruetur ven
ter omni die laxus cum supposito vel
clysteri acuto, prout docuimus capitulo
de stypticitate ventris. parag. de emperi
cis. Bibat mellicatum, vel vinum cla
rum, vetus, amarum, vsu tamen mode
rato. Caueat a satietate cibi vel potus
pro posse. Vomati omni mense semel,
vt supra diximus. Caueat a piscibus, &
ab aqua frigida, & coitu omnino, & fa
tigatione iuncturarum ex moribus vel
stationibus laboriosis, & proprie paro
xysmo vicinante. Similiter a rebus fri
gis, viscosis, & pane azymo, & carni
bus porcinis, extremitatibus animalium,
& visceribus eorum: similiter & a casco
veteri, & a lotionē mēbrorum ex aqua
frigida vel calida: sed cum necesse fue
rit, sudet in stuphis siccis, vel sedeat in
aquis tinarum & proprie post purgatio
nes diuerſas: & tunc vtatur electuarijs
calidis: sicut sunt theriaca vetera, diatrion
pipereon, zz. conditum & melius omni
bus est pyrethrum conditum, & fit sicut
zz. conditum: quoniam a proprietate
fortificat cerebrum, nervos & membra
iuncturalia frigida: vt dicit Mes. in suo
de appropriatis, capitulo de epilepsia,
autoritate Hippocratis.

Emperica. Arthetica cum sit passio articuloꝝ timorosa sape contingens, nisi sunt cōmuniter operātes localit̃ remediōꝝ conferentiū post purgationes vniuersales, & proprie in declinatione adinuenisse genera diuersa, ex quibus sunt vnguenta, olea, balnea, fomentationes, suffumigia, quæ diximus. Vnguentum ranarum expertum, sic fit. ℞. adipis ranarum lib. vnam & f. butyri recentis, vncias sex, marciaton, agrippæ, dialthææ. añ. vncias tres: olei chamomillæ, olei anethi, olei castorei. ana, vncias duas, olei ros. vncias quatuor, olei costini, terebentinæ, ana, vnciam vnam. ceræ vnciam vnam, olei communis antiquissimi, lib. vnam. sepi castrati vetustissimi, lib. vnam. euforbij vnciam f. re sinæ pini, vncias duas, thuris vnciā vnā: conficiantur omnia simul ad formam vnguenti, & ex eo vngantur iuncturæ debiles ex causa calida vel frigida proprie tamen frigida hora declinationis ad ignem vel solem calidum leniter fricando, donec penetret cum reiteratione frequentata per dies plurimos: quoniā molificat materias residuas, & insensibiliter resoluunt. Vnguentum aliud expertum. ℞. vulpem viam decollatam, extractis tamen intestinis, & ipsam fac bulliri cum pelle & pilis in oleo communi & sanguine suo, donec caro ab ossibus dissoluatur: tūc cola oleum, quod remanet, & dissolue in eo ceram rubeam sufficientem: & si fortificare volueris: adde serapini, euforbij, oppoponacis, postquam dissoluta fuerint ad ignem in calola, & incorporentur omnia simul perfecte. Eodem modo fac vnguentum ex adipe castoris, vel canis, vel mustellæ. Vnguentum aliud magistrale aggregatum ex rebus calidis aperientibus atq; resoluentibus cum virtute: propter quod & confectus est plurimum in paralyssi atq; tortura & spasmus repletionali, & omnium ner-

uorū passioni ex frigiditate. Recipe vnguentorum trium communium, scilicet marciaton, arogon, & agrippæ. añ. 3. 4. olei laurini. 3. iij. olei castorei, olei rutæ, olei benedicti, olei petrolei, & olei terebentinæ. añ. 3. 1. pinguedinis castorei. 3. 1. misceantur prædicta cum istis rebus Recipe euforbij, serapini, galbani, assafoetidæ. añ. vnciam vnam, castorei pulueris sati. 3. 1. pipis, pyrethri, sinap. cantarid. sulphu. añ. 3. 2. oppoponacis. 3. sem. dissoluantur gumma in vino, vel aqua decoctionis cantarid. ad ignem, & cum eis incorporentur omnes res aliæ subtilissime cribellatæ, & fiat vnguentum, vel extendatur super corio albo molli, & fiat cerotum. Si vero tumor durus fuerit, bonum videtur, vt aliquid ex mollificatibus apponatur: cuiusmodi sunt adeps anatis, anseris & gallinæ, & axungia porcorum, & medulla ceruorum, & medulla crurum vaccarum, & florax liquida: verum quoniā assa est ex gummis maxime foetibus, negligatur in receptione: licet sit de maxime conferentibus in hoc casu, & apponatur aliquid ex aromaticis penetratiuis, ex quibus sunt garofili, muschus, calamus aromaticus, costus, & gallia muscata, atq; thymus: quoniam quod delectatiue sumitur, apud naturā melius operatur, siue per interius, siue per exterius offeratur. Item oleum de ranis conferens ad artheticam de causa calida in principio & augmento cū infrigidatione & repercussione propria iuncturæ. ℞. ranarū aquaticarū capita circiter lib. f. funde sup̃ ea in vase vitreato terreo olei sizamini, vel olei cōmunis kist. f. qd est pōdus. 3. 10. v. circa id: & sit vas stricti orificij, qd diligenter obturetur, & decoquat lenio igne, vsq; dū capita dissoluāt, & totū coctū fuerit: dimittatur infrigidari, & recondatur oleū in vase vitreo, & administretur liniēdo cū pēna sine fricatione omnino. Oleum benedictū conferens ad artheticam de causa

atio plurima in tina, & membrorum ablutio iuncturas relaxans. Sexta dormitatio immediate post repletionē. Septima membrorum articularium fatigatio ex cursu vel statione plurima, vel vestium strictura. Octaua est coitus: ipse nancq; a proprietate ledit cerebrum, nervos, ligamenta, stomachum; atq; omnia membra neruosa, & proprie si fuerit inordinata in quantum & quali.

Prognosticatio. Dolor articulorum si fortificetur ad vltimū difficultatem anhelitus & mortem subitā inducit. Itē si tremor cordis, & asthma & sensuū turbatio acciderint subito præ dolore, mortale. Item dolor articulorum quandoq; terminatur ad paralyfim & apoplexiam ex cerebri cōpassione. Item dislocatio iuncturæ ex dolore fit maxime in iuncturis duabus scilicet anchæ vñ cauillæ pedis, & hæc nisi statim a principio tollatur, paralyfim & claudicationem inducit perdurantem. Si apostema iuncturarum terminetur ad resolutionē gradatim quaq; die, salubre: si vero ad indurationem, quæ prohibere se non permittit per medicamina & remedia ratio nabilia, difficile: quoniā si antiquatur, ergo commotū, nec curatur. Dolor anchæ vel alterius iuncturæ si fuerit in latere sinistro, vehementior est q̃ in dextro. Arthetica difficilior curatur in senibus & flegmaticis & melancholicis per naturā, & hyeme & autumnō q̃ econuerso. Dolor artheticus antiquatus secundum periculum vel assiduitatem, raro recipit curam nisi blanditiā. Item Hippocr. 6. parti. aphorismorum. Eunt qui neq; podagrisant, neq; calui fiunt: quod verificans Gal. in commento dicit hoc verum fuisse tempore Hippo. sed non nunc propter regimen hominum gulosum. Item mulier non podagrisat, si non ei defecerint menstrua, quod Gale. ibidem verificat in commento, vt in pluribus sed non

semper. Item ibidem: Pueri non podagrisant ante spermatis emissionē, quod est anno 14. vel circa id. Quod Galenus verificās in commento ait se nunq; pueros podagricos vidisse, sed aliquñ tumore in genibus accidentem propter eorū gulositatem. Item ibidē. Quibuscuq; ab ischiatica molestatis cerebrum resilit foras, histabescit crus & claudicāt, si non vran tur. Item dislocatio anchæ si fuerit recēs, curatur: si antiqua, non. Item in dolore fortissimo iuncturarum frigiditas extrematum & sudor frigidus circa tempora, mortale.

De varicibus & elephantia Cap. III.

Istæ sunt passionēs crurum atq; pedū lex materia grossa causata, sed differunt. Nam varices dicuntur, si materia venas occupet: Elephantia vero, si musculos omniunque comprehendat. Materia autem grossa, ex qua fiunt istæ passionēs est duplex: vna quidem, quæ sit per aduersionem: & hæc est lepra particularis: Alia vero per congelationem: & hoc rarius cōtingit. Signa varicum sunt: quoniam in cruribus, inter genu & talū apparent venæ grossæ vel virides, tortuosæ: & accidunt maxime viatoribus & onera portantibus & dimicatoribus, & fabris & ad mensas regum famulantibus & crura fatigantibus stando vel currendo. Si autem materia calida sit vel frigida, discernitur per tactum calidum & colorem nigrum, & vrinam rub. grossam, & antecessionem ciborum calidorum, & laborem, & atatem, & complexionem cholericam vel melancholicam: quorum omnia contraria reperiuntur in causa frigida. Signa elephantia sunt, magnificatio cruris immensa a genu infra, adeo vt difficile sit stare vel ambulare: & iuncturæ rigescunt, quemadmodum in elephantē. Si autem materia calida sit

vel frigida, discernitur: quia in causa calida adusta sentitur caliditas ad tactum, & color apparet rubeus, obscurus cum asperitate cutis & pustulis nigris foetentibus: in causa vero frigida sentitur frigiditas ad tactum, & color apparet subalbidus cum leuitate cutis & inflatione non valde dura: neque fiunt pustulæ sed vesicæ.

Methodus. Cura varicum duplex est. Prima quidem leuior per medicinas resoluentes. Secunda vero fortior per incisiones. Flebotometur igitur a principio basilica brachij lateris eiusdem: deinde basilica pedis oppositi lateris cum flebotomo lato, & extrahatur sanguis grossus in quantitate multa, & proprie post colliquationem sanguinis melancholici ex mora in balneo aquæ dulcistepidæ. Si autem varices essent in ambobus cruribus, flebotomeni primo ambæ basilicæ in brachijs, & post hoc in pedibus inter digitum anularem & auricularem. Digeratur post hoc materia, & purgetur, sicut docuimus cap. de arthritica ram in causa calida, quam in frigida. Deinde remota causa antecedente flegmatica, decidatur coniuncta: ligetur ergo crura sub iunctura genuali per tres digitos cum fascia linea forti, habenti latitudinem duorum digitorum, vt prohibeatur cursus humorum deorsum: & si fascia imbuta fuerit in aqua pluuiali cum vino ru, styptico, vñ in albuminibus ouorum, in quibus puluis bo. arme. san. dra. terræ sigillatæ, balaustij, glandium foret dissolutus, vel in aqua decoctioni. lentiũ excorticatarum, siliginis depilati, risi, milij, plantaginis, mirtil. acaciæ, prunorum immaturorum, pitiorum, mespilorum, marcianorum et similium, melior fiet operatio. Et cum ligatura steterit per diem vnum cruribus eleuatis super lectum, flebotometur vena varicosa turgida in loco, quod est super iuncturam calcanei incisione lar

ga, & extrahatur sanguis totus melancholicus, qui fuerit in vena vna vel pluribus a ligatura prædicta. Post flebotomiam alligetur locus incisus sicut moris est, & epithymetur crus totum cum petijs lineis infusis in liquore styptico prædicto actu frigido, per dies plures quiescēdo super lectum cruribus exaltatis, & emplastretrur cum rebus eisdem, donec locus confortetur, & a fluxu securet. Post hoc fiat emplastrum resolutiuum acutum super locum totũ infra genua quod sic fit. ℞. florum chamomillæ, ficad, absynthij, rutæ, foliorum caulium, & stipitum eorum, saluæ, sauinæ, ana, M. i. decoquantur oĩa simul in lixiuio facto ex cinere quercus vel sambuci, vel vitis albæ: & deinde pistentur, & incorporētur cum eis pulueres istarum rerũ. ℞. aluminis, sulphuris, gallarum, cypressi, salis communis, añ. vnciam semis, aloes, baccarum lauri, pyrethri, seminis caulium. ana. 3. duas. In fine vero addatur sterces recens columbarum, vel caprarum, & actu calidum applicetur frequenter. Et cum eodem lixiuio calido mixto cum aceto acutissimo, vel vino veteri amaro vaporetur, & fomentetur, & epithymetur locus frequenter, donec tota materia fuerit resoluta: neque obliuiscere emplastrorum frigidorum stypticorum super coxam & genu positorum, ne fluor nouus attrahatur. Et si post ista reliquæ aliquæ apparuerint in venis, apponantur sanguisugæ quinque vel septem a genu infra, & donec earum vlcera fuerint consolidata, nullatenus abluantur. Si vero post ligaturam fortem & styptica prædicta crus denigrari coeperit, & formicare, postponantur per dies aliquot, & liniatur ex oleis & vnguentis calidis: ne forte membrum paralyticetur: deinde veniatur ad methodum iam dictam. Si vero per omnia prædicta varices non cessauerint: imo latenter

atio plurima in tina, & membroꝝ ablu-
tio iuncturas relaxans. Sexta dormitatio
immediate post repletionē. Septima mē-
brorum articularium fatigatio ex cursu
vel statione plurima, vel vestium stric-
tu. Octaua est coitus: ipse nanqꝫ a prop-
eritate ledit cerebrum, nervos, ligamenta,
stomachum, atqꝫ omnia membra neruo
sa, & proprie si fuerit inordinatꝫ in quan-
to & quali.

Prognosticatio. Dolor articuloꝝ si
fortificetꝫ ad vltimū
difficultatem anhelitus & mortem subi-
tā inducit. Itē si tremor cordis, & asthma
& sensuū turbatio acciderint subito præ
dolore, mortale. Item dolor articuloꝝ
quandoqꝫ terminatur ad paralyfim &
apoplexiam ex cerebri cōpassione. Item
dislocatio iuncturaꝝ ex dolore fit ma-
xime in iuncturis duabus scilicet anchæ
vſ caullæ pedis, & hæc nisi statim a prin-
cipio tollatur, paralyfim & claudicatio-
nem inducit perdurantem. Si apostema
iuncturarum terminetur ad resolutionē
gradatim quaqꝫ die, salubre: si vero ad
indurationem, quæ prohibere se non per-
mittit per medicamina & remedia ratio-
nabilia, difficile: quoniā si antiquatur, er-
go commorietꝫ, nec curatur. Dolor anchæ
vel alterius iuncturaꝝ si fuerit in latere si-
nistro, vehementior est q̃ in dextro. Ar-
thetica difficilius curatur in senibus &
flegmaticis & melancholicis per naturā,
& hyeme & autumnō q̃ econuerso. Do-
lor arthriticus antiquatus secundum peri-
odum vel assiduitatem, raro recipit cu-
ram nisi blanditiā. Item Hippocr. 6.
parti. aphorismorum. Eunuchi neqꝫ po-
dagrisant, neqꝫ calui fiunt: quod verifi-
cans Gal. in commento dicit hoc verum
fuisse tempore Hippo. sed non nunc pro-
pter regimen hominum gulosum. Item
mulier non podagrisat, si non ei defece-
rint menstrua, quod Gale. ibidem verifi-
cat in commento, vt in pluribus sed non

semper. Item ibidem: Pueri non podagri
sunt ante spermatis emissionē, quod est
anno 14. vel circa id. Quod Galenus ve-
rificās in commento ait se nunqꝫ pueros
podagricos vidisse, sed aliquñ tumore in
genibus accidentem propter eorꝫ gulosi-
tatem. Item ibidē. Quibusqꝫ ab ischi-
atica molestatis cerebrum resilit foras;
histabescit crus & claudicatꝫ, si non vran-
tur. Item dislocatio anchæ si fuerit recēs,
curatur: si antiqua, non. Item in dolore
fortissimo iuncturarum frigiditas extre-
mitatum & sudor frigidus circa tempo-
ra, mortale.

De varicibus & elephantia Cap. III.

Istæ sunt passionēs crurum atqꝫ pedū
ex materia grossa causata, sed diffe-
runt. Nam varices dicuntur, si mate-
ria venas occupet: Elephantia vero, si
musculos omniuaque comprehendat.
Materia autem grossa, ex qua fiunt istæ
passiones est duplex: vna quidem, quæ
fit per aduersionem: & hæc est lepra parti-
cularis: Alia vero per congelationem: &
hoc rariꝫ cōtingit. Signa varicum sunt:
quoniam in cruribus, inter genu & talū
apparent venæ grossæ vel virides, tortu-
osæ: & accidunt maxime viatoribus &
onera portantibus & dimicatoribus, &
fabris & ad mensas regum famulanti-
bus & crura fatigantibus stando vel cur-
tendo. Si autem materia calida sit vel fri-
gida, discernitur per tactum calidum &
colorem nigrum, & vrinam rub. gros-
sam, & antecessionem ciborum calido-
rum, & laborem, & ætatem, & comple-
xionem cholicam vel melancholicam:
quorum omnia contraria reperiuntur in
causa frigida. Signa elephantia sunt, ma-
gnificatio cruris immensa a genu infra,
adeo vt difficile sit stare vel ambulare:
& iuncturae rigescunt, quemadmodum
in elephantē. Si autem materia calida sit

vel frigida, discernitur: quia in causa calida adusta sentitur caliditas ad tactum, & color apparet rubeus, obscurus cum asperitate cutis & pustulis nigris foetentibus: in causa vero frigida sentitur frigiditas ad tactum, & color apparet subalbidus cum leuitate cutis & inflatione non valde dura: neque fiunt pustulae sed vesicae.

Methodus. Cura varicum duplex est. Prima quidem leuior per medicinas resoluentes. Secunda vero fortior per incisiones. Flebotometur igitur a principio basilica brachij lateris eiusdem: deinde basilica pedis oppositi lateris cum flebotomo lato, & extrahatur sanguis grossus in quantitate multa, & proprie post colliquationem sanguinis melancholici ex mora in balneo aquae dulcistepidae. Si autem varices essent in ambobus cruribus, flebotomenè primo ambae basilicae in brachijs, & post hoc in pedibus inter digitum anularem & auricularem. Digeratur post hoc materia, & purgetur, sicut docuimus cap. de arthritide tam in causa calida, quam in frigida. Deinde remota causa antecedente flegmatica, decidatur coniuncta: ligetur ergo crura sub iunctura genuali per tres digitos cum fascia linea forti, habenti latitudine duorum digitorum, vt prohibeatur cursus humorum deorsum: & si fascia imbuta fuerit in aqua pluuiali cum vino ru. styptico, vñ in albuminibus ouorum, in quibus puluis bo. arme. san. dra. terrae sigillatae, balaustij, glandium foret dissolutus, vel in aqua decoctioni. lentiū excorticatarum, filiginis depilati, risi, milij, plantaginis, mirtil. acaciae, prunorum immaturorum, pitiorum, mespilorum, marcianorum et similibum, melior fiet operatio. Et cum ligatura steterit per diem vnum cruribus eleuatis super lectum, flebotometur vena varicosa turgida in loco, quod est super iuncturam calcanei incisione lar-

ga, & extrahatur sanguis totus melancholicus, qui fuerit in vena vna vel pluribus a ligatura praedicta. Post flebotomiam alligetur locus incisus sicut moris est, & epithymetur crus totum cum petijs lineis infusus in liquore styptico praedicto actu frigido, per dies plures quiescendo super lectum cruribus exaltatis, & emplastretur cum rebus eisdem, donec locus confortetur, & a fluxu securet. Post hoc fiat emplastrum resolutiuum acutum super locum totum infra genua quod sic fit. ℞. florum chamomillae, sticad. absinthij, rutae, foliorum caulium, & stipitem eorum, saluiae, sauiniae, ana. M. x. decoquantur omnia simul in lixiuio facto ex cinere quercus vel sambuci, vel vitis albae: & deinde pistentur, & incorporentur cum eis pulueres istarum rerum. ℞. aluminis, sulphuris, gallarum, cypressi, salis communis, añ. vñcia semis, aloes, baccarum lauri, pyrethri, seminis caulium. ana. 3. duas. In fine vero addatur sterces recens columbarum, vel capratum, & actu calidum applicetur frequenter. Et cum eodem lixiuio calido mixto cum aceto acutissimo, vel vino veteri amaro vaporetur, & fomentetur, & epithymetur locus frequenter, donec tota materia fuerit resoluta: neque obliuiscere emplastrorum frigidorum stypticorum super coxam & genu positum, ne fluxus nouus attrahatur. Et si post ista reliquiae aliquae apparuerint in venis, apponantur sanguifugae quinque vel septem a genu infra, & donec earum vlcera fuerint consolidata, nullatenus abluantur. Si vero post ligaturam fortem & styptica praedicta crus denigrari coeperit, & formicare, postponantur per dies aliquot, & liniatur ex oleis & vnguentis calidis: ne forte membrum paralyticetur: deinde veniatur ad methodum iam dictam. Si vero per omnia praedicta varices non cessauerint: imo latent

Tractatus vnicus

post dies aliquot & mēses redierint, opus erit incisione venarum: quare liget̃ crus cum fasciis in locis duobus, vno quidem sub iūctura genuali ad 4. digitos, & alio super iūcturā tali, ad 3. digitos, & exco- rietur vena sub ligatura genuali, & sup̃ ligaturam tali vñ in altero loco tantum, ita vt nuda appareat: deinde eleuetur cū vncino separando ipsam a carne circū- quaq̃, & digitis apprehendendo, & lige- tur cum filo vitrobique, & incidatur per trāsuersum, & exprimatur sanguis totus medius melancholicus: deinde emplastre- tur, & ligetur totū crus cum stypticis præ dictis: quoniam generabitur in venis po- rus durus. Et scias, q̃ iste modus vtilis re- peritur in podagra, postq̃ venam cogno- ueris, per quam materia fluit. Nutriatur carnibus laudabilibus et earum iuribus, & vino albo subtili. Euitet cibos sangui- nem grossum generātes: vt sunt carnes, quæ venando capiuntur, & carnes boui- næ vel caprinæ, & caro porcorum anti- quorum fumigata & salita, & vinū dul- ce, rubeum, & panis azymus, & panis de siligine, & caseus, & similia. Caueat a labore cruris, vel statione perdurante. Caueat a lentibus, & milio, & riso, & si- milibus, & caulibus, & confectionibus de melle, & cibis assis, vel frixis omni- quaq̃. Vtatur petrosilij, fenicula, spinar- gij & similibus subtilibus, & ouis forbi- libus, & brodijs pisore, & pultribus subti- libus ex fursure, ordeo, farre, vel auena, conditis cum lacte caprarum, vel amy- dalarum dulcium, vel butyro sine pluri- mo sale. Cura elephantiz est, vt si sit de causa calida, flebotometur primo basili- ca, modo et forma dictis in varicibus. Et post flebotomiam digeratur & purgetur materia grossa, melancholica adusta, vt diximus capitulo de arthetica. parag. de causa calida. Si vero sit de causa frigida, digeratur a principio flegma gypseum, & educatur, vt docuimus ibidem de cau-

sa frigida. Post hoc vero frequenter fiat vomitus omni mense semel vel bis duo- bus diebus super se, successiue cum oxy- melle squillitico, et aqua tepida, vñ aqua decoctionis radicū raphani, seminis atri- plicis, & anethi, & modico aceti acutissi- mi super repletionem ciborum diuersorū acutorū ex oleribus & leguminibus con- ditis cum cepis & sinapi. Post tales autē purgationes, famem & sitim toleret pro- posse, & quiescat omni tempore super le- cto molli cruribus exaltatis. Post reme- dia dicta procedendū est ad localia, quæ sunt fere eadem in vtraq̃ causa. Flebo- tometur ergo vena, quæ apparet sub iun- ctura genuali, deinde flebotometur, quæ est intus super talum, & extrahatur san- guis niger grossus: deinde vñ tosetur crus totum cum scarificatione profunda: et emplastre- tur cum emplastro resolutiuo supradicto in varicibus, donec crus totū minoretur. Et si reliquæ videant̃ reman- sisse: apponantur sangui fugæ, sicut dixi- mus ibidem: neq̃ abluatur crus, donec earum morsus & vulnera scarificationū perfecte consolident̃. In fine vero rei con- fortetur crus totum cū emplastro stypti- co ex medicinis calidis & frigidis com- mixto. ℞. plātaginis, absinthij, ro. añ. m. i. decoquantur in aqua pluuiali, & vi- no rubeo pontico, & exprimantur & pi- sentur. & incorporēt̃ cū puluere istarū rerum. ℞. acacie, myrthi, mirtillorum, aloes, gummi arabi, nucis cypressi. añ. 3. 2. & calid. firmetur fortiter cum fasciā la- ta super locum. Epithymetur cū lixiui- facto ex cinere quereus, & sambuci, & absinthij, & stipitum caulium, atq̃ vitis addito modico aceti. Si vero prædicta omnia non contulerint: fiat emplastrum rubificatiuum dictum cap. de arthetica. parag. canoñ. Et si illud iterum non pro- fecerit: perforet̃ crus in duobus locis ma- xime distātibz a nervis & chordis cum acu ferrea ignita traducto cum ea filola

neo, quod omni die de extremo in extre-
mū refrigeretur, donec materia tota efflu-
xerit: neq; extrahatur, donec per se dissol-
uatur. Et sunt, qui loco eius faciunt caute-
rium, cum stilo ferreo ignito sub iunctu-
ra genuali per duos digitos ex altero late-
rum interius vel exterius, profundan-
do vsq; ad os: neq; dimittunt consolida-
ri per annum vnum vel duos, ponendo
in vlcus pillulas ex cera & pilis lanæ cō-
fectas, vř folia sambuci. Nutriatur sicut
diximus in varicibus.

Emperica. Elephantia si fuerit recens,
mollis, et parua, curat̃ quā-
doq; cum emplastris & remedijs mace-
rantibus corpus crassum: sicut fit cum li-
nistrum membrum totum ex stercore co-
lumbino, vel caprino vel vaccino distē-
perato cum vino veteri amato. Et dein-
de ponatur æger in stupham calefactam
ex ligno sambuci, & quercus, & vitis: et
sudet sudore plurimo, præter q̃ ex aqua
abluatur. Ad idem facit si membrum vř
corpus totum sepeliatur in stercore præ-
dicto calido, recenti: vel in arena cali-
da ad solem, vel calefacta ad ignem in
fornace, vel in fornace, in quo herbæ ca-
lidæ prius fuerint combustæ: ita vt caput
& pectus euententur, & venter & crura
marcescant ex calore. Et plura huiusmo-
di scripsimus, capitulo de hydropisi asci-
te &c.

Canones. Rationabile videtur, q̃ hæ-
morrhoidarum & menstru-
orum prouocatio in corpore consueto
post euacuationes vniuersales sit conse-
rens plurimum in cura varicum atq; ele-
phantiæ: cum per eas sanguis melanco-
licus adustus & non adustus sublimiter
expurgetur.

Prognosticatio. Dicit Hippocrates
sexta particu. apho-
rismorum: Maniacis, varicibus aut hæ-
morrhoidibus innatis maniacæ solutio fit.

Item in eodem. Quicunq; calui sunt, his
varices valde magnæ non nascuntur.
Quibuscunq; vero caluis existentibus,
varices magnæ innascuntur, rursus capil-
lati fiunt. Quod quidem Galenus verifi-
cans in commento ait verum esse, si per
caluiciem alopeciam intelligamus: quo-
niam alopecia curatur, caluicies nequa-
quam. Si spleneticis vel quarantarijs va-
rices aut elephantia superuenerint: tollit
ægritudinem. Item varices & elephantia
in corpore consueto præseruant a multis
malis passionibus, scilicet lepra, cancro,
hydropisi, splenetica & melancholia &
similibus: quare nullatenus restringan-
tur subito, sed gradatim purgationibus
& diuersionibus pluribus prius factis.
Item varix si antiquetur, non curatur, ni-
si p̃ incisionē. Elephantia vero si antique-
tur & magnificetur, atq; induretur, nul-
latenus curatur. Item in varicibus & ele-
phantia si menstrua vel hamorrhoides
superuenerint post eorum restrictionem
dururnā, soluit ægritudinem. Item infri-
gidatis in niue & incarcerationis consuevit
superuenire elephantia, quæ difficile cu-
ratur. Item si in elephantia crux cœperit
formicare, malum: quia calorem natu-
ralis oppressionem portendit. Item ele-
phantia de causa calida & cum pustulis
foetentibus, difficilior est ea, quæ sit a cau-
sa frigida: quoniam lepram minatur as-
futuram.

De doloribus dorsi & spa- tularum. Cap. III.

Dolor accidit in dorso, aut a causa
accidente intrinseca: & hæc est
quadruplex, vna quidem humor
calidus sanguineus extendens venam ki-
lis extensam interius super spondiles dor-
si a sursum vsq; deorsum, quam equitat
arteria ad orti, sicut dominus iumentum:
licet in exterioribus corporis sit econuer-

so vbi vena tegit arteriā per totum: sicut
seruus dominum. Sic namq sapiens natu
ra venas & arterias fabricauit & simul
ire iussit per singulas partes corporis, do
nec in ramos deueniant capillares, qui
bus materiam & efficiens tribuant nu
trimenti. Secunda causa est humor cali
dus cholericus acutus pungens neruos &
musculos, qui transeunt super dorsum.
Tertia est humor frigidus ex flegmate
vel melancholia grauans & constringēs
neruos & ossa, quæ ibi sunt plurima fri
gida per naturam. Quarta est dolor re
num ex opilatione vel arena. Aut sit a
causa primitiua & extrinseca: & hæc si
militer est quadruplex. Prima est coitus
superfluous. Secunda est labor diuturnus
in stando, vel corpus recuruādo, vel one
ra portando Tertia casus & percussio.
Quarta qualitas aëris frigidi conge
lans.

Methodus. Signa eius propter sangui
nis multitudinem, sunt do
lor extensius cum pulsatione & calidi
tate apud tactum, & vrina grossa, &
habitus viuida, carnosus, & antecessio
otij & quietis perdurans cum assiduatio
ne rerum sanguinem multiplicantium
famofarum. Et cura eius est, vt a princi
pio fiat flebotomia in die & nocte de ba
silica dextra & sinistra simul: si virtus et
ætas consenserint, vel dextra tantum: &
extrahatur sanguis plurimus pro posse:
& repercutiatur materia cum fomenta
tione dorſi totius ex aqua ros. aceto, suc
co semperniuæ, & similibus: & iaceat
æger supinus super terrā frigidā, vel sup
folia populi, salicis nenuphar, vitium, ru
bi, plantaginis, solatri, ros, si sit tempus.
Et si non suffecerit: proiciatur in aquam
frigidam, vel super niuem. In augmen
to vero fiat scarificatio profunda in nati
bus & spatulis. In statu fomentetur, &
emplastreter ex floribus chamomillæ,

melilori, seminis lini, ros. coctis in aqua,
& expressis, & repide positis frequen
ter super locum. In declinatione vero, si
neceſſe fuerit: fortificetur emplastrum ex
additione foliorum & seminis anethi.
Nutriatur cibus acetosis, & bibat aquā
frigidam, vel aquam decoctionis maci
anorum, & prunorum, aut ordei, aut iu
lep. A carnibus vero & vino abſtineat
omnino, & famem toleret pro posse. Si
tim vero extinguat cum potibus iam di
ctis, prout necessitas postulauerit. Signa
eius propter humorem acutum choleri
cum, seu flegma salsum: sunt vrina citri
na subtilis, dolor pungitius fortis cum
caliditate ad tactum & mobilitate de lo
co ad locum, & habitudo macra, citri
na, & antecessio ciborum acutorum, &
expositio corporis ad solem calidum fre
quenter. Cura eius est, vt a principio pur
getur cum vncia vna vel duabus, me
dullæ, cassiæ fistulæ, vel mānæ, vel rama
rindorum dissoluta in aqua decoctionis
prunorum colando, & dando in aurora
rotum, vel cum vncia semis electuarij
de succo ros. vel stomatici laxatiui, dan
do cum aqua calida ante diem. Deinde
digeratur residuum materiæ cum syru
po ros. vel viol. vel oxyzacarro, & era
dicetur cum pillulis de reubarbaro dictis
capitulo de catarrho: Et fiant repercussio
nes dictæ in causa sanguinea: Sed forti
or sit earum vsus adeo, vt si necesse fue
rit, cū eis aliquid opij dissoluatur. In alijs
vero temporibus, fiat sicut prius. Diate
tur ex cibus et potibus frigidis prædictis,
sed non angustietur fame, neq; siti, sicut
in prædictis, imo bibat aquam frigidam
quantum vult. In fine vero, si reliquiæ re
māserint: flebotometur basilica dextra:
quoniam educit multitudinem, & infra
gida corpus vehementer & euidenter.
Signa eius propter humorem crudum
flegmaticum, vel frigidum melanchol

eum: sunt habitudo squalida, vel macra, plumbea, & vrina alba grossa, viscosa, vel subtilis, radiosa: & quia dolor aduenit paulatim, & perdurat tempore longo assidue: & sedatur post exercitium modicum & moderatum: & forte antecessit nauseatiua satietas assidua, & potus vini plurimi & proprie in ieiunio. Et soler hæc species doloris accidere in febre slegmatica vel quartana: quoniam circa spondiles & spatulas multiplicatur humor frigidus: cum sint membra neruosa, ossuosa frigida per naturam. Et in hac specie sentitur grauitas corpus constringens cum horripilatione: sicut accedit ambulanti in niue. Cura eius est, vt a principio fiat vomitus frequens (si sit possibile) cum oxymelle & aqua calida tepida, vel cum aqua & aceto, addito modico salis & olei, vel cum aqua decoctionis raphani, & anethi post repletionem stomachi ex cibis & potibus diuersis. Vel purgetur cum vncia semis, benedictæ laxatiuæ, si vomitus non possit, sicut accidit habentibus pectus strictum, & caput debile cum gracilitate colli: Deinde digeratur residuum materię, & educatur, sicut diximus capitulo de arthetica frigida. Post purgationes vngatur collum & spina dorsi vnguento marciaton vel agrippæ ad ignem vel solem calidum frequenter in ieiunio: vel liniatur cum oleo de castoreo, vel de castoreo, vel de benedicta, & alijs calidis stypticis dictis ibidem: & capitulo de paralyti per totum. Sitim & famem toleret pro posse. Sudet & laboret in ieiunio. Nutriatur carnibus laudabilibus assis vel elixis cum feniculo, petrosilino, conditis cum sinap. Sorbeat earum iura inspissata cum vitellis ouorum, condita cum speciebus calidis aromaticis. Bibat vinum album, vetus, purum, vel mellicratum. Abstineat a potu aquæ frigidæ omnino, & piscibus quibuscumq. Signa

eius propter dolorem renum, similiter & curam complete iam scripsimus: vbi de renum passione loquebamur. Signa eius propter coitum superfluum, sunt narratio infirmi cum vrina subcitrina subtili olcaginea in superficie, & dolore circa locum renum, & concauitate oculorum, & habitudine sicca cum dolore foetido citrino. Et cura eius est postpositio coitus omnino, & somnus, & quies, & omnia quæ diximus capitulo de macie renum: quod si non sufficit: recurratur ad capitulum de satyriasi per totum. Et si hoc iterum non sufficiat, & corpus marasmetur: ad capitulum de febre hectica transeat. Signa eius propter laborem assiduum sunt: quia accedit plurimum onera portantibus, & nauem trahentibus, & athleticis. Cura eius est, quies & somnus super lecto molli tempore longo: vt ait Hippocrates: Verum si labor antiquatus fuerit, debilitans substantiam neruorum & ligamentorum & iuncturarum omnium: confortetur cum balneis & vnguentis calidis stypticis cum aromaticitate dictis capitulo de paralyti: & de arthetica per totum. Et ad idem confert proprie balneum vulpinum dictum ibidem, ita vt post exitum balnei vngatur spina tota cum vnguentis marciaton agrippæ, vel de adipe vulpino, ad solem vel ignem, vel cum frictione leni assidua penetrante. Signa eius propter casum vel percussionem, patent ex relatione patientis. Et si epas vel splen vel renes lassi fuerint, vel venarum: exhibit vrina rubicunda sicut sanguis. Cura eius est, vt ilico flebotometur basillica, vel mediana eiusdem partis. Deinde bibat aliquid aquæ frigidæ mixtæ cum aceto: quoniam agitationem humorum prohibet excellenter: & ponantur epithymata, & emplastra percussiuam famosa super locum ex ro. & solatro, & semperuiua, & lentibus excorticatis, & aqua ro.

Tractatus vnicus

& aceto, & bolo armenico, & terra sigillata, & sang. draco. & balauft. & corri. granatorum, & alijs, quæ nota sunt aliquid scienti: donec membrum confusum ab apostemare securetur: deinde ponantur resolutiua supradicta in causa sanguinea. In fine vero vngatur spina tota, & emplastretur cum stypticis dictis in cap. de paralyti, & de arthetica. Signa eius propter frigiditatem aeris continetis sunt, quia accidit post abluionem in niue vel abluionem in aqua frigida. Talis namque frigiditas quandoque membra denigrat, & cadere facit propter mortificationem caloris naturalis, & proprie in extremitatibus membrorum distantium a corde & epate, quæ sunt fons caloris naturalis. Et cura eius est eadem cum cura doloris ex humore frigido dicta superius, præter quod non est opus euacuationibus, sed calefactionibus confortatibus prædictis: verum si membrum aliquod fuerit mortificatum, necesse est ut abscindatur, si fuerit possibile: ne forte membra mortificentur vicina.

Emperica. Emplastrum cõpletum antidinum & mitigatiuum. ois doloris in quacunque particula corporis scripsimus ea, de dolore dentium parage de empericis, cui potest aliquid subtrahi ex simplicibus, vel apponi, prout visum fuerit operanti.

Canones. Dicit Hippo. 6. parti. apho. Quibuscunque dolores a dorso in cubitos transeunt, flebotomia soluit. Quod intellige verum in omni causa humoralis: quoniam flebotomia vel euacuat sanguinem, vel multitudinem: ut dicit Auicenna. ca. de flebotomia. Si vero dolor dorsus descenderit versus inguina vel vmbilicum, soluitur cum farmacia. Quoniam ut ait Hippo. vnde cunque natura repperit, illic & educere conuenit: dummodo conuenientia fuerint illa loca.

Prognosticatio. Dolor spontaneus in dorso sæpius fit a frigida causa, raro vero a calida: & iterum frequetius ex flegmate, quam melancholica: similiter & a sanguine frequetius, quam cholera: quoniam per parum est, ut in membris frigidis humor calidus dominetur. Dolor dorsus ex multitudine sanguinis illico perducit ad apoplexiam vel paralytism: nisi cum flebotomia forti subito succurratur. Dolor dorsus de causa calida, cito permutat ad resolutionem vel perniciem: De causa frigida, consuevit perdurare. Item dolor ex humore frigido crudo plurimo si perduret, apoplexiam super totum, vel paralytism super membrum vicinum consignat. Item dolor ex casu vel percussione super dorsum cantus, inducit quandoque paralytism in manu, vel pede, vel digito: quoniam a nucha oriuntur nervi motui transientes ad membra iuncturalia sibi deputata: quoniam tunc non tantum membro paralytico remedia fient apponenda, sed & spondilibus dorsus fortius: ut dicit Galenus. 3. de iuuamentis membrorum.

De gibbositate pectoris, & dorsus. Cap. V.

Accidit plerumque spondilibus dorsus & ossi lato pectoris, quod thorax dicitur, ad quod semicirculi costarum verarum terminantur, ut incurvantur intus & exterius, & fœdâ corporis faciant figuram cum attractione colli, & eleuatione humorum atque exiccatione coxarum vel ancharum. Et si ista corporis tortura fuerit ante & retro, gibbositas appellatur. Et fit propter aliquam quatuor causarum. Prima est ossium prædictorum teneritas & mollities, similiter et ligamentorum eius, sicut accidit pueris & infantibus: quare non possunt molem capitis & grauitatem propriam sustinere. Secunda est ventositas grossa frigida.

ligamenta spondilium diuidens. Tertia casus & percussio super locum. Quarta est apostema latirans in profundo dorsi vel costarum, quod sua magnitudine ligamenta propellit ad extra, & spondiles dislocat, & proprie post eius terminationem ad duritiem, & in corpore laxo raro per naturā, siue fuerit apostema calidum, siue frigidum, siue commixtum.

Methodus. Signa eius propter ligamentorum & ossium teneritatem sunt, quoniam maxime aduenit infantibus & pueris, & est sine fe. & calore: nisi fortassis dolor assiduus febrem accendat. Et cura eius est, vt fascietur dorsum & pectus totum cū fascijs latis molibus omni tempore firmiter alligatis, donec dorsi spondiles indurētur, præseruentur a fletu & vociferatione & sessione et statione erecta pro posse: multiplicetur cibis secundum numerum non secundum magnū: vt a cibis solidis, si fuerit possibile, & proprie extremitatibus porcellorum: quiescat omni tempore super lecto molli in altero laterum, vel dorso. Et si dolor extensius foris fuerit: emplastre tur dorsum ex floribus chamomillæ coctis in aqua pluuiali & vino rub. styptico, in quibus pul. thuris et mastice fuerit dissolutus: deinde diligenter expressis, & tepidis alligatis super dorsum & pectus cū fascia prædicta: sed non tangatur corpus ex alio liquore. Si vero illud nō suffecerit: rectificetur corpus ligando ipsum fortiter inter duas tegulas planas solidas subtiles, stupa interposita carminata. Et si stupa imbibatur perfecte in liquore iā dicto & diligēter expresso super tegulas firmes, melior fiet opatio. Et si illud iterum non suffecerit: firmetur super locum emplastrum stypticum cōstrictiuium extremitatū fortitudinis dictum ca. de ruptura siphac. parag. Methodus. Et dimittatur super locum decem diebus: Deinde reitetur, & dimittatur diebus quinq;, & ite-

rum remoueat: & hoc fiat toties, donec corpus a tortuositate perfecte seruetur. Signa eius propter ventositatē grossam frigidam inflatiuā sunt: quoniam post dolorem dorsi assiduū p̄durantē sine fe. accidit dorsi v̄ p̄pectoris tortura: & si vrina fuerit alba, grossa, lactea, & ætas, & complexio, & tēpus anni flegmatica, verior erit significatio. Cura eius est, vt si sit cū humoris vitio, digerāt materia flegmatica, & euacuetur cū medicinis fortibus frequentatis, quas diximus ca. de colica ventosa. Post hoc fiant localia super dorsum & pectus calida carminantia ventositates, atq; extrahentia cum virtute: sicut sunt ventosatiōes siccæ, & saccellationes & emplastrationes dictæ ibidē. Et si non suffecerit: perueniatur ad emplastrum rubificatiuum dictum de arthritica. parag. Canones. Ista tamen remedia semper firmetur vehementer super locum cum tegulis & fascijs latis & fortibus. Et si dolor augmentaretur propter vesicationem ex emplastro, postponatur per dies aliquot, & inungatur cum vnguento albo, & cum vnguento de cerussa, vel oleo ro. deinde reitetur sicut prius: in fine vero rei, & cum causa fuerit remota, fiant omnia localia ad curam pertinentia dicta in priori causa. Nutriatur cibis calidis & vino veteri amaro: famem & sitim toleret. Sudet in stupa sicca in ieiuno: habitet omni tempore in aëre calido vel calefacto. Vtatur sæpius ante diem diacimini, dyatrion pipereon, theriaca, methridato, & electuario anacardiino posito cap. de apoplexia: Et ex speciebus vratur pyrethron, pipere, cardamomo: Signa eius propter casum & percussionem, patent ex relatione patientis. Et cura eius est, vt a principio fiat flebotomia diuersa de basilica: et alia singula, quæ diximus ca. de doloribus dorsi ex casu vel percussione. Postq̄ vero locus fuerit securatus ab apostemate per repercul-

siones frigidas stypticas illic dictas, perueniatur ad remedia localia torturam respicientia: sicut ea per ordinē scripsimus in prima causa. Signa eius propter apostema, sunt febr. continua acuta cū dolore assiduo in dorso & pectore: Cum vero pertransierint: sedatur febr. continua, sed remanet dolor, & incipit dorsum & pectus eleuari. Et si apostema fuerit calidum: febris, dolor, & rubor acuentur. Si vero frigidum: febr. dolor, & rubor dimiuentur, sed tumor & grauitas augmentantur, & vrina fiet rubea, grossa. Cura eius est, vt si apud principium apostematis fueris vocatus: procedas per eius quatuor tempora, sicut in apostemate pectoris vel stomachi: vel alterius membri intrinseci: quoniam omnium apostematū methodus curatiua vna est & eadem. In declinatione vero apostematis, & cum iam terminatū est ad indurationē, procedas alternatim cū emplastris & vnguentis mollificatiuis & resolutiuis: ita tamē vt dorsum continue fasciē inter regulas supradictas: neq; causa dispositionis negligatur in mollientium atq; resoluentiū applicatione: quæ plene diximus in cap. de apostemate stomachi. In fine vero totius, intende soli dispositioni cum ligationibus & emplastris styptic. dictis in prima causa. Si vero non fueris vocatus, ante q̃ gibbositas coeperit apostemari: postponas curas apostematis, & intende curæ sclerosis primo, & gibbositatis secundo, vtriq; simul alternatim.

Emperica. In pueris, & proprie si causa nō fuerit fortis, antiqua, sufficit quādoq; cerorum confectum ex armoniacō, et laudano. añ. par. æqualib. dissolutis in simul ad ignem lentum, & incorporatis in mortario cum pistello, donec fiant sicut diuquilon, & extensis super corio albo molli, & cum tegulis leuibus et fascijs latis sæpius reuolutis firmatis super locum. Et si fortius volueris fa-

cere: adde in causa calida dragagātum, acatiam, bolum armenicum, terrā sigillatam, balauitiam, cortices granatorū, cupulas glādiū. In causa vero frigida adde bdellium, oppoponacem, thus, masticem, viscum de querc. In causa dubia omnia simul misceantur.

Canones. Quoniam neruus, & cartilago, & ossa, atq; ligamenta in complexione frigida & sicca per naturam conueniunt: neq; in modo substantiæ differunt ex radice, sed secundum gradum duriciæ, & soliditatis, consequens videtur, vt rupturæ vel dislocationi alicuius eorum æquales medicinæ conueniāt: quare dicta ea. de ruptu. siphac. & capitulo de arthetica, præsentibus sublimiter suffragantur.

Prognosticatio. Gibbositas si fuerit recens, parua, difficile curatur: si vero antiqua confirmata, nullatenus recipit curationem. Item in pueris & iuuenibus facilius tollit, q̃ in adultis & senibus induratis. Item si corpori catarrhoso per naturam gibbositas acciderit: caderet in empima suffocās cor tempore non longo: vnde Hippoc. 6. partitu. aphorismorum: Quibuscunq; gibbi fuerint ex asthmate, aut ruffi, ante iuuentutem pereunt: quoniam calor naturalis acuitur, & eius euentatio minoratur. Itē gibbositas thoracis periculosior est ea, q̃ in dorso: quoniam comprimit pulmonē. Similiter & si tumor ad interiora processerit, periculosior est ea, q̃ si exeat ad exteriora: verum quomodocunq; se res habuerit, pulmonem angustabit. Interior namq; motum eius secundum latum prohibet, exterior vero secundum longum. Item oēs gibbosi sunt asthmatici: quare vitam suam vt plurimum ex improviso termināt ante senectutē. Item sunt vt multum itracūdi, luxuriosi, & elati: quoniam in eis calidū cordis effreniter inflammatur, Item gibbositas accidens in spon-

dilibus colli extat omnium periculossima: cito namq; suffocat, velut squinãtia: vnde Hippo. Si a se. habito conuertatur collũ, & vix deglutire possit tumore non existente in collo mortale.

De laboribus sponraneis cur rentibus super extremitates totius corporis. Cap. VI.

Accidit frequẽter, vt neq; exercitio, neq; casu, neq; percussione præcedente, subito sentiat quis dolores fortes in cruribus, vel brachijs, vel pectore, vel spatulis, seu membris alijs exterioribus: quasi sit ex apostemate, vel vulnere recenti: & talis dolor dicitur a medicis labor spõraneus: quẽadmodum lassitudo propter exercitium accidens, labor dicitur absolute: prout dicit Galenus in commento illius aphorismi: *Labores spontanei narrant morbos. Fiunt autem isti labores ex humoribus superfluis currentibus per musculos et neruos, qui sunt in ambitu corporis totius sua caliditate pungentibus, sua frigiditate subito complexionem naturalem membri immutantibus, & sua quantitate continuum soluendo.* Sunt præterea trium generum, vt Gal. asserit ibidẽ. Primum namq; genus est labor vlcerosus, scilicet cum materia peccat in quali: Secundum, labor extẽsiuus, scilicet cum materia peccat in quãto: Tertium vero apostemosus, cum peccauerit simul in vtroq; Signa laboris de causa calida, sunt calor ad tactũ medicum, cum rubore & dolore pũgitiuo, mobilis de loco ad locũ, & videtur, qd sit materia furiosa. Signa de causa frigida, sunt vrina alba, grossa, vel lactea: & dolor grauius, fixus vel parũ mobilis, & cũ priuatione ruboris & coloris circa locũ: Et si stupor vel formicatio superuenerit in membro, verior fiet significatio. Similiter & habitudo corporis, si fuerit

squalida, & ætas, & complexio, & tempus anni slegmatica, & antecesserit sati etas assidua ex cibis & potibus frigidis viscosis, cum indigestione diuturna, & potus vini in hyeme plurimi, seu ilico super cibum ipsum fluctuare faciendo: significatio fiet magis certa. Signa autem distinctiua laborum sponraneorum ab apostemate sunt: quoniam in apostemate statim a principio in quacunq; particula corporis totius acciderit, fit pulsus velox, frequẽs, spissus: & sequitur febris, & tumor fortassis apparebit aliqualis, & vrina fiet rubea, vlt valde citrina, quẽ nullatenus labores assequitur: nisi fortis dolor humores & spiritus inflammet, & feb. per accidens inducat, & proprie effimeram, cum qua signa digestionis non minorantur in vrina: & si corpus consuetum fuerit huiusmodi sustinere labores periodice, & proprie post negligentiam flebotomiæ, vel balnei, vel exercitij conuerſi, vel post restrictionem mēstruorum vel hæmorrhoidarũ, vel fluxum ventris consuetum vel sang. narium, vel sudorẽ, verior fiet distinctio.

Methodus. Cura doloris a causa calida, est vt si sang. in culpa cognoueris ex habitudine viuida, carnosã, & vrina rubea, & grossa: fiat ilico flebotomia fortis de basilica partis oppositæ secundum longum vel latum: deinde de basilica partis eiusdem. Si vero chol. vel slegma salsum in culpa deprehenderit ex habitudine macra, citrina & vrina ignita, subtili, citrina: statim venter soluatur cum vnciã s. stomatici laxatiui, vel cum electuario de succo ros. dando cum aqua calida: & post purgationẽ, fiat sequenti die vel tertiã flebotomia partis eiusdem. A principio namq; rei non cõpetit flebotomia: quoniam vt ait Auic. primo cãñ. s.ẽñ. quãtra capit. de flebotomia. Et summopere tibi caue, ne flebotomando perducas ægrum ad alteram

apud statum & declinationem non suffi-
cerēt resolutiua leuia prædicta: imo pro-
cedēdum foret ad gummas calidas, quæ
sunt armoniacum, galbanum, euforbiū,
bdellium, serapinum. Et si necesse videat-
ur, ad emplastrum rubificatiuum dictū
capitulo de artherica. In fine vero rei bal-
neetur in aqua decoctionis origani, costi
serpylli, absynthij, saluix, sauinæ, menta-
strij, artemisiæ, iuniperi. Et si fortificare
uolueris: adde aluminis lib. 1. sulphu. lib.
℥. salis communis lib. 2. in decoctione: vbi
balneetur in aquis tinarum multoties an-
te cibū: Diætetur cibus calidis siccis: Ab-
stineat a potu aquæ frigidæ, & piscibus.
Sitim & famem toleret pro posse. Exer-
citetur omni die post affellationem de-
bitam vel censuerat & ante cibum, do-
nec sudet omniquaq;.

Emperica. Communiter operantes in cura laboris cuiuscuq; faciunt statim a principio flebotomiam su prædictam: quoniam licet nõ euacuet eligendo, velut farmacia, tollit tamen multitudinem: neq; medicinæ, antecessio videtur necessario præmittenda: quoniam regiminis malitia & ciborum varietas cum consuetudine flebotomadi illud nõ requirunt: quemadmodum apud regimẽ electiuum sanitatis temporibus Gal. & Hippo. ad quorum mutationem loquuntur autores posteri, & eorum interpretes methodum aggregares. Post flebotomiã vero si tempus, & agri voluntas conferint: digerunt, & euacuant materias radicatas tã in causa calida q̃ frigida, prout in capitulo de arthetica diximus. ¶ **U**ltimo vero rei vel etiam a principio, si materia fuerit pauca, fomentetur particula ex vapore aquæ calidæ decoctionis florũ chamomillæ, meliloti, ros. viol. in causa calida: sed iuniperi, absynthij, abrotani, artemisiz, sauinæ in causa frigida: recipiendo vaporem super membrum vndiquaq; pannis coopertum, vel faciant

ægrum sudare in ieiunio in stuphis ob-
 ratis calefactis ex vaporibus aquarum
 iam dictarum extinguendo lapides & ca-
 lybes ignitos, vt vapores acuant. Et post
 hæc omnia, si aliquæ videantur reliquæ
 remansisse, inungunt cum vnguentis ca-
 lidis stypticis dictis ibidem, vel marcia-
 ton, vel agrippæ, vel dialtheæ & simili-
 bus puris vel commixtis, donec materiæ
 consumptæ fuerint, & membrum cõfor-
 tatam ne alias amplius recipiat vel reti-
 neat superfluitates.

Canones. Ad præseruandum corpora
 ab huiusmodi laboribus, &
 propriè periodicis consuetis, confert ma-
 xime flebotomare, et farmacare ipsa an-
 te tempus paroxysmi per dies decem vlti-
 plures, & propriè in principio veris, & si-
 ne autumnii. Vnde Hippo. 6. parti. apho.
 Quibuscunq; flebotomia aut farmacia
 confert, hos in vere flebotomare vel far-
 macare consuevit: quod ipse significas in
 7. apho. eiusdem parti. dixit flebotomiã
 cõperere, vbi dolor sursum ascendit: far-
 maciã vero, cum ad anchas vel ilia de-
 scendit. Tunc namq; purgatio concors est
 materiæ & regioni: vnde ait: Quibuscũ
 que dolor a dorso in cubitos transeat,
 flebotomiã soluit: & farmaciã intentio-
 ne cõtraria simul intellexit: cũ fuerit vir
 diligens breuitatẽ. Et iterum comple-
 tius pertrãctans dicit. Vomitus, aut fle-
 botomiã in brachio faciendam, cum
 dolor est supra cingulum. Farmaciã
 vero vel flebotomiã in pede faciendã
 cum dolor fuerit infra cingulũ: quare 4.
 ait par. apho. Supra diaphragma dolores
 sursum farmacia indigere significant,
 quicunq; vero inferius, inferius. In hoc
 namq; loco per farmaciã omnem eua-
 cuationem intellexit. Sciẽdum præterea,
 qd labor spõraneus cum sit passio neruo-
 rum & lacertorum, quæ sunt mēbra sen-
 sibilia, motui volũtario subministran-
 tia, non est inconueniẽs si remedijs para-

lysis & spasmi & arthetice medicetur,
 sic scilicet, vt calida frigidis, & frigida
 calidis applicentur, primum canonem in
 medicina sequentes, qui dicit: Contraria
 contrarijs curantur.

Prognosticatio. apho. Labores spon-
 tanei narrant morbos. Et morbi, quos
 nuntiant, sunt apostemata & fe. & pro-
 prie si fuerint fortes frequentes. Item feb.
 continua, in qua labores huiusmodi fre-
 quenter accidunt: consueuerunt crissim fa-
 cere laudabilem per apostema creticum
 in inguinibus, vel post aures, vlt sub ascel-
 lis: quoniam hæc tria loca sunt emuncto-
 ria corporis totius: vnde Hippo. 4. parti.
 apho. Laboriosis in febribus circa articu-
 los et maxillas, maxime apostases fiunt:
 quod verum intellige, nisi natura euacu-
 etur in aliqua die critica per vrinã gros-
 sam plurimã, vel fluxum san, exuberan-
 tem. Item si quis tempore sanitaris con-
 sueuerit pati labores spõrantes in mem-
 bro aliquo, feb. superueniens terminare
 cõsuevit vt plurimum per apostema cre-
 ticum in eodem. Si vero & prius doluerit
 aliquid ante ægritudinem, illic confirma-
 tur ægritudo: quoniam membra fortio-
 ra materias propellunt super debiliora.
 Item si quis conualecens in feb. conuale-
 scentia non vera, neq; corpore purgato
 per artem vel naturam, membrum labo-
 riosum ex causa antecedente vel primiti-
 ua, recidiuam minatur, vel apostema in
 eodem. Vnde Hip. ibidem. Quibuscũq;
 resurgentibus ex morbis si aliquid labo-
 rauerit, ibi apostases fiunt. In quo cum del
 auxilio librum primum cõpleuimus ad
 votum: quoniã ipse largus est dominus,
 qui iuste petẽtibus nil abnegat, nec retar-
 dat. Cui gr̃as agentes dicamus cũ Auic.
 1. cañ. fẽ. 1. ca. de humorib. Ipsi sit laus
 omnibus factoribus meliori.

Explicit primus liber collectio
 rij Bertrucij.

BERTRV

TII BONONIENSIS,

Collectorij liber secundus.

¶ Proemium secundi libri.



PERAMBVLAVI mus curam morborum particularium iuxta pos se, cum eorum accidēti bus timorosis, quæ curā ad se trahunt, volumus nunc forma simili vniuersaliū atq; suo rum accidentium curam attrēare. Quod si quis ordinē nostrum reprehenderit con firmans, secundum doctri. Arist. vniuer salia particularibus præferendo: ei respō debimus, q; in sciētijs quadruplex genus vniuersalium reperitur. Primum est vni uersale philosophorum, quod vniuersale causalitate dicitur, quemadmodum deus & intelligentiæ, & corpora cœlestia cum suis motoribus diuersis. Et hoc quidem vniuersale prius est apud naturam, poste rius vero apud hominē cum ad ipsum omnis nostra cognitio limitetur. Secun dum est vniuersale logicorum, cuius est vniuersale prædicationis, & posterius di citur quēadmodum genus, & species &c. Et ipsum quidem contrarium est priori: quoniam est posterius apud naturā, prius vero apud hominē, vt quod causatur per abstractionē a particularibus, a quibus omnis nostra cognitio depēdet. Tertium est vniuersale mathematicorum, quod vniuersale dignitate nuncupatur: quem admodum prima principia siue dignita tes, verbi gratia: Omne totum est maius sua parte, & ipsum quidem est medium prædictorum: quoniam est apud hominē & naturam prius: cū ab ipso vna queq; veritas roboretur. Quartum vero est vniuersale medicorum, quod vniuer sale subiecti capacitate nominat: qua-

lia sunt feb. decoratio, veneficium, solu tio continui, dislocatio, similiter & apo stema: quoniam vel totum corpus simul occupant, cum insunt velut feb. & vene ficum: vel apta sunt quibuscunq; corpo ris partibus aduenire, velut continui so lutio: similiter & apostema: vel pluribus partibus simul vel diuisim: quemadmo dum dislocatio iuncturarum: & hoc qui dem vniuersale postremum est prædicto rum: quoniam & apud naturam, simili ter & apud hominē posterius est: quē admodum totum integrale scitur poste rius sua parte. Scripturi itaq; de morbis vniuersalibus, non loquemur nisi de tri bus, quæ sunt fe. venenatio, & decoratio: Alios vero manuali derelinquemus ope rationi. Verum quoniam de talibus ali quid boni scribere difficilissimū est. Est namq; feb. morbus periculosior, qui est, vt ait Gal. 8. de inge. sani, quoniam acti uissima qualitate corpus afficit, singu lasq; partes inficit, & opus virtuti dene gat: neq; medicinæ præstat apparatus. Et quod omnium difficilissimum est, abrup tis prognosticantium sententijs, medi cantis animum perterret. Idcirco diuina pietatis auxilium deuoto corde sedulus interpello: quatenus scribentis calamum taliter manuducat, vt nec in fe. cognitiōe deuler, nec in curatione erret, neq; in futu ro; præfagio vacillet, offerens libi ver bum Gal. scriptum 3. li. de medicinis sim plicibus parte proœmiali. In primis deū protektor, cuius nomen sit benedictum.

¶ De diffinitione & diuisione fe. Cap. I.



Febbris est calor omnino con trarius naturali: propter qd & feruor incommensuratus etymologizatur. Hæc autē contrarietas attenditur in tribus. Primo quidem in forma & essen tia: quoniam calor vero naturalis est ca-

lor mixti, secundum q̄ mixtum: calor febrilis est calor elementi, secundum q̄ elementum: quoniam est calor naturalis in igneum permutatus: vt dicit Galenus in commento illius aphorif. Qui crescūt &c. Secundo differunt in fine & operatiōe: quoniam naturalis calor operationes omnes in nobis perficit, & corpus custodit: calor vero febrilis destruit & corrumpit. Tercio vero in efficiēte atq; motu: quoniam calor naturalis mouetur a circumferētia ad centrum per viam vniūnis: calor vero feb. a centro ad circumferentiam per viam segregationis mixti in simplicia elementa: propter quod & a philosophis calor putredinis appellatur: vt patet quarto meteororum. Non possunt autem predicti duo calores subiecta materia differre: cum natura sit contrariorum eidē subiecto vicissim ineffe: quapropter sicut calor naturalis primitus est in corde: cum sit fons vitæ, & ab ipso procedit per venas et arterias in mēbra corporis vniuersa, vitam ipsis tribuens & virtutem: ita esse oportuit & in feb. verum cum calor naturalis sit temperatus atq; in medio existens: quoniam omne naturale temperatum: & omne temperatum est naturale, vt ait Galenus primo de accidenti. Concluditur euidenter ergo, q̄ quemadmodum calor febrilis ab ipso recedit per excessum: ita frigidas complexionis equalis ab ipso recedit per defectum. Et ista dicitur apud medicos hecetica senectutis. Ex quibus quidem omnibus talis a Gale. primo de feb. descriptio febris colligitur aggregās omnia genera causarum. Febris est calor innaturalis, accensus primo in corde, procedens ab ipso per venas & arterias mediante spiritu & sanguine in totum corpus, nocens sensibilibiter eius operationi naturali, non sicut calor ab ira, vel exercitio, vel ab igne: nisi cum fuerit vltimius permutatus. Neq; refragādum est

tali diffinitioni, per hoc quod dicitur calor innaturalis: quemadmodum faciunt sophistæ putantes calorem naturalem in corde esse rem aliam a calore innaturali eiusdem: quoniam illud a superiori reprobatur est artificie, scilicet quod duo accidentia solo numero differentia simul in eodem reperiiri possint subiecto: quare sciendum quod sunt vnus & idem velut in carbone ignito, & post hoc magis ignito, donec inflammetur. Similiter neque obijciēdum, quod in feb. epiala & lipparia calor feb. non expanditur per totum: quoniam illud fit per accidens & a causa prohibente: prout explanabimus cum de eis differemus. Cuius quidem simile accidit in primo punctuali principio feb. cuiuscunq;, & proprie humoralis: quoniam tunc corpus infrigidatur exterius, & quandoq; superuenit rigor super totum, ita vt ex hoc stulti putēt esse paroxysmū feb. interpollatæ: quem frigus, & rigor, & horripilatio consueuerunt antecedere, priusquam feb. superueniat, vel materia putrefiat. Talis nāq; corporis frigiditas non accedit, nisi quia natura, febrilis caloris similiter & suæ causæ nocumētum percipiēs, per totum reuocat sua propria instrumenta, spiritum scilicet, & calorē, & sang. ad cor: vt ibidem vnita roborentur contra morbū: quare per accidēs depauperantur exteriora calore & colore. Ex predictis ergo ostenditur: quoniam & si epar vel stomachus vel cerebrum vel splen, & vniuersaliter omnia membra corporis inflammantur, præterq̄ cor inflammatum, non fiet vera febris, quemadmodum neque si epar & membra singula infrigidentur præter cor, dicetur hecetica senectutis, sed hydropisis vel cachexia: Quapropter sequitur, vt ois feb. sit calor innaturalis corporis totius: licet illud nequaquā conuertatur. Concluditur etiam, quod ex nullo accidentium cognosci possit feb. præter q̄ ex actione

Tractatus primus secundi libri

lęsa virtutis vitalis, quę pulsu percipitur arteriarum: quoniam immediate se, desert a fonte & stipite in riuulos atque ramos: propter quod ait Gal. li. suo de pulsibus. Pulsus est pręco fidelis super dispositiones cordis, qui non fallit: potest nāq; vrina tingi plurimum: licet non sit in cor de feb. omnino. Diuidentes autem febres dicamus, qđ omne accidens diuiditur penes materiam subiectam, per quam & diffinitur in abstracto vel cōcreto. Subiectum autē febris completum est corpus humanum viuēs: cum morbus sit passio viuētis: vt ait Aristotelē in lib. de causa longitudinis & breuitatis vitę. Hoc vero corpus tribus tātum partibus integratur, quę sunt membra, spiritus, & humores: Quarum prima corpus constituit: Alię vero duę in esse viuō & operatione conseruant. Sic igitur erunt ea tres primę febris species siue differentię: quia si calefactum esse sit in membris & eorum humilitatibus secūdis: calefieri vero in spiritibus & humoribus primis, constituet febr. hectica. Si vero calefactum esse sit in spiritibus: calefieri vero in membris et humoribus, constituetur febris effimera. Si vero calefactū esse sit in humoribus: calefieri vero in membris & spiritibus, constituetur febris humoralis, quę & putrida nūcupatur. Istarum autem specierū subdiuisiones pertractabimus inferius si gillatim, cū in proprijs capitulis de qualibet loquemur. Signa febris in eo qđ febr. sunt, caliditas corporis totius apud tactū maior debito & solito sine causa manifesta: & pulsus maior, fortior, velocior atque spissior, qđ sit per naturam: Similiter & anhelitus, & actio lęsa in oībus operibus naturę corrupta, diminuta, vel ablata omnino. Verbi gratia: quoniam apud actionem lęsam virtutis animalis impedit imaginatio motus progressiui, visio, gustus & auditus: Sed apud actionem lęsam virtutis vitalis impeditur pulsus &

anhelitus, & gaudium & delectatio consueti. Apud actionem vero lęsam virtutis naturalis, impeditur appetitus et digestio, euacuatio stercoris et vrinę: verum tamen diuersificatur hæc omnia accidentia per species se, diuersas pđictas: prout suis capitulis enarrabimus. Et febrium quidem similitudinem, similiter & differentiam trium prædictarum talem nobis tradidit Gale. medicorum princeps, primo de feb. & eius interpretes Auicē, quatuor canōn. señ. i. Et est, cum lebes calidus calefacit aquam in se & aërem extra se: quod est exemplum feb. hectica. Est etiā cum aqua feruēs infunditur in lebetem, & ipsum calefacit, & aërem vicinum: quod est exemplum feb. putrida. Est etiā cum lebes & aqua frigida calefiunt ab aere calido, quod est exemplum feb. effimera. Et ex hoc scire potes in opere, quod facilius est curare febr. effimeram quā putridam, sicut & putridā, quā hecticam nisi forte felicem hecticam primę speciei: neq; confirmatam comparare voueris feb. putridā in vltimo malitię confirmatę. Dicunt præterea medici, qđ febr. putrida est febr. siens: quoniam esse eius dependet a sua causa. Febris vero hectica & effimera sunt morbi facti: quoniam post earum impressionem amplius a causa non dependēt. Ipsę namq; sunt (vt plurimum) a causa primitiua cuiusquidē nulla, vel modica reperitur intentio in curādo. Febr. vero putrida sit (vt plurimum) a causa antecedente & coniuncta: quare indicatio præcipua reperitur in cura: vt ait Gale. 8. de ingenio sanitatis. Febr. ergo facta vna intentione curantur, quę est alteratio: Febres vero siens duabus indigent intentionibus, qđ sunt euacuatio, et alteratio pfecta. Quęlibet præterea febr. si nondum impresserit eius dispositionē in corpus, & sit imprimere parata ex quacūq; leui causa, dicitur febris futura fieri. Et indicatio eius in

cura præcipua sumitur ab actu præferua-
tuo, qui cōsistit in rectificatione talis cau-
sæ, vel eius euacuatione. ¶ Vt iterum
quorū sciendū, qd feb. est essentialiter ma-
la complexio calida, prout ex dictis pro-
batum est. Est tamē & m̄ala complexio
sicca per accidens & ex consequenti: qm̄
omnis calor cū excesserit: exiccat, quē ad
modum & frigiditas humectat: vt dicit
Gal. loco prædicto: quare & res curantes
siue sint cibi, siue medicinæ, oportet vt
sint frigidæ & humidæ cum virtute. Vnde
ait Hippo. 1. part. apho. Humidæ dicitur
oibz febribus frigiditatem conferunt, expli-
cans qualiter ambiguitatem, subiectis vero
certam propter breuitatem.

¶ De febre effimera. Cap. II.

Febbris effimera, prout in prioribus
ostendimus, est mala complexio ca-
lida. diuersa corporis totius, accensa
tamen primitus in corde, habēs radicem
& calefactū esse in spiritibus; ramos
vero & calefieri in humoribus atq; mē-
bris, nocens sensibilibz actioni naturali:
sed quoniam vt ait Gal. primo de fe. me-
lior febrium distinctio est, quæ sumitur a
materia subiecta. Idcirco pro speciebus
fe. effimeræ discernendis, spiritum capia-
mus dicētes, qd triplex est spiritus, scilicet
vitalis, naturalis, & animalis: non quidē
quia differant essentiali forma, vel effici-
ente, vel materia, sed solo fine, similiter
& modo cōplexionis, verbi gr̄a: Omnis
namq; spiritus per essentiam corpus mix-
tum, clarū, subtile, calidum, vergens in
similitudinem supercelestium corporū.
vt ait Auicē. in lib. de viribus cord. Est
etiā a corde & in cordis sinistro ventricu-
lo generatus secundum formam substan-
tialē, & complexionem perfectam ex
sanguipe purissimo in ventriculo dextro
aggregato: vtrū tamen quoniā sub hac
forma & complexione non poterit im-
mediatē operationes omnes corporis exercere:

quoniam eius caliditas superflua
prohibet operationes animales, humi-
ditas vero deficiens operationes natura-
les, transmittit ipsum sapiens natura ad
membra duo principaliora post cor. scili-
cet cerebrum & ep̄ar, vt in ipsis nouum
gradum complexionis induēs prædictis
operationibus aptaretur. ¶ Hoc igitur
calefactum esse, aut extat infixum spiri-
tui virali, qui primus est, atq; calidior &
simplicior omnium: aut naturali, qui cō-
positior: aut animali, qui omniū est ma-
xime refractus atq; tēperatus. ¶ Si qui-
dem ergo infixū fuerit primo spiritui vi-
tali, consurgunt quatuor species. Prima
quidem, propter iram inflammantē. Se-
cunda, propter tristitiam constringentē.
Tertia, propter aerem calidum peruen-
tē. Quarta, propter aerem frigidū oppri-
lantem. ¶ Si vero calefactum esse fue-
rit infixum spiritui naturali, consurgunt
quinque species. Prima quidem, propter
famem vel sitim inflammantem. Secun-
da, propter cibum & potum calefacien-
tem. Tertia, propter nauseatiua satie-
tatem opprimētē. Quarta, propter ven-
tris fluxum vel stypticitatem superfluen-
tem. Quinta, propter negligentiam exer-
citij, vel balnei cōsueti, vel flebotomiæ,
vel sudoris, orificia venarum oppilantē:
ad quod etiam reducitur omnis res oppi-
lans, & p̄ interius: vt cibus & potus gros-
sus, viscosus: & per exterius, vt balneū
thermarū, vel decoctiōis herbarū. Quod
si calefactū esse sit infixum spiritui ani-
mali, surgūt sex species. Prima quidem,
propter solitudinem angustiantem. Se-
cunda, propter vigilias perdurātes. Ter-
tia, propter somnum excedentem. Quar-
ta, propter catharrum calidum adurentē
vel frigidum constringentem. Quinta,
propter aerem calidum cerebrum colli-
quantem, vel frigidum comprimentem.
Sexta, propter exercitium & laborem fa-
tigantem. ¶ Signa autem feb. effimeræ

Hubertus radicem & calefactum per g: Spiritus sunt causa materiali lib
operari, mediata quidē: Causa vero immediata quæ et ratio efficien-
tis. Est substantia substantia spiritibus, & ipsa iocunda
in raritate & spiritibus. Et qd ex quibz colligitur modus

Tractatus primus secundi libri.

communis, sunt pulsus non valde velocior neq; frequentior naturali consueto, similiter et anhelitus: & quoniam in ipsis diastole maior est, quam sistole: cum necessitas euacuandi sit adaucta, præter q̄ necesse sit fumum expellere caprinolum: & vrina non perdit signum digestionis a principio neq; tingitur vehementer, & tactus quidē corporis est calidus a principio, qui manum pungit: verum statim remittitur, si manus in loco steterit tempore nō longo: neq; lingua est vehementis siccitatis, vel asperitatis, vel nigredinis: & sitim eius extinguit magis aer frigidus, q̄ aqua. Ex signis certioribus sunt post aperientia: quoniam in principio feb. non accidit horripilatio, vel paucitas: neq; in declinatione fit sudor omnino vel paucus, roridus, subtilis. ¶ Signa vero propria speciei cuiuscunq; trahuntur complete ex infirmi narratione super antecessione causæ primitiue cuiuscunq; supradictæ, quam decet medicum diligenter indagare.

Methodus. Cura feb. effimeræ secundum omnes eius species ferè est vna & eadem in genere, quod est: vt habeatur intentio super alienatione causæ primitiue, quæ febr. induxit, cum administratione rei omnis contrariæ, donec temperies inducat: quoniam vt ait Hippoc. In omni motione corporis cum ceperit quis laborare, statim quiescere remedium est: nec in hoc cadere potest error apud aliquem sciētem in medicina, præterquam in duabus eius speciebus, q̄ vltiorem curā ad se trahunt. Quarum prima ea est, quæ fit ex nauseatiua satietate, in qua quidem oportet causam decidere, & post hoc dispositionem alterare: vt ait Gal. 8. de ingenio sanitatis. Verbi gratia: quoniam si crapula sit adhuc in stomacho, quod scies, quia recens est, neq; ante tempus longum assumpta: Similiter & sentit patiens dolorem grau-

tium apud partem ventris superiorem cum eructationibus diuersis: tunc non euadet alterum duorum modorū: quoniam vel est cibus nōdum corruptus plurimū, sed potest reduci ad benignū: quod scies ex eructatione saporem cibi retinente: quare det diatriam & piperion diagallagē cū vino veteri amaro puro, ī modica ramen quantitate, ne forte feb. dispositio augmentetur: & post hoc abstineat a cibo p̄ duos vel 3. dies & dormiat pro posse vel exercere, donec tora crapula digeratur, & redierit appetitus: & fiant dicta ca. de debilitate stomachi. Vel cibus est corruptus, quod scies quod eructationes sunt foetide, horribiles, fumosæ quidem, si corruptio processerit a calido excedere: acetosæ vero, si a frigido deficientē, quare statim educatur a principio per vomitum: vt docuimus ca. de bolismo. ¶ Si vero cibus ad intestina descenderit, distinguendum fiet hoc modo: quoniam vel stat adhuc in superioribus et gracilibus, quod scies: quia cessant eructationes, & dolor sentitur circa vmbilicum, et antecessit longū tēpus post cibū assumptum: quare si sit beniuolus: detur diatrion piperon, sicut prius: quoniam & in intestinis gracilibus quodammodo perficitur digestio prima: vt ait Gal. 8. de ingenio sanitatis cap. de fe. effici. ex satietate. Si vero sit maliuolus, & torsiones & angustias cum vigilijs patitur: educatur statim a principio cum medicina leui: sicut stomaticō laxatuum, & bened. & hierapicra: vel cum clysteri lenitiuo dicto ca. de sympticitate ventris: vel cū suppositorijs dictis ibidem. Vel cibus descendit ad intestina grossa inferiora: quare tunc educatur per clysteria siue crudus sit siue corruptus. ¶ Secunda vero species difficilis est, quæ fit ex oppilatione orificiorum venarum capillarium & pororum cutis, in qua quidem necesse est, vt medicus statim a principio sagaciter pro-

cedat, ne forte in feb. putridam conuertatur, ad quam maxime prona est propter prohibitiuam humorum transpirationem. Primo igitur materias euacuet cū flebotomia quidem, si sanguis solus, vel omnes humores simul æqualiter dominentur, qd scies ex habitudine carnosa, vñ plethorica, & vrina rubea, vel cōfusa, & colore corporis viuido vel turbido: Cū far macia vero, si vnus humor solus alius a sanguine, vel duo dominentur: quod scies ex vrina citrina subtili, vel karapo, grossa & regimine præcedente: post euacuationem vero poros aperiat cum balneo aquæ dulcis tepidæ, vel aqua decoctionis florum chamomillæ, in quo totum corpus leniter fricetur tempore longo in ieiunio ex farina fabarum, vel fursure vel sale: similiter & per interiorum cum syrupo acetoso, vel oxymelle, & cibis subtilibus: ita tamen, vt si oppilatio fortis fuerit, quod scies, quia se. est fortis, fortioribus est vtendum, sed si oppilatio modica fuerit, quod scies, quia febris & anxietas est modica: leuioribus insistendum est medicinis.

Emperica. In cura omnis feb. effimeræ, præterquam in illa, quæ sit a fame, vel siti, vel exercitio excedente, conferre videtur euacuatio cum flebotomia, vel farmacia iuxta electionem prædictam. Similiter & diæta reuulsus in quantum: atque qualis: quoniam & si non quilibet feb. effimera sit cum materia plurima sine repletionem, in qualibet tamen ipsarum læditur virtus digestiua: quare cibum simul plurimum vel grossum non potest elaborare: neque per hoc titimendum est de virtute, cum tempus huius feb. sit breue: vt infra iam dicitur. In declinatione vero cuiuslibet ipsarum competit balneum aquæ dulcis tepidæ: quoniam calorem feb. alterat, & reliquias insensibiliter resoluit. Sciendum præterea, quod in feb. effimera præ-

dicta quandoq; surgunt accidentia mala, quæ sunt dolor capitis, vomitus, fastidium, sitis, & similia: quibus succurrendum est, prout in singulorum capitulis docuimus pro posse.

Canones. Dicit Galenus octauo de ingenio sanitatis, qd proprium feb. effimeræ est. non transire tertium diem: quod si cessauerit die secunda, breuior & leuior dicitur: Si vero prima die cessauerit, verissima atq; purissima nuncupatur: cum nomen feb. effimeræ tempus vnus diei a Græcis interpretetur: nec est aliqua febris effimera quæ diem tertium transire possit: præter quod in febrem putridam conuertatur, excepta ea, quæ sit ex oppilatione orificiorum venarum & pororum: quæ quidem durare potest vsque ad diem quintam: quod si tunc non resoluitur in putridam est conuersa: quare & hæc febris non est vere effimera, sed quasi media inter effimeram & putridam iudicatur. Dicit etiam Galenus ibidem, quod proprium est feb. effimeræ, non habere periodos, neque paroxysmos: quoniam per se odus a materia dependet humoralis, præterquam in febre effimera ex oppilatione, quæ quidem periodos habet. Verbi gratia, quoniam si materia oppilans fuerit grossa, flegmatica: fiet periodus diurna: Si vero cholericæ subtilis, fiet periodus de tertio in tertium: Si melancholica, de quarto in quartum: si sang. affliget assidue, velut synocha cum acerbatione apud auroram. Istis nanque alterationum temporibus materia parum post parum oppilat: & parum post parum euaporat. Dicit præterea Galenus ad istud propositum, qd ad apostema intrinsecum in quocunq; membro, non potest accipere feb. effimera: ad apostema vero extrinsecum, et proprie paruum, et in aliquo emunctoriorum, non sequitur nisi se. effi-

Traſtatus primus ſecundi libri

mera, quod eſt: quoniam in eo non perue-
nit vapor putridus ad cor cū ſua ſubſtan-
tia, ſed cum virtute & alteratione ſola,
quod eſt proprium effimerarum.

Prognostiatio. Solicitandum in cura
feb. effimeræ ſtatim
a principio: quoniam ſi diem quartā vel
quintā ad plus tranſierit, fe. putridā
inflammat. Item ſi effimeræ calor &
omnia accidentia de die in diem mino-
rētur, ſalubre. Si vero calor fortificetur, et
pulsus diuerſificetur, & diaſtole minore-
tur, cum augmentatione ſiſtoliſ, & vrina
tingatur, neq; in ea ſigna digeſtionis per-
ſeuerent cum ſectore corporis & omniū
exeuntium amplius debito: ſignificant,
quoniam apud diem quartum vel quin-
tum cōuertitur in putridā timorofā,
ſi non ſuperuenerit ſudor roridus, aut vo-
mitus ſpontaneus, aut fluxus vētris, aut
exitus ſanguinis narium, aut alia euacu-
atio ſenſibilis eradicans cauſam antece-
dentem feb. putridæ fieri futuræ. Item ſi
in apoſtematibus interiorib; ſigna fe. ef-
fimeræ puræ apparuerint, paruitatē apo-
ſtematis, & ſalutem ſignificant. Contra-
vero ſi ad apoſtemata exteriora velut in
emuntorijs, ſigna febris alterius appa-
ruerint, præter q̄ febris effimeræ magni-
tudine apoſtematis timorofi ſignificat.
Vnde Hippocrates 4. parti. apho. In bu-
bonibus omēs feb. malę, exceptis effime-
ris. Item corpus ſanguineum per naturā
ſi febricit feb. effimera propter nauſeati-
uam ſatiatetatem, pronum eſt labi in feb.
putridā timorofā, & proprie, ſi ven-
trem habuerit conſtypatum, & demum
hecticā pernicioſā. Item corpus ſte-
gmaticum per naturam febricitans feb.
effimera ab æſtu ſol. vel negligentia pur-
gationis, & exercitiij cōſueti, pronum eſt
labi in fe. putridā chronicā malignā,
niſi apud diem tertium, vel quintū euacu-
atio ſuperuenerit ſenſibilis copioſa. Itē
corpus melancholicum per naturam ma-

xime potens eſt omni feбри eſſi. reſiſtere,
& hoc quidē ratione cōplexionis: quē ad
modum corpus temperatum potēs eſt il-
lud facere ratione fortitudinis virtutis. Itē
corpus calidum ſiccum per naturā fa-
cilis a fe. effimera curatur, q̄ corpus fri-
gidum & humidum per naturā: quemad-
modum & facilis labitur in ipſam. Vn-
de Hippo. 2. parti. apho. In morbis minus
periclitantur ægrotantes &c. Item feb.
effimera propter oppilationem venarū
& pororū corporis eſt omnibus alijs diffi-
cilior in cognoscendo atq; curādo: vt di.
Gaſ. 8. de inge. ſañ. quapropter ad ipſius
cognitionem plenius habendam ſcire cō-
uenit: quoniam hoc genus feb. nō accidit
corporibus extenuatis, ſed repletis. Ad
ipſius curationem purgationibus ſtatim
a principio fortibus eſt inſiſtendum.

De febre hectica, & eius ſpe- ciebus. Cap. III.

Feb. hectica (vt in principio defi-
nitionis fe. oſtendimus) eſt mala cō-
plexio æqualis calida & ſicca ha-
bens calefactum eſſe in cordis ſubſtātia
primo & in ſubſtantiā aliorū membrorū
omnium ex conſequēti, caleſieri vero in
humoribus & ſpiritibus. Fit autem hoc
genus feb. raro per ſe incipiendo, vt pluri-
mū autē conſequendo ægritudines alias.
Cum autem fit per ſe incipiendo: fit ab
ira aſſidua, vel labore, vel fame, vel col-
tu cor & membra inflamante atq; exci-
tante. Cum vero fit cōſequendo: fit alte-
ro duorum modorum: quoniam aut con-
ſequitur ægritudines vniuerſales, & hoc
vt plurimum. Omnis namq; feb. putrida
cum perdurat, & proprie in corpore cho-
lerico, vel melancholico, tranſit in hecti-
cā: aut cōſequitur ægritudines particu-
lares, & ſic accidit propter debilitatem
quinq; membrorum principalium, præ-
cipue cordis, pulmonis, eparis, & ſtomachi,
atq; renum, cū ſuper aliquod ipſorū

mala complexio calida & sicca longo tempore durauerit: vt ait Gal. 3. de inge. sanita. Et in isto quidem sermone comprehendo intestina, & venas, & miseras: quoniam stomacho & epati alligantur. Sunt autem feb. hec̃tica tres species, siue gradus. Prima quidem incipiens: & est, cum humiditas quæ ros dicitur, mēbris circūfluens depascitur: quemadmodum cū lucerna depascit oleum circūdans: & hæc est cura communis facilis, sed cognitionis difficilis. Secunda vero procedens: & est, cū humiditas illa, quæ cambium dicitur, membris imbibita cōsumitur: quemadmodum cum lucerna consumit oleum imbibitum in lychnio: & ipsa est facilis cognitionis, difficilis vero curationis. Tertia autem est perficiēs: cum humiditas illa, quæ glutē dicit̃, mēbrorum substantiam conglutinans inanitur: quemadmodum cum lucerna inanit humidū radicale lychnij: & hæc est manifestæ cognitionis, sed impossibilis curationis. Quoniam licet humidum influēs restaurari possit, humidum tamen radicale nequaq̃: propter quod ait Auicē. 4. cañ. præsentia. q̃ si tertia species hec̃tica posset curari, posset & senex per naturam iuuentutem induere, & se in esse viuo perpetuare. Signa propria fe. hec̃tica trahūtur a rebus quinq̃. Quarum prima est caliditas corporis infixa, quam æger non sentit, vel parum: & cū medicus manum apponit, sentit a principio calorem lentum, nisi feb. putrida complicitur: sed si manus diutius immoret̃, sentit augmentum caloris, velut puncturam acuum: cuius contrarium est in feb. effimera & putrida. Secunda est, quoniam hæc feb. nō habet paroxysmos, nec exacerbationes aliqua horarum diei: imo est fixa æqualis tēpore assiduo, nisi forte per accidens. Verbi gratia: Quoniam vt ait Gale. 1. de febribus. Feb. hec̃tica semper fortificatur per duas horas a cibo assumpto: li

cet diuersis horis inordinatis sumantur. Et ideo: quoniam tūc calor bullit ex aduentu humidi nutrimentalis super membra, velut cum aqua spargitur super calcem viam. Tertia est pullus spissus, velox, durus, debilis, subtilis, & longus ex caliditate & siccitate arteriarū: & cordis cum debilitate virtutis: quæ propter si filum humidum circūdatur brachio citius exiccabitur apud arterias: similiter si vnguentū, vel liquor liniatur super corpus rotum, citius exiccabitur apud thoracē. Quarta est, vrina velut corporis sani, & proprie in principio: verum cum processerit, fit vrina citrina intense cum oleagineitate superflua: & cum maxime processerit, fit aquosa cum vinctuositate plurima, propter caloris innati extinctionē, & humiditatum radicalium membrorū spermaticorum consumptionem. Quinta ab habitudine corporis trahitur: vt si cum prædictis corpus de die in diem extenuatur sine causa manifesta, & vigilie superfluant cum prostratione appetitus & desiderio assiduo attrahendi aerem frigidum. ¶ Signa autem distinctiua triū specierū prædictarū, sunt additio & remissio signorū prædictorū. Verbi gratia: Quoniam si signa priora omnia fuerint recentia atq̃ remissa, est prima species. Si vero fuerint fortiora & facile apparentia, ita vt vrina sit oleaginea, & adeps ventris & musculorum minoretur, & oculi concauentur, fiet secunda species. Cum vero fuerint vltimata, ita vt facies sit tornatilis, & caro musculorum omnino consumpta, donec ossa & nervi apparere coeperint præter consuetudinem, & cutis sit tensa velut corium ad ignem arefactum, quæ cum extenditur, redit cum plurima tarditate, & vox fiat gracilis, & venæ apparentes vacuæ a sanguine: tūc erit tertia species mortis vicina plaga.

Methodus. Feb. hec̃tica, cū sit febris facta: vt diximus capitulo

Tractatus primus secundi libri.

de diuisione feb. autoritate Galeñ. 10. de ingenio sanitatis, solis indiget alterationibus ad frigiditatem & humiditatem; nec est opus euacuatione causa: quoniã post suũ esse non dependet amplius a causa, nisi forte per accidens: vt pote quando consequitur ad feb. putrida illa remanente. ¶ Hac aut̃ alteratio cõplete tribus rebus perficitur, quæ sunt balneum, cibus & inunctio. In aurora igit̃, & post somnũ & digestionẽ duplicẽ cõpletam, surgat a lecto suo morose sine strepitu, et exoneret ventrem suum, si fuerit possibile, ab egestionẽ & vrina, tunc intret balneum humectatiuum, lenitiuũ, quale est proprium balneum aquæ dulcis tepidæ, sub aëre tẽperato: & fortius illo est aquæ decoctionis maluarum, foliorũ salicis, populi, & cucurb. papa. & nenuphar. viol. & ordei depilati. Et itẽ fortius est balneum ex lacte dulci recenti, aut ex lacte & aqua simul mixtis: & ex balneis humectantibus (vt dicit Mes. in suo de appropriatis ca. de spasmo) est quod fit ex aqua dulci, in qua cocta sunt capita & pedeshœdorum, & agnorum, & arietũ pinguium: propter quod & quandoq; fiunt clysteria cum huiusmodi, & conferũt vehementer: & in tali balneo leniter fricetur sine mora in ipso: quoniã nutrimentum digestum trahit ad membra, & corpus rubificat, atq; dilatat: quomadmodũ mora longa in balneo & fricatione aspera cum sudore, corpus reddit euaporabile. Cum autem balneum exierit vnguatur pectus, & spina tota ex oleo communi, & ex oleo viol. & populeon, & cum butyro recenti dissoluto cum lacte recenter mulcto. Et post vnctionem fundatur supra totum corpus aqua temperata multa vergens parumper ad frigiditatem: tunc quiescat & dormiat vndiq; pannis cõtextis super lecto molli sub aëre temperato vergẽte ad frigiditatẽ & humiditatem aliqualem, quã attrahat cũ anhe-

litu suo, præter q; corpus non tangat circũquaq;. Talis nãq; ordo balneationis & vnctionis corpus impinguat: calorẽ feb. alterat, & naturalem conseruat. Et si corpus fuerit catarrhosum, non fundatur aqua prædicta super caput, sed super corpus residuum omniũquaq;. Et si aer habitationis suæ nõ fuerit huiusmodi p naturã, fiat talis per artem fundendo aquã ros. & sternendo folia viridia populi, & salicis, & vitis albæ. Cum aut̃ bene quiesuerit, & dormierit super lecto suo, exercitetur parũper in camera, donec calor naturalis excitatus fuerit, & appetitus comedendi redierit: tunc sorbeat aliquid lactis dulcis recentis per se, vel cum mica panis de similia, & proprie si cõiuetus sit in vsu lactis, & in ipso delectetur: neq; sumat cum eo cibum alium: quoniã de facillime corruptibilibus, vt dicit Gale. 7. de ingenio sanitatis, sunt lac, sang. spermar: quare in stomacho calido lac cõuertitur in fumosum, in frigido ad acetosum, & sic nõ nutrit, sed corpus aggrauat, & virtutem lædit naturalem. Si igitur lac corrumpi consuevit in stomacho suo, quod scies ex eructuationibus, oportet vt sugatur ex mamillis priusq; aleretur ab aere continẽte. Quod si fieri non est possibile, detur ilico cum mulsum fuerit cum modico zuccari, si stomachus sit calidus, vlt modico mellis, si stomachus sit frigidus: neq; conueniẽs est in hoc omne genus lactis, imo præcipuum omnibus est lac mulieris propter homogeneitatẽ sui ad nostrum corpus: & post hoc lac asinæ: quoniam omnium est subtilissimum, & minime calefactum in stomacho: & post hoc lac capræ pastæ ex herbis frigidis & humidis, & bono scæno: & post hoc vaccæ, & post hoc lac ouium. Sed oportet, vt ipsius lactis pars superior tunicola, siue vnctiuola separet cum cochleari, postq; per vnam horã cõsisterit: vel oportet, vt ipsum cum ferro vel lapide ignito, donec

acescat, aliquantum vstuletur, & partes eius butyrosæ consumantur, quæ sunt in eo plurimæ facilis inflammationis. Et cum huiusmodi balneo, & forbitione lactis alternatim regatur per tres dies sine omni cibo alio, donec virtus confortetur: tunc namq; ad cibos alios gradatim transferatur. Si vero non sit consuetus in vstu lactis, necq; stomachus in ipso delectur: forbeat post balneum loco lactis ex iuribus hœdorum vel pullorum coctis cum portulacis, lactucis, cucurbi, vel similibus: vel sumat ex pulvis ordei, vel farris, vel auenæ conditis cum lacte amygdalarum dulcium, & penidijs: vel fumat micam panis lotam bis vel ter in aqua frigida. Et oportet, vt omnis cibis eorum sit actu frigidus, cum administratur. Et cū post dies aliquot per huiusmodi confortatus sit: nutriatur cancriis fluui alibus, vel piscibus petrosif assis supra prunas, vel elixis conditis cum vino granatorum, donec ad vsum carniū processerit hœdorum, agnorum & pullorum.

¶ Ex fructibus vtatur pomis sapidis, & piris, & citonijs assis, & pineis & amygdalis dulcibus, & auellanis mū datis, & nutritis per noctem in lacte dulci, & sic eum balneis & vnctionibus & forbitionibus prædictis alternatim factis omni die naturali bis vel ter regatur tempore longo, donec febris extingatur & corpus resumatur. Tunc caueat omnino a coitu, ira, & labore, sed gaudeat solatijs, & tripudijs, ocio & quiete, & somno plurimo pro posse. Si vero calor febris intensus fuerit: quemadmodū accidit in specie secūda, epithymetur pectus, & cor cum petijs lineis infusis in aqua ros. in qua dissolutus sit pulvis ros. & sandalorum actu frigidis vel tepescitis, si corpus ex eis rigorem senserit. Et in hoc casu præcipit Rasis in almam: vt induant camisias sandalatas, & proprie cum exeunt a balneo, in quibus dormi-

ant tempore longo. Et vngatur pectus & spina tota cum vnguento isto actu frigido. *℞.* populeon. 3. 2. olei viol. olei ros. & salicis, olei nenuphar. aii. 3. f. muscillaginis dragaganti, muscillagin. seminis citoniorum, & malux. aii. 3. 2. ceræ alba. 3. 2. conficiantur omnia simul in forma vnguēti: quoniam consumptionem corporis prohibet excellēter. Et alienetur in eius medicinis cāphora: quoniam licet sit frigida, tamē vehementer exiccat. Hæc est ergo methodus febricitantis ratione sui. Verum sequuntur ipsam quandoq; accidentia, quæ curam ad se trahunt: & sunt sitis vehemens, fluxus ventris, & stypticitas. Ad sitim igitur extinguedam vtatur ante cibum per duas horas trochis. de camphora dictis cap. de phthisi. Et fiant omnia dicta cap. de phthisi. Ad fluxum vētris vtatur trochiscis de karabe dictis ibidem: & in hoc casu præcipuum est lac vstulatum, & pulvis ex eo facti cum riso, vel farre, vel auena: quoniam stypticat, & nutrit, & alterat, & confortat. Ad stypticitatem ventris vtatur prunis, cerasis, visis maturis, ficibus ante cibū, & si necesse fuerit, leniatur cum supposito torio ex penidijs, vel sapone, vel lardo, vel cum aqua dulci calida, in qua dissoluta fuerit manna, cassia fistula, tamarindi. Sed nequaquam procedatur ad acuta: quoniam febrem inflammarent, & virtutem deicerent. Extat præterea febris hectica plerumque cum putrida, vel ægritudine alia complicata, quam sequitur ipsa remanente: & tunc fiet cognitionis atque curationis difficultas, propter intentionum multitudinem, & virtutis oppressionem. Oportet igitur, vt dicta in hoc casu, & dicta in sequentibus capitulis vbi de febre putrida loquimur, debite miscantur. Ita vt si febris hectica dominari cognoscatur ex corporis arefactione plurima, magis insistamus alteratiuis

Tractatus primus secundi libri

quæ euacuatiuis. Si vero feb. putrida domi-
nari cognoscatur ex vrinæ confusione, et
corporis plethoria, magis euacuationi-
bus insistantus: in neutra tamē neutram
partiū negligam⁹, sed vtriusq; gradatim
parum post parum intendamus: quod vt
melius fieri possit, virtutem cōfortemus
cum cibis sufficientibus appropriatis: ne
deficiat in via. Et in hoc casu penitus ali-
enandus est lactis & aquæ frigidæ vsus:
quoniam materias putridas augmenta-
ret, postq̃ eis admisceretur in stomacho,
vel intestinis: sed loco ipsius pr̃fana co-
lata capiatur, vel iulep, vel mellicratū,
prout materia calida vel frigida postula-
uerit.

Emperica. Electuarium restauratiuū
quo corpus hecticum im-
pinguatur, & infrigidatur: sic fit. ℞. suc-
ci liquif. dragaganti, gūmi arabici, ros.
sanda, al. & rub. añ. 3. 2. se. portulacæ, se-
minis papaueris al. semini cōmunium
frigidorum mundatorum, seminis mal-
uarum, seminis bombacis excorticati, se-
minis citoniorum. añ. 3. 4. spondij, reuba.
berberis. añ. 3. iij. penid. amyli, ordei depi-
lati, pinearum amygdalarum dulcium,
auellandarum excorticatarū. añ. 3. 1. zuc-
cari albissimi lib. 3. Et sunt, qui addunt
lactis papaueris, & vini granatorū. 3. 2.
propter infrigidationem: & sunt, qui ad-
dunt succi cancerum stuuiarium elixorū
in aqua dulci, & post contusorem in mor-
tario, & expressorum: vel succi cortuca-
rum, vel succi limacium, vel succi pullos-
rum, vel hœdorum, vel agnorum lib. 6.
propter resumptionem. Et fiat ex omni-
bus electuarium durū, vel confectio mol-
lis vel zucarum ro. prout ægrī desiderū
postulauerit: & potest addi aliqd ex spe-
ciebus dulcibus non acutis: sicut sunt cy-
namomum, gar. spica, propter aromati-
zationem: de quo sumat partiēs post exi-
tum cibi a stomacho, & ante balneum,
& bibat post ipsum aquam zuccari fri-

gidam, vel aquam puram. Electuarium
aliud restauratiuū, & infrigidatiuum fit
ex huiusmodi mixtura. ℞. zuccari ros.
si vter sit fluidus, vel zuccari viol. si sit
stypticus dragaganti, tria sand. añ. par.
f. electuarij ducis quarram par, si stoma-
chus sit debilis in digerendo.

Canones. Rationabiliter dubitatur,
vtrum in cura feb. hecticæ
debeat balneum antecedere cibum, vel
econuerso? Videtur em̃ autoritate Gale:
7. & 10. de ingenio sani, quē in methodo
sumus assecuti: cui & ratio suffragatur,
q̃ balneum antecedit: quoniam si cibus
antecederet balneum, raperetur crudus
ad membra. Sed huius contrarium vide-
tur: quia cū cibus restaret, balneum ve-
ro inaniat, & corpus hecticum restaura-
tione sola indigeat non autem euacuatio-
ne: videtur q̃ cibus sit balneo pr̃mitten-
dus. Dicendum autem videtur, q̃ quodli-
bet potest cuilibet antefieri: vt est de mē-
te Auic. 4. can. fē. 1. Veruntamen in hoc
accidit distinctio: quoniam in hoc corpo-
re necessaria est restauratio, similiter et al-
teratio. Si igitur medicus intendit restau-
rationi, vt pote si corpus sit consumptū,
& virtus debilitata, conuenit vt cibus
pr̃mittat: Si verō intēderit alterationi,
vt pote si febris sit intr̃sa, & multū pro-
cesserit, ita tamen vt virtus adhuc tolera-
re possit, conueniens sit, vt balneum pr̃-
mittatur. ¶ Sciendum tamen q̃ cibus,
qui potest pr̃cedere balneū, non est qui-
cunq; necq; quodocunq; offerendus, sed
debet esse modicus quātitate, & facili di-
gestionis ex sua substantia & qualitate:
velut est lac recens, vel succus pr̃fanae,
vel ius carniū laudabilium, scilicet pul-
lorum & hœdorum: & debet offerri per
tres, vel quatuor horas ante balneum, vt
perfecte digeratur, necq; crudus virtute
balnei ad membra rapiatur. Ex quibus
apparere potest, q̃ corpus hecticum po-
test tribus vicibus cibari in die naturali

& vicibus totidem balneari, ſed nō pluri-
bus, ſi rationabiliter procedatur: ſcilicet
prima in aurora, ſecunda in velperis, &
tertia in media nocte: Ita tamē q̄ h̄ hor-
rā anticipentur, & retardēt ſecundum
elongationem diei ſuper noctem in æſta-
te vel ecōuerſo in hyeme. Dicit præterea
Gaſ. 10. de inge. ſanitat̄is: q̄ maius opor-
tet eſſe tempus humectandi q̄ inſrigidan-
di propter frigiditatem eſſe qualitatem
actiuam valde: quare medicus intendat
& extēdat multum humectatiua ſuper
inſrigidatiua cum virtute. Subdit ibidē,
q̄ licet omnis cibus & porus, & aēr con-
tinens corpora hecticorum ſit actu frigi-
dus offerendus: non tamen oportet, vt ſit
frigidus vltimate: velut eſt aqua frigida:
quoniam & ſi febrili diſpoſitioni confe-
rat, membra tamen deſtruit nutritiua.
Aqua nanq̄ ſi frigida poterit, & in ſto-
macho remāſerit frigida tempore longo
digestionem prohibet, ventofitatem ele-
uat, & tranſire moratur per meſeraicas
ad epar: vt ait Hip. 3. regiminis acutorū.
Eſt tamē cum aqua frigida potata ſilico
inſlāmur, & febrem accendit, & quan-
doq̄ fluxum ventris: & proprie in vētre
cholerizante. Sit igitur aqua ipſorum, ſi-
militer & potus aliq̄ & cibi temperati cū
vergentia ad frigidum: quia & alterant
actu & virtute: neq̄ conuenit, vt ſint te-
pidi: qm̄ tepida ſunt facia vomitiua.

Prognofſticatio. Prima ſpecies hecti-
cæ facile curat̄ ſed diſ-
ficile cognoscit̄: ſecūda ſpecies facile co-
gnoscit̄, ſed difficile curat̄: tertia ſpēs eſt
cognitionis manifeſtā, ſed curationis im-
poſſibilis oīquaq̄. Itē hectica febris ma-
ximæ accidit infra annum 18. et 35. quo-
niam eſt tempus feruoris: quare in ea cor-
pus cito maraſmatur & moritur. Ante
vero hanc æratem & poſt, quandoq̄ cu-
ratur facile, vel palliatur tēpore longo,
& proprie in mulieribus, & ſanguineis,
& ſlegmaticis per naturam: vnde Hip.

5. parti. apho. Phthiſis ſit maxime ærati-
bus a 18. annis &c. Item feb. hectica vt
plurimum interficit in autumno: quoniam
tempus eſt ſiccum inordinatum & præ-
ceſſit æſtas calida, reſolutiua humidita-
tum naturalium inſluentium & radica-
lium. Vnde Hippo. 3. apho. Autumnus
phthiſicis malum. Item ſi cœperit appeti-
tus proſterni, crura inſflari, venter fluere,
capilli cadere, cutis areſcere ſiue areſcieri,
ita, vt ſplendeat velut pergamenum, in
quo non appareat rugæ omnino: propin-
quius erit morri: Vnde Hip. 5. par. apho.
A phthiſi habito diſſidia ſuperueniens,
mortalē. Itē ſolicitandū in cura hectico-
rum: quoniam moriendo loquuntur, &
loquēdo moriuntur. Item feb. hectica fa-
cilis accenditur in corpore cholericō per
naturam, vel ſexum, vel æratem, & faci-
lius curatur: & difficilius curatur & ac-
cenditur in ſlegmatico. In corpore vero
ſanguineo, vel melancholico medio mo-
do ſe habet: vt patet 2. par. apho. In mor-
bis minus periclitantur ægrotantes. Item
feb. hectica ſi fuerit complicata cum feb.
putrida, & ægritudine alia quacūq̄, diſ-
ficilioris eſt curationis, q̄ ſi ſit ſola, præter
q̄ cum hypofarca.

De hectica ſenectutis. Cap. III.

Hæc ægritudo non eſt ſe. ſed pro-
pter ſimilitudinem nois ad ſe. he-
cticam, ſimiliter & diſpoſitionis,
quæ conſiſtit in extenuatione, conſum-
ptione, et arefactione corporis, ab Auic.
ſub ſermone febris hecticæ collocat̄. Eſt
aut̄ hectica ſenectutis mala cōplexio fri-
gida, ſicca, dominās ſuper cor & corpus
totum, ex qua fit habitudo macra, rugo-
ſa cū colore pallido vel plumbeo, velut
in corporibus ſenum accidit per naturā:
propter qd̄ hectica ſenectutis diciſ. Fit
aut̄ hæc paſſio aut p̄ ſe incipiēdo, & hoc
vt raro: aut conſequendo ægritudines ali-
as, & hoc vt plurimum. Er cum ſit per ſe

Tractatus primus secundi libri.

incipiendo, fit propter frigiditatem cordis naturalem & epatis siccitatem. Hæc namq̃ duo membra principalia sunt fons & origo duarum qualitatum principalium, quibus virtus naturalis perficitur, & vita conseruatur: cor quidem caliditate, epas autem humiditate: velut accidit proprie in corporibus melancholicis per naturam, vel ætatem, vel solitudinem perdurantem. Et sicut accidit illi simeæ, de qua loquitur Galen. 4. de interioribus: quod sine causa manifesta extenuabatur quacuncq̃ die, donec moreretur: quã dum præcepisset anatomizari, nihil humiditatis reperit in capsula cordis. Et ex hoc cognouit, quoniam cor propria humiditate priuatum (quam sibi natura tribuit, ne propter motum assiduum & calorem spirituum consumeretur) deficit necessario in sua substantia & operatione. Cum autem fit consequendo, fit propter debilitatẽ stomachi, & intestinorum, & mesentericarum assiduam perdurãrem: quoniam scilicet super eadem dominatur humiditas cruda, extranea propter indigestionem & crapulam perdurantem: velut accidit pueris post vsum fructuum plurimorum, & adultis, & senibus habentibus naturaliter virtutem stomachi defectam. Signa hecticæ senectutis in communi: sunt habitudo macra perdurans assidue cum colore fœdo & debilitatio virtutis quacq̃ die præter solitum manifesta. Et est quandoq̃ cum appetitu sufficienti, quãdoq̃ vero cum prostratione appetitus, & proprie, cum stomachi frigiditas, & virtutis eius debilitas vltimatur. Signa autem distinctiua per se incipiendi, vel alias agritudines consequendi, trahuntur ex narratione patientis super debilitate stomachi, vel digestionis eius priuatione, & antecessione agritudinum chronicarum: sicut de fe. quotidiana & quartana & similibus,

Methodus. Intentio curationis huius agritudinis duobus perficitur, scilicet humectatione & calefactione: & hæc proprie fiunt cum balneis, cibis, & vnguentis: quare curatur omnino cura feb. hecticæ, præter q̃ opus est calefactiuis. In aurora igitur post somnum & digestionẽ completã & stercoreis euacuationem, balneetur in aqua dulci tepida, in qua cocta sint malua, althea, artemisia, calamitũ, balsamita, vel in qua cocta sint capita & pedes hœdorum, & agnorum, & arietum pinguium, in qua fricentur leniter cum farina fabarũ excoctarũ, vsq̃ usq̃ furis sine mora in ipso: quã dum membra rubere cœperint, atq̃ dilatari ex nutrimento attracto per balneũ & frictionẽ, ilico cessandũ est: ne forte balnei vel frictionis superfluitas poros dilataret, corpus inaniret. Tunc igitur inungatur pectus, & spina tota cum dialthee mixta cum modico populeon, vel cum oleo nardino, vel butyro recenti sine sale: & post vnctionem fundatur super pectorum aqua dulcis tẽperata, vel frigida, si ex ea nõ senserit horrorem: & ponatur in lecto molli in quo pannis molli bus vndiq̃ coopertus dormiat, & quiescat sine sudore. Postea vero parumper exercitur sub aere temperato, donec calor naturalis similiter & appetitus excitentur, & tunc comedat ex cibis facilis digestionis calefactionibus moderatis: sicut sunt iura pulloꝝ & hœdoꝝ & agnorum annalium inspissata cũ vitellis ouorum, & cõdita cũ zinzibere, cinamomo, croco, cardamomo: & sicut sunt oua sorbilia, & pisces petrosi recetes assii, vel elixi conditi cũ speciebus aromaticis nõ acutis: & sicut sunt bucellæ panis de simila condita cum butyro: nec cibum vna vice multiplicet, donec digestio stomachi confortetur. Postq̃ autem cibis talis digestus fuerit, quod est apud horam ve-

Sperorum, redeat ad balneum supradictum: & sic pergatur per plurimos dies cum balneis & vnctionibus, & cibationibus alternatim bis vel ter quacunque die naturali, donec corpus perfecte resumatur, & dispositio permutetur: quemadmodum plene scripsimus capitulo de cura feb. heclicæ. Quod si stomachus & intestina fuerint humoribus crudis repleta, digerantur statim a principio & educantur (prout docuimus capitulo de sto. debilitate) & post hoc perueniat ad balneationem supradictam: Et cum ad sanitatem redierit debitam vel cōsuetam, abstinat a coitu, vñ labore superfluo, & vigilijs, & ira, & solitudine pro posse; Gaudeat otio, tripudijs & quiete: exercitetur omni die gradatim ante cibum incipiendo motum a debili, tendēdo ad fortem & redeundo ad debilem. Sed post cibum exercitari nō conuenit omnino aut parūper: vt scilicet cibus ad fundum stomachi descendat, præter q̄ ad eius latera conquassetur. Ex fructibus vtatur pineis mundatis, & amygdalis dulcibus, & auellanis, & fisticis, et ficub⁹, & vuis maturis: Et quandoq; si venter restrictus fuerit, sumat ante cibum ex prunis & cerasis, sed eorum vsum deuitet assiduum: leniatur quandoque natura cum cassiast. ramarind, manna, sed non cum acutis.

Emperica. Regimē istius ægritudinis, est regimē impinguationis corporis macri, frigidi, debilis, melācholici per naturam. Hoc autē regimen maxime compleretur cum cibus & medicinis sanguinem & sperma multiplicantibus: vt sunt pisces laudabiles, & diascaryon, & dianthos: quare dicta capitulo de deflectione coitus, & quæ dicuntur cap. de ingrossatione corporis macri, sublimiter hic suffragantur. Ex cibus præterea mul-

tum & subito nutrientibus est lac butyrosus recenter mulsus, quale est vaccinum, vel ouinum: quemadmodū & lac nō butyrosus in cura feb. heclicæ commendatur: velut est lac muliebre, vel asininum, vel caprinum. Oportet autem, vt qui ex lacte nutriri, & impinguari voluerit, sit in ipso consuetus, & in ipso stomachus, & os ægri delectetur: quod si non fuerit, corrumpetur in stomacho calido quidem ad fumosum, in frigido vero ad acetosum: quare non nutrit, sed eructuationes & angustias inducet. Ars autem lac conseruandi, ne corrumpatur extra stomachum, vel in stomacho, hæc est vt sugat a mamillis: quod si abominabile fuerit, forbeat ilico cū mulsus fuerit per se, vel cum mica panis de simila, præter q̄ alius cibus omnino ei miscetur: nisi forte stomachus fuerit cholericus, tunc conuenit vt aliquid zuccari tabarzeth miscetur, vel flegmaticus: tūc conuenit vt aliquid mellis purissimi miscetur. Si vero lac recens haberi non sit possibile, poterit hoc modo per horas sex, vel circa id in bonitate sua conseruari, videlicet vñ ilico cum mulsus fuerit ponatur in vase ligneo bene obturato, in aqua calida temperata: quoniam naturalem facit calorem remanere.

Canones. In cura huius ægritudinis tempus calefaciendi breue est, tempus vero humectandi longum valde, quod est: quoniam humiditas est qualitas tarde imprimens in corpus, & siccitatem deuincens: propter quod ait Galenus septimo de ingenio sanitatis: quod facilius est humidum exicare, quā siccum humectare: verum cum caliditas fortis exiccet, conuenit hunc patientem abstinere a rebus acutis: vt

sunt pig; allia, sinap: similiter & ab acru minibus, vt acerū & agresta, succus ber beris: & a cibis valde salicis, vel fumiga tis: nisi forte quandoq; ex eis parum gu stauerit ad prouocationē appetitus: sed nutriatur rebus dulcibus aromatizanti bus facilis digestionis: sicut est vinum ru beum dulce clarum: similiter & clareū: quoniā solum dulce nutrit, vel per se pu rum vel prædominans in mixto: vt ait Gale. 3. de simpli. medicinis. Sciendum præterea, q; cum hectica senectutis non sit aliud, q̄ defectio virtutis nutritiæ: ne cessarium est, vt in eius cura rectificatio ni & cōfortationi membrorum natura lium insistamus, & proprie circa stoma chum & epar cum vnguentis & empla stris calidis stypticis aromaticis: quæ suis capi. tractauimus pro posse.

Prognosticatio. Hectica senectutis maxime accidit an te 18. annū & post 3. annū modo quasi contrario se, hectica: quod est, quoniam ante tempus 18. annorum est humidum radicale adhuc plurimum, cui nondū ac cidit diminutio, de qua curandū sit: qua re calidum naturale remanet oppressum ad quod deferuit plurimum humidum influens nutritiale, & proprie in pue ris gulosis. Sed post tēpus 24. annorum, quod est terminus perfectionis & consi stentiæ, diminuitur humidum radicale, atq; depascitur a calore: quare deficiente pabulo, deficit & calor naturalis. Item hæc ægritudo maxime accidit corpori bus melancholicis per naturam, vel regi men, vel ætatē, & quādoq; flegmaticis. Item hæc ægritudo (vt plurimum) succe dere consuevit ægritudinibus chronicis apud declinationem: quoniam tūc est in eis sang. modicus & calor naturalis defe ctus ex ægritudine præcedenti: quare sa gaciter succurrat. Item hectica senectu tis est tardioris terminationis ad mortē, citioris vero ad salutem: cuius contrariū

in se, hectica reperitur. Sunt eius præterea tres species siue gradus: quemadmodum & feb. hectica: quarum prima est facile curabilis, sed difficile cognoscibilis: se cunda vero econuerso: tertia autem nul lius latet cognitionē, sed nequa q̄ recipit curationem: quemadmodum neq; senitiū naturale. Neq; differūt hi gradus, nisi se cūdum magis & minus vel antiquius & recentius: vnde Hippo. 2. par. apho. Quæ ex multo tempore extenuatur corpora, tarde reuerti consueuerunt.

¶ De cura feb. putridæ. Cap. V.

Licet omnis feb. per naturam rei sit calor putredinalis, & omnino calo ri naturali contrarius vt ostēdimus cap. de diffi. feb. veruntamen apud medi cos illa feb. proprie dicitur putrida: cuius calefactum esse est in humoribus, calefi eri vero in spiritibus ac membris, quæ et feb. humoralis nuncupatur. Ad sciētiam autem perfectam nominis & diffinitio nis feb. putrid. dicamus: quoniam ista 4. habēt se per ordinem: vt dicit Gal. 11. de ingēn. sanit. Primo namq; humoralis ma teria collecta ex cibis & potibus super fluis in corpore, replet ipsum secundum vasa, sua quantitate, & aggrauat secun dum virtutem sua qualitate: deinde ve ro talis repletio & grauitas poros cutis, & ora venarum capillarum oppilat: tē tio vero talis oppilatio transpirationem & euationem caloris naturalis prohi bet: quarto autem calor naturalis humo rum ex hoc ebullit, neq; regulatur a natu ra: quare fumum capniosum a cētro ele uat ad circumferentiam: velut accidit in stercorebus, et alijs rebus cum putrescūt: qui perueniēs corporaliter ad cor, ipsum inflāmat vltra sui debitū: deinde proce dens ab ipso per venas & arterias in cor pus vniuersum, febrem putridam indu cit. ¶ Causa igitur feb. putridæ triplex est, scilicet primitiua, antecedens & con

uncta: quæ & sunt causæ omnium morborum, neque sunt plures aliæ. Primitiua quidē, est causa extrinseca, veluti æstus solis, carētia exercitiij vel balnei, vel euacuationis cōsuetæ: similiter & antecessio crapulæ perdurantis, & proprie ex rebus facile putrescentibus, vt sunt lac & fructus, olera & pisces: & sicut est motus inordinatus super cibum, & assumptio vini plurimi vel confectionum calidarum et fumosarum post cibū. Antecedens vero, est causa intrinseca mediata quæ cum facta fuerit immediata, vocabitur cōiuncta causa. Verbi gratia: humor vel cibus superfluous aptus putrescere, donec et iam putrescat. ¶ Ad completum igitur intellectum feb. putridæ & suarum specierum: dicamus, quod secundum Gale, primo de differentijs febrium, differentiæ multipliciter inquiruntur. Prima quidē, ex materia, & hæc est melior illarū distinctio: quoniam aut est humor simplex, aut mixtus: & siquidem simplex, sic sunt quatuor species. Prima ex sanguine: Secūda ex cholera: Tertia ex flegmate: Quarta ex melancholia. Si vero commixtus, sic sunt diuersæ species, quæ calamo scribi non possunt, nisi in genere: prout dicemus de cura febrium putridarum & compositarum. Secunda diuisio feb. putridæ est ex forma afflictionis: quoniam aut eius materia est intra venas & arterias, & sic fit feb. continua, quæ semper affligit: aut est extra venas, & sic fit feb. interpollata, quæ quæda certis periodis fluit ad mineram putredinis, idcirco quietem interponit. Tertia vero diuisio ipsarum, & quæ est maxime necessaria cognosci a medico ipsam curare volenti, est ex qualitate materiæ & modo cursus eius in pugna contra naturam, quæ est: quoniam materia aut est acuta, calida & sicca, & sic febr. facit acutam: aut frigida grossa, & sic febrem facit chronicā: aut medio modo, & sic feb. facit tropicā seu

cōuersiuam. Hanc autem posse pertractabimus capitulo de significatione feb. an terminada sit per crisin, vel sine crisi: quoniam non est possibile ipsam perfecte intelligere sine crisis cognitione. ¶ Signa feb. putridæ communia, quæ non faciunt errare, cū simul fuerint sunt hæc: pulsus velocior & frequentior debito vel consueto, in quo systole maior est quā diastole, propter minorem necessitatem expellendi fumum capniosum, quæ euacuadi calidum: similiter & anhelitus inordinatus, & vrina rubea confusa, in qua non apparet digestio statim a principio vel parum apparet, & proprie cum materia fuerit pauca, & virtus fortis cum regimine bono, & tactus quidem corporis apud manū medici sentitur calidus, mordax, acutus, vaporosus: & permutatio lingue ad sapores alienos sine causa manifesta, cum siti et fastidio, et anxietate plurima & lassitudine membrorum corporis totius, & permutatione somni & vigiliarum secundum ordinem non consuerum, & dolore capitis pulsatio, & fœtor exeuntium plus debito vel consueto. ¶ Signa distinctiua feb. putridæ, an sit cōtinua, vel interpollata, non possunt trahi, nisi ex post apparentibus: quoniam in principio omnis feb. putridæ sentit patiens horripilationem & rigorem: hoc tamen non est in feb. cōtinua, propter reuocationem caloris naturalis ad interiora, propter sensationem nocumētī, sed in fe. interpollata, propter sparsionem materiæ, nondum putrescentis, aptæ tamē putrescere super membra sensitua musculosa, quæ sunt in ambitu totius corporis: similiter & in declinationibus earum fit (vt plurimum) sudor exuberans, vaporosus, vel alia euacuatio sensibilis manifesta: nisi fortassis materia sit pauca & benigna, & virtus fortis insensibiliter ipsam resoluens: quare oportet vt talis distinctionis signum capiat ex afflictione se. Verbi gratia: Si desinit

Tractatus primus secundi libri.

aliqua horarum febris tendens ad quietē perfectā, vere erit interpollata: Si vero nūq̃ perfecte definit eius afflictio, licet exacerbetur magis vna horarum diei altera, vere dicitur feb. continua proportionata. Quod si omni tempore aequaliter affligat, velut synocha, dicitur feb. cōtinua, nulli interpollata feb. proportionata.

Methodus. Cura febr. putridarum in generali duobus perficitur instrumentis, diæta videlicet & medicina. Operatio namq; manualis ad ipsarū curam nō pertinet: nisi cum fuerint cum apostemate: de quibus nos iam expediui in lib. i. verum tamen de his duobus instrumentis autores medicinarū, & maxime Hippo. & Gal. canones scripserunt vtilēs atque necessarios diuerfos. Nos ergo vt eorum dicta breuiter perstringamus, nihil vtilium præmittentes duas proposui tractemus quæstiones. Quarum prima est de diæta, qualis, scilicet, & qua hora diei vel morbi sit offerēda a medico methodum obseruanti. Ad quod videtur respondendū, qd canon perfectus de modo cōbationis in feb. putrid. quibuscūq; tam continuis q̃ interpollatis cōplectens oēs regulas autorū gēnales, habet septem partes. Quarum prima est, qd in nullius feb. paroxysmo seu exacerbatione, dādus est cibus, neq; ilico ante ipsū, neq; ilico post ipsum: nisi fortassis accidēs aliquod magnum timorofum ad hoc necessitauerit. Verbi gratia, syncopis, quæ consuevit quibusdam accidere, vel defectio in principio paroxysmi, vel augmento, vel statu, vel declinatione, non solū propter inaniationem, sed propter feb. molestiā: quare tunc qualibet horarum cibus erit offerendus: & adhuc magis, si sit propter inaniationem. Hic tamē cibus oportet, vt sit paucus, facile transmutabilis habēs virtutem alterandi, atq; confortandi potentem: sicut est mica panis pluries lota in aqua frigida, vel vino albo, claro, ponti

colymphato: & si est intentio vomendi in paroxysmis feb. interpollatarū de cho. vel flegmate: quoniam in eis facilius fiet vomitus, si cibus offeratur. Et hanc partem cāñ. tradidit nobis Hippoc. parti. i. apho. cum dicit: In paroxysmis subtrahere oportet: apponere enim læsio est: quod Gal. pertransiit ibidem in commento ait. Quoniam dum cibus subtrahitur, calor totaliter super materiam morbi conuertitur & paroxysmū abbreviat bono fine. Secunda pars cāñ. est, qd magis debemus eligere vicinari declinatiōi paroxysmi vel exacerbatiōis (si oportet) q̃ principio: qd calor naturalis minus impeditur facta pugna, q̃ ante pugna: propter qd ait Hip. i. reg. acutorū. Dandus est cibus postq̃ calor in calcaneum declinauerit, i. postq̃ calor se. expansus fuerit perfecte a centro cordis ad circumferentiā oīquaq;: sicut fit in declinationibus omnium fe. et paroxysmorū. Tertia pars canonis est, licet principiū paroxysmi debeat magis fugi, q̃ declinatio regularis: est tamē in casu quandoq; necesse fieri, si molestia accidentia (vtpote syncopis vel debilitas plurima, non tamen facta propter inaniationem: sed propter fe. molestiā) superuenire consueuerunt in declinatione magis q̃ in principio: quoniam vniuersaliter in omni fe. hora conuenientior & tranquillior est eligenda. Aliter namq; cibus nō dingeretur, sed corrumperetur, & materiam se. augmētaret. Quarta canonis pars est, qd hora crisis & per totum statum, donec tota crisis cōpleatur, in fe. habentibus vera crisis, est tenuissima diæta vtendū. vnde Hip. i. par. apho. Quādo ægritudo est in statu, tenuissima diæta oportet vti. Tenuissima autem, diæta (vt dicit Gale. in commento illius apho. i. part. i. Tenues & certæ diætæ &c.) consistit in omnino nihil dādo de cibo: istud tamē qñq; fallit in casu. Verbi grā: si accidentia critica fuerint malitiosa virtutē dericiētia: tunc

nanq; cibus in hora status, imo & hora
 crisis non est denegandus: cum virtus sit
 a medico p^ræcunctis p^ræseruanda. Scien
 dum tamen, q^d accidentia crisis duorum
 sunt generum: quædã sunt signa crisis tan
 tũ sicut dolores capitis, anxietas, aliena
 tio, difficultas anhelitus, rigor, et similia,
 per quæ nihil euacuat de materia: & ex
 talium apparitione, & virtutis fatigati
 one, non debet dari cibus apud crislm:
 quoniã impediretur natura. Signa nanq;
 talia non fiunt ex virtutis defectione: sed
 ex pugna naturæ contra materiam mor
 bi, quam patitur in eius separatione post
 digestionem & expulsionem subitã ad
 exteriora. Alia vero signa sunt & causa
 crisis: sicut est sudor, fluxus narium, flu
 xus v^etrⁱs, vomitus diarrria vrinæ, & ge
 neraliter omnia, per quæ euacuat aliqd
 de materia a corpore. Et ex tali defectio
 ne virtutis facta per aliquod istorum vel
 plurima simul oportet cibare ægrum in
 statu & in ipsa crisi. Ista præterea quarta
 pars cañ. licet sit vera in statu fe. acutę cũ
 determinatione iã dicta: non tamen pro
 pter hoc est vera in statu omnis fe. Fallit
 nãq; in tribus casibus. Primo quidem in
 statu sumpto penes digestionem tãtum
 sine difficultate acciditum: vt diximus
 ca. de pleureti. Secundo vero in statu, qui
 extenditur vltra spacium quatuor dieꝝ:
 quoniã sicut dicitur primo de crisi, & sicut
 patet de anxio in commetio illius apho.
 paroxysmos & consistentias &c. Status
 quãdoq; durat per septem dies: sed diætã
 tenuissima nõ debet dari, nisi per spacium
 4. vel 3. dieꝝ ad plus, & maxime in pro
 cessu morbi cum virtus est iam debilita
 ta: vt patet per Hippocr. & Galenum in
 tota prima particu. aphori. Tertio fallit
 in statu, quem non sequitur declinatio:
 q^d morituri solis prognosticis sunt relin
 quendi. Quinta pars cañ. principalis est,
 q^d si febr. putrida curanda, sit feb. acuta
 simpliciter, quæ terminatur in die 14. tũc

ab hora status vsq; ad finẽ crisis, & prin
 cipium declinationis est vtendum diætã
 tenuissima, sed in principio & augmẽto
 diætã absolute tenui. Si vero sit febris
 peracuta, quæ terminatur in die septima:
 diætã tenui est vtendum. Si vero sit feb.
 perperacuta, quæ in quarta die futu
 ra est facere crislm: tunc a principio vsq;
 ad finem diætã tenuissima est vtendum.
 Et hanc partem canonis tradidit nobis
 Hippocrates prima particu. aphorismo
 rum, cum dicit: Quibus continuus est sta
 tus, continuo & tenuiter reficere oportet.
 Est autem diætã tenuissima (vt dicit Ga
 lenus ibid. Tenuis & certã diætã &c.)
 cum totus cibus aufertur, aut solum mel
 licratum, aut iulep, vel succus granatõe
 offertur. Diætã tenuis, cum prisana cola
 ta, vel mellicratum nõ aquosum offerit.
 Est autem tenuis absolute, cum ius pullo
 rũ, vel prisana non colata, vel cibus gros
 sus in substantia, paruus tamen in quan
 titate donatur. Et ex contrario intellectu
 istius canon. cognoscimus: quoniam fe.
 putrida chronica, vel tropica est a princi
 pio grossæ diætãda, prout signat nobis
 Hippo. particula prima aphor. cum ait:
 In tenuibus diebus peccant ægrotantes
 &c. In ista tamen quinta parte canonis
 sunt septem conditiones obseruandæ, sci
 licet complexio, consuetudo, ætas, tẽpus
 anni, regio, habitudo corporis, virtus: qm̃
 si oia ista aut plurima eorũ inclinẽt ad ci
 bum, erit diætã minus subtiliãda. Verbi
 gratia: Complexio cholerica, cõsuetudo
 gulosa, ætas iuuentutis & pueritiæ. In
 istis nanq; casibus Hippocratis canon.
 non debent obseruari. Sexta pars canon.
 principalis est, quod si possibile fuerit, &
 paroxysmus, vel exacerbatio febr. non
 prohibuerit, cibetur hora sanitati consue
 ta: quoniam tunc natura magis in ci
 bo delectatur. Septima pars canonis
 est, quod sicut tempus digestionis primæ
 cibi in stomacho non est idem apud

Tractatus primus secundi libri

omnes homines tēpore sanitatis (vt ait Gal. in cōmento illius aphō. 7. part. Si ine-
briatus &c.) ita neq; tēpore ægritudinis:
& ideo tarde digerenti plus temporis re-
seruetur. Licet autem de hora digestionis
non possit dari certa & vniformis men-
sura: communiter tamen & vt plurimū
requiritur spacium decem horarum inter
cibum & cibum ad minus. Canones autē
proprijs in quibuscunq; feb. putridis in-
terpollatis, aut continuis, acutis vel non
acutis: dicemus capitulis singularē. Quæ-
stio secunda est de secūdo instrumento cu-
rationis feb. putridarum (quod est medi-
cina) qua scilicet horarū ægritudinis, con-
ueniens sit morbi materiam euacuare, et
cū quali medicina: & proprie in feb. acu-
tis: quoniā in illis maior cadit timor. Ad
quam videtur taliter respondendum, qđ
considerando debitum processum artis,
& naturæ non debet euacuatio fieri, nisi
digesta materia, excepto solo casu furo-
ris: quod nobis Hippoc. 1. parti. aphō. in
primo cañ. vbi dicit: digesta medicari, &
mouere non cruda: neq; in principijs, nisi
materia fuerit furiosa: multa vero non
sunt furiosa. Redditur autem materia fu-
riosa quinq; modis. Primo quidē ex sua
qualitate, vt si sit calida cholericā, subti-
lis & naturæ rebellis, quā sine nocumen-
to non potest expellere: vt est cholera pro-
prie zinariā, id est prassina. Secundo ex
sua substantia venenosa, quam natura
perhorret a forma specifica: vt melācho-
lia adusta, quæ dum funditur super arenā
ebullit, & ab ea fugiunt muscæ. Tercio
ex sua qualitate: vt in synocha inflatua,
vel synocha patrescēte: quia timetur suf-
focatio calidi naturalis, vel ruptura ve-
narum. Quarto propter dolorē proster-
nētem virtutem: vt in colica, vel iliaca,
vel arthetica. Quinto propter nocumē-
tum cadēs in membro nobili necessario
pro toto: vt in squinantia, & frenesi. In
omnibus enim istis euacuamus ilico, dige-

stionem nullatenus expectādo: verunta-
men in hoc cadit distinctio non modica,
quæ plurimum est necessaria atq; vtilis
medico operanti: & est, sicut dicit Gale.
11. de inge. sanita. & Auicē. 4. cañ. fēñ.
1. qđ duplex est euacuatio, scilicet mino-
ratiua, & eradicatiua. Euacuatio mino-
rationis habet fieri in principio, vt natu-
ra reddatur potētior super residuum ma-
teriæ, digerendæ & expellendæ. Et licet
principium sit triplex, scilicet principii
digestionis, & principium (quod est spa-
cium trium dierum) & principii (quod
est punctum indiuisibile tēporis, quo pri-
mum coeperit æger sentire nocumētum:
vt distinguit Galeñ. in cōmento primi
progno.) Intelligo tamen hic spaciiū triū
dierum: nisi fortassis feb. esset chronica,
in qua principii digestionis vltius per-
durat. Ista etiam euacuatio minoratiua
quinq; fit cū flebotomia, et proprie si solus
san. peccauerit: velut cōtingit in fe. san.
vel si omnes humores simul dominētur:
velut in quibusdam feb. compositis, &
erraticis. Veruntamen Gal. 11. de ingeñ.
sanita. præcipit hanc euacuationem fieri
in omni feb. cum flebotomia, & proprie
in corpore sang. iuvene, carnosō. Et hoc
quadruplici de causa: Primo quidē pro-
pter consuetudinem: secundo propter mi-
norem eius timorem: tertio propter eius
subitum apparatus: quarto, quia & si
nō qualitati cōferat, confert tamē quan-
titati: quoniā educit multitudinē: quare
potest fieri a principio omnis feb. putre.
continua vel interpollata, & proprie in
corpore habente sang. multitudinē, præ-
terq; in causone, & tertiana pura: quoniā
ex ea timetur ebullitio & furor cholerae:
& præterq; in feb. flegmatica pura: quoniā
in ea timef. flegmatis incrudatio,
& morbi prolōgatio cum debilitate vit-
tutis. Fit autem euacuatio minoratiua
cum farmacia, quando alius humor so-
lus a sanguine, vel duo simul dominan-

tut: velut accidit in caufone, & tertiana pura, & quartana pura, vel notha: Similiter & in feb. flegmatica pura, vel non pura. Iſta tamen farmacia nō debet eſſe quæcunq; medicina, ſed tātum lenitiua: ſicut eſt ea, quæ ſoluit lubricādo, vel lubricum faciendo: vt caſſiaſi. manna, tamarindi, violæ, pruna, ſuccus granatorū dul. Non autem quæ ſoluit comprimēdo, ſicut mirobalani: quoniam poſt ſolutionem derelinquūt ſtypticitatem, quod eſt periculoſum in omni feb. niſi fortaiſſis fuerit cum fluxu ventris ſuperfluus: neq; q ſoluit attrahendo, ſicut ſcamonea, agarius, turbiti: quoniam habent virtutem venenofam, quæ virtutem membrorum naturalium debilitat & feb. inflāmmat, & deſtruit loca ſana: vt ait Auic. capitulo præſenti. Veruntamen & in hoc cadit diſtinctio neceſſaria: quoniam & ſi ratione huiusmodi venenofitatis nocumēta prædicta inferāt: proſunt tamen in alio, ſcilicet euacuando, vel minorando cauſam ſe. quate eiſdem conueniūt vti quandoq; in principio feb. & proprie reubar: & turbiti & diagridi, cum ſint minus venenofæ tunc ſcilicet, quando videmus q plus adueniat ex eis iuuamenti, q̄ nocumēti. Et hæc omnia plene trahuntur ex illo apho. primæ parti. In acutis paſſionibus raro & in principijs, farmaciaſ vti, & hoc prius dñdicātes benefacere, Similiter & ex alio 2. particulā. Inchoantibus morbis, ſi quid videtur mouēdum, moue. ¶ Euacuatio vero eradicatoria habet fieri apparēte digeſtione facta: quapropter ait Gale. 11. de inge. ſanit. q. neq; ſecreatiua, neq; vrinatiua, neq; ſudoriſera, neque ſecreſſiua donabis, niſi materia apparente prius quodammodo digeſta: & Auic. præſenti cap. dicebat. Oportet igitur, vt in principio des ſyrupum ace. compoſitum ſiue ſimplicem: in augmento vero atq; ſtatu ſyrupum aceto. cōpoſitum dabis. In iſta tamē euacuatione era-

dicatoria cadit diſtinctio vtilis & neceſſaria: & eſt, cū virtus per ſe ſuffecerit: tunc non debet fieri per artem, ſed naturæ cōmitti in hora criſis: vt dicit Hip. 1. parti. apho. Ea quorum criſis ſit, aut facta eſt æqualiter & c. vel virtus ſola non ſuffecerit, & hoc dupliciter: quia vel hunc defectum præcognoſcimus ante ſtatum ſcilicet, quia ſcimus ex debilitate virtutis, q̄ ipſa motura ē impfecte ad criſim apud ſtatum: & tunc debemus euacuare in augmento, vt natura poſtea ſuper reſiduū valeat per criſim perfectam & completā cauſam omnino eradican-do: vel hūc defectum non præcognoſcimus ante ſtatum, ſed ſolum cognoſcimus ipſum præſente criſi, quæ eſt hora ſtatū, et proprie circa finem eius, & hoc regulariter: quia v̄ certe ſcimus meſuram illius defectus: et tūc debem⁹ euacuare hora criſis & auxiliari naturæ, non tamen quomodolibet, ſed per eandem regionē cū natura. Verbi gratia: ſi natura cupit facere ſudorē, da in potu iulep. calid. & pone veſicas plenas aqua calida circa corpus totum, atq; ipſum pannis calidis lenibus molli⁹ bus cooperi, & præcipue vt eius aſtantes dirigant anhelitum verſus lectum ægri. Si autē cupit facere fluxum ſan. narium, intinge ſetas porcinas intra nares, & emūge eas. Si vero vomitum, pone digitum vel pennam oleo tepido inunctam intra gulam, & da in potu aquam tepidam cū aceto. Si vero fluxum vētris ilico fac ſuppoſitorium ex ſapone, vel melle vel ſellibus: vt docui cap. de ſtypticitate ventris: propter quod ait Hippoc. 1. parti. apho. vnde cunq; reperit natura & c. & Auicē. ca. præſenti. Et ſi natura non mouet, moue tu hora motus eius: vel non certe ſcimus meſuram illius defectus hora criſis & motus: & tunc debemus auxiliari naturæ poſt criſim & motum, ne fiat recidiua: quapropter ait Hippo. 2. parti. apho. Quæ relinquantur in morbis & c. quate

Tractatus primus secundi libri.

euacuabimus post crisim hora declinati-
onis, non quia sit vera declinatio: quoni-
am neq; vera cris, antecessit, sed declina-
tio non vera. Et adhuc euacuatio, quæ sit
hora crisis, non debet fieri quodcumq;
sed hora qua accedentia crisis minus in-
festant. Vniuersaliter tamen sciendum,
q; tutius est atq; melius ægro, & medico
hanc euacuationem fieri post crisim, &
cum iam apparuerit operatio naturæ di-
minuta manifeste, quàm hora crisis: quo-
niam non est possibile nobis perfecte co-
gnoscere perfectionem euacuationis ho-
ra qua sit: saluo tamen semper iudicio
medici prognostici de crisi diminuta,
quam non sequitur declinatio: quoniam
morituri solis prognostici sunt relinque-
di. Ex quibus omnibus ostenditur, cano-
nes euacuationis in feb. putrida supradic-
tos non esse intelligendos de crisi permu-
rationis, id est, quæ sit per apostema cre-
ticum. Verum tamen rationabiliter vi-
detur dicendum, q; etiam in hoc casu au-
xiliari possumus naturæ post huiusmodi
crisim diminutam, & hoc quidem cum
emplastris calidis attractiuis ex fermento
& cepis crudis confectis, & cum frica-
tionibus illius membri, & proprie si sit
membrum ignobile, vel emunctorium
doctrinam Auicennæ sectantes primo
canoñ. fēñ. quarto capitulo de cura apo-
stematum dicentis: q; est, quandoq; cum
volumus huiusmodi apostemata & ipsa
prouocamus, si non sunt: & augmenta-
mus, si sunt, scilicet cum per ea corporis
membra intrinseca exonerabuntur. Re-
stat autem hoc quoddam de euacuatio-
ne minoratiua pertractandum, quod est:
quoniam cum ipsa sit quandoq; possibi-
lis fieri in eadem feb. putrida cum flebo-
tomia & farmacia (vt ostēdimus in præ-
dictis) dubium adhuc videtur, an flebo-
tomia sit præmittēda farmacia, vel ecō-
uerso: quādo scilicet vtraq; ipsarum vti
volumus apud minorationem. Ad quod

dicendum videt, q; si se. sit interpollata
farmacia est præmittēda flebotomia,
ne forte flebotomia trahat materiam ad
venas vicinas vi vacui, et ex se. interpol-
lata faciat continuam: quoniam hæc est
permutatio maligna. Si vero sit se. conti-
nua, præmittēda est flebotomia, & pro-
prie si medicina subsequens debeat esse
fortis, agitatiua: q; si fuerit debilis, leniti-
ua, non refert, quid de eis antecedit. Con-
ueniēs est etiam (vt dicit Gal. 9. de inge-
sanitat.) vt in omni se. putrida curanda,
sit aer continēs frigidus & humidus tem-
perate, per se vel per artem, corpore ta-
men assidue cum pannis calidis cooper-
to: quoniam sic euentabitur cor per inspi-
rationem: neq; tamē prohibeat assidua
resolutio materiæ per poros cutis & ve-
narum. De somno præterea & vigilijs
scire conuenit, q; sunt sibi inuicem con-
causa: vt ait Gal. 1. x. de ingenio sanitat.
Somnus nanq; deseruit in fe. putridis ad
digerendum, vigiliæ vero ad resoluendū,
& proprie, si fuerint naturaliter se haben-
tia in quāto & quali: quare prohibeatur
æger a somno diuturno pro posse nisi for-
te consuetudo, vel necessitas propter vi-
gilijs nocturnas, vel debilitatem virtutis
ad id instigarit: tunc nanq; possibilis
est fieri ab aurora vique ad horam terciā
diei: vt ait Hippo. 2. prognostic. Verum
quomodocumq; res se habuerit, nullatenus
dormire permittatur in principio, vñ
augmento paroxysmorum & exacerbati-
onum: quoniā virtutem debilitat, ma-
teriam incrudat, labores multiplicat, &
paroxysmum & to. feb. elongat, vt ait
Gale. in commento illius apho. 2. partic.
In quo morbo somnus &c. In statu vero
& declinatione similiter & in crisi dor-
miat quantum potest, quia virtutem for-
tificat in expellendo materiā, & sensum
læsionis obrundit. Quia si vigiliæ super-
fluxerint methodo succurratur, vt docu-
imus in cap. vigiliarum lib. 1. ne forte vis

tutem debilitent, & morbum abbreviēt ad perniciem sui resolutione potēti. Hac igitur methodo curatiua regatur omnis feb. putrida per diætā, & medicinas vsq; ad declinationem perfectā: quod tempus conualescentiæ nuncupatur. Tunc namq; confortetur, & resumatur corpus cum cibis & potibus laudabilibus consuetis, donec omniquaq; restauretur. Et scias, q̄ in finibus omnium febrium putridarum competit balneum aquæ dulcis tepidæ cum sudore rorido sine mora multa: quoniam reliquias materiæ resoluit, & virtutē excitat attractiuā subservientem nutritioni membrorum.

Emperica. Scripsimus in methodo de instrumentis principalibus in cura fe. putridarum, quæ sunt diætatio, & euacuatio: volumus nūc describere de instrumento quodam minus ramē principali, quod est potus sitis extinctiui: quoniam sitis est ex accidentibus febris, quibus necesse, vt debite succurratur. Circa quod sciendū, q̄ (sicut ait Gal. 8. de ingenio sanitatis.) Sitis tolerare in feb. est martyrium sine iuamento: quoniam virtutem debilitat, feb. inflāmat, vigilias cum angustia multiplicat, vias stypticat, digestionem & euacuationem retardat. Dicimus igitur, q̄ potus s̄mo si in feb. sunt quatuor, duo quidē in fe. de causa calida, videlicet iulep, id est, aqua zuccari, & prisana id est aqua ordeī: duo veto aliq̄ in feb. putrid. de causa frigida, scilicet hydromel, vel mellicratum, quod latine aqua mellis interpretatur: similiter aqua cicerum & pisorum: Neq; conuenit, vt detur aqua frigida pura in fe. putrida, præterquam in synocha et caufone: quoniam materias incrudat, vias oppilat, & morbos elongat. Iulep. conficitur ex libr. vna aquæ puræ dulcis fontanæ vel fluuiialis: & vncia vna zuccari albillimis mixtis, & aliquantum bullitis ad ignē lentum, & spuma-

tis & colatis: q̄ si magis additum fuerit de zuccaro, fiet magis confortatiuum, et magis lenitiuum, sed minus extinctiuū, Hydromel fit eodem modo, si pro zuccaro mel coctum despumatum capiamus. Aqua cicerum vel pisorum fit ex decoctione lib. vnius cicerum cum corticibus exterioribus & substantia integra: quæ sic fit. In aquæ puræ fontanæ lib. 20. bullierint donec medietas consumatur: tunc coletur, & reseruetur: & confert in feb. febricitantibus. Habet enim virtutem deopiplandi, subtiliādī, atq; vrinam prouocandi, & proprie si aliquid apponatur ex feniculo, vel petrosil. sitim tamen non tollit. Aqua ordeī (quæ prisana dicitur colata) fit dupliciter in genere: quoniam aut medicus intendit cum ea potum medicinale, aut cibalem: Si medicinale, fiat sic, ℞. ordeī boni ex corticati & fricati cum panno aspero, donec cortex interior crepetur, libr. vnam aquæ fontanæ lib. 20. decoquantur simul lento igne vel super carbones, donec media pars aquæ vel duæ partes consumantur: coletur, & reseruetur in vase vitreo, donec infrigideatur, & sic construit ipsam Mes. in suo de appropriatis, cap. de pleuresi. Est namq; lenitiua, abstersiua, vrinatiua, similiter & ventris lubricatiua, & oppilationū aperitiua, nec non & sreatiua. Verumtamen Auerrois septimo colliget. aliter ipsam construit. ℞. ordeī boni nō excorticati sed integri, sicut seminatur in terra li. i. aquæ puræ, lib. 20. imbibatur primo ordeum in aqua per sex horas, donec dilateretur, & mollificetur: deinde bulliatur simul ad lentum ignem, sicut prius. Et si volueris magis clarificare, consue ordeū post imbibitionem in panno lineo denso. Si vero volueris facere potum cibalem. ℞. ordeum & aquam sub portione prædicta, & frica ipsum cum panno aspero fortius quàm prius donec scilicet cortex interior separetur: quod

Tractatus primus secundi libri

si non sit possibile fieri cum panno, fiat cum mola: deinde medullam albam ordeï laua cum aqua calida ter vel quater semper aquam renouando: Vltimo vero bulliatur lento igne cum aqua frigida pluuiali prius calefacta, donec medietas vel tertia pars aquæ remanserit: deinde coletur, & reſeruetur in vaſe vitreo. Hæc aqua ſedat ſitim, lenit aſperitatem gutturis & linguæ, calorem mitigat, ſputū prouocat, nutrit & ventrē lubrificat. Et ſi per amplius decoxeris, magis nutrit, & minus ventrem inflabit: Et ſi pultem ex eo facere volueris, adde oleum & ſal, neq; cola, & reperies bonitates eaſdem: & tunc dicitur priſana non colata.

Canones. Neceſſe eſt in fe, putridis vt viſcera illa lædant, quæ ſunt receptacula propria materierum. Verbi gratia: In febr. de cho. epar. in febr. de flegmate, ſtomachus & pulmo, in fe. de melancholia ſplen in febr. de ſang. cor & vena corporis totius: quare oportet, vt in curis ſingulorum talibus membris cum alteratiſis & cõfortatiſis aſſidue ſuccurratur: vt dicit Auer. 7. ſui colliget ca. præſenti. Horum autem copiam reperies in capitulis ſingulorum libro 1. Sciendum præterea, qd licet in cura ois morbi intentiones ſunt 18. attendendæ, quæ ſunt morbus, cauſa morbi, virtus, ætas, complexio, conſuetudo, tempus anni, & regio, corporis habitudo, ſitus membri, varietas membri, ſenſibilitas membri, operatio, atq; neceſſitas, nobilitas membri, colligantia, conſtitutio aëris, & anteceſſio diætæ, prout nos docet Gale. 4. de ingeñ. ſanita. Verumtamen in cura febr. putridarum duo ſunt ex eis præcipue, ſcilicet cauſa morbi, & virtus ægri. Hæc namq; duo ſunt, quæ pugnant inter ſe pro pernecie, vel ſalute conferenda: ita ſcilicet vt in diſgeſtionibus & alterationibus cauſam magis attendamus, ſed in diætâ atq; in euacuatione virtutem magis inſpiciamus:

ne forte virtutem ſimul cum morbo præſternamus. Scire etiam cõuenit, qd diætæ ordinatio in febr. putrid. eſt duplex. Vna quidem vniuerſalis reſpectu totius ægri tudinis: Alia vero particularis reſpectu cuiuſcunq; diei. Vniuerſalis autem eſt triplex: quoniã aut trahit ab eſſentia morbi, quia aliter diætamus in febr. acuta, & aliter in peracuta, & aliter in perperacuta, & aliter in tropica, & aliter in chronica: Aut trahitur a quatuor temporibus vniuerſalis morbi: quia aliter diætamus in principio, & aliter in augmento, & aliter in ſtatu, et aliter in declinatione. Aut trahitur a virtute: quia aliter diætamus in virtute conſtanti, & aliter in debili. Particularis vero ſimiliter eſt triplex: aut em̃ trahit ab interpollatione paroxyſmi, aut conſuetudine numeri cibationū quaq; die tempore ſanitatiſ: aut ab accidentibus paroxyſmi: & hæc omnia plene tractauimus in methodo veſtigij autorum fideliter inhærentes. Cura præterea in febr. eſt triplex. Vna quidem gratia diſpoſitionis, & ſic in omni febr. competunt frigida & humida per naturam: ſecunda vero gratia cauſæ, & ſic in fe. quibuſdã competunt calida & ſicca, puta Hæmaticis: quibuſdã frigida & humida, vt cholericis: quibuſdã calida & humida, vt in melancholicis: vnde frequenter accidit, vt medicina conueniens cauſæ, noceat diſpoſitioni, & econuerſo. In hoc tamẽ calu quod eorum magis timueris, magis attēdas. Verbi gratia: diſpoſitionē in fe. de cholera, ne fortē calorem inducat: Cauſam vero in febr. de flegmate vel de melancholia, ne forte morbum prolonget: vt runque vero ſimul in febr. de ſanguine, ne fortē ſuffocationem ſubitam inducat. Tertia autem cura eſt accidentium conſequentium febrem, ſcilicet ſitis, dolor capitis, faſtidium, ſtypticitas ventris, vel fluxus eius, & ſimilia. Et quẽadmodum eſt cura triplex, vt ſcri

plimus cap. de ardore vrinæ. Demum sciendum, q̄ om̄is feb. putrida, quemadmodum & om̄is morbus materialis salubris, quatuor habet tempora vniuersalia, prout sæpius tactum est ca. præsentī: verum quomodo distinguantur, & quomodo per signa propria cognoscantur, diximus cap. de pleuresi pro posse.

Prognosticatio. Priusq̄ prognosticare possumus in fe. putrid, scire oportet, quæ & quot sint genera signorum attendendorum in feb. & qualia sint eorum fundamenta, a quibus trahuntur, & quid habeant significare. Ad cognitionem igitur signorum quæ et quot sint in genere, duplex est diuisio necessaria: quarum prima est, q̄ signorum (vt patet 3. de accidēte & morbo) quædā signat ægritudinem, quædā causam ægritudinis, quædam longitudinem & breuitatem ægritudinis, quædā tempora vniuersalia ægritudinis, quædam salutem vel mortem. Secunda diuisio est, quòd quædam sunt accidentia, ægritudinem antecedentia, vt rubor faciei synocham: quædam coexistunt ægritudini, vt dolor lateris pungitiuus in pleuresi existit coæquus: quædam vero concomitantur ægritudinem, vt icteritia quandoq̄ sequitur feb. de cho. & vomitus feb. de flegmate: & hydrop̄, feb. de melancholia, & variolæ feb. de sanguine: & ex huiusmodi signis post apparētibus sunt om̄ia signa exēritum a corpore, scilicet, vrinæ, sputi, egestionis, & sudoris: a quibus digestio et indigestio, salus & mors significantur. Ad cognitionem aut̄ signorum, a quibus trahuntur, & quæ sunt eorum fundamenta, scire nos oportet: q̄ om̄ne signum aut trahitur a substantialibus morbi, vtpote ab actiōe læsa, ablata, diminuta vel corrupta: aut trahitur a calibus & accidentibus morbum consequentibus, vtpote a qualitate corporis permurata, vel exeuntibus a corpore, mutatis. Ad cognitionē

autem signorum, cuius causa quærat̄ur & quid habeant significare, sciendum: q̄ vltimate nihil aliud significant nisi vel virtutis dominium super causam morbi (quoniā in hoc est salus atq̄ vna ægri) vel causæ dominium super virtutem, in quo consistit perniciēs: quare volentem prognosticare in feb. putrid, primo scire conuenit fortitudinem causæ morbi. Dicamus ergo q̄ virtus dicī debilis & fortis dupliciter. Vno mō formaliter, prout est potentia animæ, & sic nūq̄ variatur virtus in ægritudine. Alio modo materialiter, scilicet ratiōe suor̄ quatuor instrumentorum, quibus agit cōtra morbum, quæ sunt calor innatus (qui cōplexio dicitur) & calor influēs (q̄ spūs dicī) & mēbra & humores, prout hæc oīa vel plura eorum sunt bene se habētia in quanto & quali: similiter & in modo substantiæ & situ: & ad hoc non modicum deseruit influxus astrorum infortunatorum: vt dicitur primo prognosticorum, vel eufortunatorum: vt dicitur ibidem, & 3. de criticis diebus: & eodem modo dico de morbo. Cum autem dicim̄ virtutē esse fortem in fe, nō sufficit illud ad salutem: sed requiritur q̄ sit fortis per comparationem ad morbum, & eius causam. Potest nāq̄ virtuti forti fortior morbus obuiare, qui mortē infert: propter quod ait Hippocr. 1. prognosticorum, q̄ in signis prognosticis non sufficit bonitas & malitia perpendere signorum, imo neque ipsorum multitudinem, sed eorum inter se comparisonem. Potest namq̄ vnum bonum signum efficax pluribus malis signis debilibus resistere, similiter & eōuerso. Et ex hoc manifeste apparet causa, quare in feb. & proprie in feb. acutis, æger pleiūq̄ moritur: cuius pulsus est magnus, fortis, ordinatus: & alter ecōtra saluatur, cuius pulsus extat paruus, debilis, inordinatus. Quod si q̄s oblecterit, Quid ergo fiet, cum virtus & morbus fuerint

Tractatus primus secundi libri.

æqualis fortitudinis omnino & dicemus, quod illud tempore longo stare non potest, quin alterum ex eis dominetur. Ad quod facit regimen medici, similiter & aspectus astrorum. Volentes igitur in speciali omnia signa prognostica generalia se, putridarum tam bona quam mala sub compedio cōstringere, & proprie Hip. & Gal. qui plurimum in eis sunt conati. Dicamus, quod cum signum nihil aliud sit per essentiam, quam accidens consequens morbum velut vmbra corpus: ut probat Galenus. tertio de accidenti & morbo: oportet necessario, ut quemadmodum accidēs, ita & signū trahatur ab aliquo istorum trium in genere quæ sunt actio læsa, qualitas permutata, & extēs permutatum: de quibus per ordinem dicamus. Neque putet aliquis in signis huiusmodi certā fore fidem, sed probabilem solum atque æstimatam: quoniam ut ait Hip. 1. partit. apho. Acutorum morborum non omnino certæ sunt pronuntiationes, neque sanitatis, neque mortis. Signa igitur prognostica in feb. putri, in communi sumpta ab actione læsa, sunt in genere tria bona, & totidem mala eis opposita: quoniam aut trahuntur ab actione læsa virtutis animalis: sic ut sunt omnia signa significantia ablationem, vel diminutionem, vel corruptionem sensus & motus voluntarij super corpus totum: & hæc quidem sunt septem numero bona, & totidem mala eis opposita. Primum est confortatio mentis interioris secundum discretionem, & imaginationē, & locutionē, & memoriā perfectā: similiter & claritas sensuum exteriorum sine errore circa sua sensibilia propria. Secundum est somnus naturalis vel consuetus tempore sanitatis secundum quantum & quale, & hora diei & noctis sine stupore, vel lassatione post ipsum. Vnde Hip. 2. par. apho. In quo morbo somnus laborem præstat, mortale. Et subdit in proximo: ubi somnus desipientiam sedat, bonum; ubi vero præstat, mor-

tale. Tertium est decubitus ægri super alterum laterum non super dorsum, nisi quandoque propter consuetudinem, vel lecti declinationem. Quartum est mobilitas facilis & leuitas corporis totius atque laterum, cum se reuoluit de latere super latus. Quintum est absentia saporum alienorum apud gustum sine causa manifesta, vel eorum præsentia debilis vel diminuta. Sextum est fortitudo capitis, ita ut neque dolorem sentiat, neque angustiam omnino vel paucam. Septimum est fortitudo virtutis expulsiuæ cerebri super omnia sua emunctoria, & proprie cum sternutatione temperata. Si autem signa trahantur ab actione læsa virtutis vitalis: sic fiunt quatuor salubria, & totidem mala eis opposita. Primum est pulsus magnus, fortis, ordinatus cum spissitudine moderata: quoniam fortitudinē virtutis certificat: similiter & diastole maior, quam systole, & tempus quietis post diastolen: quoniam calorū feb. declinationem significat confidenter: sicut apparet in finibus paroxysmorum feb. interpollatarum. Secundum est anhelitus ordinatus facilis non intersectus ex suspirijs vel asthmaate vel orthopnoia. Tertium est tranquillitas cordis in suo motu, ita ut neque salter, neque tremat, neque cadat. Quartum est pulmonis & cannae facilitas, ita ut neque tussi, neque siti mendosa, neque caumate affligantur, neque vocis generent sonum maiorem, vel minorem solito. Si vero signa trahantur ab actione læsa virtutis naturalis, sunt septem numero bona, atque vitalia, & totidem mala eis opposita. Primum est bonitas appetitus ad cibum debitum vel consuetum secundum substantiam, & quantitatem, & qualitatem, & numerum, & ordinē, atque horam sumptionis. Secundum est paucitas sitis, & dysyderium ad motus naturales debitos, & consuetos. Tertium est absentia inflationis, & rugitus & an-

gustia circa ventrem post cibum assum-
 prum: quoniam fortitudinem virtutis di-
 gestiuæ stomachi significat. Quartum
 est absentia doloris pungitiui vel grau-
 tiui in alterutro hypochondriorum: quo-
 niam fortitudinē virtutis digestiuæ epa-
 tis & splenis significat. Quintum est ex-
 pulsio superfluitatum primæ & secundæ
 digestionis debita vel consueta secundū
 quantitatem & substantiam cibo pro-
 portionatam, & secundum qualitatem
 materiæ congruentem, & secundum ho-
 ram naturæ & consuetudinis conuenien-
 tem. Sextum est titillatio virgæ & testicu-
 lorum ad coitum: quoniam significat vir-
 tutem gignitiuam in eis nōdum fore so-
 pitam, quæ est melior significationum.
 Septimum est priuatio sensationis malæ
 circa musculos, q̄ sunt in ambitu totius
 corporis: velut horripilatiōis, v̄l rigoris,
 aut tremoris, aut ardoris, aut pūctionis:
 nisi fortassis aliquod talium acciderit v̄l
 naturæ pugnantis contra morbum: sicut
 sit in principio paroxyfmi febrium
 interpollatarum & in crisi feb. acuta-
 rum: quoniam bonitatem significat sen-
 sus naturalis. Signa vero prognostica ge-
 neralia in feb. putridis tracta a qualitate
 corporis permutata, sunt tria in gñe: qm̄
 aut trahuntur a colore, aut a calore, vel
 frigore, aut ab habitudine. Si quidē a co-
 lore, sic sunt duo numero bona, & totidē
 mala eis opposita. Primum est, color fa-
 ciei debitus & consuetus, ita vt neq; liuo-
 re neq; pallore, neq; rigore, neq; rubore,
 neq; squalore, neq; vario colore sit muta-
 tus propter ægritudinē, & proprie infra
 3. dies a principio ægritudinis, sed sicut
 color sanorum, vel similis colori sanorū.
 Secundū est, vt icteritia v̄l citrina vel ni-
 gra non superueniat, nisi forte post septē
 dies, & antecedentibus signis digestionis
 perfectæ, & virtute cōstante. Vnde Hip-
 pocrates quarta parricula aphorismorū:
 Icteritia si superuenerit ante septimum

diem, malum. Istud tamen dictum Hip-
 pocratis pertractione indiget: vt ostendi-
 mus cap. de icteritia lib. primo. Si vero
 trahatur a calore vel frigore sic sunt duo
 signa bona, & totidem mala eis opposi-
 ta. Primum est, vt calor sit æqualis super
 corpus vniuersum, neq; extrema frigeāt,
 & viscera adurantur: quoniam quanto
 extrema calidiora fuerint cum signis bo-
 nis alijs, tātō foret amplior spes salutis.
 Vnde Hippocra. quarta partie, aphori-
 smorum. In non deficientibus febribus,
 si quidem quæ extra, fuerint frigida, quæ
 vero intus, ardeant, & sitim habeāt, mor-
 tale. Et ratio est, quoniam proprium est
 calori putrido moueri a centro ad circum-
 ferentiam in mixto, cum non fuerit pro-
 hibens aliquod: vt est apostema magnū
 in corporis profundo. Secundum est, vt ri-
 gor vel tremor non superueniat, & pro-
 prie in feb. acutis, nisi fortassis post signa
 digestionis, & in die critica, quam præ-
 cessit dies sua indicatiua cum sudore len-
 to & cum virtutis constantia, quæ cum
 simul fuerint: crisim significant ad salu-
 tem. In alijs vero morrem festinam ex ef-
 frenitate materiæ, vel morbi longitudi-
 nem ex grossitie atq; multitudine mate-
 riæ demonstrant. Vnde Hippoc. quarta
 particula. apho. Si rigor inciderit feb. non
 deficiente, iam debili existente virtute,
 mortale, intelligens hoc de crisi sympto-
 matica, sed tamē in 1. apho. eiusdem par-
 ticulæ ait. A causone habito rigore sup-
 ueniente, solutio sit, intellexit hoc de crisi
 naturali. Si autem trahantur signa hæc
 ab habitudine corporis, sic sunt signa quas
 tuor numero bona, & totidem mala eis
 opposita, quæ ponit Hip. primo progno-
 stic. Primum est, dispositio faciei, vt scilicet
 sit facies similis sanorū, neq; sit facies
 similis cadauerum mortuorū, quæ facies
 tornatilis nuncupatur: cuius hæc est dispo-
 sitio, vt statim a principio se, & proprie
 infra tres dies, sūt oculi concaui, lipposi,

Tractatus primus secundi libri

qui lumen videre perhorrescunt, & sint inæquales, utpote vnus maior & eminē-
tior altero, vel sint inuersi, ita vt sola eo-
rum alba videantur, vel sint tremuli, la-
chrymosi, vel fixi, cōgelati, & tempora
sint, velut lamina ferrea, & aures frigi-
dæ, & earū pulpæ abbreviatæ, & nares
acutæ eminentes atq; porrectæ cum an-
gustia foraminum suorum, & frons ari-
da, tensa, velut corium torrefactum ad
ignē, quod nullatenus rugas habet, neq;
plicatur, neq; redit in situm proprium lu-
bito, si trahatur, & mentum longum, &
genæ prominētes propter consumptionē
maxillarum, & os amplum & curuatū
cum distorsione labiorum, & assiduitas
anhelandi per os, non per nares: Hæc em̄
omnia, similiter & extenuatio corporis
totius subita præter debitum vel consue-
tum mortem propinquam significāt ex
feb. fortitudine corpus & virtutem ma-
rismante, & proprie, si causa non ante-
cesserit primitiua. Verbi gratia: Vigiliæ
assiduæ, sudor plurimus, fluxus vētris su-
perfluus, ieiunium cum prostratione ap-
petitus, & similia: quoniam in eis minor
cadit timor, q̄ ex feb. Secundum est habi-
tudo corporis totius, vt scilicet sit corpus
totū molle, tractabile, flexibile, neq; sit
vēter inanitus, velut vesica vacua, neq;
crura rigeār, velut lapis aut lignum: qm̄
talis est dispositio cadaueris, cum infrigi-
datur, Vnde Hip. 2. parti, apho. In oibus
morbis, ea quæ circa vmbilicum & pe-
ctinē spissitudinē habere melius est &c.
Veruntamen oportet, vt corpus ex feb.
extenuetur magis vel minus, prout feb.
maior vlt̄ minor fuerit, & corpus rari, in-
compactū. Quapropter ait Hip. 2. part.
apho. Febricantibus non omnino in su-
perficie permanere, vel nihil minueret cor-
pus, aut contabescere magis eo, quod sit
secundum rationem, malum: hoc em̄ lon-
gitudinē ægritudinis, hoc vero imbecilli-
tatem virtutis significat, Tertium est, ha-

bitudo testiculorum in viris, & mamilla-
rum in mulieribus, vt non sint dilatata,
mollia, pendētia, neq; sint arefacta, cor-
rugata: quoniam consumptionem humi-
ditarum radicalium demonstrant. Quar-
tum est, habitudo iuncturarum & mem-
brorum articularium, vt sint leuia, flexi-
bilia ante & retro, neq; rigeant, velut in
tetano: neq; recurrēt, velut in spasmo.
Vnde Hippo. 2. parti, apho. Feb. in spa-
smo melius est, q̄ spasmus in feb. Signa
autem tracta ab excentibus mutatis, li-
cet sumantur a septem, quæ sunt sudor,
vrina, sputum, egestio, & fluxus mēstru-
orum, & fluxus sang. narium, atq; vo-
mitus: Nos tamen de sudore & vrina so-
lum loquimur præsentī sermone: quoniā
de sputo diximus cap. de pleuresi, de ege-
stione vero capitulo de fluxu ventris: &
sic alia etiam suis capitulis proprijs dixi-
mus. Sudor igit̄ si superuenerit in die cre-
tica, & post signa digestionis, & fuerit
neq; ardēs, neq; frigidus, neq; subtilis im-
bibitus, neq; viscosus fluens (sicut oleū)
neque modo appareat, modo desit, atq;
neq; in quadam parte corporis accidat,
& in quadam parte non, sed fuerit copio-
sus, assiduus, æqualis per totum, quē be-
ne sufferre potest virtus agri, neq; fuerit
foetidus magis solito vel debito: omnia
istā bonū significant, contraria vero ma-
lum. Sudor circa caput solum exiens, de-
bilitatem significat cerebri: & si circa pe-
ctus & thoracem acciderit, oppressiōnē
significat cordis: si vero circa mirach vē-
tris & hypochondria se tenuerit, debilita-
tem virtutis, atq; multitudinem materię
significat circa membra nutritiua. Vn-
de Hippo. 4. part. apho. Vbi sudor in cor-
pore, illic ægritudinem demonstrat. Est er-
go malus sudor, si fuerit circa vētrem so-
lum: peior vero, si circa pectus solū: sed
pessimus omnium atq; mortalis, si circa
tempora atq; frōtem. Sudor præterea fri-
gidus timēdus est, ex multitudine & gros-

sond

ſitie materiæ, & morbi longitudine, quã ſignificat. Sudor calidus timendus eſt, ex furore materiæ, & virtutis ſubita ſuffocatione. Vnde Hippo. 4. parti. apho. Sudor multus, calidus & frigidus, ſuperfluens, frigidus maiorem, calidus minorem ſignificat ægitudinem. Item ſudor frigus generaliter in omni feb. malus eſt, at que timendus : quoniam aut caloris naturalis extinctionẽ, aut materiæ ſignat multitudinem. Vnde Hip. 4. parti. apho. Frigidi ſudores cum feb. quidem acuta mortem, cum molliori vero longitudinẽ ægitudinis ſignificant. Vrina ſi ſtatim a principio infra primos tres dies incipiat apparere digeſta, & de die in diẽ eius digeſtio augmentetur, atq; perſeueret cũ conſtantia virtutis, ſalubre. Dicitur autẽ digeſta ex ſignis quatuor: primo quidem ex ſubſtãtia temperata inter groſſum & ſubtile: ſecundo ex colore temperato, ſcilicet citrino vel ru. claro: tertio ex quantitate proportionata materiæ & diætæ: quarto ex cõentis, quę ſunt tria, ſcilicet, nebula pendens in ſuperficie, quæ inchoatam digeſtionẽ ſignificat: & nubes natans in medio, quæ augmentum digeſtionis ſignat: ſimiliter & hypochaſta, alba, levis, æqualis in fundo reſidẽs, in figuram pyramidis, aſcendens, quæ vere ſignificat complementum digeſtionis. Vrina cruda & indigeſta velut alba lactea vel karopos vñ palæaris, & cuius cruditas de die in diem augmentatur: neq; cibi, neq; remedia rationabiliter exhibita proficiunt ad producẽdum digeſtionem, vel cõformãdum virtutem, mortem ſignat aſſutur. Vrina quæ diuerſificatur in digeſtione ſecundum ſe, vel ſecũdum tempora, morbi malitiam & materiæ diuerſitatem, & virtutis anguſtiam demonſtrat. Verbi gratia: ſi ſit digeſta ſecundũ ſubſtantiam, ſed non ſecundum cõentia: vel ſit digeſta ſecundum calorem, ſed non ſecundum ſuam ſubſtantiam; vel ſi mo-

do digeſta fuerit, modo cruda redierit alternatim. Vrina diuerſicolor : verbi gratia: rubens inferius, liuens ſuperius, aut cõuerſo hæterogeneam materiam, & virtutis anguſtiam demonſtrat: quare ſi pars vrinæ ſuperior, peior apparuerit, freneliſim vñ lethargiã, vel ſubeth ex feb. minatur. Si vero pars inferior, deterior euenerit, nefreſim, vel iſteritiã, vñ epatis & ſplenis duritiem promittit. Si vero pars media, cordis minatur ſuffocationem. Vrina viridis ſpaſmum de inanitione, & mortem ex aduſtione ſignificat. Vrina nigra in feb. putridis ſecundũ ſubſtantia vel contenta, mortem ex aduſtione ſignificat, & proprie, ſi præceſſerit eam viridis. Quod ſi liuida antecceſſerit, mortem ex congelatione, & caloris naturalis extinctione demonſtrat. Et quanto magis nigredo deſcẽderit ad fundum vrinalis, eo magis malũ pronũtiabit: vt di. Galeñ. 2. de criſi. Eſt tamen frequenter cum in feb. putrid. & proprie melancholicis, vrina nigra expulſionem naturalẽ ſignificat & ſalutẽ, tunc ſcilicet cum euenerit poſt ſigna digeſtionis, & cum alleviatione virtutis ex ipſa quaq; die, & fuerit plurima perdurans, neq; deliteſcat ſubito poſt eius apparitionem. Caue præterea in feb. putrid. vt di. Hippo. 2. progno. ne renum, vel ſplenis, vñ veſicæ vitio capiaris, attribuens feb. quod eſt aliorum. Eſt namq; cũ in ſe, egreditur per accidẽs vrina nigra, vitio renum vel ſplenis vel matricis, cum eorũ oppilatio tollitur per naturam. Et eſt cum in ſe, apparet vrina lactea veſicæ vitio. Diſtingue ergo vrinam albam ex fœtore & contento albo, ſquamoſo reſidente in fundo vaſis, velut furfures ſuper cutẽ. Vrinam vero nigrã ex ſenſatione doloris circa renes vel hypochondrium ſiniſtrũ, vel ſumẽ ventris: quoniã talia non ſunt proprie in feb. Et ex melioribus ſignificationibus eſt, quas patiens refert ſuper cõſuetudine tales vri-

Tractatus primus secundi libri.

nas faciendi periodice, vel assidue. Ex signis igitur huiusmodi prognosticare possumus in feb. putrida quacunq; mortem vel salutem: verum si diem & horam mortis vel salutis præscire volueris, ad signa prognostica, quæ dicemus in crisis, erit recurrendum. Quoniam vt ait Gal. 3. de crisi. solius ægritudinis diem & horam est scire possibile, cuius est vera crisis. Hæc igitur de fe. putrid. in generali dicta sufficiant, quæ necesse est, vt omnia vel plurima in illius mente resideant assidue, qui ipsas curare methodo, vñ in ipsis prognosticare rationabiliter attentat.

De febre sanguinea. Cap. VI.



Ebris ex sanguine non est fieri possibilis interpollata, sed tantum continua: quoniam sanguis non remanet sub propria forma, nisi cū est intra venas: & ilico cum venas exierit in stomachum vel intestina vel spongiositatem membrorum, necesse est vt in virus & saniem conuertatur: vt dicit Hippo. sexta particula aphorismorum, quod totum accidit ex temperamento suæ complexionis, & debita habitudine suæ compositionis: quemadmodum apparet in lacte & spermate. Hæc febr. non complicatur cum feb. alia, vel non manifeste. Quod quidem accidit propter multitudinem sanguinis in corpore nostro super humores omnes. Connumeratur præterea hæc fe. inter feb. continuas acutas valde, quas Gal. arsius, vel conclusas appellauit. Auic. vero peracutas vel perperacutas: & sunt fe. quæ terminantur in quarta, vel 7. die, vel ad plus 14. quod tēpus nulla fe. peracuta potest transire, siue sit mortalis, siue salubris: propter quod ait Hippo. 2. partic. aphorismorum. Acutæ ægritudines in 14. diebus terminantur. Est autem febr. sanguinea duarum specierum: quoniam vel sanguis peccat in quanto: quare cum sit

per naturam calidus, feb. inducet, quæ dicitur synocha inflatiua: Vel peccat in qualitate: quare cū a natura non regitur, putrescit, et feb. efficit, quæ synochus appellatur. Vnde versus: Synocha de multo, sed synochus ex putrefacto. Non potuit autem hæc diuersitas in alijs humoribus reperiri: quoniam neque sunt in corpore plurimi, neque benigni, velut san. propter quod Gal. 9. de ingenti. sanitatis. Hanc feb. mediam inter febres putridas, & effimeras ordinauit. Hæc etiam feb. siue sit inflatiua, siue putrida tres habet species. Vñ quidem, quæ statim cum incipit, acuitur assidue: quoniam in ea plus reperitur putrefactionis, quæ resolutionis: & ista acmaistica appellatur. Aliam vero, quæ e conuerso procedit: quoniam statim a principio de die in diem mitigatur, cum in ea plus resolutionis, quam putrefactionis reperitur: & hæc peracmaistica dicitur. Tertiam vero mediam inter istas, scilicet quæ semper affligit æqualiter, quasi sit semper in statu: & hæc homotenus nuncupatur. Neque potest ista diuersitas in humoribus alijs reperiri: quoniam illud vel subtilitas, vel grossities, vel viscositas, vel modiciras impedit. Signa feb. de sanguine in communi sunt: quoniam ipsa non accidit corporibus matris frigidis per naturam, vel regimen, vel ætatem, vt ait Galenus non de ingenti sanitatis: quapropter non accidit feminibus, vel melancholicis, sed sanguineis carnosius rubicundis per naturam, atque adolescentibus vel iuuenibus perfectis. Quod si corporibus flegmaticis vel cholericis acciderit: sit hoc ex antecessione otii & quietis, & somni plurimi, & ciborum sanguinem multiplicantium: vt sunt proprie vinum, & carnes laudabiles: quare cum post ista neglexerint exercitia, vel balnea consueta, vel euacuationes cum flebotomia, surgit febris. Et ad hoc disponit plurimum pororum densitas, velut in corpore musculofo, denso,

compacto, puræ carnis aquæ tactum: similiter & pororum oppilatio ex balneis stypticis, vel vnguentis prohibentibus inspirationem. Significant autem hanc febem in cōmuni vrina rubea grossa, & facies rubea cum inflammatione maxillarum, & imaginatione rerum rubearum: & pulsus magnus, latus, longus, fortis, velox, atque spissus: & dolor capitis fortis, grauis, pulsatiuus, cum instātia viliariū assidua: & sitis intēsa cum dulcedine saliuæ sine causa manifesta: similiter & grauitas plurima corporis totius: ita vt anhelitus fiat strictus, velut præfocati: & est eius caliditas vehemens, velut in causone, sed est cū humiditate. Signa vero propria distinctiua inter synocham & synochum sunt quatuor: quorum primum est: quoniam in synocha inflatiua apparet vrina rubea, clara, grossa non confusa: In syncho vero putredo foetida, confusa propter humoris ebullitionē. Secundum vero: quoniam in synocha sentitur pulsus ordinatus, & æqualis: In syncho vero diuersus, & inordinatus: quoniam in eo virtus magis fatigatur: & in syncho systole est maior, quā dia-stole: cuius contrarium reperies in synocha inflatiua: & similiter fiet apud anhelitum. Tertium vero: quoniam in synocha sentitur ad tactum calor corporis vaporosus, suauis: in syncho mordax, durus, acutus propter fumos putridos capnios. Quartum vero: quoniam synocha non habet periodicationes diurnas: quoniam ipsa est febris non proportionata ad materiam: Synochus vero exacerbatur de tertio in tertium: quoniam sanguis cum putruerit, similitudinem cholerae assumit: vt dicit Galenus loco supradicto. Et duo quidem vltima sunt certa, quæ non faciunt errare. Potest autem & quintum addi, quod est: quoniam vt plurimum synocha incipit calida sine tremore & rigore, synochus vero cum rigo-

re: quemadmodum & alia febres putridæ: quod quidem accidit propter vapores putridos dispersos super musculos, qui sunt in ambitu totius corporis.

Methodus. Cura vtriusque febrium sanguinearum, vna fere est atq; eadem: vt docet Galenus nono de ingenio sanitatis, similiter & Auicenna capitulo presenti: quorum doctrinam assequimur pro posse. Cum igitur hanc febrem primo cognoueris: fac ilico flebotomia basilicæ dextræ, vel simul vtriusque cum incisione larga, siue fuerit in die, siue in nocte. Neq; refert an in principio vel augmento vel statu illud facias, si prius non fueris vocatus: quoniam a prima die vsque ad septimam potest in hac febre fieri flebotomia, in qua quidē tantum de sanguine subtrahatur, siue per assiduationem hora vna, siue per secundationem horis diuersis, donec æger ad syncopim conuertatur: si tamen virtus & ætas consenserint, & proprie in corpore compacto & robusto: veruntamen oportet, vt magis vicinemur syncopi in synocha inflatiua, quā in syncho: quoniam in ea virtus magis fortis est, & citius per flebotomiam exoneratur, quā in putrida, in qua sanguis dupliciter peccat. Oportet etiam, vt stomachus sit vacuus a cibo, ne forte crudus rapia-tur ad venas per flebotomiam. Vnde confortetur os stomachi, & virtus cordis cum mica panis lota pluries in aqua frigida, vel infusa in succo agrestæ, vel berberis, vel granatorum: quoniam hic cibus refrigerat & a syncopi præseruat, si non est: vel ipsam abbreviat & alleuiat, si est. Demum quiescat, & dormiat super lectum suum in aëre frigido per se, vel infrigidato cum aqua rosace, vel folijs recentibus populi, vel salicis, atque vitis albæ. Et si per solam flebotomiam corpus extenuatum

Tractatus primus secundi libri

fuert, bene erit: quoniam significat feb. esse curatā: quare regatur cum succo ordei, vel auenæ, & potuiulep, & alienatione rerum calidarum, donec ad perfectā sanitatē redierit. Si vero flebotomia prædicta non suffecerit, vel quia virtus ægri ipsam fieri non permittit, vel quia pusillanimus fuit aut æger: quia febris est maligna, quod scies ex calore forti corporis & saltu atque tremore cordis, adustione linguæ, & siti intēsa: tūc da in potu aquā frigidam: sed non paucam, ne forte cito inflammetur in stomacho, & febrem augmētet, sed plurimam valde, tantam scilicet quantam æger desiderat, vel tolerare queat, donec facies liuescat, & oris labia tremant, & totum corpus infrigideat: quoniam in hac feb. non cadit timor incrudationis materiæ cum sanguis sit humor temperatus in substantia, in quo nō expectat digestio, nisi pauca, & proprie in syncho putrescente: ut dicūt Gal. & Auicē. locis supradictis. Veruntamen si acciderit incrudatio, & morbi prolongatio, atq; eius permutatio in febrem flegmaticā, ita ut & permutandum foret regimen feb. sanguinæ in regimen febr. ex flegmate cum digestionibus & euacuationibus & diætā calidā: illud tamē minus foret malum, quam ægrum subito suffocari, vel eius venas crepare: quoniā melius est aliqd malū ægris inferre, quā sinere eos in mortē cadere: ut dicit Gale. q. de ingenio sanitatis: loquēs de cura huius febris: quapropter & Ras. in diuisionibus cap. præsentī, ait, q; per huiusmodi viam incrudationis materiæ cum potu aquæ frigidæ, & post hoc cōuersiōis regiminis ad febrem flegmaticā, plurima gens est p me curata. Et licet huiusmodi potus aquæ frigidæ, similiter et flebotomia fortis supradicta corpus sanum interficerēt: huiusmodi tamē corpus alleuiant: & cōfortant: quæ admodum & ieiunium tri-duanum in febre peracuta, in potu tamē

aquæ frigidæ tres sunt conditiones attendendæ. Prima est, ut materia sit digesta, si fiat in syncho putrescente: quare nō detur in principio, sed in augmento digestiæ materia cum oxyzaccharo, si fuerit imbibita: vel cum syrupo acetoso, si fuerit grossa viscosa, præmissa tamen minoratione ei in principio cum flebotomia forti supradicta. Secunda vero, ut nō sit apostema in aliquo viscerum: quoniam eius maturationem impedit, nisi fortassis foret cholericiū purum, quod raro est. Tertia vero, ne stomachus & diafragma sint debilia per naturā, & proprie in corpore macro: quoniam fortassis ex eo spasmarētur, & accideret malitia anhelitus, & spasmus vniuersalis corporis totius, & demum suffocatio: quare necesse videtur, ut ægrum interroges, si consuetus sit in potu aquæ frigidæ tempore sanitatis, similiter & cibis frigidis acetosis regatur vsq; ad sanitatem perfectam.

Emperica. Communiter operantes nō faciunt flebotomiam vsq; syncopin, sed flebotomiā satis fortē, vel secundationes tres tribus diebus continuis a principio: Et si virtus ægri sit debilis per naturam, vel ex timore flebotomię: sicut quibusdam accidere consuevit apud omnem flebotomiā videlicet, ut syncopissent: tunc ante flebotomiā dāt aliquid ex mica panis infusa in aqua frigida, & vino pōtico, vel aceto simul mixtis: quoniā præseruat eos a syncopi, os stomachi confortando, & cordis feruorē reprimendo. Quod si adhuc flebotomiæ secundationem perhorruerint, faciūt scarificationes profundas. Primo quidem in pulpis crurum. Secundo in natibus: & tertio in spatulis, donec sanguis minoretur, & assidue cum flebotomia: & post frigidam aquam tribuunt in potu per se vel mixtam cum aceto. Cum huiusmodi igitur regimine flebotomiæ, & potu aquæ frigidæ, & cibis acetosis, atq; diætā tenui

regant eos vsq; ad horam status, & crissim: quod quidē tēpus in synocha inflatua est dies quarta (vt plurimū) vltima. In synocha vero putridi dies septima vel vndecima, vel ad plus decima quarta. Consuevit nāq; pluribus superuenire hora illa sudor criticus, vlt fluxus sanguinis narium materiā febris eradicās perfecte: quibusdam vero sola superuenit resolutio materiæ insensibilis paulatina, et proprie, cum antecessit euacuatio fortis supradicta: Medicina præterea lenitiua ventris, & sanguinis mundificatiua est melior in hac febre ex cassia fistula, tamarinid. & māna dissolutis in aqua seruēti decoctionis prunorum siccorū: sed non fiat euacuatio cum acutis: quoniam febr. & eius causam redderēt furiosam. Medicinæ vero confortatiuæ per interius sunt trochisci de cāphora & spodio, dicti supra, & zucarum rosaciū, & violaciū, diaprunis, triasandal, diarodon abbatīs: ex quibus detur in aurora cum aqua frigida, & meridie & sero cū itur ad lectū. Medicinæ vero cōfortatiuæ per exterius sunt epithymata frigida posita super cor epar & tēpora ex aqua rosea, & aceto, vel succo solatri & semperuiug, postq̃ in eis puluis ro, sandal, antheræ, camphoræ fuerit dissolutus. Accidentia præterea febr. hanc consequētia, & proprie fortia, quæ ad se curam trahūt, sunt duo, scilicet sitis, & vigilia, de quibus diximus lib. 1.

Canones. Excusamur quandoq; a potu aquæ frigidæ, tunc scilicet cum in ea corpus non est consuetum, & est ratum laxum, non valde carnosum, & proprie cum antecesserit flebotomia fortis supradicta, quam illico cōsequitur fe, extinctio, & virtutis exoneratio. Excusamur etiam quandoq; a flebotomia plurima, cū scilicet corpus ipsam abhoruerit, & potus aquæ frigidæ sibi fuerit delectabilis consuetus. Excusamur præterea quandoq; ab vtriusq; scilicet flebo

tomia, & potu aquæ frigidæ, vt vel oīno non fiant a medico, vel parumper, tunc scilicet cum natura per se materiam eduxerit & feb. fugauerit in toto, vel in parte: quod quidem fit per aliquam quatuor regionum, quæ sunt fluxus san. narium, fluxus plurimus ventris sanguineus, mictus san. copiosus, & sudor vniuersalis corporis totius: de q̃ quidē sudore in hac feb. refert Gal. 5. de accidenti & morbo, similiter Aristotel. in lib. de animalibus: q̃ est visus in quibusdam corporibus, velut sanguis aquosus, & proprie in corporibus raris, quorum pori, & ora venarū sunt larga, & sang. subtilis aquosus. Dubitatio præterea difficilis cadit inter medicos de flebotomia forti supradicta in hac feb. quoniam Gal. Ras. & Auic. in præsentī capit. præcipiunt ipsam vsq; ad syncopim fieri, sed Auic. 7. colligit. fortis simis rationibus refutat: quoniam neque natura facit crissim vsq; ad syncopim, nisi symptomaticam & mortalem, quam ars imitat, cum rationabiliter processerit: neq; decet medicum virtutem naturalem deicere, sed potius cōfortare: cum sit eius custos: neque fiendus est a medico actus curatiuus, in quo plus cadit timoris & nocimenti, q̃ salutis & iuamēti. Timor namq; redundat ad ingloriationē medici: nocumentum vero ad perniciem ægrotantis. Sanguis præterea cum fuerit ex flebotomia fortiter minoratus, eradicabitur faciliter per naturam: quemadmodū accidit & in caufone, in quo quidem non eradicamus statim totam choleram a principio, sed ipsam solummodo minoramus committentes residuum operi naturæ. Similiter & in fe. de flegmate, vel de melancholia: verum cum non sit possibile rationibus necessarijs contradicere, neque credere autoritates principis medicorum omnino fore falsas, dicamus quoniam eorum discordia cadit super solo verbo. Noluit enim Gal. flebo

Tractatus primus secundi libri.

iniam supradictam fieri vsq; ad syncopim inanitionis: quæadmodum fit in crisisibus malignis: sed ad syncopim permutationis. Omnis namq; permutatio cum fortis fuerit et subita, virtutem debilitat: quoniam vt di. Hippo. 2. partic. aphorif. secundum multum & repente euacuare, aut replere &c. Quod si permutatio fuerit ad bonum ab inconuenienti ad conueniens, debilitatur quidē virtus hora breuis, sed post hoc illico fortior, atq; exonerata resurget. Si vero fuerit ad malū, quæadmodū a conuenienti ad inconueniens, debilitatur virtus hora illa, similiter & post ipsam. Volut ergo dicere Galeñ. q; debeat fieri flebotomia vsq; ad syncopim, idem vsq; ad euacuationem plurimam, ex qua corpus sanum syncopifaret propter inanitionem: illud corpus tamen syncopifaretur tantum propter subitam mutationem: & aliam solutionem diximus capitulo de syncopi.

Prognosticatio. Synocha inflatua minoris est temporis, q̄ synocha putrescēs: quoniam peccatum duplex fortius est se solo. Itē synocha inflatua (vt plurimum) terminat̄ in die quarta, vel quinta vel ad plus in septima vel ad bonum vel ad malum. Synochus vero in septima vel 11. vel ad plus in 14. si non fuerit erratum super ægro, neq; materia in crudata fuerit ex potu aquæ frigide: quoniam tunc potest durare vsq; ad 40. dies, vel plures: quæadmodum in feb. stegmaticis chronizant̄. Item si statim a principio supueniat fluxus sanguinis narium plurimus, vel sudor copiosus, vel alia euacuatio sensibilis vna vel plures simul, constante virtute, salutem significat, & crissim perfectam. Si vero sanguis niger, paucus exierit, vel si lucidus, subrilis exierit, qui restringi non potest, arterie rupturam, & crissim symptomaticam significat superfluam vel diminutam, & per consequens mortem festinam, Quod

si talia appauerint die quarta, crissim bonam vel malam significat in septima: si vero in vndecima, crissim in quartadecima promittit. Item si statim a principio virtus debilitetur, neq; remedia rationabiliter exhibita contulerint de die in diē, & vrina confundatur, & pulsus diuersificetur, & calor augmentetur, & cor tremat, neq; sitis extingatur, & lingua denigretur: mortale. Item si pustula nigra: vel liuidæ exeūt a corpore, mortale: si vero rubæ, salubre, & propriæ virtute alleuiata per ipsas, prout dicemus ca. de variolis & morbillis. Item asthma si perduauerit cum dispositione præfocatiua, & facie adusta, mortale. Item feb. sang. est a tota sua specie timorosa: quoniā est se. peracura, vel perperacura, quæq; velox atq; fortis est crisis: quapropter in eis volens prognosticare, necesse est, vt omni hora ægro assistat: ne forte propter illarum motū subitū medici iudiciū perturbet: vt di. Ra. ī almā. Itē signa prognostica cōiadi. ca. de fe. pu. in gñali p̄sentib; sublimiter suffragant̄: qm̄ scire faciūt futurā mortē vel salutē. Quod si diē certā p̄scire volueris, ad capitulū quartū tractatū de crisisibus erit recurrendū. Itē di. Auic. p̄sentica. q; si in v̄tre fuerit sonus & rugitus cōpulsatione venarū & angustia, mortale: qm̄ v̄l sanguinis ebullitionem maximā in vena kili & arteria adorti significat, transeuntibus interius super dorsum, vel apostema magnū cōfirmatum. Item inter huiusmodi feb. species acmaistica est omnium periculosior, peracmaistica securior, sed homotenus est medius ipsorū.

De febre cholERICA interpolata. Cap. VII.

Hoc genus fe. fit ex cholera rubea: putrescente in stomacho vel intestinis, seu alio loco corporis extravenas: quoniam ebullitio cholerae putrescentis obseruat periodum de tertio die.

in tertium, ita scilicet vt die vna gescat, & altera bulliat: propterea quod cholera vna qualitate preparate ad putredinem participat, quæ est caliditas: & altera prohibente putredinem, quæ est siccitas: idcirco febris tertiana nominatur. Est autem duorum modorum, qui sunt pura et non pura: pura quidem, cum eius materia est cholera rub. cui nihil aliorum humorum fuerit permixtum: Non pura, cui aliquid flegmatis, vel melancholiæ sit admixtum: quare tertiana notha id est adulterina nuncupatur. Signa tertianæ puræ sunt, quod incipit eius paroxysmus cum rigore simili puncturæ acus, & non est in ea frigus vehemens, neque pulsus valde parvus, neque concutiuntur dentes in ea, sed est frigus remissum in qualitate, & breui duratione, ita vt festinet ad augmentum: quare tunc festinat infiamatio, & magnificat pulsus, & fit velox, spissus, non diuersus valde, sed fortis, ordinatus, similiter & anhelitus: deinde apud statum fit vehemens caliditas, & sitis & angustia, ita vt quâdoque accidat alienatio, & sorda pulsatiua fortis: et sentit manus tantæ gentis calorem siccum mordicantem. Et tempus quidem augmenti, vel status excedit valde tempus principij: quoniam in ea frigus est transiens, calor vero perdurans. In declinatione vero paroxysmi eleuatur sudor plurimus subtilis vniuersalistotius corporis. Et fit quandoque vomitus rei liquidæ citrinæ subtilis vel viridis amaræ, similiter & egestio: quare minoratur pulsus, & fit rarus: & magnificatur systole, & euaporat calor putridus a centro corporis ad extrema: & sic terminatur paroxysmus: & spacium paroxysmi est ad plus duodecim horarum naturalium: verum (quod vt plurimum accidit) est, vt sit eius paroxysmus octo horarum, & affligit apud meridiem: & est vrina subtilis, citrina vehementer: & lingua nigra, adusta, & os amarum sine

causa manifesta: & si fuerit corporis habitudo, et ætas, et tempus anni cholerica: similiter & regimen antecedens, & multiplicatio caloris feb. in corporibus: vterior erit tua significatio. Signa tertianæ nothæ, sunt refectio, atque obscuritas omnium accidentium prædictorum cum elongatione paroxysmi, & proprie apud eius principium.

Methodus. Cura tertianæ puræ est, vt dicit Ras. in almâ. vt statim cum feb. cognoueris: euacues materiam solutione minoratiua cum cassiastula, mânia, tamarind. dissolutis in aqua decoctionis prunorum, et violæ. sed non in die paroxysmi: deinde digerat materiam omni die cum syrupo acetoso simplici, vel ozyzaccaro dando in aurora vncias duas cum aqua plurima frigida, vel cum aqua prædicta per tres vel quatuor paroxysmos. Et cum vrinâ videris perfecte digestam, euacuetur materia solutione eradicatiua, cum stomatico laxatiuo, vel cum electuario de succo rosæ. vel cum 3. 2. reubarbari optimi puluerisati & commixti cum solutione minoratiua prædicta. Nutriatur ex mica panis lora in aqua frigida, & post hoc imbibita in vino granatorum, vel ex pultribus ordeï vel auenæ conditis cum lacte amygdalarum dulcium, vel ex lactuca portulaca, bleta, spinarcha, cucurbita, coctis, & coctis cum aceto, aut ex carnibus laudabilibus coctis cum eisdem. Vtatur pro sapore succo granatorum, vel berberis, vel trifolij, vel acerosæ. Bibat aquam frigidam, vel aquam decoctionis prunorum siccorum aut ordeï. Confortetur hora, qua non sumit cibum cum zaccaro rosæ. vel syrupo rosæ. si venter sit obediens: vel cum zaccaro violæ. vel syrupo violato, si venter fuerit costypatus: Et leniat cum supposito rio vel clysteri: & sit totum studium tuum in extinctioe caloris cum rebus frigidis & humidis: quoniam conueniunt materiæ & dispo-

Tractatus primus secundi libri

sitioni: nisi fortassis apostema in visceribus, seu oppilatio illud prohibeat. Et voluit quidem Auic. ca. praesenti, vt statim a principio istius feb. vlcq; ad tres paroxysmos fieret flebotomia de basilica dextra: quoniam materia diminiuit, & reprimat calorem. Verum in hoc cadit timor furoris cholerae, cum extrahitur eius frenum, similiter & raptus ipsius ad interiora venarum vi vacui trahentis: quare ex se, interpollata fieret continua, quae est permutatio maligna. Quod si corpus fuerit sanguineum robustum, flebotomia non abhorremus, quoniam est conferens quodammodo in principio omnis feb. vt ostendimus de cura feb. putridae in generali, cap. de methodo. Cura tertianae notata est, vt a principio ad tres paroxysmos fiat minoratio materiae cum flebotomia basilicae, vel cum aqua medicinae praed. cui 3. i. turbith. pul. & 3. f. zinzibe. sint commixta: Deinde digeratur residuum materiae cum syrupo acetoso, & oxymelle simul mixtis, & cum aqua calida bibitis in aurora: Post septem vero paroxysmos vel nouem, et cum vrinam videris digestam, eradiceur materia cum hiera picra Gal. vel benedicta laxatiua. Alijs vero diebus, & proprie si venter sit constipatus, leniatur ante paroxysmum cum suppositorio vel clysteri: prout diximus capitulo de stypticitate ventris. Nutriat aqua decoctionis cicurum vel pisorum, vel iuribus pullorum alteratis cum petroselin. hyssopo & lactuca. Bibat vinum album debile lymphatum, vel aquam decoctionis prunorum & passularum, vel aquam decoctionis ordeï, hyssopi, & anisi. Confortetur virtus hora, qua non sumperit cibum vel medicinam cum huiusmodi mixtura. 18. diarrodon abbatis, rosatae nouellae, triasand. añ. 3. f. electuarij duobus 3. i. & sic tam in nutrientibus virtutem, quam curantibus morbum calida frigidis adiungantur, ita tamen vt a principio

ægritudinis frigida dominet. In fine vero calida: quoniam humores calidi sunt facile mobiles furiosi, frigidi vero adherentes viscosi.

Emperica. Ars faciendi syrupum digestium cholerae, & euacuatium a quacunque particula nostri corporis, hæc est. 18. ros. viol. endiuiae, lactuce, portulacae, plantaginis, trifolij, acetosae, scariolae, antherae, nenuphar. cicoreae añ. M. vna prunorum damascenorum 40. numero, seminum quatuor communium frigidorum maiorum, quae sunt cucur. cucu. melon. citruli añ. 3. f. seminum quatuor communium frigidorum minorum: vt se. endiuiae, lactuca, scariolae, portulacae, se. papaueris, vel corticis eius añ. 3. i. sandalorum alborum & tubeorum & citrinorum, caphorae, spodiij añ. 3. 2. ordeï p. i. psyllij. p. f. decoquantur omnia in lib. 8. aquae purae fontanae, postquam in ipsa fuerint infusa per noctem, & in 3. i. acetum, donec tertia pars fuerit consumpta: tunc coletur, & cum infrigidatum fuerit, & clarificatum, addatur libra f. vini granatorum, vel berberis, & reducatur ad ignem, & syrupus fiet cum lib. duabus zuccari, & aromatizetur cum cinamomo, ligno aloes, calamo aroma. folijs cardamomi añ. 3. 2. teredo omnia grosso modo, & ligando in panno lineo mundo, raro & suspendendo in syrupo apud decoctionem secundam. Dentur ex eo omni die 3. 4. per se in aurora, si fuerit subtilis aquosus, vel cum 3. duabus aequae calidae, si fuerit spissus, & bene decoctus apud syrupificationem. Et si vis, vt a proprietate caput respiciat: adde herbis praedictis flores chamomillae, meliloti, sticad. ex speciebus nuces muscatas & cubebas. Si vero ad pectus, pulmonem & cor, adde capill. vene. enulam campanae, ordeum, foenum graecum: ex speciebus, liquiritia, passulas & iuiabas. Si vero stomachum & intestina, adde herbis praedictis cotonea, pira, mala maciana: ex speciebus masticam, & grana granatorum, &

omnia styptica, quæ virtutem syrupi retineant in loco. Si vero epar & melerai-cas, adde culcutam, epaticam, ameos, amomum, & multiplica endiuia: ex speciebus spicam nardi, & multiplica sandalos. Si ad splenem, adde ciperi, capparis, et aliquid scolopēdriæ vel tamarisci. Si ad matricem, adde pulegium, calamē tum: ex speciebus grana iuniperi: sub modica tamen quātitate: quoniam raro est, vt in splene, vel matrice cholera domine tur. Si vero ad renes & vesicam: adde ex seminibus diureticis. Si ad medullas ossium et iuncturas: adde poliū montanū, artemisiā, fumū terræ in decoctione prima: ex speciebus se. calida cōmunia in decoctione secūda: & si laxatiuum facere volueris, adde in decoctione prima cassiæ fistulæ, tamarind. añ. 3. iij. & in decoctione secunda reubarbari. 3. 2. diagridij 3. 6. terēdo & ligando in panno lineo, & suspendendo in syropo, donec ipsorum virtus transeat in syropum: & tunc detur de eo sicut prius: quia facit leniter ascellare bis vel ter quaq; die. Iste nāq; syropus est se-re continens omnia digerētia choleram, vel euacuantia cum ipsorum directiuis. Artem autem facienda syrupum digesti uum & euacuatium cholæræ & stigmatis simul, describemus de se. compositis. Dicunt quidā experti, qd hoc emplastrū super epar in die paroxysmi remouet, vlt mitigat paroxysmum feb. tertianæ. qm cholæræ putrefactionē refrenat. Ite. sandal. alb. & rub. añ. 3. 2. farinæ ordeï. 3. iij. aloes. 3. 2. cōfice cū succo solatri et absynthij & modico aceti. Alij vero dicunt, qd mica panis lota in aqua frigida pluries, deinde expressa, & imbibita in vino granatorum, vel berberis, vel aceto, & ante paroxysmum comesta per vnam horā, vlt etiā apud paroxysmū, cū aduultu sit vehemens, idem operat. Vniuersaliter nāq; frigida & sicca prohibēt putredinē, quē admodū calida & humida causāt ipsā.

Canones. Scripsimus superius cān. necessarios in cura feb. tertianæ cuiuscunq; dirigentes medicum in administratione debita cibi vel medicinæ. ca. de cura feb. in generali: Attamen illis dictis generaliter vidētur duo specialia præsentī capitulo apponenda. Quorum primum est de hora cibationis in hac fe. Vbi sciēdum prout colligitur ex mente autorum, & proprie Auic. Cibus debet offerri ante paroxysmum regulariter 2. horis vel quatuor ad plus, prout agri virtus digerens, vel cibi quantitas, & qualitas postulauerint. Dico autem regulariter: qm est, cum in principio paroxysmi cibus cōpetit, tunc scilicet cum vomitum intēdimus prouocare: est etiam, cum in medio paroxysmi, tūc scilicet cum virtutem ex inanitione seu morfu cholæræ defectam volumus cōfortare. Inter hos cibos cadit differentia secundum substantiā & quantitātē: quoniam primus oportet, vt sit exoleribus, vel leguminibus plurimus atq; vndosus: secūsus vero ex mica panis infusa in aq; frigida, vel vino granatorū in quātitate valde parua. Et numerus quidē cibationū regulariū inter paroxysmū et poxysmū est, vt ter vlt quater reficiātur. Verbi grā: Si virtus sit debilis, & cōsuetudo crapulosa, & materia feb. plurima vlt non pura, oportet vt quatuor vicibus cibus offeratur: primo quidē 3. horis post definitiā paroxysmi: deinde vero transactis decem horis, dabitur secūsus: dein de iterum 10. trāfactis, tertius: deinde iterum 10. trāfactis, dabitur quartus, tribus ante principium paroxysmi: cum principium paroxysmi sit 12. horarū ad plus. Tempus vero quietis 36. horarum, licet (vt plurimum) tēpus paroxysmi apud communiter febrientes hac feb. 8. horarū reperiaf. Et tūc inter cibationē et cibationē cadere pōt spaciū 11. horarū. Et ex hoc exēplo distinguere potes horas trium cibationū: veruntamē siue ter, siue quater

Tractatus primus secundi libri.

cibus fuerit offerendus, hoc diligenter obseruandum, vt cibus multum elongetur a principio paroxysmi: quoniam est res conferens in cura feb. proportionalis. De clinationi vero si vicinari oporteat, non erit adeo verendum: quoniā vt ait Hip. primo regi. acutorum. Ilico post paroxysmum cibus dari potest cum calor fe. ad calcaneum declinauerit: & hoc quidem est, cum hora declinationis nōdum bene trāsiuit. Secundum est speciale addendū de hora euacuationis in hac fe. quod est, vt nō deē medicina laxatiua in die paroxysmi, sed quietis: ne forte motus periodī impediāt motum medicinæ, & ne virtus duplici labore fatigetur. Et vrile consilium videtur, vt non fiat euacuatio cū myrobalanis: quoniam soluendo ventrē inducunt stypticitatē, similiter & sodā, q̄ sunt accidentia maligna in quacūq; feb.

Prognosticatio. Fe. tertiana vero nō durat vltra septē paroxysmos, imo (vt plurimum) infra terminat, prout cholera sit plurima, vlt̄ pauca: sed tertiana non pura potest per duos vel tres menses durare. Ex quo scire potes, q̄ materiæ viscositas peramplius fe. elōgat, q̄ ipsius multitudo quantumcūque. Vnde Hippocra. 4. particula aphorismorum: Tertiana vero si non iudicatur septem periodis, longissima est. Item in omni feb. tertiana, similiter & in omni feb. interpollata, si aduentus paroxysmorum anticipet a principio, breuitatē agitudinis significat: si vero retardet, præcedenti euacuatione sensibili, declinationem præsentem significat: si vero æqualiter stet, longitudinem protendit. Vnde 4. particu. apho. Quibuscūq; exacerbationes fiunt, si qua hora feb. dimiserit, in crastinum eadem hora accipiat, discretæ erit. Itē feb. tertiana pura, est ex tota sua specie salubris, non pura vero timorosa. Morbi namq; prolixitas, & medicinæ diuersitas virtutem naturālē prosternt,

Item in feb. tertiana pura, primus paroxysmus est principium, quare fit facilis: secundus aut tertius augmentum, quare fit fortior: quartus vero & quintus est status, quare fiunt in vltimo furoris & malitiæ: sed sextus & septimus declinatio, quare minorabuntur omnia accidentia gradatim: quæ si medicus a principio huius feb. prædixerit, sapiēs apparebit. Itē feb. tertiana non pura (vt plurimum) cum elongatur: conuertitur in quotidianam, & fortassis ad hecticam & mortē.

De febre cholericā continua & caufone. Cap. VIII.

Fit hæc feb. ex cholera rub. putrescente intra venas & arterias atq; vasa conclusa: quapropter est de genere feb. cōtinuarum acutarum, quemadmodum & feb. de sanguine. Est autem duorum modorum: quoniam aut cholera putrefit in venis distantibus a corde, vtpote quæ sunt in ambitu corporis totius: tūc tertiana cōtinuā nūcupatur, & absolute acuta iudicā. Aut cholera putrefit in venis propinquis cordi, vtpote, quæ sunt in pectore & pulmone, epate & splene, & ore stomachi: & tunc caufon vel caufonides appellatur, & peracuta & perperacuta iudicatur. Et dixerūt proveci in medicina, q̄ vtracq; istarum fieri potest ex flegmate falso puro, vel cholera permixto: quoniam flegma non fit falsum, nisi per aduersionem plurimam, & commixtionē cholera rub. multæ. Signa tertianæ continuæ sunt omnia signa tertianæ interpollatæ, cui extat proportionabilis: præter q̄ in ea non accidit horripilatio, neq; rigor, neq; sudor, nisi cum sit crisi. calor autem, & alienatio, & sitis, & vigiliæ, & linguæ nigredo, similiter & omnia signa alia sunt in ea vehemētiora. Signa caufonis, sunt signa eadem, cum fuerit in vltimo febre mentis malignitatis, & pulsus spissus, velox, diuersus, inordinatus.

tus: similiter & anhelitus, & vrina subtilis citrina vehemēter, vel rufa vel liuida, radiofa. Et ista quidem feb. sunt in omnibus accidentibus (vt plurimum) similes feb. de sanguine: quoniam sang. & cholea sunt humores calefacientes: verum differunt: quoniam synocha non excrescit aliqua dierum periodice, cum sit feb. non proportionata ad aliquam februm putridarum interpollata. Feb. vero cholea fit periodice fortior de tertio die in tertium: quē admodum & tertia interpollata, & non sunt cū ea rubedo faciei supflua, neq; corporis repletio plurima extensua cum dispositione præocatiua assidua, velut in sanguinea. Quod si tempus anni, ætas, & cōplexio, atq; regimē antecēdēs cholerica fuerint, & habitudo corporis macra: venior fiet tua significatio

Methodus. Cura vtriusq; se. continua rū de cholera est, vt statim a principio minores materia cū medicina lenitiua: qualis est cassia, manna, camaria, cū in aqua decoct. prun. & viol. dissoluuntur: qm̄ leniendo ventrē, alterāt calorē. Et non detur medicina fortis: qm̄ materiam agitarēt indigestam, & frenesim induceret pnciosam. Post hoc vero per totū tempus principij & augmenti, donec status accesserit, & signa digestio nis perfectæ apparuerint in vrina, quod est apud diem quartum, vlt ad plus septimum: sit tota intentio tua tam in cibis q̄ medicinis ad infrigidandū & humectandū, & proprie in causone: cū proprie alterantia dispositionem febrilē, digerāt materiam, cū cholera digestio sit eius ingrossatio, donec redierit ad moderamen. Datur igit̄ omni die ante aurorā syrupus de prunis vel syrupus de nenupha. vel syrupus acetosus simplex vel oxyzaccarum ad potandum. cū aqua frigida in æstate, & calida in hyeme. Quod si venter fuerit obediens quaq; die plus duabus vicibus, nō erit opus medicina laxatiua, sed

extinctiua tantum, adeo vt si plurimum fluxerit, ad stypticas recurra: quas diximus ca. de fluxu vētris. Apud vero ortū solis, qd̄ est post duas horas a sumptione syrupi, tribuatur in cibo pulmentū ex farina ordei vel auenæ conditum cū aceto vel lacte papaueris albi, vel lacte amygdalarū dulciū: vlt de mica panis infusa in aqua frigida, vel vino granatorū, vel nutria ex cucurbitis, melonibus, lactucis, portulacis, malis macianis coctis, & conditis cum aceto vel succo berberis & granatorum. Bibat apud cōmissionem aquam frigidam puram, vel mixtā cum aceto, vel aquā decoctionis ordei & prunorū siccorū. In meridie vero, cū est vehementia sitis & furoris, bibat syrupū ros. vel viol. cū aqua frigida pura: vel bibat iulep aquosum. In sero aut, cū petitur somnus & quies: bibat syrupum de papauere, vel de pŷlio cū aqua frigida pura, vel cum aqua decoctionis semi. lactuce & portul. & illinianē frōs & tēpora atq; nares cum oleo de mādragora, & fricentur volæ manuum, & plantæ pedū cū sale & aceto, & fomentent crura cū aqua tepida, in qua cocta sint folia salicis & populi, vitis albæ, viol. & folia papa. cū corticibus: qm̄ hæc omnia calorem febrilem extrahunt, & somnum inducūt. Cōfortetur virtus hora, qua cibū nō sumpserit, ex zuccaro ro. vlt viol. vel triasā. & diarodō abbatis puris vlt cōmixtis. Neq; prohibeat æger ab usu fructū frigidorū humidorū, vt sunt pruna, pira, persica, & mala acetosa: quoniā alterant & confortant. In statu vero subtilietur regimē vltimate, qd̄ est nihil dare in cibo, neq; in potu, neq; in medicina: si virtus consenserit, donec superuenerit crisis, & transierit cōplete. Si igit̄ apud crīsim vomitus choleicus supuenerit: adiuuet natura cū impositiōe digiti, vel pēnæ linitæ in oleo in profundū gulæ. Si vero fluxus san. nariū: iuuetur natura cum setis porcinis missis

Tractatus primus secundi libri

in nares, & emunctiōe vehementi. Si vero sudor vniuersalis apparuerit: confor-
tur natura, si pigra vel insufficiens videa-
tur cum poru iulep feruentis: & quāto ca-
lidius potest, bibatur, & cooperiatur dili-
genter vndiq; pānis calidis mollibus: &
assint eius amici vel astantes, & pannos
calefaciant manibus tractando, & anhe-
litum illic dirigendo: & aperiantur pori
cutis cum fricatione leui facta cum pan-
nis lineis mollibus infusis in aqua & ace-
to, postq̃ in eis cocti fuerint fursures, &
flores chamomillæ, deinde expressis dili-
genter; & tepidis & toridis per longum
refricatis. Ad hoc plurimum confert etiā
ponere vesicas siccās semiplenas ex aq̃
calida circa latera patientis omniūq;:
quoniā illico facit sudare. Sternatur præ-
terea camera ex folijs ro. & vio. populi
& salicis & nenuphar. vitis albæ, & si-
milibus: Et aspergantur eius parietes ex
aqua ros. & aceto, vt aer inspiratus infri-
gidetur: quoniā illud est necessarium in
omni febre pro cordis euacuatione. Com-
pleta vero crisi perfecte, resumať virtus
ex carnibus hœdorum, pullos coctis &
conditis cum rebus frigidis sape dictis.

Emperica. Hæc igitur est cura vera se-
continua de cholera cuius-
cūq;: quoniam morbum & eius causam
euacuat, & remouet cū virtute. Verum
præter ipsam est etiā cura accedētū cōse-
quentiū vehemētiā huius fe. q̃ sunt dolor
capitis, vigilie, sitis, alienatio, icteritia,
syncope. & debilitas virtutis: de quibus
omnibus iam sufficienter dictum est lib.
primo suis proprijs capitulis. Ad confor-
tationem igitur virtutis, quæ est medica-
turæ principalis, hic reliqua referemus.
Confortatur autem virtus, non nisi per
confortationem organorum, quæ sunt ce-
rebrum, cor, epar, & testiculi, cum rebus
alterantibus eorum complexionē distē-
peratam in feb. Epithyma confortans ce-
rebrum, fit ex aquā ros. & aqua solatri,

semperuiuæ, & iulquiami, si in ea puluis
ros. & sandalorum distemperetur addito
modico aceti, & actu frigidū super ver-
ticem, vbi sunt commissuræ cranei abra-
sis prius capillis sapius cum pānis lineis
emplastretrur: similiter & super frontem,
& tempora circūquaq;: similiter & odo-
rare aquam rosaceam, in qua sandali, et
aliquid calami aromatici fuerit dissolu-
tum, confert: quoniam calorem aliterat,
materiam repercutit, frenesim prehibet,
& somnū inducit. Epithyma confortans
cor, sic fit. ℞. aquæ ros. aquæ buglossæ.
añ. 3. 4. aceti 3. f. amphora 3. f. croci 3. i.
& in isto actu frigido peria de syndone,
vel scarleto, vel serico infundatur, & su-
per pectus frequenterur. Epithyma con-
fortans epar, sic fit. ℞. aquæ ros. aquæ
endiuiæ, aquæ solatri, añ. partes duas, aq̃
absynthij partem 1. aceti acutissimi par.
f. distemperetur in eis puluis earundem re-
rum, & frequenterur super epar. Epithy-
ma confortans testiculos, sic fit. ℞. aquæ
ros. par. vnam vini puri aromatici veteris
& potētissimi partes duas, aceti par.
f. pulueris diamargariton. quar. vnius
partis, distemperetur omnia simul, & cū
pannis lineis actu frigidis emplastretrur
super testiculos viros, & mamillas mu-
lierum, frequenter reiterando, postq̃ fue-
rint exiccata. Et potest fieri etiā hora cri-
sis, si virtus videatur debilis.

Canones. Hæc febris est proprie spe-
cies eius, quæ causon dicitur:
cum sit peracuta, quæ terminatur in die
septima: vel perperacuta, quæ terminat
in die quarta: tenuissima diætā erit regu-
lāda, ita vt si terminatio sit in quarto, ni-
hil detur in cibo statim a principio vsq;
declinationem perfectā: Si vero in septi-
mo, nihil detur post diem quartū, prout
dixim⁹ capitulo de febre in generali. Ve-
runtamen huiusmodi canones Hippoc.
Rasis in diuissimib; præsentī capitulo
refutat, dicens, & nō attendas illud, quod

dicſe a ſtultis medicis: q̃ multitudo extin-
ctiōis a cibis & medicinis exhibitis tar-
dat criſim: ego iam expertus ſum ambas
vias, ſcilicet et regiminis extinctiū dicti
in methodo, & regiminis ſubſiliatiū, q̃d
dixit Hippo. & viam extinctiuam rep-
peri ſecuriore: Et qui mortui ſunt in hac
febre ſub regimine extinctiōis, ſunt mul-
to pauciores eis, qui mortui ſunt ſub regi-
mine ſubſiliatiuo: quoniam ſi nō dabun-
tur extinctiua, affabitur cerebrū, & ner-
ui, & ſtomachus, & accidet ſpaſmus, &
frenſis mortalis. Ex quibus ſcire potes
canoñ. Hippo. eſſe veros regulariter: qm̃
morbum et eius cauſam decidunt, falſos
vero accidentaliter: quoniam virtutem
proſternunt, & proprie in corporibus deli-
catiſ, aſſueris multo cibo tempore ſanita-
tis. Diſcit præterea Raſ. loco prædicto, q̃
non debet prohiberi in hac ægitudine,
quin æger bibat aquā frigidā cū vult,
& quātum vult: quoniam extinguit ve-
hementer. Quod intellige verum, ſi cor-
pus in ea fuerit cōſuetum, & delectetur,
nec ſit in viſceribus oppilatio, ſeu apoſte-
ma: quoniam licet intruder materiam et
morbum prolonget & criſim retardet,
maius tamen conſert iuuamentum: qm̃
prohibet maraſmum: de quo potu aquæ
frigida loquens Galenus 9. de inge. ſani,
ait: q̃ melius eſt aliquod malum ægris
gignere, q̃ ſinere eos in mortem cadere.
Congruit igit̃, vt potus iſte ſit plurimus
ſimul vna hora: quoniam aqua modica
facile inflammatur. In cura præterea hu-
ius feb. nō comperit ſieboromia: quoniā
educit multitudinē humorū oīm, de q̃bus
cholera refrenatur: propter q̃d ait Auic.
1. canoñ. ſeñ. 4. capitu. de ſieboromia: q̃
ſummopere cauendū eſt a duabus rebus
ex ſieboromia, ſcilicet humorum calido
rum ebullitione, & frigidorum intrudati-
one: veruntamen ſi corpus fuerit ſanguini-
um & conſuerum in ſieboromādo, &
vrina rub. obſcura videatur: competit a

principio materiā minorari cum ſieboro-
mia, nō quidem ſorti ſimul plurima, ſed
eadē die bis vel ter gradatim ſecundata:
quia conſert quantitati, ſed nō qualitati.

Prognosticatio. Feb. cōtinua ex cho-
lora moroſa eſt atq; ſu-
ſpecta de tota ſua natura: quoniam mor-
bi velocitas, & materiæ fuſcoſitas virtu-
tem deſciūt regitiuam. Item prima eius
ſpecies, quæ quidem tertiana cōtinua nō
minatur, terminatur vt plurimum in 7.
die ad mortem vel ſalutem, & proprie ſi
ſigna digeſtionis, vel indigeſtionis cū cō-
uenientia particularium cōperint die 4.
vel 5. manifeſte apparere: veruntamen ſi
prolongetur 14. non tranſit: quoniam vt
ait Hip 2. parti. apho. Acuta ægitudines
in 14. iudicanſ. Secunda ſpecies, quæ cau-
ſon dicitur, vt plurimum in 4. terminat̃,
& proprie ſi ſtatim a principio & infra
primas duas dies ſigna digeſtionis vel in-
digeſtionis in vrina cum conuenientia
particularium manifeſte cōperint ap-
parere. Item in quacunque iſtarum feb.
fluxus ſang. narium copioſus, aut vomi-
tus cholericus, aut ſudor calidus vniuer-
ſalis totius corporis, aut fluxus veneris
cholericus ſuperuenerit, ſtatim a princi-
pio, vel in aliqua die critica, quam præ-
ceſſit indicatiua, poſt ſigna digeſtionis
perfectæ, cum conſtantia virtutis, & al-
leuatione infirmi, ſalubre: contrarium
vero mortale. Item ſi remedia rationabi-
liter exhibitā itaq; die, cōtulerint, & ac-
cidentia fuerint remiſſa, ſalubre: contra-
rium mortale. Item ſi lingua nigra fuerit
& aduſta cū aſpitate multa malignior,
atq; deterior ſect feb. Si vero al. erit leui-
or: ſi vero citrina, media fiet inter utrūq;
Item ſi ſpaſmus, aut tortura ſuperuene-
rit, aut oculorum conſortiſ, mortale: qm̃
ſignificat ſpaſmum de inanitione. Vnde
Hippo. 2. parti. apho. Febrem in ſpaſmo
melius eſt fieri, q̃ ſpaſmum in feb. Item
ſi vrina rubea fuerit, vel citrina vehemē

Tractatus primus secundi libri.

ter, & in crastino alba subtilis euenerit, mortale: quoniam frenesim significat perniciosam: vnde Hip. 4. parti. apho. Quibus vrinæ lymphidæ aut albæ, malū: maxime vero si in freneticis appareat. Item si patiens statim a principio imaginatio nes habeat extraneas cum soda vel sine soda, frenesim significat assuturam: nisi cū percussus circa cerebrum, ilico succuratur. Item si extrema frigida fuerint & pectus & venter adurantur, mortale: quoniam apostema magnum in interioribus demonstrat: vnde Hip. 4. par. apho. In non deficientibus feb. si quidem quæ fuerint extra, frigent: quæ vero intus ardeat, & sitim habeant: mortale. Item si rigor supuenerit in aliqua die critica vel non critica, neque ipsam vera crisis subsequatur, mortale: quoniam materiæ multitudinē, & virtutis significat defectionē, quæ crissim attentat, quæ perficere non potest: vnde Hip. ibidē: Si rigor inciderit se, non deficiente, sã debili existente corpore: mortale. Si vero crisis fida atque cōplera subsequatur, cū sudore calido vniuersali totius corporis, atque fluxu san. copioso, salubre: quoniam virtutis expulsiuæ significat fortitudinē, & crisis bonitatē: propter quod ait ibidem: A causone habito rigore superueniente, solutio fit ægritudinis. Item si hæc feb. crissim faciat p̄ ictēritiā in die 7. 9. vel 11. vel 14. salubre: si vero ante 7. diē, mortale. Vnde Hip. ibidē. Ictēritia si superuenerit in feb. acuta añ. 7. malum. Istud tamen ampliori indiget tractatione, quā iam scriptum est li. 1. ca. de ictēritia. Item si stupor, aut alienatio, aut asthma vehemens superuenerit, aut inquietudo facendi diuersa, ante quæ signa digestionis perfectę cœperint apparere, mortale: quoniam crissim symptomaticeam significat malignam: propter quod ait Galenus tertio de crisi: quod omne signum criticum, si ante signa digestionis euenerit, malum est atque timendum.

De flegmatica interpolata Cap. IX.

Accidit hæc ex feb. flegmate putrescente extravenas, vtpote i stoma cho, intestinis & spongiositatibus membris: vix quoniam ebullitio flegmatis putrescentis redit periodice quaque die: propterea quod flegma participet vna duarum qualitatum præparatium ad putredinē: cum humiditas sit velut materia patiens magis quæ caliditas, quæ est causa efficiens. Idcirco hæc feb. quotidiana interpolata nūcupatur. Est autem duorum modorum: quæ ad modum et fe. interpolata de cho. scilicet pura & non pura. Pura quidem, cū sit ex flegmate puro, cui nihil aliorum humorum, vel alienæ qualitatis est cōmixtum: cuiusmodi est flegma dulce, vel vitreum, siue acetosum. Non pura vero, quæ sit ex flegmate, cui aliquid cholæræ vitellinæ vel melancholiæ reperitur cōmixtum: vel sit ex flegmate falso. Flegma namque non fit falsum, nisi per adustionē vel humorum adustorum commixtionē: licet prima atque propria flegmatis qualitas, sit frigiditas cum humiditate, quæ minime in flegmate falso reperitur. Signa feb. quotidianæ interpolatæ puræ sunt, quod incipit eius paroxysmus cū horripilatione veri frigoris super dorso & extremitatibus membrorum, præter quod sentiat patiens velut acutum puncturam tremorem vel rigorem vehementem, sed grauitatem solam extrema constringentem: & durat ista frigiditas tempore longo. Et fit pulsus, paruus, velox, spissus, mollis, diuersus, inordinatus: deinde cum peruenit ad augmentum, tardatur eius calefactio: neque fit vehemens, imo fortassis non calefacit, & proprie si flegma sit vitreum grossum: quare neque magnificatur pulsus vehementer apud statum. Et est tempus principij longius multo tempore status vel augmenti: quoniam est in ea caliditas transiens, frigiditas vero p̄du

rans. In declinatione autem non aduenit sudor, nisi fortasse paruus viscosus adhærens, & proprie apud principium ægritudinis, cum materia nondum est digesta, neque subtiliata: et magnificatur apud declinationem diastole cum sua quiete, & minoratur systole & eius quies: & expanditur calor ad manus & pedes: & est cum ea vomitus flegmatis, & humiditas in ore, & prostratio appetitus, & sitis paucitas: Et spacium quidem paroxysmi est 18. horarum, vel circa illud: spacium vero quietis, sex horarum: quare aduenit (ut plurimum) circa occasum solis, & durat usque ad meridiem, priusquam reliquæ perfecte resoluantur: & forte non resoluunt, donec alius redierit paroxysmus. Et accidit (ut plurimum) hæc sepueris & mulieribus & crassis laute ferulantibus, cum multiplicatione somni & quietis, & ventibus in cibo fructibus humidis, & piscibus, & lacte. Et in principio quidem huius ægritudinis est urina alba grossa spumosa: In augmento vero ruffa vel subcitrina grossa: sed cum ad statum pervenerit, fit rubea, clara, subtilis cum hypostasi alba leui æquili pluria. Verum dum hypostasis minoratur in urina, et præcessit euacuatio plurima per sudorem, vomitum, & secessum flegmaticum: tunc vera morbi declinatio indicatur. Et cum perdurauerit hæc sepe tempore longo, mollificatur ex ea corpus, & albescit facies, & citrinatur, & palpebre inferiores inflantur: velut in hypofarca. Signa sepe quotidiana non pura, sunt retractio signorum omnium prædictorum cum vergentia ad caliditatem, & sitim vehementem, & abbreviationem paroxysmi & proprie apud principium ægritudinis in universale.

Methodus. Cura sepe quotidianæ puræ est, ut statim a principio minoretur materia cum benedicta laxativa, vel medicamine de turbith, dicto capitulo de soda: dando ex eis modicum horum maioris quietis. Confortetur etiam natura quaque die ad vomitum in principio

paroxysmorum, si fuerit possibile, cum aqua tepida mixta cum sale & aceto, vel cum aqua decoctionis raphani & anethi mixtis cum eisdem, præmissa saturitate ex leguminibus & cepis & oleribus salitis, si conferens videatur: & secundum quod exiens fuerit magis grossum, vel viscosum, tribuatur ei medicinarum fortiores. Digeratur ergo materia cum syrupo acetoso composito, vel cum oxymelle squillitico, dâdo ex eis in matutinis aliquid cum aqua calida primo: deinde apud statum cum aqua decoctionis seminis feni, & radicum petroselinæ & omnium provocantium urinam: quoniam plurima pars huius materię educitur per urinam: & tunc eradicetur materia cum katartico fortis: sicut hierapicra Galeeni, & pillulæ cochlearis, & medicamen de myrobala, kebulis, & pillulæ stomacicæ, quæ omnia diximus capitulo de debilitate stomachi. Et si venter fuerit restrictus, leniatur quaque die gradatim cum supposito, vel clysteri, donec ad acuta perveniantur. Nutriatur ex carnibus hocedorum vel pullorum coctis cum petroselinæ conditis cum sinapi & melle vel melle & aceto, vel succo berberis & trifolij, faciendo ex ipsis salsamentum. Bibat vinum album clarum parumper ad aquatum: vel bibat mellicratum, si caput ex vino noceatur. Confortetur virtus hora, qua cibum non sumperit, cum electuario ducis, & diarhodon abbatis simul mixtis: vel cum zuccaro rosæ, & diagallan. simul mixtis, bibendo post illud aliquid vini prædicti. Abstineat a fructibus, oleribus, & piscibus pro posse, neque bibat aquam frigidam: quoniam materiam incurdat, & sepe, elongat, quæ per se naturaliter chronisat. Cura sepe, quotidianæ non puræ est, ut in cibis & medicinis caliditas remittatur: quare detur pro digestivo syrupus aceti simplex primo: deinde apud augmentum syrupus acetosus compositus, neque ultra oxymel

Tractatus primus secundi libri

compositum transcendatur. In cibis vero dentur pulres ex ordeo & auena conditi cum vino pōtico vel aceto. In potu vero tribuatur iulep vel melicratum aquosum: Et gargariser sapis cum aqua frigida & aceto: quoniā sitim reprimat excellenter. Medicina præterea materiam digestam eradicans melior hæc est. ℞. turbith alb. & electi atq; mūdati ʒ. i. reubarb. boni ʒ. i. zz. cinamomi añ. ʒ. f. zucar. ʒ. i. fiat ex omnibus puluis, qui sit dosi vna: & si reubarbar. habere non poteris, sumas loco eius diagridi. ʒ. f. & vniuersaliter conferunt in hoc casu omnes medicina tam digestiua q̃ solutiua, quæ dicuntur cap. de scabie & pruritu corporis.

Emperica. Ars faciendi syrupum digerentem atq; educentem flegma ex quacūq; particula corporis hæc est. ℞. pulegij. calamēti, mentæ, saluiæ, maioranæ, saturiæ, primulæ veris, balsamitæ, abrotani, rorismarini, absynthij, fumiteriæ, basiliconis, artemisiæ, origani, costi, serpylli, fileris montani: oīm vel plurium. añ. m. i. rad. quatuor communium calidorum, scilicet anisi, apiij, feniculi, petrosilij. añ. ʒ. i. zz. cinamomi, xyloaloes, xylobalb. folij indi, gariofi. añ. ʒ. ʒ. mellis despumati, lib. i. vel mellis & zuccari añ. li. f. fiat syrupus bene coctus, & clarificatus: quem admodum fiunt & alij syrupi, de quo potentur ʒ. iij. actu calidæ omni die in aurora. Et si laxariuum facere volueris, adde turbith, hermodactilorum, agariici, myrobalanorum emblicorum & kebul. añ. ʒ. i. in decoctione prima: quoniam faciet his vel ter leuiter assellare quacūq; die, donec sufficere videatur. Et si volueris, vt a proprietate caput & eius partes respiciat: adde herbis prædictis sticad, peoniam, flores chamomillæ, meliloti, chamedryos, chamæpityos, nasturcium, rutam, senecion. Ex speciebus adde nuc. musca. cubebas, carpob. anacard, thus, laudanum, atq; castoreū.

Si vero pectus & pulmonem & cor, adde hyssop. ireos, enulam campanam, ca. ve. prassium albū, ordeum, scœnūgracū, anethum. Ex speciebus adde, liquir. palfus, iuiubas, sebestē, caricas, dragagantum, penidias, dactylos pingues, amygdalas dulces, pineas, & fisticos. Si vero stomachum & intestina, adde citronia, mentam, mastice, olybanum, gallangā. Si vero epas, & venas totius corporis, adde epaticam, enduriam, squinantum, eupatorium, cuscutam, ameos, amomū, & duas spicas. Si vero splenem, adde scolopendriā, polytricum, tamariscum, adiantum, squillam, tubeam tinctorum, cyperi, capparis acor, azar, folia vel flores sambuci. Ex speciebus, adde zedairium, & baccas lauri. Si vero matricem, renes, & vesicam: adde saxifragam, milium solis, sauinam, grana iuniperi, macedonicum. Ex speciebus cantarides sine capitibus & alis: quoniam sua fortitudine vlcera renes & vesicam. Si vero ad iuncturas, adde polium mō. azar, amomum, acor, piper, & squillam, similiter acetum plurimæ acuitatis. Est namq; fere continens omnia simplicia digerentia atq; educentia flegma cuiuscūq; modorum a proprietate. Dicunt præterea excellentes in hac arte, q̃ si omni die ministratur. ʒ. f. de myrrha & thure sero cum itur ad somnum; abbreviant paroxysmum huius fe. similiter & totam feb. quoniam stomachum corroborant, putrefactionē prohibēt, & materiam flegmaticā exiccāt, & proprie post purgationes. Et ipsas iam descripsim⁹ ca. de catarrho, & alias dicemus ca. de feb. pestilentiali.

Canones. Minera putredinis in hac febre, est vt plurimum in stomacho & intestinis atq; venis mesericis, & quandoq; in concauitatibus plurimis: quare necessarium videt, vt in eius cura membra talia nullatenus negligantur. Confortentur ergo stomachus & in-

testina per intus, & exterius cum calidis
 stypticis: velut sunt olibanum & mastix,
 & trochisci de reubarbaro, et trochisci de
 eupatorio dicti capitulo de oppilatione
 epatis: si materia vicerit dispositionem:
 sed cum zuccaro ros. & trochis. de ros. et
 rosata nouella, si dispositio magis fati-
 garit. Et hos trochiscos iam scripsimus
 ca. de oppilatione splenis. Docuimus cō
 fortantia stomachum in ca. eius proprio.
 Confortentur meseraicæ cum aperienti-
 bus & exoppilantibus, quæ diximus ca.
 de oppilatione epatis & venarum. Con-
 fortatur autem pulmo cum exiccātibus
 catarrhum, quæ diximus ca. de catarrho.
 In cura præterea huius se. non conuenit
 euacuatio cum flebotomia regulariter:
 quoniam procurat incrudationē: verun-
 tamen in casu possibilis est fieri, & pro-
 prie in principio apud minorationem: cū
 scilicet hæc febris est de flegmate non pu-
 ro, & in corpore carnosio viuido, cui⁹ ve-
 næ sunt tumidæ apparentes, & quod cō-
 fuerum est in flebotomādo. De hora etiā
 cibationis in hac se. sciendum, q̄ sicut di-
 cunt Auicen. & Isaac, conuenientior ci-
 bus est, qui datur tribus horis ad minus
 ante paroxysmum, vel sex ad plus: verū
 cum spacium quietis sit breue valde, cū
 sit, scilicet sex horarum tantum: videtur
 de mente ipsorum, vt cibus ilico post de-
 sinentiam paroxysmi extet offerendus.
 Quod si quis obijceret, quoniam sub hac
 via dabitur semel tantum cibus quacūq;
 die: quare fiet tenuis diætā in se. chronica
 quod est contrarium canonibus Hippo.
 qui in huiusmodi se: grossius iubet refice-
 re, ne virtus deficiat in via, Responden-
 dum videtur, q̄ si virtus fortis est, & ma-
 teria pauca, sufficiet talis diætā: quoniam
 etiam flegma nutrit, cum fuerit digestū
 ante putrefactionē ex eo, q̄d flegma est
 sanguis non complete digestus: neq; vir-
 tus deficiet, cum sub huiusmodi regimi-
 ne morbus acuet, Si vero sit virtus debi-

lis, vel materia multa: erit grossius diæ-
 tandum: quare conuenit, vt detur semel,
 bis, vel ter: semel in medio declinationis
 perfecte, & iterum ante principium paro-
 xysmi futuri per duas horas. Et oportet,
 vt sit cibus paruus quātitate, sed magn⁹
 virtute, qui cito & multum nutriet, & fa-
 cile digeratur: cuius modi sunt iura carni-
 um laudabilium, & oua sorbilia, & testi-
 culi gallorū nondum coeutium, & car-
 nes auium syluestriū paruarum. Et qm̄
 ad oblationem debitam cibationum in
 feb. interpollata vel continua necesse est
 quatuor tempora paroxysmi vel exacer-
 bationis cognoscere (sicut nanque diætā
 vniuersalis in se. regulariter dirigitur ad
 elongationē, & viciniam status vniuer-
 salis: ita & diætā particularis dirigitur
 quacūq; die ad statum particularem paro-
 xysmi.) Dica mus ergo eorum notitiam
 per signa distinctiua. Cum igitur vadis
 ad infirmum, & tangēdo corpus circun-
 quacūq; reperis brachia, & manus, & pe-
 des frigida, vel minus calida, ventrē ve-
 ro & pectus calidum sufficienter: scias,
 q̄ est principium paroxysmi se. interpol-
 lata, & principium exacerbationis con-
 tinuæ febris sibi proportionatæ: similiter
 & si repereris frigiditatem, vel diminutā
 caliditatem in ambitu corporis totius. Si
 vero repereris corpus æqualiter calidum
 per totum: scias, quoniam est status vel
 augmentum: cum non differant, nisi mo-
 do gradatius. Si vero manus & pedes re-
 pereris calidiores trunco corporis, decli-
 nationem certificabis: in qua calor putri-
 dus motu proprio agitatur a medico ad
 circumferentiam omni quacūq;. Est autem
 & alia ipsarū distinctio per pulsū: quo-
 niam in principio paroxysmorum pul-
 sus profundus, & fit paruus, debilis, spīs-
 sus, in quo systole & quies post ipsum est
 maior, q̄ diastole: quoniam est maior ne-
 cessitas expulsiōis sumi putridi, q̄ euen-
 tationis caloris naturalis oppressi. In au-

gmēto verò & statu magis ac magis diastole augmētāf, sed systole cōtrario modo. In declinatione fit valde manifestus, & dilatur arteria, & diastole fit maior q̄ systole: similiter & eius quies. Ex quo scire potes, q̄ magnificatio diastoles in pulsu statim a principio feb. breuitatem morbi significat: quemadmodum & subita apparitio digestionis in vrina.

Prognosticatio. Feb. interpollata de flegmate, & proprie, quæ est de flegmate puro, durat (vt pluri mū) vsq; ad quadraginta dies, & quandoq; per tres menses: quoniā est feb. chronica per naturā. Quod si apud diem. 14. vel infra terminetur, non erit ex qualitate materiæ, sed diminuta quantitate: verbi gratia, cū flebotomia a principio modica fuerit, vel euacuatio fortis plurima quaq; die apud paroxysmum cū vomitu, aut fluxu ventris, aut sudore. Et si paroxysmi statim a principio ægritudinis anticipent atq; accurrentur: breuitatem ægritudinis significant: Si vero retardentur, aut æqualiter stent, non præcedenti aliqua sensibili euacuatione copiosa, materiæ grossitudinem, & morbi longitudinem præfigurant: quare si cum his virtus fuerit defecta, & appetitus prostratus, mortem expectabis. Item si paroxysmi anticipent, est augmentum: si postponantur, & euacuatio sensibilis præcesserit copiosa, ē declinatio: Si vero æqualiter euenierint, & signa digestionis perfectæ nōdum appuerint, & accidentia malignentur, statum maxime dubitabis. Et idem intelligendum est in tertiana interpollata, similiter & in quartana. Verum & in exacerbationibus fe. continuæ proportionalium idē iudicandum. Item hæc feb. si multum perdurauerit: perducet ad feb. hecticam, dispositione vincente super materiam: sed ducet ad hydropisim, materia super dispositionem dominante: similiter & ducet ad feb. erraticas & de-

num ad quartanam. Vnde Hippocra: 3. prognost. Febribus inordinate vagantibus, quartanæ sunt futuræ. Item si patiens ex ea somnolentus fuerit omni hora, & grauitatem senserit circa caput: si beth aut stuporem prædicat futurum, nisi cum medicinis euacuātibus per inferius vehementer succurratur, & cerebrum ex rebus calidis fortiter excitetur, & confortetur, prout docuimus lib. primo.

De febre flegmatica continua quæ latica nuncupatur. Cap. X.

Hæc febris extat proportionabilis feb. flegmaticæ interpollatæ: quoniā fit ex flegmate & humoribus crudis frigidis intra venas putrescentibus: Similiter & exacerbat quaque die, & præcipue apud occasum solis: quemadmodum & feb. illa: verum quoniam modica est eius caliditas respectu feb. cōtinuarum de cholera, latica nominatur. Signa eius sunt signa feb. flegmaticæ interpollatæ, præter q̄ horripilatio non est cum ea periodice: quemadmodum nec in alijs feb. quibuscunq; continuis: sed est velut similitudo horripilationis in corpore ex sua diminuta calefactione: & nō est in ea sudor, nisi fortassis apud statum, cum sit crisis: sed est cum ea vomitus, & solutio flegmatica ante crisim, similiter & post. Hæc præterea fe. vt multum est similis feb. hecticæ, & proprie quando prolongatur: sed discernitur inter eas ex pulsu & vrina, atq; exacerbationis forma: quod est, quoniam in hac feb. pulsus est mollis, paruus, latus, & vrina alba grossa in principio, sed rufa vel liuida post augmentum, & exacerbatio fit maxime versus noctem, siue aliquid assumptum fuerit in cibo, siue non: & est cum ea cutis mollis laxa, non tensa, neq; arida: quorum omnium contrarium reperies in fe. hectica, prout descriptimus suo

loco. Verum si acciderit ipsarum complicatio, difficilis erit earum cognitio, atque curatio.

Methodus. Cura hmoi fe. est cura feb. interpollatae tã in cibis q̃ in medicinis, p̃ter q̃ magis necesse est cautelam obseruare in administratione medicinarum calidarum, & proprie si caput est debile, ṽl si æger est ex his, quibus ægritudines cerebri sunt consuetæ: ne forte materia flegmatica calore feb. & medicinæ leuigata, sursum per venas rapiatur, & faciat lethargiam: quare confortetur cerebrum statim a principio cum stypticis temperate calefacientibus: & abradantur capilli, & frequentetur humorum diuersio, atq; extractio per inferius cum suppositorijs & clysterijs acutis, si per se non assellauerit bis vel ter quaq; die. Quod si vomitus fuerit laboriosus & difficilis, ilico restringat: & hæc omnia pro posse iam diximus ca. de lethargia.

Emperica. Omnia quæ scripsimus emperica in ca. fe. flegmaticæ interpollatæ, conferentia sunt p̃senti. ca.

Canones. Oportet, vt in hac feb. multiplicetur omnia, quæ prouocant vrinã tã in cibis, & potibus, q̃ in medicinis: quoniã plurimũ materiæ flegmaticæ purgatur per vrinã quaq; die: quia minorabitur materia atq; diuertetur a cerebro & sperabitur crisis futura fida: nisi materia fortassis insensibiliter resoluitur. Nec prætermittendus est stomachus, quin confortetur cum stypticis modo calidis, modo frigidis, vt remaneat naturaliter appetitus, prout materia, vel dispositio postulat: quoniã est magis necessarium, q̃ in fe. flegmatica periodica: cum sit magis timorosa.

Prognosticatio. Hæc fe. chronica est, & perdurãs: quare nõ terminatur ante diem quadragesimum: imo vt plurimũ prolongatur vsq; ad diem sexagesimum: nisi fortassis materiæ pau-

citas, & euacuationum pluralitas morbi accurtarint: & idcirco durat eius principium vsq; ad 20. diẽ vel sibi vicinã. Item di. Ras. in diuisione, ca. p̃senti: q̃ paræ accidit, vt fiat in ea crisis cũ sudore: qm̃ vt plurimũ est vt fe. chronicæ, q̃ sunt de flegmate vel melancholia, cũ resolutione terminentur, siue fuerint periodicæ, siue continuæ: quare euacuatur in eis materia paræ post parum quaq; die cretica per fluxum ventris, aut vomitum, aut sudorem. Et vomitus & fluxus ventris vt plurimum accidunt a principio, sudor aut in fine post digestionẽ. Item in om̃i fe. chronica si virtus fuerit debilis statim a principio, vel appetitus prostratus, mortale: quoniam deficit in via. Item dicit Hip. 4. parti. apho. Quibus in dentibus limositates fiũt in febris, diuturniores & fortiores fiunt feb. quod est: quia dentium & linguæ muscositas significat materiam in stomacho plurimã viscosam. Item si in fe. vrina fuerit ampullosa vel turbida cõfusa lethargiam aut suberh minant, & proprie si æger somnolẽtus fuerit, aut frigidus circa caput: quare succurrat cũ ligationibus extremorũ, & fricationibus fortibus, & suppositorijs acutis atque clysteribus: & prohibeatur a somno, donec materia diuertatur, atq; minoreẽ. Vnde Hip. 4. par. apho. Quibuscunq; in fe. vrinae concurbatæ & cõuersæ fuerint, velut subiugaliũ, his capitis dolores aut assũt, aut aderũt, aut p̃suerũt. Itẽ si color faciei liuescat, & palpebræ tumescant futuram hydropisim significat & proprie hypochondracem: nisi cum remedijs ad hydropisim conferentibus, aut calidis aut frigidis prout feb. aut materia conseruerint, ilico succurratur. Item si facies citrineretur, & oculi concaueretur & cutis tendatur velut coriũ arefactũ, fe. hecticã significat accessisse. Omnis namq; fe. chronica cũ perduratur, adducit hecticã: si dispositio vicerit materiã, aut hydropisim: si super dispositi-

Tractatus primus secundi libri

tionem materia dominetur. Item hæc se, si complicitur cum hectica, morale: quoniam fiet opus curis contrariis, quibus virtus fatigatur. Febri namque flegmatica copetit calefactio atque euacuatio, febri vero hectica in frigidatio cum humectatione.

¶ De febribus epiala, liparia, & horripilatione, cui caliditas non succedit. Cap. XI

Iste tres passionis fiunt ex eadem causa: quoniam ex flegmate gipseo, grosso, viscoso, adhærente stomacho & intestinis & venis melaericis: quare fiunt huiusmodi feb. interpollatae. Neque potest hæc materia generari in epate & venis: quoniam ut ait Gal. primo de complexionibus. Vita non sustinet in membris principalibus tantam frigiditatem: & hæc quidem materia cum non putrescit: causat colicam malignam: ut de seipso testatur Gal. loco supradicto. Verum differunt quodammodo: quoniam ut ait Auic. quarto ca. secundum. primo ca. de cura feb. istarum. Feb. liparia dicitur, in qua partes exteriores corporis frigescunt, venter vero & petus exardescunt: quoniam in ea flegma grossum, dum putrescit: efficit velut carbonem ignitum in visceribus, a quo dum fumus putridi eleuantur ad extrema corporis circunquaque musculos grauant sua quantitate: deinde cum in loco steterint, & calor putredinalis exhalarit debiliter insertus, in frigidant sua qualitate: velut apparet in vaporibus aquæ ebullientis: & ad id operatur plurimum oppressio caloris naturalis, atque eius reuocatio ad corporis interiora: quoniam ex his in frigidantur exteriora, depauperantur spiritu & calore. Feb. vero epiala dicitur, in qua modo contrariæ partes extremae calescunt, interiora vero frigescunt: quoniam in ea calor putridus debilis a principio non obtinet super flegma grossum, sed solummodo super partes ligidas & subriles: quare

sumantes ad extrema calefaciunt ea vehementer, partibus grossis viscera in frigidantibus: velut glacies dura congelata: quoniam materia licet fuerit ante paroxysmum frigida: tamen cum mouetur aut agitata ad putredinem magis ex ea corpus in frigidatur. Horripilatio vero dicitur, cum corpus sentit frigiditatem cum grauitate quadam membra constringente: quare ex ea horror fit cutis, & pori coartantur, donec pili, qui stant in eis rigere videantur. Verum differunt horripilatio, rigor, tremor atque typus: quoniam & si quodlibet eorum significet dispositionem corporis frigidam in se, tamen aliter & aliter illud accidit: ut ait Auic. 4. canon. secundum. 1. ca. de differentia ipsorum. Dicitur namque horror siue horripilatio, cum talis frigiditas aduenit sine punctura: quoniam accedit ex materia grossa frigida flegmatica currente super musculos, qui sunt in ambitu totius corporis: quemadmodum contingit in feb. flegmatica. Rigor vero dicitur, cum aduenit frigiditas, velut cum acum punctura: quoniam accedit ex materia chole. subtili musculos stimulante: quemadmodum contingit in feb. choler. Tremor autem esse dicitur, cum ad tantam malitiam processerit frigiditas, ut medullas ossium conterat, neque corpus continere se possit, quin moueatur omnia sua membra, & labia oris, atque dentes concutiantur: quoniam fit ex materia frigida grossa melancholica: velut apparet in quarrana. Typus vero dicitur dispositio quadam levis frigida cum halationibus & oscitationibus diuersis: velut accedit in declinationibus feb. apud materiam paucam: similiter & in earum principijs cum materia nondum fuerit complete ad putredinem agitata. Signa prædictarum feb. sunt signa feb. flegmaticæ putæ interpollatæ cum additione signorum prædictorum apud principium paroxysmorum, cum redierit periodice quaque die, & pro-

prie post occasum solis, qui est hora diei flegmatici deputata.

Methodus. Cura istarū omnium vna est atq; eadē, quod est, vt tā in cibis et potibus q̄ in medicinis xger regatur velut est in feb. flegmatica pura interpollata: sed necesse est, vt in eis calidas magis augmenteitur, & virtus medicinarum soluentium vltimetur, & regi men subtilietur: quapropter perueniendū videtur in digerentibus ad oxymel squiliticum: In medicinis vero solutibus ad pillulas hermodi, maiorum, et ad pillulas de opoponace, et ad pillulas de colloquin tida: quas oēs diximus ca. de arthetica.

Prognosticatio. Hæ sunt fe, maxime chronisantes: quoniā grossificies & viscositas, similiter & frigiditas prohibent materiæ consumptionē: quare non terminatur ante diem 40. vel 60. nisi materia fortassis fuerit modica a principio, & virtus expulsiva fortis cum euacuatione sensibili plurima diuersa per vomitum, urinam & cecessum. Neque oportet vt expectet in eis sudor, nisi fortassis tardus, paucus, frigidus, viscosus, cum quo crisis nō completur. Item si virtus fuerit debilis a principio, aut plurimum deficiat in processu, & appetitus prosteratur, mortale: quoniam deficiet ante cūsum, & resolutionem completā. Item hæ fe, cum perdurauerint tempore longo, perducū ad hydropisim, materia vincente: aut ad hecticam & marasimū, calore putrido dominante. Item ex huiusmodi febribus feb. erraticæ procedere consueuerunt: quoniā pars materiæ subtilior prius inflammabitur, & faciet paroxysmum, quo desinente vel in medio existente, pars grossa putrescit, & alium faciet succedere paroxysmum, & putabitur, q̄ sunt duæ fe. cum nō sint: & hoc potest accidere in fe. quartana vel tertiana nō pura, cū materia fuerit heterogenea, seu commixta.

De febre melancholica interpollata, quæ dicitur quartana.

Cap. XII.

Causatur hæc feb. ex melancholia putrescente in aliquo loco corporis extra venas, velut in stomacho & intestinis et cauernositate splenis, atq; ossium medullarum: verum quoniā ebullitio melancholiæ putrescētis tardum habet reditū, scilicet de quarto die in quartum inclusive, propterea q̄ humor melancholicus tam ex modo substantiæ, q̄ ex sua qualitate causis putredinis repugnat. Idcirco fe. hæc quartana tunc capatur. Est autem duorum modorum: quæ ad modum & febr. interpollatæ, quæ sunt quartana vera & non vera. Vera dicitur, cum humor feb. efficiens est melancholia simplex naturalis, cui nihil, aut paræ accedit ex admixtione aliorum humorum, et quæ neq; per aquisitionem, neq; per conglutinationem plurimam perdidit propriam naturam: & hæc est melancholia, quæ est sicut fex massæ sanguineæ: quemadmodum in oleo sit amurca. Non vera autē dicitur, quæ sit ex melancholia non naturali vehemēter ingrossata per adustionē, vel cōgelationē, vel humorū valde grossæ admixtionē: cuiusmodi sunt flegma vitreum, aut gipseum in intestinis frigidis generatum. Et licet huiusmodi feb. distinctum nomē obtineat ex periodis, nō tamen distinguī potest a feb. quartana per naturam rei: quoniā humores principali ter distincti in massa sanguinea nrī corporis, non sunt nisi quatuor, qui sunt flegma, cho. sanguis purus, & melancholia: quare sub eodem ca. sunt reponendæ. Singna quartanæ veræ sunt, quoniam incipit eius paroxysmus cum horripilatione difficili, vehementi, cui succedit tremor corporis torius, & dentium concussio quærens profunditatem ossium & medullarum, & proprie post tres vel quatuor pa

Tractatus primus secundi libri.

roxyſmos, & nō ſentit patiēs velut acū puncturam ſed laſſitudinem & grauitatem plurimam, quaſi ſit inſrigidatus in niue, aut cæſus fuſtibus, aut in carne lace- ratus: & ſit pulſus hora illa valde par- uus ita q̃ licet in principio paroxyſmi cuiuſcunq; feb. pulſus minoretur, non ta- men ſicut in hac minoratur, adeo vt per ſolum pulſum cognoscere poſſes hanc febr. ſi pulſum ægri conſuetum nouiſſes apud ſanitatē. Deinde cum caleſcit, & venit ad augmentum, ſit vehens eiꝯ caliditas, adeo vt in ſtatu iuxta calidita- tem ſynochæ & tertianæ, & cauſonis, parum differat ab ea, & vltra calidita- tem feb. ſlegmaticæ qualiſcunq; ſed eſt eiꝯ ſiccitas, ſicut ſiccitas tertianæ, & eiꝯ vrina aquoſa in principio, & pro- prie ſi ſit in principio oppilatio: poſt hoc ſit ruſa groſſa, cum materia digeritur, & calor inſigitur in rem durā, velut in car- bonem: & quandoq; ſit nigra, rubea, ob ſcura. Et illud quod errare nō facit in hac febr. eſt, vt dicit Auerro. quarto colliget. quoniā redit periodice de quarto in quar- tum incluſiue, & proprie apud octauam horam diei: quod natura alia feb. facere poteſt, neq; ſimplex, neq; compoſita. Si- gna quartanæ non veræ ſunt, oīa ſigna prædicta, præter quod tardatur eiꝯ peri- odus: quoniam redit de quinto in quin- tum, aut de ſexto in ſextum, aut ampli- us propter groſſitiem vel frigiditatem vltimā: quare tales feb. non ſunt quar- tanæ, ſed quintanæ, & ſextanæ nomi- nantur. Et dicit Raſ. in diuiſionibus: O- quam parum euenit feb. cuiꝯ paroxy- ſmus pertranſit quartum diem. Verum ego iā vidi multoties paroxyſmos per- tranſeuntes.

Methodus. Cura quartanæ veræ eſt, ſi vrina ſit rubea groſſa in principio, & habitudo corporis ſanguinea: minoretur ſtatim a principio mate-

ria (ſed non in die paroxyſmi) cum fle- botomia baſilicæ ſiniſtræ primo, deinde cum flebotomia ſaphenæ ſiniſtræ: & fiat incifo venæ larga, vt ſanguis groſſus ex- trahatur. Ad quod conſert plurimum, vt æger ſedeat in balneo aquæ dulcis tepide ante flebotomiam, vel in aqua decoctio- nis maluarum, maluauiſci, ordeī depila- ti, & ſœnigraci: quoniam tunc melan- cholia ſanguinea, id eſt ex ſanguine adu- ſto, vel congelato genita iudicabitur eſſe cauſa antecedens huiꝯ feb. quæ proprie cum flebotomia ſeparatur. Si ergo nigrū groſſum fuerit, quod egreditur, plurimū ex ipſo extrahatur, aut ſimul, aut apud ſecundationem factam aliquoties vlcq; ad ſeptem aut nouem paroxyſmos. Si vero ſubtile, clarum fuerit, illico reſtrin- gatur. Si autem vrina fuerit a principio ſubtilis, aquoſa, habitudo corporis ma- cra melancholica aut ſqualida ſlegma- tica, non fiat flebotomia, ſed euacuatio cum medicina lenitiua: vt eſt apozima de myrobalanis indis, & apozima de el- leboro nigro: quæ diximus capitulo per- turbatione ſenſuum: vel cum apozima- te de polypod. quod R̄. polypo. vnciam vnam myrobalanorum indorum vnciā vñā & ſ. ſenæ, epithymi. añ. drachmas duas, roſ. rub. ſcolopendriæ. añ. vnciam ſ. piſtentur groſſo modo myrobalañ. & buliantur cum polypodio & ſcolopend. in lib. x. aquæ claræ, donec conſumantur ex aqua partes duæ: tunc addantur ſenæ, epithymum, atq; roſæ: & iterū aliquan- tulum ſuper carbonē leuiter excoquan- tur: quoniam perderet virtutem in deco- ctione forti: tunc ſcricentur res manibus vehementer, & exprimatur earum vir- tus, & aqua coletur cum vnc. dua. ſyrupi roſ. vel viol. aut cum aqua decoctionis prunorum & zuccari: & detur totum an- te diem: Deinde digeratur reſiduum ma- teriæ cum oxymelle compoſito, aut ſquil- litico, aut cum ſyrupo acetoso, dando ex

eis omni die in aurora cum aqua decoctionis cypeti, capparum cum zuccaro dulcorata: & akernetur prædicta purgatio omni septimana semel post huiusmodi maturationem, ita ut balneum aquæ dulcis tepidæ omni die frequentetur, præterquam in die paroxysmi: quoniam est vehementer confers in digerendo materias grossas cum sua humectatione & subtilisatione mensurata. Et si materia fuerit adusta, quod scies ex rubore urinae & febre, caliditate apud paroxysmum, sint omnes medicinae liquores, ita ut in eis humiditas super calefactionem domineatur: quare sufficit syrupus acerolus in digerendo, & aqua casei, in qua infusum sit epithymum per noctem in soluendo. Si vero materia non fuerit adusta, quod scies ex albedine urinae & febre remissa caliditate apud statum paroxysmi, oportet ut sint omnes ipsarum medicinarum fortiores, ita ut in eis caliditas cum humiditate aequaliter dominetur: quare requiruntur oxymel in digerendo, & myrobala, & senæ, atque polypod. in acutandis donec gradatim ad lapidem lazuli & elleborum nigrum perueniamus, & proprie apud statum ægritudinis, cum materia perfecte fuerit digesta. Tunc namque conuenit ipsam eradicare cum medicinis fortibus: ut sunt pillule de lap. armeno, & pillule de elleboro nigro, quas diximus capitulo de melancholia. Et medicinarum communes vsitates conferentes in hoc, sunt hieralogopion, hierarussil, diaphana, cartaticum imperiale. Hac igitur methodo reguletur patiens, ita ut solutio iteretur post digestionem, et digestio post solutionem, licet non videas in eis magnum profectum statim a principio: quoniam est morbus difficilis eradicationis: verum tamen sub hoc regimine nequaquam prolongetur, & hæc est eius cura per medicinas. Dicamus igitur consequenter de dextra. Sit omnis cibus co-

rum humidus cum caliditate temperata: sicut sunt pisces parui petrosi elixi cum petrosil. aut conditi cum zinzibere & cinamomo, aut assii super prunas: carnes hædorum, pullorum castratorum, agnorum annalium, & vitulorum lactentium coctæ cum petrosil. & sicut sunt blæta, spinarch. rapæ dulces coctæ cum carnibus eisdem: Et ex cibis ventrem leniter soluentibus, sunt aqua decoctionis caulium recentium condita cum sale & butyro: similiter & ius galli vetustissimi cocti cum aqua & sale, in quo proiectum fuerit aliquantulum polypod. quoniam in eis sunt partes acutę secessuæ, & proprie si parum ex eis ante cibum sumatur, vel e malis sapidis dulcibus post cibum. Abstineat a cibis & potibus sanguinem grossum generantibus: quoniam multiplicant melancholiam: ex quibus sunt caro ferina, caro bouina, caro porcina & hircina, & omnis res vehementer salita, panis azymus, & res frigide in sartagine, quales sunt tortellæ. Et ex oleribus sunt allia & caules, ex seminibus lentes & fabæ: nisi fortassis cum corticibus lentium intendat leuem ventris solutionem. Et ex potibus, sunt vinum rubrum album grossum, ceruisia, vel aqua frigida pura. Abstineat a coitu superfluo, & ira, & tristitia, & labore. Habitet assidue sub aëre temperato: & gaudeat solatijs, tripudijs, otio, quiete, & somno plurimo pro posse: nisi cum appropinquauerit paroxysmus: tunc non competit, ut dormiat, donec totum principium transierit, & paroxysmus peruenit ad augmentum. Hac est ergo huiusmodi feb. cura per omnes dies quietis, sicut requiritur. Sed nunc dicamus de regimine ipsius in die paroxysmi. Cum igitur accesserit tempus paroxysmi: sit venter eius omnino vacuus a fecibus atque cibis, & si non aliter, saltem cum suppositoio & clysteri: & cum su-

peruenit tremor aut horripilatione mittit
ipsum in tinnam aqua dulcis calida aut
torum aut saltem manus & pedes quoniam
am faciliabit paroxysmum, & faciet se
stinare caliditatem. Et prouoca in eo vo
mitum, si fuerit possibile, & si non aliter,
saltem cum oxy melle composito, aut sy
rupo acetoso in potu exhibito cum aqua
calida decoctionis seminis anethi aut ra
dic. raphani, premissa saturitate ex olei
bus & cepis & leguminibus & piscibus
salitis, & proptie si materia non fuerit
adusta. Quod si vomitus facilis fuerit &
consuetus, frequenteretur multoties in die
bus quietis. Cum autem frigus transierit,
& paroxysmus peruenit ad augmentum:
extrahe ipsum a balneo, & pone
ipsum super lectum mollem, & panis ca
lidis cooperi ipsum diligenter, ut calor ac
celeret ad statum: & tunc in potu tribue
aliquid ex prouocantibus sudore, & pro
prie apud statum ægritudinis, cum mate
ria perfecte fuerit digesta: qualis est po
tus aqua calida, in qua pul. cardamom.
aut garofil. cum zuccaro fuerit bullitus.
Et pone circum corpus, vndiquaque veli
cas, in quibus sit aqua decoctionis origa
ni, calamenti, & flos chamomillæ: quo
niam faciet sudare: & cū sudor fluxerit,
abstergatur gradatim cum pannis lineis
calidis: quoniam poros aperiet, & alium
faciet succedere sudorem: & sic regatur,
donec paroxysmus perfecte declinaret,
& calor naturalis ad interiora fuerit re
uocatus: tunc nutriat cibis suis dictis. Cy
ra febris quintanæ, & sextanæ eadem est
cū supradicta: sed necesse est vt in eis vir
tus medicinarum calefacientium, atque
subuliantium vltimetur.

Emperica. Scripsimus in ca. de melan
cholia. syrupum nobile ad
omnem ægritudinem ex melancholia:
quoniam est potens in digerendo, exoppil
lando, ventrem leniendo, atque splenē con
fortando: quare illuc recurramus. Dica-

mus & hic artem faciendi syropos dige
rentes atque euacuantes humorem melan
cholicum a quacūque particula nostri cor
poris, sine adultu, siue condensatum. Itē
florum borraginis & buglossæ (si tempus
fuerit) vel herba recētis añ. M. i. florum
sambuci (si tempus fuerit) vl. cortic. eius
medianæ, flor. genestæ, foliorum salicis,
corticis medianæ fraxini, scolopendriæ,
amarisci, cortic. rad. apij recētis añ. M.
fruchamedryos, chamepyteos, cuscuta
squinanti, eupatorij, hylopi añ. M. vnus
quar. par. ciperi, capparis, acori, azari,
squillæ, añ. 3. f. ameos, amomi. añ. 3. py
rethri, gentianæ, zinziberis, cinamomi,
baccarum lauri. añ. 3. 2. vini albi dulcis
clari aromatici lib. 5. mellis albi, & zuc
cart. añ. lib. 5. fiat ex omnibus syropus be
ne coctus subtilis & bene clarificatus mo
do & forma, quibus sunt alij syropi: de
quo potetur omni die in aurora aliquid
per se, vel cum aqua calida. Et si laxati
uum facere volueris, addethymi, epity
mi. 3. 4. fenē. 3. 2. polypodij, agarici, her
modactyl. añ. 3. 1. elulæ. 3. 5. in decoctio
ne prima: & da ex coctis prius, quoniam
faciet refectiones liuidas vel plūbeas his
vel ter quaque die leuiter assellare. Et si vo
lueris, vt a proprietate membrum aliqd
respiciat: adde ex directiuis, quæ dixim
us de febre. flagmatica interpollata. Et
nancq; ferex continens omnia simplicia di
goremia, & euacuata melancholicos hu
mores: ætiam quoniam melancholia ma
xime dōminetur in splene, conueniens vi
detur, vt medicinæ dirigentes ad splenē,
multiplicetur in syrupo. Disce præterea
expertisq; sitia a grana myrthe subtiliter
contendantur, & cum 5. duabus vini albi
sextisiamaripechtur condicue, & si que
ad tres paroxysmos, febre illico decidit,
vel abbreviant, vel alieuiant euidenter:
quod est: quoniam in myrtha ex propria
te subtiliat, prouocat, exoppilat, & putre
factionem prohibet: ad quod tria in de-

seruit sua complexio calida & sicca vehementer. Idem operatur vrina propria calida bibita omni die in ieiunio, & proprie cum in die præcedenti potauerit vinum potens. Et idem facit vinum decoctionis absynthij colatum, & cum melle aut zuccaro dulcoratum, & bibitū in ieiunio. Similiter & aqua decoctionis pyrethri & gentianæ dulcorata, sicut prius. Similiter & ista confectio. ℞. pyrethri, gentianæ, chamedrysos. añ. 3. f. mellis albilib. f. si ex ea sumplerit omni die in ieiunio. 3. f. cum. 3. 2. aque decoct. hylopi, aut cum 3. 2. aquæ rutæ: quoniam in breui tēpore rectificat melancholiam. Similiter & ista cōfectio. ℞. assæ fe. foliorum rutæ, siccæ, piperis lon. añ. 3. 2. cōfice cum melle, & da patienti ante accessionem per 2. horas ad modum castaneæ.

Canones. In cura istius feb. oportet, vt cum cautela procedat, ram in cibis q̄ in medicinis, plus q̄ in febribus al. chronicis propter difficultatē suæ eradicationis. De modo igitur cibationis, est sciendum, prout docet Auicē. 4. canoñ. vbi loquitur de hac febre: q̄ oportet, vt ipse ieiunet in die paroxysmi: quod sic videtur intelligēdum, vt si venturus sit paroxysmus in die, tunc prandiū dimittat, neq̄ cœnet, donec declinatio trāsierit cōplete: Si vero feb. sit ventura de nocte, tunc omittat cœnam, neq̄ prandeat, donec paroxysmus pfecte declinarit, quantumcūq̄ fuerit prolongatus: & sic per diem paroxysmi intelligimus duodecim horas ante paroxysmum. Nam si 24. horas vellemus intelligere, cōtingeret agrū duobus diebus assidue ieiunare: cum paroxysmus veræ quartanæ. 24. horas occurrat naturales, quod absurdum videret: verum communiter operantes cibum offerunt 6. horis ad minus ante paroxysmū: sed oportet, vt talis cib⁹ sit paruus quantitate, & magnus virtutē, qui cito digeratur, & corpus multum nutriet, & virtutem

conseruet, quod est necessarium in omni feb. chronizante: sicut sunt iura carnijum laudabiliū, & caro auiū paruarū, & pisces recentes petrosi assi vel elixi, nisi forassis vomitum intenderet: quoniā tūc cibum ex oleribus in principio paroxysmi sub multa quātitate donaret. Post declinationem vero paroxysmi similiter & diebus quartis nutria ē ex cibis grossis supradictis. De qualitate ciborū aduertendum, q̄ oportet, vt omnium eorum cibis sit fortis in humectando, sed temperatus in calefaciendo, & proprie si melā choliam fuerit adusta. Vehementer namq̄ calida sanguinem adurūt, velut allium, sinap. & piper. quando assumuntur vsu non moderato. Vehementer autem frigida san. condensant, velut lactu. portula. Sicca vero comprimunt, vt assaturæ & tortellæ: ex quibus omnibus humor melancholicus augmenatur. De medicinis præterea sciēdum, q̄ neq̄ digestiua, neq̄ solutiua, neq̄ vrinæ prouocatiua fortia sunt a principio agnitrudinis offerēda, ne educatur subtile, & remaneat grossum lapidificatum: quare gradatim erit a leuioribus ad fortiora transeundum, donec hora status apparuerit, in qua virtus oīs rei vltimari poterit: quapropter ait Auic. q̄ a principio dādus sit syrupus acetosus simplex, sed compositus in processu. Sciēdum etiam q̄ medicinæ curantes hāc feb. oportet, vt sint calidæ subtiliatiuæ penetratiuæ cum virtute: verum si materia adusta fuerit, cōuenit vt earum caliditas refragantur, nō tamen omnimode postponatur: quoniam licet repugnet dispositioni materiæ secundum qualitatem, cōfert tamen secundum modum substantiæ, cum sit grossa cinerosa: propter quod ait Auicē. in hoc casu danda pūsana cum pipere: q̄a natura sagax vteret pūsana contra dispositionem feb. et materiæ, sed pipere cōtra grossiorem humorum. Cum autem splen sit receptaculum proprium

Tractatus primus secundi libri.

melancholiæ, necessarium erit, vt eius cōfortatio non postponatur in hac fe. quare rectificetur prout docuimus ca. de debilitate splenis: vt massam sang. mundi ficiet, & melācholiā ad se trahat. Item licet omnis melācholia sit frigida & sicca per naturam propriam: magis tamen sollicitudum tam in cibis q̄ in medicinis ad remouendū siccitatē q̄ frigiditatē: qm̄ tempus humectandi longius est valde tēpore calefaciendi, vel infrigidandi, vel exiccandi: vt ait Gal. 7. de ingeni. sanitatis: quapropter oīa q̄ dicuntur infra cap. de impinguatione corporis macri, præsentī cap. sublimiter suffragantur.

Prognosticatio. Dicit Ras. in diuissio nibus, q̄ feb. quartana raro fit per se incipiendo, vt plurimū vero ad fe. alias chronicas consequendo: quoniam ex huiusmodi feb. melancholicis humor multiplicatur in corpore propter incinerationem humorum ex febri li calore, qui post q̄ humores subtilis accenderit, & consumpserit, etiam grossos inflāmabit. Cum aut̄ fit consequendo, fit post fe. quotidianā et tertianā nō puram, & proprie cum earum periodus cœperit oberrare: quoniā vt ait Hip. 3. prognost. fe. inordinate vagantibus quartanę sunt futurę. Cum aut̄ fit per se, accidit plurimum in autūno & hyeme: qm̄ hoc tēpore cholera nigra dñatur ex incensione calōr. aëris post ætatē præteritā, & vnione caloris naturalis in visceribus animalū apud hyemē præsentē. Item hæc fe. accidit (vt plurimum) in senibus, aut melancholicis per naturam: veruntamen cū sit in iuuenibus, antecessit regimen ex potu & cibo melancholico, & labor & vigilia & sollicitudo plurimā perdurās. Item hæc fe. ex tota sua specie chronica est valde, ita vt annum integrum obtineat per naturā: Verum si patiens erret in regimine, poterit (vt Auicenna testatur) annis 12. perdurare, nisi fortassis virtus deficiat

& morbus ad mortem accurtes. Quod si feb. huiusmodi contingat prius terminari, non accidet hoc, nisi quia materia fuit pauca statim a principio, vel virtus expulsiua fortis, & euacuatio sensibilis plurima apud paroxysmum cum vomitu & fluxu ventris, & sudore: quoniam vt ait Galenus tertio de creticis diebus: quemadmodum acutę agitudines motum lunę sequitur, ita chronicę motum solis. Item hæc fe. facilius terminatur vere & æstate, quā hyeme vel autumnō: quare si continuetur vsque ad hyemem, consuevit vsq̄ ad veris principium aut æstatem subsequenter durare. Vnde Hipocrates secunda particula aphorismorum: Estiux quartanę vt multū breues sunt, autumnales vero longę, maxime si ad hyemem coniungantur: quod pertractans Galenus in commento illius, dicit idem de morbis omnibus materialibus iudicandum. Citius namq̄ resoluitur materia, vel virtus in aëre calido dissolvente, q̄ frigido constringente: quare morbus citius finietur ad mortem vel salutem. Item omnes quartanarij sunt spleneticī, & per consequēs icterici ictericia nigra: quare cum rectificatione splenis succurratur. Item leprosi non valde fiunt quartanarij. Quod si feb. quartanam habuerint, & in eis multum perdurauerit, lepram curat inchoatam. Item si prolongetur hæc feb. perducit ad duritiem epatis & splenis, & deinde ad hydropsim timorosam. Itē si vrina fuerit alba, subtilis, aquosa statim a principio, & perdurauerit sub hac forma tempore longo, morbi longitudinem & materię duritiē significat: Si vero gradatim coloretur quacq̄ die cum ingrossatione substantiæ, & bonitate contentorum, morbi significat breuitatem. Item vrina nigra, aut plumbea in colore cum sedimine grosso liuido aut rubeo arenoso, post signa digestionis perfectę gradatim eueniēs qua-

que die, morbi declinationem significat, & salutem. Si vero ante signa digestionis subito euenerit talis, & modo appareat, modo delitescat, materię multitudinem, & virtutis naturalis angustiam repræsentat. Item feb. quartana (vt plurimum) est salubris ex interpositione diurnę quietis: q̃ si periculosa quandoq̃ fuerit, ex defectione virtutis hoc contingit. Item mania & melancholia si febr. quartana superuenerit, tollit ægritudinē. Item quartana quę sit de melancholia adusta vehementius affligit, & citius terminatur: quę vero de non adusta, moderatius affligit, & tardius terminatur.

¶ De febre melancholica continua Cap. XIII.

Fit hæc feb. ex humore melancholico putrescente intra venas, sed rarissimus est eius euentus, adeo vt conuenientius dicatur senium natura. Et signa eius sunt, signa feb. quartanę periodicę, præter q̃ non accidit in eius exacerbatione tremor, aut horripilatio: quemadmodum nec in alijs febribus continuis: verę exacerbatur de quarto in quartum, sicut & fe. quartana periodica, ad quā existit proportionata, sed repescit in alijs dieb.

Methodus. Cura eius est cura fe. quartanę periodicę, sed magis confert in ea euacuatio cum flebotomia q̃ in periodica: quare flebotomē in principio basilica sinistra in brachio, & post hoc saphena pedis sinistri cum cautela, quę diximus in extrahendo sanguinē grossum nō subtilem, & post hoc gradatim procedatur ad medicinas digestiuas, & deinde ad solutiuas, atq̃ vrinariuas, primo quidem leuiore, secundo fortiores: prout diximus in cura feb. quartanę interpollatę.

Prognosticatio. Non fit hæc fe. per se incipiendo, sed consequendo ad feb. continuas, & proprię acu-

tas. Item hæc fe. lentum habet calorem, vehemēter tamen profundo corporis insertum: quę admodum & hecica: quare cauendum, ne fortassis ad illam trāsmutetur: verum si non trāsmutetur ad hecicam, vt plurimum fiet salubris.

¶ De febribus compositis, & comixtis & erraticis, quę plane ticę dicuntur. Cap. XIII

Dixerunt medici, q̃ species feb. simplicium plurimę sunt valde, & proprię nō tēpore: qm̃ ex inordinato regimine atq̃ confuso generantur humores, qui putrescentes cōfusas se, inducunt: quę admodum enim humor quilibet cuilibet est possibilis cōmisceri: cū sint corpora liquida facile terminabilia termino alieno, similiter & oportet febrem quālibet cuilibet copulari: verū in quibuscūq̃ hic noscitur, in quibuscūq̃ minime, qd̃ qd̃ accidit ex prædominio alterius ipsarum super alteram excessiue: quapropter ait Auer. 4. coll. O q̃ paruus est numer⁹ morborū simpliciu a nobis repert⁹: Sed huiusmodi specierum numerus ad ternariū reduciē apud nostrū intellectū: qm̃ aut cōpositę, aut mixtę, aut erraticę nūcupant. Cōpositas vocamus, cū duo vel tres humores simplices distinctis locis putrescunt simul hora vna vel propinqua: quare duas vel tres feb. faciunt simul in tempore vno vltēpore propinquo: verbi gratia, vt tertiana continua cum flegmatica cōtinua coplicetur, aut fe. sanguinea cū flegmatica, vel quolibet cōtinua cū interpollata, seu econuerso. Et huiusmodi species famosior est hemitritæus verus, & non verus. Verus quidem componitur ex tertiana cōtinua & flegmatica interpollata, sed nō ver⁹ ecōuerso. Cōmixtas vero dicimus, cū fe. aliqua vna & eadē sit ex flegmate vel melancholia, vel alio quīs mō diuersorū humorū gñibus simp̃ in minera putredis copulatis: q̃lis fe. tertiana notha

Tractatus primus secundi libri

vel quotidiana vel quartana continua, vel interpollata, cum fuerit non pura. Erraticas autem dicimus, cum sit fe. ex humore vnicò, verum heterogeneò secundum partes suas. Verbi gratia: si sit ex flegmate grosso & subtili, aut ex melancholia similiter, aut ex cholera pura & vitellina: quare si partem subtilem contingat prius putrefieri q̃ grossam, procederēt ei⁹ periodi postponēdo: si vero grossa prius putruerint, procederēt anticipando: neq; est necessarium, vt pars subtilior semper prius putrefiat: quoniam potest pars grossior prius abijci a regimine naturæ: potest etiam calor naturalis esse minus in ea contemperatus, quare facilius euaporat. Signa feb. cōpositarum sunt, vt non confidas in cognoscenda feb. per periodum ipsius, imò secundum accidentia sibi appropriata: quandoq; enim euenit ex cōpositione duarum tertianarū paroxysmus omni die, qui est periodus feb. flegmaticæ: sed cum videris paroxysmum omni die cum accidētibus tertianæ euenire: scias, quia sunt duæ tertianæ, quarum vnus paroxysmus accedit, cū recedit alia tertiana. Et iterū aliter. Quandoq; enim accidunt in corpore simul duæ feb. interpollatæ, vna ex cholera, & alia ex flegmate, quæ faciunt paroxysmum vnus diei tardum in calefactiōe, & valde perdurantem, paroxysmum vero alterius diei calefactionis vehementis cū siti & alienatione plurima: scias, q̃ non est feb. simplex. Quandoq; etiā accidunt simul in corpore duæ fe. quarum vna est continua, & alia interpollata: vt patet in hemitritico vero et nō vero: quare postq̃ videris feb. nulla horarum omnino deficere, neq; corpus infrigidari, & cum hoc accidunt paroxysmi periodice: scias in corpore duas fore fe. vnā continuā, & aliam interpollatā. Quod si feb. cōtinua fuerit valde arsiua cum siti & oris

amaritudine, interpollata vero leuior est reditione paroxysmorū omni die & proprie apud occasum solis: scias, q̃ est hemitriticus verus: si vero fuerit ecotario, fiet hemitriticus nō verus. Veruntamen ne cadat in cognitione duarum febrium interpollatarum cōpositarum: est sciendum, q̃ paroxysmi talium feb. tribus cōponuntur modis: quoniam aut sunt concomitantes, aut subintrantes, aut subalternantes. Concomitantes dicimus, qm̃ cū incipit paroxysmus vnus, incipit similiter & alius, vel parū post, ita q̃ sit additio manifesta in frigore, rigore & horripilatione. Subintrantes dicimus, quando vnus paroxysmus desinit, & alter statim incipit, vel parum post. Subalternantes vero dicimus, quando inter paroxysmū & paroxysmum cadit quies mediā manifesta. Et quemadmodum diximus de paroxysmis feb. interpollatarum, intelligimus etiam de exacerbationibus seu supeccrescentiis feb. continuarum proportionatarum ad illas. Et feb. quidem concomitantes difficilis sunt cognitiōis, subintrantes faciles, subalternantes vero medię sunt earum. Signa feb. cōpositarū, sunt signa feb. quotidianæ nō puræ vel quartanæ non puræ. Signa feb. erraticarū: quę planeticæ dicuntur, sunt: quoniam procedunt earum periodi ordine turbato: Verbi gratia: nunc anteriorādo, nunc postergando: verum in hoc cadit error: quoniam si fuerit illud secundum ordinem digestiōis, nō significabit fe. erraticā. Omnis namq; feb. interpollata cum ad augmentum peruenerit, anticipant eius paroxysmi: cum vero declinarit, postponūt: sed cum in principio fuerit aut statu: accidunt vna hora, aliter tamen & aliter, prout in cap. de fe. flegmatica interpollata distinctimus, cap. de prognosticatione.

Methodus. Cura omnium istarum fe. est cōpositio medicinarū simplicium sub proportione, quā requi-

rit se, dispositio, & eius causa antecedens: verbi gratia, si feb. sit composita de feb. de cholera, & fe. de flegmate qualicūq; continua vel interpollata: tunc oportet, q̄ in digerentibus misceatur syrupus acetosus & oxyzaccharum cum oxymelle, similiter et in euacuationibus turbith cum reubar. vel agaricus cum diagridio misceatur: similiter et in cibationibus lactuca cum fen. & in saporibus agresta cū si nap. & in potibus vinum & aqua misceantur. Cautela tamen huiusmodi est semper obseruanda, vt si dispositio magis infestauerit, quod scies ex ardore, & siti vehementi, magis alterantibus insistantur. Si vero materia, quod scies ex angustia corporis ex repletionē venarum, & vrina grossa, magis euacuantibus vtamur. Si vero virtus debilis fuerit, ipsam præcipue confortemus cum cibus & potibus, pro tunc morbum & eius causam negligendo.

Emperica. Ars faciendi syrupum humores compositos digerentem quoscūq; similiter & ipsos extrahēs a particula nostri corporis quacūq; hæc est. ℞. calamētū, organi, mentæ, pulgij, herbæ paralytis, betonice, balsamitæ. añ. m. f. ratiōe flegmatis: ros. viol. en diuiz. lactucæ. añ. m. f. ratiōe cholere: herbæ vel flor. boraginis & buglossæ, scolopendriæ, sticad. arabic. rorismarini. añ. m. f. ratiōe melancholice: se. anisi, feniculi, sileris montani. añ. 3. ratiōe viarum oppilatarū: zinz. ciñam. xyloaloes, xylobalsami, folij indi. añ. 3. ratiōe aromatizationis & confortationis virtutis: mellis & zuccari. añ. lib. f. fiat ex omnibus syrupus bene coctus & clarificatus modo & ordine, quo fiunt alij syrupi: & ex ipso potest omni die in aurora per se, si aquosus fuerit: sed cū aqua calida, si fuerit per decoctionem inspissatus. Et si laxatiuum facere volueris: adde turbith, agarici. añ. 3. f. ratiōe flegmatis, cassiegi.

tamarindor. añ. 3. ratiōe cho. hermod. seneg. thymi epithy. añ. 3. ratiōe melan choliæ, myrobalanor. kebulor. vel mariscis. 3. ℞. ratiōe confortationis mēbroꝝ nutritiuorum: & ponantur omnia in decoctione prima, postq̄ fuerint in mortario aliquantulū contusa: & fiat syrupus, sicut prius: quia faciet agrū affellare bis vel ter leuiter quacūq; die. Et si volueris, vt stomachum aut caput vel membrum ali quod respiciat a proprietate, adde ex di rectiuis, quæ diximus capitulo de feb. fle gmatica interpollata.

Canones. Scire oportet, q̄ in cura feb. compositarum vel commixtarum insistentum est a principio circa rectificationē humorum calidor. subtilium, & post hoc grossorum cum digerētibus atq; euacuātibus appropriatis: qm̄ illud quod plurimū accidit, est vt humores subtiles agitentur statim a principio, grossiores vero tarde in processu. Aduertendum præterea, q̄ humores calidi subtiles plus indigent alterantibus q̄ educentibus: grossi vero frigidi e conuerso: vt ait Auicē. & Auer. autoritate Auēzoar. s. sui colliget. Nunq̄ visa est medicina laxatiua ministrari, apud cuius operationē nō euacuaret cho. rubea in principio: qd̄ quidem accidit propter eius subtilitatē & caliditatem: quoniam disponunt ad motum. Sollicitudum etiā statim a principio se. putridar. in confortatione stomachi, epatis & splenis, & vniuersaliter omnium membrorum naturalium, atque ad eorum exopillationem. Quoniam vt ait Ras. in diuisionibus cap. præsentī. In omni huiusmodi se, inflatur facies, & cor rumpuntur viscera, & debilitant & infirigidantur stomachus & epar: quare cum calidis stypticis hora vna, deinde penetrantibus diaforeticis hora alia subtraher succurratur: & hanc artem iam descripsimus cap. de flebotomia.

Prognosticatio. Feb. composita aut commixta vel errata ex tota sua specie difficiles sunt, et maligna: quoniam in eis virtus opprimitur et corrumpitur: neque medicina rationabiliter exhibere poterunt illico subuenire. Quod totum ex hoc accidit: quoniam causa contraria secundum complexionem vel substantiam similiter aequaliter dominantur: quapropter omnes feb. huiusmodi prolixae sunt, & malignae. Item dicit Ras. in diuisionibus cap. praesentis: quod plures feb. composita quae accidunt, sunt illae quae fiunt ex cho, rubea & flegmata continua vel interpollata: quoniam omnis cibus vel humor dum corrumpitur, transiit (ut plurimum) in hos duos, in cholera quidem per adustionem, in flegma vero per incruditionem vehementem. Item dicit Hippo. 3. prognosticorum. Febribus inordinate vagantibus quartanae sunt futurae, & proprie apud autumnum: cum sit tempus inordinatum. Item si febris hectica complicetur cum putrida, mortale: quoniam hectica restauratio indiget, putrida vero inanitione. Item ad febres compositas, cum perdurauerint, accidere consueuerunt opilationes & durities in epate & splene, & demum hydropisis ascites.

De febre pestilentiali. Cap. XV.

Accidit interdum aeri, qui est hic apud nos circa terrae superficiem, ut corrumpatur & putrescat: quae admodum accidit & aquae, quae stat in paludibus & stagnis: quare cum attrahitur per anhelitum spiritus corrumpit & humiditates, quae sunt in corde & capsula eius, & febrem inducit quae epidemia graece, & pestilentia latine dicitur. Et numeratur haec feb. inter continuas acutas quae apud diem 14. terminatur vel prius. Haec autem aeris corruptio, aut sit ex causa manifesta, ut a cadaueribus mortuorum: non defunctorum, & infusione lini, vel canabis in

aq. vicinis hominum habitationi, & proprie cum a locis huiusmodi peruenit status veterum austrinorum: Aut sit ex causa occulta, ut ex influentibus orbium & astrorum. Quapropter ait Hip. 1. prognost. Est autem quoddam coeleste sydu, quod latere non oportet. Signa fe. epidemiae sunt, quod est graecae caliditatis cum tangit exterior, sed est difficilis & perturbans interior, & proprie circa thoracem & pectus, ubi est suae putredinis minera: quapropter est cum ea lingua nigra, adusta, & pulsus spissus paruus debilis, in quo systole maior est, quam diastole: sed fortificatur apud noctem: similiter & anhelitus, sed est foetoris horribilis: similiter egestio & vrina: & adherent ei praecordiorum dolores, & tristitia & vomitus, & sitis: & vrina ipsorum est laudabilis, digesta pariter differens ab vrina sanorum: veruntamen est interdum ru. grossa cum liuiditate, & proprie cum fe. est malignantis vehementia: & est cum ea prostratus appetitus, ita ut si vehementer ab astantibus non resistatur, moritur sine cibo, & multiplicatur in ea vigilia, & inquietudo iacendi super lecto suo, & dolor oris stomachi, & tussis sicca, & tensio, vel spasmus membrorum nervosorum, ita ut ex illis omnibus ager cadat frequenter in syncopim, & debilitationem virtutis ultimam. Cum igitur videris febrem sic inquietam cum nausea frequenti, & signis omnibus, aut pluribus iam dictis: tunc scias, quod ipsa est feb. pestilentialis: verum si cum praedictis multiplicatur haec fe. in hominibus, & sunt signa pestilentiae manifesta in aere circumdante, ut caliditas plurima cum turbulentia nubium, & multitudine pluviarum, & alteratione aeris subita, nunc ad claritatem, nunc ad obscuritatem, & multiplicatio vermium, & serpentum, & multiplicatio variolarum in pueris, & morbillorum, & status assiduus ventorum calidiorum humidiorum, scilicet austrinorum: verior erit tua significatio.

Methodus. Sit tora tua intentio in con-
fortatione cordis istorum:
quoniam est illud, quod maxime labo-
rat in hac feb. Confortatur autē cum fri-
gidis, stypticis, aromaticis: quoniā calo-
rem se. reprimūt, virtutē alliciūt, & vehe-
menter putredini resistūt: quare per inte-
rius & exterius ministrent. Tēperet igit
aēr a principio habitationis ipsorū ster-
nendo per cameras plantas frigidas, vi-
rides, redolentes vt folia ros. salicis, nenu-
pha. & vitis albæ, & aspergātur parie-
tes cū aqua. ros. & aceto, & suffumigen-
tur cū sandal. & cāphora & ligno aloes
& xylobalsa. positis super carbones, &
odorē res easdem in manibus suis reten-
tas, siue facta ex eis poma cum laudano
& storace. Roretur frequēter eorū facies
cum aqua rosacea. Et fomententur os et
tēpora, similiter & pectus torū ex aqua
ros. & aceto, postq̄ in eis pulvis ros. cam-
phorę et sandalorū fuerit dissolutus in fun-
dendo in eis pānos lineos mundos vel se-
riceos, & actu frigidos frequentando su-
per locum. Nutriatur ex pullis assatis cō-
ditis cum vino granatorum, vel berbe-
ris, vl' aceto: similiter et vitellis ouorum,
& mica panis de simila lota in aqua fri-
gida, deinde expressa, & imbibita in vi-
no granatorum: potest quandoq; in cibo
sumere lētes excorticatas vel bis coctas
cum aceto, similiter & pulmentum ex fa-
rina ordeī vel auenæ conditum cum ace-
to. Bibat vinum album bonum odorise-
rum, cui admixtum sit quantum est eius
quintuplum ex aqua dulci frigida vehe-
mēter: vel bibat aquam frigidam cum
vino granatorum, vel agresta vel cum
aceto: si p̄ sto nō est aliud. Sorbeat quan-
doq; lac acetosum, vel lac vtilatum cū
lapide ignito, & cum eodem lacte & fa-
rina auenæ fiat pulmētum: vtatur extre-
mitatibus hęc dorū vitulorum coctis &
conditis cum vino pontico, & aceto, &
semine anethi, postq̄ fuerint vehementer

infrigidata. Et sit studium plurimū in cō-
fortatione virtutis eorū ex cibis & poti-
bus acetosis generē diuersorū, quæ proto-
cent appetitū: & cū ager cibū abhorruerit,
ab alitibus exhortetur: qm̄ cadit vir-
tus & moritur, si non cibus offerat. Con-
fortetur hora, qua cibū nō sumperit, cū
diarhodon abbatis, rosata nouella, zuc-
caro ro. triasand. simplicib; vl' cōmixtis.

Emperica. Prohibeatur hic ager a ci-
bis humidis pro posse: sicut
iura carniū elixarum, similiter & a po-
tibus vaporosis, vt sunt vinum purum,
ceruisia, & claretum. Et sit ipsorum aspe-
ctus ad septentrionem, non ad austrum:
prohibeatur etiam a balneis & ablutioni-
bus aquæ calidæ dulcis: Quoniam vt ra-
tio testatur caliditas & humiditas vehe-
menter allicitas putredinē, caliditas effe-
ctiue, humiditas subiectiue. Dicunt præ-
terea experti, q̄ si quis sumperit ex his
pillulis omī die 3. f. in aurora tēpore pesti-
lentiz, nō cadet in hanc se. 18. aloes, 3. i.
myrrhæ, croci, añ. 3. f. terātur, & cōficiantur
cū vino bono odorifero, & cū eodem
assumanē in potu: qm̄ materias putridas
leuiter euacuant, & nō putridas reseruāt:
verū si corpus non fuerit plethoricū, neq;
sit opus purgatione omnino, oportet vt
aloe & myrrha decē vicib; abluant, aut
plurib; in aqua dulci, donec partes acutę
resoluantur, & sola stypticas remanse-
rit aromatizans. Idem operatur theriaca
bona, si cum vino claro aromatico &
aqua veri frigoris potetur in ieiunio. O-
dor etiam assiduus camphoræ, si calidi-
tas sit vehemens in visceribus, vel mu-
schi, si caliditas non sit fortis, conferre dī-
citur.

Canones. Non confert in hac feb. pur-
gationibus insistere: quoniā
humor putridus nō est eius causa, sed va-
por aeris putridus cor inficiens & eius hu-
miditates: Veruntamen si venter sit sty-
pticus, leniat cū suppositoio vel clysteri,

& quandoq; cū medicina leui: cuiusmo-
di sunt cassiafi, manna, tamarind, si bul-
liantur in aqua cum viol. vel prunis &
colentur, & potentur in aurora. Quod si
corpus carnosum fuerit atq; rubicundū,
& vrina rubea confusa, & cōsuetudo in
flebotomando: flebotomandum erit sta-
tim a principio: quoniā humores super-
fluos diminuit, virtutem alleuiat, & a fe-
putridis præseruat. Nec videtur negligen-
dum, quin detur medicina digerēs quaq;
die: quoniam humores rectificat, & ab-
ebullitione putrida refrenat: cuiusmodi
sunt oxyzaccarum, & syrupus acetosus
simplex, si cum aqua frigida potentur
in aurora: sed apud meridiem, cum est si-
tis vehemens, bibat syrupum de papaue-
re: & fiant omnia quæ de fe. tertiana con-
tinua diximus, & proprie si sitis & vigi-
liæ perdurant.

Prognosticatio. Feb. epidemiales ex
tota sua specie timo-
rosæ sunt & suspectæ: quoniam in eis mi-
nera putredinis est in corde, quod est fons
vitæ: propter quod ait Auic. quarto cān.
capitulo præsentī: quod nō oportet in ea
digestioni credere: quoniam potest vrina
apparere digesta, & q̄ æger tamē tendit
cōtinue ad mortem, quod est: quia potest
in hac fe. virtus naturalis esse fortis, qua-
re digestionem perficit in cibis & humo-
ribus quaq; die: virtus vero vitalis est de-
bilis prostrata, quæ pulsum faciet parū,
spissum, velocem, debilem, inordinatū:
pulsus igitur est credendum, qui nō fallit,
cum sit præco verus: vt dicit Gal. lib. suo
de pulsibus. Item si syncop. fortis & fre-
quens acciderit, aut appetitus omnino fu-
erit prostratus: mortale. Item omnis feb.
cum ad crisiū peruenerit modo natura-
li, & præcedentibus signis digestionis: fre-
quentius terminatur ad bonum, quā
ad malum, præterquam hæc fe. in cuius
crisi non est confidendum: quoniam est
(vt plurimum) mortalis: vt ait Gale. in

commento illius apho. secundæ particu-
læ. Quibuscunq; crisis sit, his nox difficilis
&c. Item hæc feb. & similiter omnis fe.
putrida multiplicatur maxime sub æsta-
te pluuiosa: vnde Hippo. 3. partic. apho.
Constitutiones vero anni omnino quidē
siccæ &c. Item ad hanc feb. variolæ, &
morbilli succedere consueuerunt, & pro-
prie tempore senectutis aut iuuentu-
tis: quare si copiose & subito exierint,
fortitudinē virtutis expulsiuę significant
& crisiū ad salutem: si vero contrarium
acciderit, mortale.

De morbillis & variolis.

Cap. XVI.

Variolæ & morbilli sunt pustulæ
plurimæ & minutæ causatæ in fe.
acuta ex materia plurima calida
dispersa super cutim totius corporis, &
accidunt (vt plurimū) infantibus & pue-
ris ante tempus pubertatis: quoniam in
illis ætatibus virtus naturalis roboratā,
vt partes mensurui malignas retentas in
porositatibus membrorū embryonis ra-
dicibus expellat. Verum hæ partes sunt
duorum modorum: quoniā aut sunt san-
guineæ, & causant variolas: aut choleri-
cæ adustæ, & generāt morbillos: q̄ si fue-
rint frigidæ & slegmaticæ, non poterūt
fieri causa talium passionum, sed scabiei
& pruritus. Accidunt etiam hæ passio-
nes corporibus adultis, et proprie post cri-
ses diminutas se, acuturum: ita vt vario-
læ feb. de sanguine, morbilli feb. de chole-
ra consequantur. Signa eorum commu-
nia sunt: quoniam apud initium genera-
tionis amborum, sit feb. continua acuta
caloris vehementis, & dolor fortis super
dorsum, & pruritus in naso, & timor in
somno sine causa manifesta. Signa vero
distinctiua sunt: quoniam apud generati-
onem morbillorum sunt communia ac-
cidētia fortiora, & caliditas, & angustia.
cum dolore capitis, & faciei rubore, simi-

liter & vigiliz vltimantur. Deinde post tres dies vlt quatuor exeūt a corpore toto pustulæ duræ rubeæ minutæ, quæ nullum aut paruum faciunt cubū, sed apud generationem variolarum fiunt accidētia minora: deinde post tres vel quatuor dies apparent in toto corpore, similiter & in albuginibus oculorum, pustulæ latæ molles subalbida, quæ cum maturantur: faciunt saniem & cub.

Methodus. Distinguūt hi morbi per quatuor tempora: quemadmodum & omnes aliq, cum fuerint salubres. Est nāq; principium in eis, anteq; pustulæ exterius incipiāt apparere: Augmentum vero est, quando pustulæ apparēt, & augmentantur: sed est status, cum maturantur, & cubum faciunt & rupturam: Declinatio vero, cum vlcera exiccātur, & faciunt crustas, & vestigia planantur: secundum hæc igitur quatuor tempora diuersificatur & cura. In principio igitur ægritudinis, & postq; principium cognoueris in hac febre, fiat illico febricitans basilicæ (si virtus & ætas consenserint) & extrahatur sanguis plurimus pro posse simp̃ hora vna vlt apud secundationē: quoniam materiam diminuet, & variolarum & morbillorum impedit generationem. Et regatur patiens hora illa cum cibis & potibus stypticis pro posse, ex quibus sunt pulles ex farina auenæ conditi cum aceto, similiter & lentes excoricate, & risum, & mica panis abluta in aqua frigida, & postq; imbibita in vino granatorum vel succo berberis aut acetosæ: vel sicut sunt pulles ex farina similæ cōditi cum lacte vstulato. Bibat aquā frigidam puram, aut mixtam cum aceto. Vtatur zuccaro rosato, & triasanda. Et in hoc casu conferunt trochis. de kara be, & de camphora, & de spodio: si ventris restrictus fuerit, cum cassia fistula, & non cum fortibus medicinis: quoniam in hac ægritudine cadit timor plurimus dy-

senteriz malignæ. In augmento vero, cū pustulæ coeperint apparere, abijciat hoc regimen, & capiat aliud omnino. Quoniam vt ait Hip. i. par. apho. Vnde cūq; natura reperit &c. quare non fiat flebotomia, neq; leniatur vter: quoniam materiam ad centrum corporis diruarēt, & fortassis subitam inducerent suffocationem, sed cum cibis & potibus temperate subtilibus diætetur, quibus materiæ diriuētur ad corporis circumferentiā, præter q; plurimum inflāmentur: sicut sunt pulles ex farina ordeī farris vel auenæ conditi cū lacte amygdalæ, & sicut est hæc aqua. ℞. sicuum siccarum, passularum. añ. 3. iij. rad. feniculi, se. anisi, petrosilij granatorum, aut berberis aut lērium excoricatearum. añ. 3. i. sandalorum. 3. f. pistentur, & bulliātur in lib. quatuor aquæ dulcis, donec medietas consumatur: tunc coletur, & referuetur, & frequenter ex ea potetur in die: quoniam variolas & morbillos prouocat, & maturat. Et cū fortis care volueris in prouocando, adde croci aliquātulū, et coperiat assidue cū pannis calidis mollibus, donec sudet. Et ponant super ipsum, & coram eius oculis res rubeæ: quoniā facient eas exitum a propriestate festinare & mittantur pedes & manus in aquam calidam: quia faciet, vt aluietur variolarum exitus in membris: & distilletur in oculos & aures & nares aliqd ex rebus stypticis, quod partes huiusmodi defendat ab exitu variolarum & morbillorum: & gargariset cū eis dē: quoniam si acciderent in oculis, adducerēt cæcitatem, & in auribus surditatem: similiter & aliorum membrorum nobilium tollerent operationē sua corrosione vehementi. Ex rebus huiusmodi conferētibus est aqua ros. & proprie cum in ea sumach & berberis & grana granatorum bulliantur, similiter & collyria styptica dicta ca. de ophthalmia, & de fluxu lachrymarum: ex quibus hora post horam.

Tractatus primus secundi libri.

distilletur in oculos: similiter et oleū ro. et oleū myrrinū, ex quibus multoties aliqd sugatur per nares, & in aures distilletur. In statu vero & cum pustulæ sint maturæ, & sanies & virtus & sanguis emanarint: fiat reditus ad diætā stypticam dictā in principio: quoniā confortando partes intrinsecas, propellet materias ad exteriora: similiter & intestina custodiet a crisi symptomatica, quæ accidere consuevit in hac feb. per fluxum ventris dysentericum timorofum: & a cibis & potibus sanguinem multiplicantibus abstineat pro posse, donec morbus ad perfectam venerit declinationem: ex quibus sunt carnes, ova, & vinum, nisi fortassis virtus fuerit debilis: tunc namq̃ sumat aliquid ex ipsis vsu moderato. In declinatione igitur, & cum vlcera coeperint desiccari, & cortices cadere, confortetur earum exiccatio (si tardauerit) cum lana vel bombace inuncta & imbibita in aqua falsa, & posita super loca vicibus alternatis: & suffumigentur membra ex rosas siccis & myrtillis, & ex ligno sambuci, vel tamarisci posita super carbones, & abluantur ex aqua decoctionis rerum earundem: & inungantur ex oleis mollificantibus: vt est oleum chamomilinum, & similia: & sicut est aqua decoctionis maluarum, viol. & altheæ. Sic ergo mollificatiua cum exiccantibus vicibus mutuis alternent, donec omnes cortices ceciderint, & vlcera fuerint exiccata. Tunc igitur repleantur eorum vestigia ex cibis & potibus corpus impinguantibus pro posse: vt dicemus capitulo de impinguatione corporis macri: Similiter & cum vnguētis & emplastris carnem generantibus: sicut est vnguentum vel emplastrum, quod sic fit. ℞ lithargyri abluti nouem vicibus in aqua ros. & toties cribellati. ʒ. duas, radices cannarum siccarum farinæ risi, pulueris ossium adustorum, farinæ fabarum ex-

corticatarum, añ. ʒ. i. teratur omnia subtiliter, & cribellentur, & cum muscillagine se. lini, scenigræci, psyllij incorporentur in formam vnguēti vel emplastri, & super loca concava ponatur iero, & cum itur ad lectum, & mane cum aqua calida abluatur. Ad hoc conferre videtur plurimum frequens sessio in balneo aquæ dulcis tepidæ post cibum sine mora plurima in ipso: quoniam nutrimentum ad membra trahit et carnem multiplicat in eisdem.

Prognosticatio. Vt atq̃ istarum se. continua est acuta valde: quare vehemens cadit in eis timor, & proprie apud statum & finem augmenti, cū pustulæ exierint: velut sudor apud crisim: verum morbillus est deterior, in quo maior cadit timor suffocationis & corrosionis membrorum principalium, q̃ in variolis: quoniam est cum eis febris acutior, & accidentia fortiora: quapropter fit crisis in morbillis, & egrediuntur pustulæ apud diem tertium, aut quartum, aut quintū ad plus. Crisis vero atq̃ exitus variolarum accidit (vt plurimū) apud diem septimum, vel nouum. Est ratio in quibusdā corporis particulis exterioribus, vt in variolis maior cadat timor, q̃ in morbillis: quæ sunt oculi, aures, atq̃ guttur: quoniā partes huiusmodi vehementer ab ipsis corroduuntur, nisi fortassis statim a principio cum gargarisimis & collyrijs stypticis succurratur. Item morbilli & variolæ cum bene fuerint purgati, corpus mundant a lepra, & cancro, & morphea alba & nigra præseruant. Item si fiant huiusmodi pustulæ in crisi feb. epidemialis, & virtus constituerit: crism significat salutarem. Item si pustulæ in ambobus paucæ fuerint, & cito exierint, & cito maturentur, salubre: si vero contrarium, mortale. Item si pustulæ, nunc appareant, nunc delitescant cum dolore & angustia in visceribus, vit

tutis expulsiuæ debilitatem, & materiæ multitudinem et crīsim significat mortale. Item si syncopis fortis & frequens acciderit, mortale. Item si malitia anhelitus aut difficultas transglutiendi cibū & potum superueniet cū siti et angustia vehementi, mortale: quoniam materia plurima membra spiritualia oppilat. Item si fluxus ventris superuenierit statim a principio, & ante apparitionem pustularū, in variolis siue morbillis, crīsim significat ad salutem: & proprie si nō superfluaxerit, neq; viscera senserint nocementū: Si vero post apparitionem pustularum, & apud statum vel augmentum fluxus ventris acciderit, crīsim symptomaticā, & dysenteriam significat timorosam. Item si fuerit color morbillorum rubeus, aut violaceus, aut niger, aut liuidus, mortale: quoniam materiam adustam significat & venenosam. Item si variolæ fuerint citrinæ vel duræ, spissim inuolutæ, vel rubæz vehemētē, aut violacæ, aut ambræauerint vt formica, aut cutim corporis corrugauerint, velut in spasmo: omnes malæ sunt, & mortales: vt ait Ras. in diuisionibus ca. præsentī. Item si sanies alba laudabilis ex eis fluxerit apud maturatiōē, salubre: si vero virus viride cœnosum cū fœtore horribili, mortale. Item si vrina liuida fuerit, aut nigra, aut viridis, aut diuersi coloris confusa, mortale. Item si virtus consisterit, & appetitus remanserit, & anhelitus bonitatem suam seruauerit, & remedia rationabiliter exhibita quaq; die contulerint, & sitis & calefactio remissa fuerint, & pustulæ cito apparuerint, & apparentes exterius remanserint, & remanentes cito maturauerint, & maturantes saniem albam lenem & æqualem emiserint, & calor totius corporis æqualis fuerit, & viscera dolorem non senserint: omnia ista salubria, atq; vitalia sunt signa.

TRACTATUS SECVN
dus secūdi libri, cuius quinque sunt capitula. Primum est de crīsi, quid sit, & quot modis habeat fieri, & per quas regiones.



DIXIMVS IAM CVram febrium omnium posse: volumus nunc sermonem nostrum dirigere super accidens quoddam horribile, consequens feb. apud ipsarum terminationem ad bonum vel ad malum, qd crīsis græce & latine iudicium appellatur: quoniam omnis febris hora crīsis ad salutem vel perniciem iudicatur. Est autem crīsis (vt dicit Gal. in primo & tertio de crīsi) vehemens atq; velox motus morbi contra naturam, & everso, in quo natura subito vel vincit, vel vincit in toto vel in parte: quoniam est velut pugna vel duellum inter morbum & virtutem: quare oportet, vt ipsorum alterum subito propellatur sensibiliter extra corpus in toto vel in parte: verum quemadmodum expulsio sensibilis, aut subita, potest fieri tribus modis: similiter & crīsis. Modus primus est, in quo æger mutatur subito ad perniciem vel salutem: qm tūc virtus aut materia subito tota simul propellitur extra corpus: velut accidit in febribus vere acutis quibuscunq;. Secundus modus est, in quo æger subito mutatur ad melius vel ad peius: post hoc autē paulatim tendit ad perniciem vel salutē: quoniam fit primo crīsis diminuta ad bonum vel ad malum, deinde virtus proficit, vel deficit, velut accidit in febribus chronicis, & non vere acutis: in quibus virtus partem materiæ primo expellit subito, deinde residuum insensibiliter resoluit, vel ab ipsa quaque die resolvitur. Tertius modus est, in quo æger paulatim primo tendit ad melius vel ad peius, post

Tractatus primus secundi libri

hoc autem subito mutatur ad perniciem vel ad salutem: quoniam virtus primo paulatim resolvit aliquam portionē materiæ, vel resolvitur ab ipsa: post hoc vero subito residuum expellit sensibilibiter, & expellitur ab ipsa: velut accidit in febribus chronicis, similiter & in febribus interpollatis. In his namq; materia primo diminuit in quolibet paroxysmo per vomitum, vel sudorem: deinde apud diem quadragesimum vel sexagesimū fit fortis crisis ad vitam vel mortem. Neq; poterit euacuationis creticæ fore quartus modus, in quo æger paulatim tendit ad perniciem vel salutem a principio aggritudinis vsq; ad finem: quoniam modus hic non crisis, sed resolutio nuncupatur: quemadmodum accidit in febribus, quæ sine crisi terminantur. Regiones autē per quas crisis habet fieri, sunt duorum generum: quoniam aut expellitur materia totaliter extra corpus, aut ad mēbrum debilius: Si primo, appellatur crisis euacuationis, & continet sub se septem species, quæ sunt sudor, vrina, fluxus ventris, vomitus, fluxus sanguinis nariū, & fluxus mēstruorum, vel hæmorrhoidarum. Pluribus namq; modis nihil egreditur sensibilibiter corpus nostrum. Si secūdo modo, tunc crisis permutationis ab Auic. nominatur: & continet sub se tres species famosas, quæ sunt apostema ceticū post aures, & in igitibus, & sub assellis: cū ista sunt emūctoria corporis ignorabilia per naturam fabricata: velut in omnib; latrina: licet oīs pars debilior apud dolum ceticum, sit receptaculum fortioris. Signa crisis communia, sunt turbatio sensuum & rationis plus solito cum dolore capitis & scotomia, & angustia agri, cū inquietudine iacendi super lecto, & inflātia vigiliarum, & somnus profundus, et dolores fortes in visceribus, & anæratio anhelitus, & vehementia sitis & calor: & aduenit quibusdam rigor fortis, & an

ticipat hora exacerbationis magis solito. Omnia ista cum apparuerint in die, crisis significat futuram in nocte, & econuerso: quoniam vt ait Hippo. secunda parti. apho. Quibus crisis fit, his nox difficilis &c. Quod si cū prædictis febris fuerit vere acuta, & dies expectata fuerit vere cretica, quam sua indicatiua præcessit cum signis & euacuationibus creticis diminutis, & digestio perfecta, vel cruditas vltimata visa fuerit in vrina: verior fiet tua significatio, Signa crisis propria futura per sudorem, sunt cū prædictis pulsus mollis et vndosus, caliditas cutis torrida vaporosa, & q; æger sentit circa superficiem velut acuum puncturam, & retinentur sterces & vrina vehementer. Signa vero propria crisis futuræ per vrinam, sunt cum prædictis grauitas & commotio circa scæmur & pectinē, & q; æger est ex illis, qui venas habent largas, et consuevit crism facere per vrinā, Signa crisis propria per fluxum ventris, sunt cum prædictis grauitas & commotio circa ventrem & vmbilicum, & ventositatū egressio plurimarum. Signa crisis propria per vomitum, sunt cum prædictis animi subuersio, & nausea, & tremor labiorum inferiorum oris, & multitudo sputi vel saliuæ: Quod si singultus supuenerit, verior fiet significatio. Signa crisis propria per fluxum sanguinis narium, sunt cū prædictis fluxus lachrymarum inuoluntarius, & rubor faciei atq; oculorum cum imaginatione rerum rubearum ante oculos, et turbatione visus, similiter & nasi pruritus vehemens, & anhelitus restrictio, & temporum pulsatio, & venarum inflatio, quæ sunt in fronte. Signa crisis propria per fluxum mēstruorum vel hæmorrhoidarū in corpore consueto, sunt cum prædictis pruritus in ano cum tumore & inflatione venarum ibidem: similiter & agitatio circa sumē ventris, & ardor circa vuluam, & dolor

circa alkatim. Quod si corpus cōsuetum fuerit in hac crisi, & vrina nigra fuerit, aut cum sedimine nigro, verior fiet tua significatio. Signa propria crisis futuræ pexituram, sunt cū prædictis sensatio grauitatis plurimæ in aliqua parte corporis puta post aures, vñ in coxis aut sub ascellis: & quia se. fuerat de flegmate, vel de cholera non pura, & vrina fuerit alba grossa lactea vel subtilis aquosa, neque virtus fuerit fortis excellenter: quare materiam perfecte non expulit, sed ad membrum debilius deriuauit.

Methodus. Cum hora crisis accesserit & id perfecte cognoueris ex signis supradictis, nihil ægro tribuas in cibis potibus aut medicinis, sed ipsum penitus naturæ derelinquas: quoniam natura est agens sapiens, quæ melius operatur in singulis iuxta posse, nisi fortassis virtus defecerit, & pulsus paruus fuerit atq; inordinatus, non quidem ex fortitudine accidentium, sed multitudinis euacuationum. Tunc namq; cibus modicus erit statim offerendus, velut est mica panis lora in aqua frigida, et post hoc imbibita in vino pontico vel succo granatorum. Et q̄diu via crisis non apparuerit per signa certa, nihil fiat circa ægrum: ne forte medicus, & natura contrarias petāt regiones. Cum autem via crisis apparuerit, & virtus sufficere videat, adhuc medicus ocietur: quoniam vt ait Hippoc. 1. parti. apho. Ea quorum crisis fit & facta est æqualiter, non mouere & c. q; si virtus insufficiens videatur, confortet ipsam medicus per eandem regionē: quoniā vt ait Hippo. ibid: Quæ ducere oportet, vnde cunctæ natura repit & c. quomodo autem naturam confortare possumus apud crīsim per eandem regionem, complete diximus capitulo de cura feb. putridarum in generali.

Prognosticatio. Si signa crisis euenerint in die cretica radi

cali, quam suam præcessit indicatiua radicalis, & apparuerint signa perfectæ digestionis in vrina, & virtus fuerit fortis, & pulsus magnus inordinatus, crīsim si dam completam & perfectam significat affuturam: Si vero cōtrarium omnīū prædictorum euenerit, crīsim mortalem significat & malignā: verbi gratia, qm si die quarta apparuerit paruus sudor, aut fluxus ventris modicus, neq; signa digestionis manifeste apparuerint, neque virtus sit valde fortis: crīsim mortale significat in septima: quoniam virtus non potest morbum superare, prout attentauit in die quarta. Quod si quedā eorum affuerint, & quedam non: crīsim significant diminutam, quam sequitur recidiuatio, nisi cum euacuationibus post crīsim succurratur. Quia vt ait Hip. 2. parti. apho. quæ relinquuntur in morbis post crīsim & c. Item sollicitandum in feb. ad faciendum crīsim completam, & si non aliter, saltem per artem: quoniam vt ait Auic. 4. cañ. ca. finali. Omnis recidiua deterior est sua radice: quoniam naturam reperit defectam. Veruntamen distinguendum in recidiua, ne fiat error, quoniam est vera et non vera: vera dicit, quæ fit ex sparsione materiæ post crīsim derelictæ: Nō vera vero dicit, quæ post crīsim gñatur ex malo regimine in toto vñ in parte. Itē si quis conualescat in fe. putrida sine euacuatione sensibili omnino vel modica, recidiuam non euadet, nisi cum purgationibus per artem succurratur. Vnde Hip. 2. parti. apho. Non secundum rationem alleuiatis non oportet credere & c. Item feb. singulæ crīsim faciunt vt plurimum per regionem suæ materiæ cōgruentem: verbi grā, fe. de sanguine per fluxū sanariorum: sed feb. de cholera, per sudorem, vel fluxum vētris cholericum: sed de flegmate, per vomitum vel vrinam: sed de melancholia per fluxum menstruorum vel hamorrhoidarum: sed fe. composita

Tractatus secundus secundi libri.

per apostema ceticū: veruntamen ipsarū qualibet crīsim potest facere, per quālibet regionem. Item crīsis ex tota sua specie plus attinet salutī q̄ mortī, nisi fortassis morbus fuerit pestilēcialis: vt ait Gal. in commento illius apho. 2. part. Quibuscūq; crīsis sit &c. Ex quo scire possumus, q̄ ad pugnā ceticam plus laeessit virtus, q̄ morbus, nisi crīsis symptomatica fuerit & maligna.

De cognitione febris an terminanda sit per crīsim, vel sine crīsi: & an febris sit longa, vel brevis.
Cap. II.

Modi terminationis materialū ægritudinum sunt tantum duo: quoniā aut terminatur subito, & sic terminatur per crīsim: aut paulatīne, & sic terminatur per resolutionem. Dico autē materialium: quoniā ægritudinum immaterialiū, cuiusmodi sunt mala compositio, & solutio cōtinui: similiter & mala complexio immaterialis: vt est fe. hectica, et fe. effimera vera proprie loquendo, non est terminatio: cū non sit in eis pugna, sed rectificatio sola. Vt autē scire possimus, quæ materialis ægritudo terminetur per crīsim, & quæ per resolutionem, distinguendum videtur, quot cōditiones pertineant ad veram crīsim. Dicitur igitur, q̄ sunt quatuor, prout colligit ex diffinitione veræ crīsis posita autoritate Gal. proximo ca. p̄cedēri: Quarū prima est, vt sit pugna vehemens virtutis contra materiā morbi, & econuerso. Secunda vero, vt hæc pugna fiat subito, et nō rēpore longo. Tertia, vt tota materia aut virtus tota, aut maior eius pars ad extrema corporis expellatur. Quarta autē, vt hæc expulsio sit sensibilis & manifesta. Ista namq; cum omnia simul fuerint, faciunt ægrum necessario festinare

ad mortem subitam, vel salutem: quod & vera crīsis appellatur. E contra vero, cum nulla conditionum acciderit apud ægritudinis terminationē, resolutio nuncupatur. Quod si quædam affuerint, & quædā nō: poterit crīsis large nuncupari. Verum cū huiusmodi pugna cetica, similiter & resolutio sibi cōtraria oriri habeant, non nisi ex contrarietate atq; resistentia virtutis & materiæ facientis morbum, & huiusmodi contrarietas nō accedat, nisi in morbis virtutē molestātibz: dicendū videtur, q̄ omnis morbus hmodi, aut est molestans per essentiā: cuiusmodi sunt febres, aut per indignitatē læsæ actionis apud eius paroxysmum: cuiusmodi sunt apoplexia, epilepsia, tetanus, et squinantia: quare videtur relinquendum, q̄ in sola se, possit vera crīsis fieri, similiter & resolutio contraria crīsi. Sola namq; febris est morbus totum corpus occupans, & virtutem essentialiter molestans: vt ait Gal. 8. de ingenio sanita. Sed ad magis specialia descendentes, dicamus quibus febribus vera crīsis conueniat, & quibus resolutio contraria, & quibus crīsis non vera: Propter quod est sciendum, q̄ triplex est genus febrium: quemadmodū & genus humorum, qui sunt materia ipsarum: quoniam aut febris est ex materia calida subtili, aut ex grossa frigida, aut ex materia media seu commixta. Et primæ quidem acutæ, secundæ vero chronicæ, tertiæ tropicæ nuncupantur. Veruntamē vt ait Auicenna, genus acutarum feb. est triplex: quoniam aut sunt acutæ absolute, & hæc apud 14. aut 20. terminantur: quod Hippo. testatur secunda part. aphorismorum. Acutæ ægritudines &c. Aut sunt magis acutæ, & peracutæ vocantur, quæ terminantur apud diem septimum, vel nonum: Aut sunt in vltimo acutæ, & perperacutæ vocant, q̄ terminantur apud diem quartū, vel quintum, Tropicæ vero feb. dicuntur, quæ nō

habet motum assiduum a principio suæ inchoationis vsq; ad terminationem (velut acutæ) sed die qualibet critica mouentur ad crissim diminutam, & post hoc iterum quiescunt. Verum qualitercunq; se res habuerit apud diem tricesimum leuesha vel quadragessimam ad plus terminantur: neq; possunt huiusmodi terminum præterire: quoniam dies quadragessimus, est terminus dierum acutarum omnium, & initium chronicarum, & præcipue chronicarum ortum ex tropicis vel acutis: vt dicit Gal. in commento illius aphorismi, tertia particula plurimæ pueris passiones, Chronicæ vero dicuntur feb. quietæ, pigre quasi non videantur mouere: quare durant vltra 40. diem, & per menses & annos plures. Acutis igitur febribus vera crisis congruit, chronicis vero resolutio contraria, sed tropicis crisis non vera. Acutæ namq; ex materia acuta generantur, qualis est cholera vel sanguis. Chronicæ vero ex materia grossa frigida, qualis est melancholia & flegma vitreum. Tropicæ ex materia media, qualis est flegma naturale. Ex quibus omnibus apparet scire possumus, in quibus febribus, & in quibus diebus vera crisis accidat: quoniam non nisi in feb. tertiana, & proprie continua, vel synocha, & synocha inflatiua. Neq; post diem vigesimum quoquo modo, quapropter ait Auerrois quarto colligit: qd post diem vigesimum non fit crisis sensibilis, & proprie ægritudinum acutarum. Similiter & in quibus febribus, & in quibus diebus non vera crisis accidat: quoniam non est, nisi in feb. flegmatica & proprie continua: neq; post diem quadragessimum quoquo modo. Similiter & in quibus febribus, & in quibus diebus sola resolutio crisi contraria contingat: quoniam non est, nisi in feb. quartana, & quinana & sextrana, & proprie cum vltra diem quadragessimum perdurant. Febres itaq; veram habent

res crissim breues sunt, & citæ terminationis: febres vero quæ sola resolutione participant prolixæ sunt per naturam: Quæ vero crisi non vera participant, mediæ sunt earum. Verum subtilitatio diætæ plurima in cibo & potu, & caliditas complexionis naturalis, & raritas corporis, & tempus æstatis, & regio australis, & antecessio ciborum calidorum subtilium, febrem vehementer abbreviant ad bonum vel ad malum: quemadmodum contrarium prædictorum omnium feb. elongat. Iterum autem certior cognitio breuitatis & longitudinis morbi trahitur ex signis digestionis in vrina: verbi gratia: In quibuscunq; febribus principium est longum, omnia alia tempora subsequencia sunt longa, & per consequens feb. longa. Sed cum principium fuerit breue, omnia alia tempora fient breuia & per consequens tota fe. Quod quidem necessarium est, atq; utile ad cognoscendum statum, an scilicet sit longinquus vel propinquus a principio: vt ait Galenus primo de crisi,

De significatione quatuor horarum vniuersalium febris, & in qua earum debeat fieri crisis.
Cap. III.

Febri quolibet, & proprie cum fuerit salubris humoralis, quatuor habet tempora, quibus eius alteratio secundum materiam & virtutem sensibiliter variatur: quapropter necesse est, vt cognoscantur a medico: quoniam per ea cibis atq; medicina, similiter et actus prognosticus quamplurimum variantur. Sunt autem principium, augmentum, status, & declinatio perfecta, quorundem discretio fit tribus modis. Vno quidem modo distinguunt per numeros dierum: & tunc dicimus fore principium cum æger primū

Tractatus secundus secundi libri

senferit diffuetas atq; indebitas sui corpo-
ris alterationes, quibus febris præsigna-
tur, quas singulas iā descripsimus in ca.
se. putridarum in generali. Vel dicamus
principium, spatiū trium dierum: vt ait
Gale. 3. de crisi. Tunc augmentum dici-
mus, cum febris perperacura processerit
ad diem 2. & se. peracura ad diem tertiū,
& feb. acuta absolute, ad diem septimū,
& feb. tropica ad 14. diem, & feb. chroni-
ca ad vigesimum vel sibi propinquū.
Tunc statum dicimus, cum feb. ad diem
suam creticam peruenerit vel proximā
præcedentem. Tunc vero declinationem
dicimus, cum feb. crism fecerit fidam &
completam. Secundo modo distinguun-
tur hæc tempora per gradus accidētium
propriorum: verbi gratia, vt tunc dica-
mus principium: cum accidentia feb. sin-
gula (qualis est dolor capitis, sitis, vigi-
lia &c.) nondum fuerint sensibiliter au-
gmentata. Augmentum dicimus, cū oīa
aut plurima sensibiliter acciuntur & au-
gmentata sunt: statum, cum vltimātur,
id est ad vltimum difficultatis & mali-
tiae peruenerunt: declinationem vero cū
habita euacuatione forti plurima sensi-
bili coeperint accidentia singula mitiga-
ri. Tertio modo & magis rationabiliter,
distinguuntur per motum digestionis, vt
q; tunc dicimus principium, cum nondū
apparuerint signa digestionis in vrina,
vel fuerint occulta, diminuta: verbi gra-
tia, vt cū. vrina est alba, aut lactea, aut
glauca, aut karopos in colore, & grossa
valde in substantia, vel subtilis valde, et
in ægritudine mortali, tunc dicimus esse
principium: cum nondum apparuerint
signa manifesta cruditatis. Isto nanq; tē-
pore natura non operatur manifeste con-
tra materiam, nec materia cōtra naturā.
Augmentum vero tunc dicimus: cum
apparent signa manifestæ digestionis in
vrina, videlicet, quoniam vrina est palli-
da vel subpallida, vel subcitrina & me-

diocris in substantia cum nebula penden-
te in summo, vel natante in medio: & in
ægritudine mortali, tunc dicimus esse au-
gmentum: cum apparent signa manife-
stæ cruditatis: cuiusmodi signa sunt con-
traria prædictis. Isto nanq; tempore vel
virtus agit in materiam, vel materia in-
surgit contra virtutem. Tunc autem sta-
tum dicimus: cum apparent signa in vri-
na perfectæ digestionis omniuaq;: ver-
bi gratia, vt cum vrina sit citrina, aut ru-
fa, aut subrufa in colore, tēperata in sub-
stantia cum hypostasi alba leni aequali
pyramidali vsq; in diem creticam hu-
iusmodi apparēs: aut cū ægritudine mor-
tali apparere coeperint signa cruditatis
aut adustionis vltimatq;: vt est vrina aquo-
sa subtilis, aut nigra spissa, aut liuida cō-
fusa, aut viridis cœnosa cū debilitate vir-
tutis, & pulsus paruitate. Isto nanq; tem-
pore natura operatur in materiam iuxta
vltimum suæ potentiae, & ipsam digerit
cōplete, atq; a iuuatiuo separat, vt apud
finem status ipsam subito expellat, & cri-
sim faciat salutarem: Aut materia vehe-
menter insurgit contra virtutē, & ipsam
opprimit totam simul, & crism efficit
mortalem. Tunc vero declinationem di-
cimus, cū post euacuationes creticas co-
piosas calor se. quieuerit, & vrina secun-
dum colorem & substantiam ad statum
redierit corpori debitum & consuetum.
Neq; poterit hora veræ declinationis esse
in febribus perniciosis: quoniam potest
q; mori in principio ex multitudine ma-
terię: in augmento ex debilitate virtutis,
in statu ex vehementia accidentium: sed
in declinatione vera nullus moritur oīno,
vt ait Gal. 3. de crisi. Qualiter nanq; vir-
tus post pugnam deficeret, quæ in pugna
vitaliter præualebat: plerunq; tamen per
accidēs mors fit in declinatione vera: cū
scilicet nouus morbo accesserit, aut apud
crism superfluentem iuuatiuum cum no-
citiuo exhalarit. Distinctiones aut variæ

quatuor horarum in febribus iam dictæ, quandoque simul incidunt temporibus eisdem: quandoq; vero sibiinuicem succedūt in toto, vel in parte: prout complete ostendimus ca. de pleuresi. Verū quali ter his tēporibus variandus sit actus me dici secundum cibationem & euacuatio nem cum medicina exhibita in ca. de eu ra fe. putrid. in generali distinximus pro posse. Restat igit̃ dicere nunc qua horaꝝ debeat fieri crisis tam salubris q̃ morta lis. Potest vtraq; accidere in augmento similiter et in statu, vt ait Aui. 4. cañ. fēñ. 2. ca. de indicijis bonæ crisis: tamē quæ est in vltimo bonitatis atq; certitudinis so lummodo fit in statu: quare est sicut me trum & regula crisiū aliarum: quoniā bonæ aut malæ dicūtur, prout ab illa elō gantur. Verum in hoc refert: quoniam si virtus fortis sit plurimū, & materia mo dica calida subtilis & benigna, nō expe ctabitur plena digestio & completa, sed fiet crisis fida, perfecta & cōpleta in au gmento, & proprie circa eius finem: qm̃ expeller virtus crudum cū digesto. Quod si virtus debilis extiterit, & materia plu rima grossa viscosa frigida: non dabun tur induciæ vsq; ad horam statum, sed in augmento materia obruet virtutem, & faciet crislum mortalem. Si vero virtus et materia æqualis fuerint fortitudinis se cundum potentiam & quantitatem nō insurgent contra se, nisi apud digestionē completam vel cruditatem vltimam, & facient crislum hora statum mortalem vel salubrem. Nec dicat aliquis, q̃ crisis potest fieri in principio: quoniam pugna cretica non accidit inter duos debiles o mnino, neq; inter debilem & fortem, sed tantū inter fortes: quare si virtus sit debi lis in principio, resoluet sine crisi: Quod si virtus & materia fuerint æqualis forti tudinis vel circa id: agē in se mutuo, do nec in augmento vel statu alterum duo rum dominetur: & ad id non parum con

fert auxilium medicū, influxus astrorum apud diem creticam bonam vel malā: propter quod ait Gal. 3. de crisi. Et nō po test aliquis subito saluari ab ægritudine sine crisi, sed mori gēs plurima sine crisi.

¶ De cognitione dierum cretico rum, qui sunt & quot sunt.

Cap. III.

Quoniam crisis perficitur non so la virtute naturali pugnante cō tra morbum & eius causam, ve rum auxilio corporis cœlestium, per quo rum ordinatissimam lationem omnis la tio inferior gubernatur: vt ait Aristote les 1. meteororum, & Hippo. 1. progno sticorum, & Galenus 1. de creticis: neces sarium videtur dies cognoscere: in qbus corpora cœlestia virtutē benignam in fluāt, aut malignam in corpore ægri ad crislum bonam vel malam faciendā. Sed licet corpora cœlestia plurima atq; diuer sa sunt valde, secundum naturam & vir tutem: medicus tamen duorum tantum influxum considerat, scilicet solis & lu næ: quoniā sunt omnium præcipua apud sensum & virtutem: similiter & morbis creticis sufficiunt omniquaq;. Quemad modum enim om̃is morbus aut est chro nicus, aut acutus: quoniam & tropici ve re chronici iudicantur: sic & motus solis per circulū zodiaci, chronicus est, ita vt nō nisi anno integro compleatur: motus vero lunæ per zodiacū brevis est & acu tus, ita vt quolibet mense compleatur. Quapropter oportuit, vt morbi chronici acciperent virtutem solis & eius motū: morbi vero acuti, virtutem & motū lu næ sequerētur. Cum igitur motus corpo rum cœlestium similiter & astrorum nō nisi tempore mensureretur: vt ait Arist. 4. physicoꝝ: tempus autem per dies & heb domadas & medietates hebdomadaꝝ, quæ quartæ nuncupātur: similiter & per menses distinguatur: fuit necessarium, vt

Tractatus secundus secundi libri.

motum & influxum solis & lunæ medicus consideras, distinctiones temporum iam positas denotaret. Incipientes igitur dicamus, quod quemadmodum apud astronomos sunt dies & hebdomadae, & medietates hebdomadarum atque menses, similiter est apud medicos: verum ut plurimum differunt: quoniam dies quæ apud astronomos naturalis appellatur, est 24. horarum naturalium completarum: dies vero medicorum est, 24. horarum naturalium & quartæ decimæ partis unius horæ: quoniam quemadmodum sol terræ circumulum describit suis horis, ita luna circulationem unam suis perficit horis morbos acutos sensibilibiter variantem horis supradictis. Similiter differunt & hebdomadae, atque earum medietates: quoniam hebdomada astronomorum constat ex septem diebus naturalibus completis: Medietas vero hebdomadæ ex tribus diebus naturalibus: & 12. horis. Sed hebdomada medicinalis ex septem diebus medicinalibus componitur qui non constituunt nisi sex dies naturales & 18. horis. & dimidiam, prout ostendimus ex aggregatione dierum prædictorum. Medietas vero hebdomadæ constat ex tribus diebus naturalibus & 8. horis & dimidia & quarta pars unius horæ naturalis. Et medici quidam hebdomadam vocauerunt quadram: quoniam per singulas hebdomadas peragrat luna quartam partem zodiaci. Sed medietates hebdomadarum, quaternos appellauerunt: quoniam in omni hebdomada fit media dies quarta: quemadmodum & trium hebdomadarum unione periodum vocauerunt: quoniam per singulas tres hebdomadas simul copulatas perficitur dierum & hebdomadarum medicinalium computatio per integra & diminuta, ita ut tunc alia computatio inchoetur: verum cum mensis ex hebdomadis quatuor integretur: oportuit, ut quemadmodum

mensis astronomorum ex quatuor hebdomad. constat perfectus, quæ sunt 28. dies naturales: similiter & mensis medicorum ex quatuor hebdomad. dierum superiorum prædictorum, quæ non sunt nisi, 26. dies naturales & 22. horæ. Hæc est igitur dierum hebdomadarum atque mensium medicinalium inuestigatio sumpta a priori: Sed a posteriori inquirendo dicamus, quod mensis astronomorum est duplex in genere: scilicet solaris & lunaris. Solaris quidem est spacium temporis, quo sol unum ex signis zodiaci motu proprio percurrit, & continet 30. dies naturales & decem horas & dimidiam horam: quod tempus si diuidatur per quatuor fiet hebdomadæ solares: & hæc hebdomada si per 7. diuidatur, fient dies solares. ¶ Mensis vero lunaris est triplex. Primus quidem dicitur coniunctionis, & est spacium temporis, quo luna coniuncta soli recedit ab ipso, & pertransit totum zodiacum, & plus adhuc, donec soli coniungatur iterum: & continet 29. dies naturales & 12. horas. Secundus dicitur mensis peragrationis: & est spacium temporis, quo luna mouetur sub zodiaco ab eodem puncto ad idem redeundo: & continet 27. dies naturales & 8. horas: quare deficit a mense coniunctionis in duobus diebus naturalibus & quatuor horis, quo quidem mensis ille indiget, ut luna solem inueniret. Tercius dicitur mensis apparitionis: & est spacium temporis, quo luna apparet nobis hic inferius illuminata, quod quidem accidit cum a sole recedit post coniunctionem, quæ adustio nuncupatur: & continet 26. dies naturales & 12. horas: quare deficit a mense coniunctionis tribus diebus naturalibus, quibus luna non apparet illuminata: quoniam stat sub acustione totidem diebus. Sed cum luna virtutem suam non influat in hæc inferiora, nisi per suum motum & lumen: quemadmodum neque aliquod aliud astrorum (ut ait Aristotle-

les secundo cœli) oportuit vt medicus
mensẽ peragratiõis, & mensẽ ap-
paritiõis in sui consideratiõem assu-
meret, neq; mensẽ coniunctiõis com-
putaret: quare si menses hi duo aggregen-
tur: constituunt 53. dies naturales & vi-
ginti horas: quod tempus si totum medi-
etur, constituet mensẽ medicinaleẽ su-
pradictũ cũ suis hebdomadis & diebus.
Postq̃ igit̃ dies hebdomadas atq; menses
inquisimus, fiet modo consequens, vt
ipsorum computatiõem inquiramus.
Circa quod est aduertendum, quòd dies
naturales astronomorũ, similiter & heb-
domadæ sunt integræ & perfectæ et pla-
na est eorũ computatiõ: verum apud me-
dicos variatur: quoniam prima hebdo-
mada computatur diuisim a secunda:
ita scilicet vt dies seprimus naturalis sit
finis primæ hebdomadæ, & dies octa-
uus sit principium secundæ. Secunda ve-
ro hebdomada coniunctim computatur
cũ tertia: ita scilicet vt dies decimus quar-
tus naturalis totaliter sumptus, sit finis
secundæ hebdomadæ, & principium ter-
tiæ: vt sic prima periodus, qui sunt tres
hebdomadæ medicinales, compleatur in
viginti diebus naturalibus & duodecim
horis: vt ait Hippocrates tertio progno-
sticorũ, quod quidẽ ex hoc accidit: quoniã
medicus 12. horas naturales aut plures
pro die completa recipit: q̃ si pauciores
fuerint, abicit ominò propter paruita-
tem: quemadmodum accidit in compu-
tationibus astronomorũ, vt sic quodam-
modo per integra sua computatiõ proce-
dat. Cum igitur seprimus dies primæ heb-
domadæ medicinalis sit spaciũ duode-
cim horarum & dimidiæ, postquam sex
dies præcedentes fecerimus integros at-
que naturales, sequitur vt horis huiusmo-
di pro die septima computet complete:
sed cum dies septima secundæ hebdoma-
dæ, quæ erit dies 14. sit tantum 11. ho-
rarum, postquam dies omnes fecerimus

integros atq; naturales, oportuit vt il-
la dies bis numeraretur, & sic dies septi-
ma secundæ hebdomadæ, & dies prima
tertiæ hebdomadæ vocaretur: quoniam
per huiusmodi reduplicatiõem, quod
deficit in hebdomada secunda, recupera-
tur in tertia, & econuerso: & quemad-
modum sit computatiõ hebdomadarũ
in prima periodo, quæ in die vicesima na-
turali terminatur inclusiue: ita & in peri-
odo secunda, quæ incipit in die vicesima
prima naturali, & in 40. die naturali ter-
minatur: similiter & in tertia periodo,
quæ incipit in die 40. naturali, & in die
60. naturali terminatur. Postquam non
computantur dies, neq; hebdomadæ, ne-
que periodi, sed menses atq; anni: quoniã
est terminus ægitudinum maxime chro-
nicarum, quæ cursum solis assequuntur,
& non per crism, sed per resolutionem
terminantur. Ex omnibus igitur, quæ di-
cta sunt, docemur dies ereticos computa-
ri: verbi gratia, in prima periodo: quo-
niam si morbus terminabitur in die deci-
ma quarta vel infra: cõputabimus oẽs
eius dies per dies fractos atque medici-
nales, ita vt si morbus inceperit die so-
lis hora secunda, dicemus quòd incipiet
dies secunda die lunæ hora prima, & pau-
lo prius: quod non æstimatione dignum
propter suam paruitatem. Et quòd dies
tertia incipiet die martis hora vicesima
quarta diei præcedentis, & sic anticipan-
do per vnam horam naturalem quaque
die naturali: quare cum ad diem decimã
quartã peruenerimus, incipiemus ipsam
14. hora ante diem decimã quartam na-
turalem. Et ex hoc scire potes, quare plu-
rimum fit crisis fida & completa in die
13. naturali, similiter & in die 21. natu-
rali: quoniam id accidit ex hoc, q̃ dies
cretici medicinales incipiunt & termi-
nantur in eisdem. Si vero morbus termi-
nabitur post diẽ decimã quartã, vtpote
in die 17. vel 20. tunc nõ g dies medica

Tractatus secundus secundi libri

les, sed per dies integros cōputabis: quoniam reduplicatio diei 14. totum errorē complanabit. Quod si nō fieret, tunc tres hebdomadæ medicinales in 10. diebꝫ naturalibus complerentur, quod est contra Hippo. tertio prognosticorum. Et quædā modum de prima periodo distinximus, ita fiat similiter in secunda & tertia, semper in eorum principijs modum computationis renouando, quemadmodū & in prima. Restat autem adhuc dierum & hebdomadæ atqꝫ periodorum & mensium medicinalium virtutes pertractare ita vt scire possimus, qꝫ sit dies creticus ad bonum & ad malum, & quis sit dies indicatiuus: similiter & in qua hebdomada atqꝫ periodo virtus eorum augementur aut debilitetur. Dicamus igitur, qꝫ oīs dies, aut est creticus, aut indicatiuus, aut intercicens: vt ait Galenus 3. de creticis: & si fuerit creticus, aut est radicalis, aut accommodatus, aut intercides. Dicimus autem dies creticos radicales: quoniam fit in eis, vt plurimum crisis ad salutem: propterea qꝫ sunt dies quadragꝫ, in qꝫbus luna forti mutatione sui secundum lumē & motum respicit inferiora. Et sunt isti dies 7. 14. 20. quantum ad primam periodum vniuersalē: similiter & 27. 40. quantum ad secundam periodum vniuersalē: similiter & 34. 47. 54. 60. quantum ad tertiam & vltimam periodum vniuersalē. Postea vero sunt menses medicinales vsque ad tres vsꝫ quatuor: & deinde solares, sicut patet in chiragra vel podagra: quæ in quibusdā corporibus tempore veris vel autumnī redire vel terminari periodo consueuerunt. Dies autē creticos per accommodationem dicimus: quoniam fit in eis crisis ex virtute hebdomadæ, quarū sunt medietates, & sunt isti 4. 11. 17. quarū ad primam periodum. Similiter & 24. 31. 37. quātum ad periodum secundā. Similiter & dies 44. 51. 57. quantum ad periodum tertiam vniuersalem:

Et post hoc sunt medietates mensium & annorum. Dies vero creticos intercidentes dicimus: quoniam in ipsis fit sæpe crisis ad bonum vel ad malum, quemadmodum & in radicalibus: veruntamen illud nō accidit ex influxu corporum celestium, sed ex impetu morbi vel virtutis. Et sunt isti dies tertia, quinta, nona. Ex quo scire potes qꝫ in secunda periodo vniuersali & tertia, non sunt huiusmodi dies: quoniam solæ feb. perperacutæ, vel peracutæ, vel acutæ sunt impetuosus motus, quæ necessario sub prima periodo terminantur. Dies autem indicatiui, vt ait Gal. loco supradicto, cōsimili modo distinguuntur, scilicet quoniam aut sunt radicales, aut accommodatæ, aut intercidentes. Dicimus aut radicales: quoniam fortis, aut veridica est earum indicatio: cum sint dies indicatiui, in quadris, siue septimanis: vt est dies quarta, quæ indicat super 7. et 11. quæ indicat super 14. & 17. quæ indicat super 20. Et vniuersales sunt omnes huiusmodi dies quos creticos per accommodationē dicimus in secunda periodo vniuersali et tertia: quoniam sicut dies quadragꝫ est radicalis in cretican do, ita dies quaternorum est dies radicalis in indicādo super quadram proximā sequentē. Dies vero indicationis per accommodationem dicimus: quoniam quædammodum creticatio propria quadrarū accommodatur diebus quaternarū (vt iam diximus) similiter & econuerso virtus indicatiua propria quaternorum accommodatur diebus quadrarum: & huiusmodi sunt dies 11. qui indicat super 17. & 20. quæ indicat super 14. Et similiter est intelligendum de secunda & tertia periodo vniuersali. Dies vero indicationis intercidentes dicimus, in quibus est virtus indicatiua, sed non fortis: quemadmodū necqꝫ virtus creticādi. Et huiusmodi sunt dies tertia, quæ indicat super quintam, & quinta supꝫ 9. quodā modo. Et quædā

modum dies cretici intercidentes nō sunt in secunda, neq; in tertia periodo vniuersali: similiter neq; dies indicatiui intercidentes: quod quidem contingit propter tarditatem motus ægritudinum durantium vltra primam periodum vniuersalem. ¶ Est præterea sciendū q; tam vītus indicatiua, q̄ cretica certior atq; fortior existit in prima periodo vniuersali, q̄ in secunda vel tertia. Similiter & in prima hebdomada primæ periodi certior atq; fortior, q̄ in secūda vel tertia hebdomada periodi eiusdem: quoniam in huiusmodi periodo virtus ægri, et furor materiæ, & aspectus lunæ simul concurrunt ad creticandū atq; indicandū: In alijs vero periodis solus aspectus lunæ: quare manifestū est q; dies septima fortior est in creticādo, q̄ dies 14. quemadmodum et dies 14. fortior est q̄ 20. Similiter et dies quartus fortior in indicando super 7. q̄ 9. super 14. & ista est fortior q̄ 17. super 20. quod non paræ deseruit medico, qui vult diem crisis cognoscere, ante q̄ sit, & qui vult noscere futuram mortem, vel salutem: prout in proximo capitulo differemus. Dies autem intercidentes absolute nuncupamus omnes alios, qui neq; sunt cretici, neq; indicatiui, quocunq; modo: vēr si crisi. aut indicatio accidit in ipsis, timorosa est, & mortalis: quoniā nō fit in eis pugna ex aspectu corporum cœlestiū, neq; ex instinctu virtutis contra materiam morbi, sed ex impetu materiæ super virtutem: quoniam est motus pugnæ symptomaticæ nō naturalis. Et huiusmodi sunt 2. 6. 8. 10. 12. 16. 18. quantū ad primam periodum vniuersalem: & cōsimiliter est intelligendum de diebus proportionabilibus in secunda & tertia periodo vniuersali: propter quod ait Galenus tertio de creticis, q; dies septima assimilatur principi, dies vero sexta tyranno crudeli. Et quemadmodum inter dies creticos, similiter & indicatiuos sunt quidam

fortiores alijs in virtute bona: sic erit intelligendum de istis in virtute mala: qm̄ omnium deterior est dies 6. & post ipsam 8. et 12. minime vero malus est 16. & 18. sed medijs amborum sunt dies 13. & 10. quoniā aliquid bonitatis recipiunt a diebus creticis radicalibus sibi vicinis: quas propter in ipsis crisis accidit ad salutē.

¶ De præcognitione diei, qua crisis debet fieri, & per quam regionem, & an sit laudabilis, vel mortalis. Cap. V.

Q Vi scire desiderat crisim, ante q̄ sit, & eius regionem atq; qualitatem, necessarium sibi fiet, vt in scientia medicinæ sit pfectus, & apud experientiam eruditus: similiter & apud intellectum per naturam clarus: quoniā illud difficilius est in hac arte: quapropter ait Hip. 2. par. apho. Acutorum morborum non omnino certe pronuntiationes sunt nec salutis, nec mortis. Sed vt aliqd huius artis capiamus, quod medicorum princeps tradidit in tertio de crisi, fideliter inhærentes vestigijs eius scilicet incipiamus. Oportet medicum decem cautelas cognoscere, per quas ars prædicta comprehenditur: quemadmodum & conclusio perfecte scitur, nō nisi per præmissas. Quarū prima est, vt feb. cognoscat essentiam, an sit vehemens quæ cum crisi terminatur. Secunda vero est, vt qualitatem eius consideret, an cum suis accidentibus sæua sit an benigna. Tertia est, vt horas quatuor tam vniuersales q̄ particulares in feb. & in eius paroxysmo perfecte cognoscat, non solum quando sunt præsentēs, sed & cum sunt adhuc futuræ: & q; nequaquā dubitet, an status ægritudinis sit propinquus vel longinquus: quoniā penes statum omnis crisis indicatur. Quarta est, vt modum febris consideret, an sit febris peracuta, aut perperacuta, aut reuersiua. Quinta est, vt dies tam creticos

Tractatus secundus secundi libri.

¶ indicatiuos: similiter & eorum sortitu-
dinem secundum bonitatem & malitiā
nullatenus ignoret. Sexta est, vt crisim
cognoscat secundum essentiam & quali-
tatem, quod est: quoniam crisis aut est
laudabilis, aut illaudabilis. Dicimus
quidem laudabilem, cum fuerit in die
cretica, quam præcessit sua dies indicati-
ua, & sit post signa digestionis comple-
tæ, & sit cum purgatione sensibili atque
sufficiēti ad extra corpus omnino humo-
rum ægritudinem facientium non alio-
rum: & sic per regionē naturæ atq; mor-
bo congruentem, & sic cum accideribus
non fortibus vltimate. Crisim autem il-
laudabilem dicimus, cū qua deficit ali-
quod prædictorum. Quod si omnia defe-
cerint, aut in contrarium sint mutata, cri-
sim perniciosam appellamus. Et hæc oīa
iā diximus in ca. de crisis definitione. Se-
ptima est, vt tenorē virtutis agnoscat an
sufficiens, vel insufficiēs videatur. Octa-
ua est, vt ægri corporis habitudinē secun-
dum rarum & compactū: necnō eius &
complexionē naturālē, atq; ætatē, & cō-
suetudinē quomolibet dephēdat. No-
na est, vt exteriora non negligat, imo &
ipsa perpendat, q̄ sunt regio, atq; tēpus
anni &c. Decima est, vt signa oīa iā bona
quā mala circa ægrū in se. cognoscat cū
ipsorū numero & virtute. Et has quidem
cautelās oēs iā pertractauimus capitulis
supradictis. Verū tamen adhuc necessa-
ria est et cautela altera, quā addidit Aui.
vt scilicet cursus ægritudinis attēdat, an
scilicet per dies impares vel pares. Omnis
nanq; feb. de cholera vel sanguine putre-
scente, mouetur per impares: verbigrā,
Exacerbat die prima, & mitigatur in
secunda, & post hoc acuitur in tertia, &
mitigatur in quarta: sicq; procedit in suis
exacerbationib⁹, atq; paroxysmis vsq;
ad perfectam declinationem. Sed omnis
febris de flegmate aut melancholia, aut
sanguine non putrescēte, mouet per dies

pares: verbigratia. Moderate incipit ex-
acerbatio die prima, & fortificatur in se-
cunda: post hoc mitigať in tertia, & exa-
cuitur in quarta: sicq; procedit per dies
principij, augmenti, & status vsq; ad per-
fectam declinationem. Ex quo iam scire
possumus, q̄ omnis febris acuta moue-
tur per impares, chronica vero p̄ pares,
præter solam febrem synocham inflati-
uam, quę licet sit acuta in vltimo, moue-
tur tamen per pares: propter qđ dictū est
ab Aui. & proprie loquēdo, neq; p̄ pares
neq; p̄ impares mouetur: qm̄ nō est
proportionalis ad febrem aliquam interpol-
latam, sed est tota quasi sit in statu tem-
pore omni vsq; ad perfectam declinati-
onē post crisim fidam & completā. Feb.
vero composita mouētur motu materiæ
prædominātis in ipsis: verbigratia. Ver-
us hemitritæus per impares mouetur,
non verus per pares. Hæc autem caute-
la fuit ex hoc necessaria: quoniam crisis
non sit, nisi in die paroxysmi: vt ait Ga-
lenus tertio de crisi: quare volētem diem
crisis præcognoscere, oportet diem paro-
xysmi nullatenus ignorare. Redeundo
igitur ad principale propositum dica-
mus primo, qualiter valeat præcognosci
qua die sit crisis fieri futura, & post hoc,
qua hora eiusdem diei crisis debeat ter-
minari, & an ad mortem, vel salutem.
Et tertio dicamus, per quam ventura sit
corporis regionem. Dicit itaq; Galenus
tertio de crisi, q̄ si in feb. valde acuta ap-
pareant prima die signa perfectę digesti-
onis in vrina, cum constantia virtutis at-
que omnibus signis salubribus: tunc pro-
culdubio crisim faciet salubrem in die
tertia, vel quarta, vel ad plus quinta: &
proprie si causa morbi, ætas, & comple-
xio, regimen, atq; tempus anni fuerint ca-
lida vehementer, neq; ceciderit error su-
per ægrum vel medicum in regimine se-
cundum cibum & medicinam: sed virū
acciderit in die quarta vlt̄ quinta, p̄ quali

ratem ægritudinis deprehendes. Morbus nanq̃ ſæuus prius criſim faciet, q̃ benignus: quoniam virtus delicata eſt, neque morbum malignum poteſt diu tolerare: quare ſurget ad ipſum expellendum. Et ſubdit, quòd rariſſime fit criſis in quarta ira, q̃ Archigenes non vidit ipſam fieri niſi bis, ipſe vero ſemel: quoniam raro ſi unt feb. valde acutæ currentes per pares, frequenter vero per impares. Quod ſi canoem peruerterimus prædictum dicentes, q̃ ſi in prima die ægritudinis apparuerint ſigna vltimæ cruditatis, cum deſectione virtutis atq̃ omnibus ſignis malignis: tunc procul dubio fiet criſis mortalis eiſdem diebus: quoniam vt ait Hip. tertio prognosticorum. Idem terminus in febribus his quidem ad mortem, his autē ad ſalutem. Quod ſi quædam ſignorū apparuerint, quædam vero occulta fuerint cum vltimatione ſignorū bonorum vel malorum, hi quidem morientur, hi vero ſaluabuntur eiſdem diebus: vtri q̃ in diſſicilem exitum conſequentur. Dicit etiā Gaſ. tertio de criſi, q̃ ſi in ægro febriente feb. valde acuta non appareat in prima die ægritudinis ſigna manifeſta digeſtionis, neq̃ in ſecunda neq̃ etiam apparuerit eiſdem diebus aliquod ſignum timorofum, ſed omnia ſigna fuerint laudabilia cum conſtantia virtutis: deinde vero die quarta ſigna manifeſta digeſtiōis in vrina appareant, cū ſignis oībus laudabilibus aſſidue perdurantibus: tunc procul dubio criſis ſalubris ſuperueniet in die ſeptima, vel nona, & proprie ſi inter diem quartam & ſeptimam non fuerit erratum ſuper agro. Vtrum autem criſis terminetur in die ſeptima, vel tardetur ad nonā, poteris diſcutere ex qualitate ſe, & ætate ægri, atq̃ eius complexionis: qm̃ ſi oīa declinauerint ad caliditatem vehemētem, complebitur feb. in die ſeptima: ſi vero feb. remiſſior fuerit, & ætas ſenectutis aſ fuerit, & cōplexio ſlegmatica, differetur

vſq̃ ad diem 9. Quod ſi canoē peruerterimus dicētes, q̃ ſi in die prima ægritudinis aut ſecunda nō appareat ſigna cruditatis vltimæ, atq̃ appareant eiſdem diebus ſigna aliqua laudabilia vigorofa: deinde vero die quarta appareat manifeſta ſigna cruditatis, atq̃ indigeſtiōis cum deiectione virtutis, & ſignis omnibus timorofis: tunc procul dubio in ſeptima vel nona ſuperueniet criſis mortalis, & proprie ſi virtus ægri non varietur inter diem quantum & ſeptimum. Vtrum autem criſis tardetur vſq̃ ad diem nonum, vel compleatur in ſeptima, ſciſcipotēſt ex tenore virtutis, & complexione, & ætate & regimine conſueti temporis ſanitatis, & vehemētia morbi: quoniam ſi plura aut omnia ſignificent calorem aut agitationem ſubitam, fiet mors & criſis in ſeptima. Si vero talia fuerint mitiora, morietur in nona. Quod ſi quædam ſignorum apperuerint, quædam vero latuerint ſecundum bonitatem & malitiam ſignorum, ſimiliter & eorum fortitudines in ſignificando, fiet hic ad mortem vel ſalutem iudicandus. Poſteſt nāq̃ vnum bonum ſignum efficax, pluribus malis debilibus obuiare: vt ait Hipp. 3. prognosticorum. Dicit Gaſ. loco ſupradiſto, q̃ ſi in agro aliquo non appareant ſigna certæ digeſtionis ante diem ſeptimum, dum tamen ſigna alia omnia ſint procul a timore: deinde die ſeptima appareant ſigna digeſtionis certa, cum conſiſtenti virtutis, & ſignis omnibus laudabilibus, non elongabitur, quin criſis ſi da perfectæ & completa ſuperueniat in die vndecima vel decima quarta. Sed in quo illorum dierum illud accadat, diſcutiendum erit, ſicut prius. Quod ſi canoē peruerterimus in contrarium, certo ſciemus, quia fiet criſis mortalis diebus eiſdem. Si vero canoem mediauerimus, huic mortem, huic ſalutem dubiam promittimus. Dicit etiam ibidem Gaſen. q̃

Tractatus secundus secundi libri

si videris ægrum, cuius ægritudo non est inflammata, neq; vehemēter acuta, sed acuta absolute, & videris morum ægritudinis in diebus primis tardum, & est q; signa principij digestionis morantur tempore longo, & q; signa augmenti & digestionis manifestæ incipiunt solummodo apparere in die 11. reliqua autem signa omnia sunt procul a timore: tunc securi erimus, q; crisis salubris non accidet, nisi in die 17. vel 20. Inter quæ taliter distinguemus: quoniam si morbus fuerit lētus & complexio decliuus ad frigiditatem, & æger fuerit senex, & signa digestionis non valde fuerint adauctā in die 14. tunc crisis non accidet ante 20. Si vero signa fuerint permixta atq; ad caliditatem declinātia, & augmentētur plurimū signa digestionis in die 14. tunc in die 17. crisis fiet consummata: verum qualitercunq; res se habuerit, & quantūcunq; lenta fuerit febris acuta, aut signa digestionis parua fuerint in die 17. sunt tamen de signis certissimis, q; morbus 20. diem non pertraheret: quoniam hæc dies est terminus omnium ægritudinum vere acutarum. Quod si. canonem peruerterimus in contrarium omnino cū conditionibus eisdē, certi erimus, q; crisis mortalis accidet in eisdem diebus. Si vero canonem mediemus, huic salutem, huic mortē dubie promittimus: neque post diem 21. docet nos Gal. diem crisis agnoscere futuram, insinuans fortassis, q; post diem huiusmodi non fiet vere crisis, sed vel resolutio, vel crisis diminuta, cum qua morbus non simul terminatur. Ex quibus relinquitur manifeste, q; in solis se. acutis, est vere futura cognoscere, sed in feb. tropicis aut chronicis nequaq; nisi fortassis probabiliter ex consideratione virtutis. Cum autem ex huc vsq; dictis aliquantulum didicerimus diem crisis agnoscere, priusquam fiat tam mortalis q; salubris: volumus consequenter horam diei cognoscere, qua

crisis compleatur: verum quoniam crisis salubris non perficitur, nisi post statū paroxysmi: crisis vero mortalis terminari potest omni hora paroxysmi: quoniam vt ait Galenus tertio de crisi, potest quis mori in principio paroxysmi, in augmento, statu aut declinatione: idcirco horam crisis agnoscere, est horam mortis certificare. Sunt igitur ex ægris, qui multum debilitantur in principio paroxysmorum ex multitudine materiæ virtutem opprimētis: sunt alij qui maxime debilitantur in augmento paroxysmi propter pugnam & vehementiam, quæ fit inter morbum & virtutem. Tertij sunt, qui maxime debilitantur in statu paroxysmi propter accidentium furorem, & prauitatem ultimam. Sunt similiter & alij qui maxime lassantur in declinatione propter motum caloris naturalis simul cum calore putrido a centro corporis ad diametros omniquaq; quamobrem corpus resoluitur, & mollicatur, & cor infrigidat, & sic virtus deperditur in toto vel in parte: quæ si medicus a principio cognouerit, horā mortis minime dubitabit. Quæadmodum namq; crisis non accidet, nisi in die paroxysmi: similiter neque deterior pars crisis perficit nisi in deteriori horæ paroxysmi, vt ait Gal. loco supradicto. Verum tamen sciendū, q; non est possibile adeo certe atq; firmiter crīsim malā agnoscere, quando est, & antequam erit, quemadmodū crīsim bonam: quoniam crisis bona fit per naturam, quæ ordinatissime procedit in operationibus suis: crisis vero mala fit ex morbo, qui fit, & currit motu inordinato. Et iterum ex alio: quoniam crisis bona fida & completa vna sola via perficitur in omni ægritudine, quod est post signa digestionis perfectæ, & hora status vniuersalis, cum cōstantia virtutis, atq; omnibus alijs signis bonis apparentibus sine permixtione timoris omnino: Crisis vero nō fida, sim.

liter & crisis maligna modos habet varios, & velut infinitos: quapropter ait Gale, in de crisi, q̄ crisis fida & cōpleta est sicut metrū & mensura & regula crīsum altarum: quoniam non dicitur ipsarū ali qua bona vel mala, nisi quia multū accedit, vel recedit ab illa. Dicendum autem consequenter videret, quibus signis possumus agnoscere, per quam regionem crisis sit ventura: verbi gratia, an per sudorem, aut vrinam, aut alio modo sensibili quocunq;: sed illud iam plene distinximus in primo capitulo tractatus præsens: quare diligētes breuitatem in hoc tractatum finiamus.

TRACTATVS TERTI
us secundi libri, cuius sunt tria capitula: primum de cura venenorum in generali.



Venenorum duplex est genus quoniam aut sunt humanæ naturæ cōtraria ex tota sua substantia, quod medici proprietatem seu formam specificā appellant: vt sunt napellus, & spurtū viperæ: similiter & eius dentes, & cauda scorpionis, & sagitta toxicata: quapropter accidit (vt Gal, testatur in libello de malitiā complexionis diuersæ) q̄ quemadmodum vipera interficit hominem suo sputo: similiter homo viperam, & proprie in ieiunio, cū adhuc virtus eius non sit ex qualitate cibi minorata. Aut sunt humanam naturam corruptentia ex sua qualitate seu complexionē: Et ita quidem duorum modorum sunt: quoniā aut hoc faciunt per caliditatem vltimam incidendo & corrodendo membrorum nobilium substantiam, & proprie cordis, cui omne genus venenorum præcipue nititur obuiare: quoniā est sedes vitæ: similiter & officia venarum aperiendo, & nutrimentum cordis per fluxum

dyntericum educendo: cuiusmodi sunt calx viua, argentum viuum, auripigmentum, arsenicum, & proprie sublimatum & realgar & scamonea, atq; elleborus niger, & aloë, cum nō fuerint consolata. Aut hoc faciunt per suam frigiditatem vltimam calorem & spiritus condensando, & cursum eorum per venas & arterias prohibendo, & demum membra nobilia, & proprie cor mortificando: cuiusmodi sunt opium, hyoscyamus, mandragora: similiter & papauer nigrū, nix & glacies, & aqua veri frigoris, cū plurimum ex ipsis cito rapitur ad epar & venas: velut accidit post balneum aut astitū. Et genus quidem venenorum operantiū a proprietate differt ab alijs in pluribus: Primo quidem, quoniam ex sua malitiā vehementi non patitur, vt esse possit cibus vel medicina, qualiter cunq; consoletur. Secundo, quoniam humanam naturam destruit, siue per interius cū cibo aut potu assumatur, siue per exterius læsionem foris vel puncturam: quoniam & si modicum fuerit in substantia, eius tamē operatio est magna valde: quapropter accidit, vt ilico cum acciderit, corpus sentiat nocumentum: Alia vero mora indigent, atq; vicissitudine frequentata. Signa venenorum operantiū a proprietate, sunt antecessio rei suspectæ in cibo vel potu vel medicina, vel membris alicuius punctura, vel foris: post quod statim sequitur calor corporis vehemens cum angustia & sudore: similiter & rubor faciei, et citrinitas oculorum, & inflatio venarū, & fœtor plurimus cum siti perdurante: deinde cum ilico non subuenitur, & virtus veneni peruenit ad cor, accidit virtutis dissolutio frequens, & cadunt membra, & fit syncopis profunda, & moritur post illud homo. Quod si in membro aliquo morsus acciderit, vel pūctura, velut a vipera vel cane rabido, vel scorpione, vel a sagitta toxicata: surgit statim

Tractatus tertius secundi libri.

in tumore & fit dolor in eo fortis et fortis accidit alienatio rationis, et proprie si neruus fuerit latus, et fortassis fit syncopis, cum lassa fuerit arteria. Quod si non succurratur: denigratur membrum, & perdit sensum & motum, & demum corrumpitur in eo virtus nutritiva: quare putrescit, & mortificatur, & deinde mortificat membra vicina, donec pervenerit ad nobilia: tunc namque mortem universalem inducit. Signa venenorum operantium a qualitate calida, sunt antecessio rei suspectae in cibo vel medicina: post quod accidit dolor, & mordicatio in ventre plurima perdurans: licet res assumpta non credita fuerit illud facere: velut accidit cum mel crudum assumitur, & lac, cum in stomacho caseatur, & fructus frigidi, cum instillantur: deinde cum non subvenitur: fiunt fortassis omnia accidentia venenorum operantium a proprietate. Quoniam illud, quod plurimum accidit: est ut huiusmodi venena sint calida vehementer, & adiuvant caliditas eorum motum & operationem: & fit fortassis vomitus difficilis frequens, aut fluxus superfluus ventris, primo cholerae, post hoc flegmatis, & post hoc melancholiae, & post hoc sanguinis laudabilis, donec ad intestinorum corrosionem & dysenteriam perduxerit timorosa. Signa venenorum operantium a qualitate frigida, sunt antecessio rei suspectae in cibo vel potu, vel medicina, ad quam praeter solitum vel debitum statim accidit gravitas membrorum, & rigor corporis cum frigidityte. Post hoc vero succedit tarditas in motibus, aut spasmus aut tetanus, & demum suberth, & somnus profundus, a quo non potest excitari per tres dies vel plures. Quod si excitatus fuerit, illico clauduntur oculi, & dormit sicut prius: & durat hic somnus tempore longo, donec aut calor naturalis venenum destruxerit: (quare expergit a somno, & loquitur & movetur & sic qua-

dit) aut venenum destruxerit calor: quare nequaquam expergit, donec moriatur.

Methodus. Cura generalis venenorum omnium est duplex. Una quidem praevisiva, antequam venenum appropinquat corpori humano. Alia vero sanativa, postquam venenum impressit in corpus. Cura praevisiva est, ut qui timorem habuerit in assumptione rei venenosa (velut principes, magnates) non sumat cibos, neque potus, neque medicinas, nisi a persona sibi nota, & de qua confidit, & quae huiusmodi coram eo praestantur. Caveat praeterea a cibis & potibus habentibus saporem excellentem: utpote dulcedinem, vel acetositatem, aut viscositatem vehementem: quoniam in huiusmodi virtus venenorum est magis occultata. Sint eis vinum & aqua reposita diligenter in vasis obturatis: ne fortassis serpens, aut aranea potassent ex eis, aut demergatur in ipsis. Sumat omni septimana bis vel ter, s. theriae veteris electam, & proprie theriacalem de viperis cum vino puro, claro in ieiunio, vel cum aqua frigida, si calorem timeat ex ea & sit corpus calidum per naturam, aetatem, tempus anni, & regionem. Et assidue comedere super cibum nuces, ficus & rutae: quoniam a proprietate resistunt veneno, adeo ut si in cibo assumptum fuerit, aut virtus eius reprimatur, aut expellatur per vomitum, nec ex ipso corpore nocet: ut ait Galenus, de simplicibus medicinis. Et Rasius, in Alman. lib. 1. ca. de summa medicanda venena. Et idem operatur butyrum recens sumptum in cibo super buccella panis. Cura sanativa veneni operantis a proprietate, si fuerit a sumptum in cibo vel potu, est ut illico cum quis senserit mutationes non consuetas post assumptionem alicuius rei, quam hoc ex natura facere non deberet: sumat in potu aquam plurimam tepidam mixtam cum oleo et aceto, donec ex ea repleatur, & prouocetur vomitus cum digito, vel penna inuncta oleo misca in profundum gulae. Quod si vomitus

tardauerit: repleatur oleribus & piscibus salitis, & bibat de super vsq; ad fluentū ex aqua decoctionis rad. raphani, & seminis atriplicis, & anethi, addito modico aceti, olei, & salis. Quod si adhuc non succederit: suspendatur per pedes capite declinato, & confortetur, donec euomat ex cibis diuersis: quoniam vomitus fortis assiduus, est ex rebus maxime iuuariuis, quando venenum ebibitum extat adhuc in stomacho, nec descendit ad intestina, vel meseraicas. Post hoc vero considera, si in ventre sentiat aestuationem, fiat ilico suppositorium de salegemma, vel clystere acutum dictum ca. de stypticitate vētris, donec intestina omnia perfecte euacuetur. Tunc ergo prohibeat a somno pro posse, ne forte venenū ad interiora rapiatur. Et dentur ei confectiones frigida vice vna: vt est zuccarum ros. et diapapaueris, & zuccarum viol. & diarhodon abbatris, & rosata nouella. Dein de vero medicina bezartica, id est, liberans a veneno a proprietate vice altera, velut est theriaca vetustissima, et proprie theriaca Andromaci vel theriaca Ga. dissoluta in aqua frigida vel in aceto vñ in potu data. Huius nāq; vicissitudo virtutem veneni diminuit, & virtutem naturalem augmentat. Quod si sitis & calor superfluxerint: bibat aquam frigidā puram vel mixtam cū aqua ros. & aceto quantum voluerit, vel bibat lac acetosum: quoniam acuitatem veneni reprimat excellenter. Quod si per hmoi dolor non minoretur, opus erit narcoticis: quare gradatim ad ipsa procedat. Detur ergo in potu theriaca infra sex menses confecta: quā si non habeatur, dissoluantur in 3. r. theriacae veteris grana 4. opij, vel detur filonium recens. Quod si adhuc non succederit, augmentetur opium gradatim. Et si virtus consisterit, purgetur alternatim. Post hmoi narcotica cum medicina aliqua lenitiua, vt cassia fistula dissoluta

in aqua decoctionis prunorū viol. donec venenum & opium totaliter extrahant: & emplastre locus dolorosus cum semperuua, solatro & nenuphar. coctis in aqua perfecte, deinde expressis, & pistatis in mortario, & incorporatis cū aqua ros. & addito semine iusquiami, & solijs eius recentibus, si tēpus sit ad hoc. Et epithyme pectus rotū cū petijs lineis imbutis in aqua ros. frigida, postq̄ in ea pul. sandal. & ros. & camphoræ & terræ sigillatæ fuerit dissolutus: quoniam cor confortat, nec venenum ad se trāsire permittit. Similiter confortetur cerebrū & epa cum eisdem, & ponatur in aëre frigido, ventoso, & euenietur eius facies cum flabello, donec virtus exciteat. Si igitur post hæc omnia dolor vētris cessauerit, & virtus naturalis redierit: regatur ex carnibus pullorum & hocotum coctis cum lactu cis & portul. & cucur. conditis cum aceto vel agrestia, vñ succo berberis, vel granatorum, vel trifolij, vel succo acetosæ. Vtatur ex fructibus frigidis, prunis & cerasis lapidis post cibum. Bibat vinum ponticum, vel mixtum cum aqua clara, donec ad perfectam redierit sanitatem. Si vero post hæc omnia virtus naturalis defecerit, & syncopis frequens superuenierit, aut dissolutio membrorum: significat quoniam virtus veneni transiit ad cor: quare prognosticis derelinquat. Cura sanatiua veneni a qualitate calida operantis sumpti in cibo vel in potu, est eadem omnino cum prædicta: præter quod oportet, q̄ sint in ea clysteria lenitiua nō acuta. Sed & hoc est addendū, q̄ si fluxus vētris fortis supuenerit, restringat pro posse: sicut docuimus ca. de fluxu vētris. parag. de cura fluxus supfluētis propter medicinā effreniter laxantē. Cura sanatiua veneni opātis a q̄litate frigida assumpti p̄ interioris ē, vt fiat vomitus statim a principio, sicut dixim⁹, vicibus frequētis. Et clysterizet post hoc cū clysteribus

Tractatus tertius secundi libri

acutis, fortibus, calidis, attractiuis, quæ diximus capit. de stypticitate ventris. Et emplastrerur stomachus & intestina cū emplastris calidis, dictis capitulo de debilitate digestionis stomachi: & prohibeatur omnino a somno, trahendo ipsum per capillos, & faciendo sternutationem cum pipere vel condisi. Et dentur ei in potu confectiones calidæ cum vino veteri amaro: sicut est confectio anacardina, dicta cap. de apoplexia, & diamargariton, & diatrion pipereon: & ex melioribus rebus est theriaca vetus. Frictetur corpus totum vehementer cum pannis asperis ad ignem calefactis: & ponatur in loco calido luminoso, donec cessauerit a somno: tunc nutriatur ex alijs & cepis, & mica panis imbibita in sinapi & melle simul mixtis, vel in formam saponis. Et sitim ei pro posse inducas, & laborare, et sudare facias in ieiunio, vsq; ad perfectam sanitatem. Cura morsus vel puncturæ ex animalibus venenosis vel puncturis vel sagittis toxicatis, est vt statim a principio & proprie intra tres dies stringatur membrum ligatura forti supra locum lesum: ne virtus venenosa transeat in corpus. Et ponatur super locum vêtosa lata cum stupa ignita, donec attrahat vehementer: & si conferens videatur, fiat scarificatio circumquaq; deinde ponant puluui viui scissi per medium super locum: qm̃ membrum fortificant, & venenum ad se trahunt. Deinde emplastrerur cum emplastris rubificantibus factis ex stercorebus columbarum & ficubus, & sinapi & cepis crudis simul incorporatis, & actu calidis positis super locum. Et ex vehementer attrahentibus, est vnguentum fuscum actu calidum illinitum: aut cantharides incorporatæ cum vnguento apostolicon, vel cum fermento. Ex attractiuis igitur huiusmodi, fiat alteratio frequentata, & sis audax in attrahendo: quoniã siue morsus fuerit venenosus, siue non, fiet conse-

rens cum virtute. Sed ante huiusmodi attractum, similiter & post, liniatur theriaca electa sup vlcus, & intra circūquaq;. Et eisdem diebus prohibeatur a somno superfluo pro posse: ne forte venenū cū spiritibus ad interiora corporis rapiatur: neq; permittatur vlcus consolidari quocūq; modo, sed ponatur in eo succus caulis recentis vbletæ cum aceto & sale & sinapi tritæ & confectæ cum melle, aut succus alli et cepæ crudæ, aut aliqd aliud acutorum: donec patiens omnino in membro nullum senserit nocumentum. Neq; negligatur membrum sanū circūquaq;, sed a principio confortetur cum emplastris percussiujs factis ex cancris contritis cū corticibus & solatro, & semper uiua, aut cum aqua ros. & terra sigillata, & bolo armenico. Et sumat de theriaca bona om̃i die aliquid cum aqua frigida statim a principio vsq; ad tres vel quatuor dies. Quod si intra hos locus corrumptur, & vlcus discoloretur, oportet vt cū ferro ignito cauterizetur vsq; ad profundum valde: vt totum locū obrineat viciatum: quoniã malitiam veneni resoluit, et escharam duram faciet intra labia circūquaq; ne venenum valeat pertransire. Post hoc vero tempus non videtur cauterium cōferre: quoniã venenū perambulauit membrum circūquaq;: quod quidē cognoscēs ex coloris sui denigratione, & sensus & motus priuatione: quare oportet vt totaliter a corpore reserectur, si fuerit membrum possibile truncari: velut sunt manus & pedes. Quod si non fuerit possibile, nullatenus curatur, sed fortassis cum blanditijs vita per dies aliquot prolongatur cum vnguentis frigidis stypticis vehementer, quæ diximus ca. de malitia cancri reprimēda. parag. de apostematibus mēbri in matrice. Veruntamen est sciendum, qd ex moribus animalium venenosorū, sunt quædam in quibus conferunt medicinæ calidæ, quas

hoc vero sequatur localia prædicta. Nutriatur carnibus elixis, non fumigatis, & iuribus eorum: bibat aquam puram, vel vinum debile lymphatum vltra medietatem. Abstineat a cibis acutis: vt sunt cibi, in quibus ponitur multū salis, aut piperis, aut sinapis: similiter & ab acuminibus vt sunt acetum, agreſta, allia, cepe & porri: quoniam sola dulcia vel aquosa generant sanguinem nō mordacē.

Emperica. Furfures capitis, & scissura capillorum ex eisdem fiunt causis: quare vt plurimum simul accidunt, & curantur cum eisdem: & ipsa iam diximus ca. proximo præcedenti. Furfures præterea fiunt in capite, quemadmodum scabies sicca pruritiua super corpus eorū: quare cura scabiei, quæ dicitur proximo sequenti cap. præsentibus sublimiter suffragatur.

Prognosticatio. Furfures cum fuerint fortes et difficiles, præparant ad lepram.

De pruritu & scabie corporis.

Cap. III.

Cum supra corpus totum dominatur mala complexio diuersa calida sicca adusta, generantur humores acuti, ex quibus cum in membra fluxerint: fiunt humiditates nitrosæ mordaces. Et siquidem hæc mala complexio fuerit sine materia omnino, vel cum materia pauca, sicut cum est parua recens, facili: accidit ex ea dispositio cutis velut furfures aut squamæ siccae, quā quidē dispositionem pruritum, aut scabiem siccā vocauerunt. Cum vero ista complexio fuerit cū materia plurima, sicut cum est fortis antiquata: accidit ex ea cutis dispositio cum bothor, ex pustulis diuersis, quā scabiem humidam appellarunt: & fit cū ea multitudo pediculorū & lendium, qui ex huiusmodi materia generantur adusta, qualis est proprie cho. ru, vel nigra: similiter

& flegma salsum. Nā non fit flegma salsum, nisi per aduſtionem flegmatis naturalis plurimā vel cholerae permixtionē. Accidit autem hæc passio illis, qui plurimum vtuntur cibis acutis, vt pote, in quibus multum salis ponitur, aut piper, aut sinap. aut allia, aut cepe, aut vinū vetus, purum amarum, & caseus antiquus, & legumina omnia, & proprie lentes, & milium, & panicum: similiter & qui cibis facillime corruptilibus nutriuntur, vt piscibus, lacticinjs, oleribus, fructibus arboris, & proprie cum super ipsos mouentur motibus inordinatis, donec adurant, velut accidit in pueris gulosis: similiter & qui præter solitum & debitum negligunt ablutiones corporis a sordicie & sudore, & balneationes, & pannorum mutationes. Membra namque extrinseca & proprie cutis sunt per naturā debilia fabricata: vt omnis interiorum superfluitas ad exteriora propellatur: vt ait Gal. 6. de accidenti & morbo.

Methodus. Cura eius, cum est recens sicca facilis, solis indiget alterantibus ad frigiditatem & humiditatem: quare balneetur multoties in aqua dulci tepida pura, aut in aqua decoctionis maluarum, viol. althææ, florum chamomillæ, aut meliloti, aut in aqua decoctionis fumiterræ, & maluarum, & foliorum salicis & populi: quoniam resoluit & humectat cum lenitate: & in ipsa fricetur assidue ex farina fuisu. & fabarum, ciceræ & pisorū, addito modico aceti. Et post exitum a balneo inungatur ex vnguento albo vsitato, vel ex vnguento alio, quod iam diximus. Et huiusmodi balneationem cū inunctione viciſſim assidue diebus pluribus, donec curetur. Regatur cibus et potibus humidis valde sed frigidis moderate, ex quibus sunt carnes recentes laudabiles elixæ cum lactucis, cucurbitis, bletis, & similibus: & pulres ex farina similæ, vel ordeï, vel auenæ cum la

Tractatus quartus secundi libri

lacte dulci conditi. Bibat vinum album aquosum mixtum cū aqua plurima, vel hydromel aquosum, vñ ulep vel aquam frigidam puram. Abstineat ab omnibus acutis supradictis: similiter & ab acrum nibus vt sunt acerum & agrestia: nisi fortassis aliquid ex ipsis gustauerit gratia prouocationis appetitus. Abstineat etiā a dulcibus vehementer: sicut est mel, aut cibus vñctuosus: vt pote in quibus plurimum adipis, aut olei, aut butyri permiscetur: quoniam facile inflammantur, et in choleram conuertuntur. Sola nāq; insipida & aquosa, vel dulcia moderata, vñ acetosa non fortiora generant sanguinē non mordacem. Cura eius, cum est fortis antiquata, & cum qua vrina sit citrina vehementer, indiget a principio purgationibus humorum adustorum. Fiat igit in primis flebotomia basilicā dextrā, vñ sinistrā, si scabies regionem superiorem corporis occupauerit: aut saluatellā pedis dextri vel sinistri, si tenuerit inferiorē. Post illud vero vñtose partes scabiosā cū scarificatiōibus profundatis in balneo calido: quoniā huiusmodi flebotomia, et scarificatio extrahūt sanguinis massam adustam intus & extra venas residentē, necnon corpus refrigerant manifeste. Similiter et sanguifugā super membra sordida applicentur. Post ista vero omnia digeratur residuū materię, qđ neq; flebotomia extrahere potuit propter sui grossitatem, aut adhārentiam viscosam, neque scarificatio, nec sanguifuga educere potuit propter sitis profunditatem, cū syrupo de fumoterrā. Cuius descriptionē ponit Mes. in suo antidotario: duplicem scilicet maiorem & minorem: sed maior est melior, quā sic fit. ℞. myrobalanorū citrinorū, kebulorū. aī. 3. 20. vel myrobalanorū oīm v. aī. 3. 10. florū buglossę & boraginis violę absynth. cuscute. aī. 3. 1. ligurię, ro. aī. 3. 6. polypodij, epithym. aī. 3. 7. prunorū & passularum, aī. li.

℞. tamarind. cassiā. aī. 3. 2. hac omnia bulliāt in aquā lib. decē, vñq; dum deueniat ad tres lib. & cum succo fumiterrę recentis cocti & depurati atq; colati & zuccari. aī. li. iij. fiat syrupus, de quo potentur oīm die in aurora. 3. 2. cū 3. 4. aquā calidā. Et si volueris ipsum acuire: adde scamoneā. 3. 6. hic nāq; syrupus romachum, & epar, & splenem cōfortat: operationes aperit, icteritiam nigram & citrinam tollit, colorem corporis efficit bonum: morbos cutis sanat, & proprie quę materia sunt humores adusti, falsi: sicut est scabies, impetigo, serpigo, lepra, morphea: quoniam ipsorum malitiam corrigit atq; leniter educit quāq; die faciens bis vel ter assellare. Purgetur deinde cū pillulis de fumoterrā, quę sic fiunt. ℞. myrobalanorū citrinorū & kebulorū & indorum. aī. 3. 4. aloes epatici, epithym. aī. 3. 7. diagridij. 3. 4. Informentur pillulę cum succo fumiterrę, aut cum aqua decoctionis eius: & detur ex eis. 3. 1. & 6. sero cum itur dormitum sine cōena. Vel si pręsto aliud non fuerit, digeratur materia cū syrupo aceroso cōposito ex aqua decoctionis fumiterrę & prunorum siccorū, & vio. & purgetur cum hierapicra Gal. vñ lectuario de succo rosaceo laxatio. Post purgationes igit sapius reiteratas, procedatur ad remedia localia supradicta.

Emperica. Syrupus digerens materias adustas, similiter & educēs a quacūq; particula corporis nostri, sic fit. ℞. florū boraginis, florū buglossę, endiuę, epaticę, ros. violę cicoreę, cuscute, lactuę. aī. M. 6. florū chamomillę, meliloti, florū sambuci, corticis eis mediani, lappatij acuti & rotundi, scabiosę, rapij barhati, fumiterrę. ana. M. quantam partem, prunorum siccorū & passularū. aī. 3. iij. cassiā fistulę, tamarin. aī. 3. 1. fenę, thym. epithym. polypodij, aī. 3. 1. & 6. myrobalanorū citrinorū &

*Ex hīs quodam pruriginosus
supra ss. i. in melle
Joh. Spenning, 1794*

kebulorum & indoræ. añ. 3. f. scamoneæ, masticeis, añ. 3. 2. decoquantur sene, thymum & epithy. & cum modico bullierint, ab igne deponantur: ne fortassis eorū virtus ab igne resoluatur: tunc coletur, & syrupifetur cum lib. 7. zuccari: & de eo bibant omī die 3. 4. sine additione aquæ: quoniam fiet per se subtilis aquosus sufficiens. Item farmacum leuiter euacuans humores adustos a corporibus delicatis, est serum, vel lac acetosum, cum ex ipso bibitur lib. vna vel se, in aurora. Quod si parumper acueri volueris, infunde in ipso per noctem integram myrobalarum citrinorum & kebulorum. añ. drachmas duas, postquam pistata fuerint grosso modo, & posita circa occasum solis in ipso sero actu calido, & crastino colata & expressa diligenter. Pillulæ præterea nobiles ad idē, quæ pillulæ de aloenuncupantur. ℞. aloes boni 3. 2. myrobalarum indorum. 3. 2. senę epithymi, scamoneæ, masticeis añ. 3. semis, informetur cum succo fumiterræ, vel apij, vel sero caprino: & detur ex eis a 3. 1. vsq; ad 3. 2. Electuarium ad idē quod diarob cū turbith appellatur. ℞. turbith albi & electi. 3. 1. zinzib. 3. f. gariofi, cynamomi; añ. 3. 2. diagridij. 3. 1. zuccari lib. 1. & detur ex eo. 3. f. vel 3. 6. Puluis ad idem. ℞. turbith, drachmas duas, reubarbari drachmam vnam, hermodactylorum. 3. 1. & semis, zinziberis, 3. semis, zuccari. 3. 2. & sit totum dosis sua. Et si reubarbarum habere non poteris: pone diagridij quantum est medietas ipsius. Vnguentū cutim mundificans a pediculis & scabie, sic fit. ℞. argenti viui extincti, cadmiæ, argenti, arsenici rubei & citrini, scabiosæ, ellebori albi, statifagriæ, hermodactylorum, lithargyri, salis, sulphuris añ. quantū volueris de omnibus vel de quibusdam: terantur omnia subtilissime, & cum oleo vel axungia vel aceto vel succo absynthij, vel vino conficiantur in for-

mā vnguēti, & ex ipso corpus inungat pluribus diebus in loco calido, & proprie post purgationem: deinde sordities diligenter in balneo abstergantur. Est namq; tanræ efficacix, vt ipsum per se solum cum balneo sæpius refricatum excuset medicum a purgatione. Et si cingulus vel ventris ex eo liniatur, liberat a lēdibus & pediculis deferētem. Et si magis ipsum stypticare volueris, adde modicum ceræ & terebētinæ, & ex albuminibus ouorum. Est namq; fere continēs omnia simplicia putredinem prohibentia, & vermes natos ex putredine perneccāia, præter aloen & fel & myrrham: quæsi placuerit, apponantur. Balneum præterea materias scabiei resoluens, atq; corpus pulchrificans, fit ex aqua decoctionis scabiosæ, fumiterræ, florum chamomillæ, apij, statifagriæ, meliloti, lappati acuti et rotundi, & tapsi barbari: vñ ex aqua calida, in qua sulphur, & sal, & alumen dissoluta fuerint: vel ex aquis tinarum: quoniam sunt sulphureæ vel aluminosæ per naturam: quæadmodum & aqua maris amara est atq; salsa per naturam.

Canones. Hæc passio cum nō accidat (vt diximus) nisi post malā complexionem calidam & siccam adustam, videtur necesse, vt cum ipsa corporis habitudo fiat gracilis extenuata, imo & illud est conuenientius: vt quando corpus præter naturam cōperit extenuari, scabies & pruritus assequatur: quemadmodum ostēditur in decrepitis & conualescentibus post ægritudines diuturnas. Ex quibus scire potes, q̄ ars impinguan di corpus macrum (quam scribemus inferius proprio ca.) præsentibus sublimiter suffragatur.

Prognosticatio. Scabies & prurigo cū fuerit fortis, difficilis, antiquata lepram significat assuturam. Item scabies cum accidit infantibus aut pueris paruulis curari non debet: quoniā

Tractatus quartus secundi libri.

fortitudinem virtutis naturalis, & mundificationem sanguinis menstrui significat in poris corporis derelicti, & a lepra futura præseruat. Item scabies cum accidit in corpore post ægritudines diuturnas aut acutas cum alleuatione viscerum & membrorum interiorum, & constantia virtutis, & bonitate appetitus, crâsim significat salutarē: Si vero grauitas in interioribus remanserit, aut morbi longitudo, aut recidiuā significat affuturam: nisi forassis patiens errauerit in die, et cibum superfluum assumpserit: qui cū imperfecte digerit̃, in scabiē transmutatur: quemadmodum accidit patientibus appetitū caninū. Vnde Hippo. 4. par. ampho. Quibuscunq; febribus longe, his pustulæ & dolores in articulis fiunt. & statim post ait: Quibuscunq; ex febribus resurgentibus aut pustulæ aut dolores in articulis fiunt, ij amplioribus cibis vtuntur. Item dicit Hippo. sexta parti. apho. Latæ pustulæ non valde pruriginosæ fiūt. Item si corpus scabiosum urinā habuerit laudabilem, atq; bene digestam, secundum substantiā, sedimē & colorem, & egestionēs similiter naturales secundū quantitatem, & colorem cibo proportionaras: certificat interiorē corporis munditiā, & virtutis naturalis bonitatem: Si vero contrariū apparuerit, materiæ multitudinem, & purgationis significat necessitatē. Vnde Hippo. ij. parti. apho. Quibus fauces ægrotant aut pustulæ nascunt̃ in corpore, cōsiderare egestionēs oportet si, n. cholericę fuerint, corp⁹ ægrotat: si vero similes sanis fuerint: certū est corpus nutriti: Item corpora scabiosa cacochymica non impinguantur, anteqam purgentur: quoniam eorum cibus totus conuertitur in materiam corruptam, cui in corpore permiscetur, præterquam eius modicum necessarium ad vitam. Vnde Hippo. ij. parti. apho. Non pura corpora quanto magis reficiēs &c.

De lepra. Cap. III.

Lepa est morbus vniuersalis corporis totius, proveniēs ex dñio melancholiæ nō naturalis plurimā super humores atq; membra, ex qua quidē color ipsorum inficitur, & forma, & figura corrumpit̃, & alteratur eorū cōplexio, & lædūtur operationes naturales, & fortassis soluitur eorū cōtinuitas, ita vt vlcerentur, donec cadant: qm̃ est velut cancer vniuersalis: quemadmodū & cancer est velut lepra particularis: vt ait Auicē. 4. canoñ. cap. præsentī. Dicamus aut̃ fortassis, q̃ melancholia non naturalis est duplex. Vna quidem genita per aduersionē humorū, & est illud quod accidit vt plurimū: & hæc est membrorū corrosiua vehementer, & proprie cum fuerit ex humoribus calidis ante aduersionē, qui sunt cholera & sanguis. Alia vero genita per humorum condensationē, & est illud quod accidit perrarū: qm̃ vt ait Gal. 2. de complexionibus: Sapius est in nobis calidum adurens, q̃ frigidum congelās: & hæc nō est membrorū corrosiua vlt̃ modicum, et proprie cum fuerit ex humorib⁹ frigidis per naturā, qui sunt flegma & melancholia. Et huiusmodi quidem melancholia nō naturalis morbos efficit diuersos, modis tamen varijs & diuersis: qm̃ aut colligitur in mēbro vno, aut vero super corpus totum. Et si colligitur in membro vno solo, fit hoc dupliciter: quoniam aut si git̃ in eius profundo, dū currit ad ipsum per venas & arterias proprias, & sic efficit apostemata corrosiua: cuiusmodi sunt cancer, zepherios, & herpes esthiomenus, quæ differūt inter se. Quoniam si melancholia non naturalis fuerit adusta grossa fit cancer: si subtilis adusta fit herpes esthiomenus: Si frigida congelata fit zepherios, duricies nominata: de quibus nos iam expediuimus quantum intentionis nostrę fuerat, capitulo de apostematibus in matrice, Aut spargitur super eius su-

Perficiem, donec perueniat ad cutim, & ſic efficit albaras, & morpheam, & al-
 gueſcit: quarum diſtinctio inter ſe inferius
 proprijs capitulis apparebit. Cum autē
 ſpargitur ſuper corpus totū intus & ex-
 tra venas, fit etiā hoc dupliciter: quoniā
 aut putrefcit, & reſoluitur, & ſic efficit fe-
 brem quartanam: aut non putrefcit: nec re-
 ſoluitur: & ſic lepram inducit. Ex quibus
 ſcire poſſumus, q̃ lepra in ſe aggregat vi-
 tia cæterorū. Eſt nāq̃ illud lepra in toto,
 quod cancer in parte: eſt autē illud in car-
 ne, quod morphea in cute: & eſt illud per-
 manens, quod eſt in quartana deficiens.
 Quapropter a medicis mala infirmitas
 nominatur: quoniam & ex eius cōtagio
 corpus ſanum maculatur. Sunt autem le-
 præ, quemadmodū & morborū materi-
 alium omnium tres cauſæ, quæ ſunt pri-
 mitiua, antecedens, & coniuncta. Cauſa
 primitiua eſt aduſio aſſidua in ſole cali-
 do, vel ad ignem, & coitus ſuperfluus, et
 labor, & fames, & ſitis, & vigilia, &
 vſus ciborū acutorū, & vini veteris ama-
 ri. Hæc em̃ oīa ſanguinis maſſam peru-
 runt: vt plenius diximus capitulo de hæ-
 morthoidibus, & capitulo de mania ca-
 nina: quæ vero ſanguinem condensant,
 ſunt ambulatio aſſidua per niuem, & ha-
 bitatio ad ſeptētrionem, & incarcerationio
 inter muros, & ſomnus & ocium, & ab-
 latio coitus omnino, & vſus ciborū groſ-
 ſorum, & potus aquæ frigidæ vehemen-
 ter: hæc enim omnia ſanguinem conge-
 lant: Sunt tamen præter hæc duas cauſas
 aliæ tres cōmunes ad vtrunq̃, quæ ſunt
 habitatio frequēs inter leproſos, & coitus
 cū muliere leproſa, vel cū qua ante breui-
 tpe leproſus coiuuit: quare ſit vir leproſus
 aut ſæctus, aut vtrunq̃. Et nō oportet, vt
 fiat mulier leproſa ſemper in quā lepro-
 ſus proijcit ſperma ſuum: quoniam ma-
 tricis deſinitas illud prohibet: Et tertia cau-
 ſa, quæ eſt omnium potiſſima eſt coitus
 cū mēſtruata: quare ſit puer leproſus, qm̃

vt ait Auerro. 3. collt. vt plurimū in eſt
 hæc paſſio ex gñatione, & raro per accu-
 ſionem: quare difficilis eſt curæ. Fœtus
 enim cum concipitur hora menſtruorū,
 aduſionem aut cōgelationem recipit in
 ſua ſubſtantia, quæ apud ſinem iuuentu-
 tis, & proceſſum ſenectutis q̃ plurimum
 roboratur, donec exterius manifeſtetur
 in corpore, & lepram inducat: velut ſer-
 mentum cum per diem & noctem in pa-
 ſta laſcitauerit. Aetas nāq̃ iuuetutis, eſt
 tempus aduſionis. Aetas vero ſenectu-
 tis, tēpus frigiditatis & ſiccitatis per na-
 turam. Cauſa vero lepræ antecedens, eſt
 mala complexio calida ſicca, vſ frigida
 ſicca corporis totius, incipiēs ab epate &
 corde, a quibus fluit virtus nutritiua me-
 diantribus venis & arterijs in corpus vni-
 uerſum: quare multiplicatur humor me-
 lācholicus, & ſanguis groſſus in eiſdem:
 ad quod nō parum efficit ſplenis oppila-
 tio, ſeu debilitas per naturam. Cauſa au-
 tem coniuncta eſt, cum humor huiusmo-
 di perfecte aduritur, aut condenſatur, do-
 nec in melancholiam non naturalē con-
 uertatur, quæ eſt quadruplex, ſicut & le-
 præ ſpecies quatuor famoſæ ſunt. Cum
 nāq̃ ſanguis aduritur, alopecia nuncu-
 patur. Cum vero cholera, diciſ leonina.
 Cum autē alteratur ſlegma, tyriam vo-
 cauerunt. Et cum melācholia naturalis,
 elephantiam appellarunt: quorū omniū
 curam & acciētia per ordinē dicamus.
 Signa lepræ communia trahuntur a tri-
 bus, quemadmodum & acciēdens eſt triū
 generū: vt ait Gal. 3. de accidente: & ſunt
 qualitas corporis mutata a qualitate, &
 exiens mutatum, & actio mutata. Et ſi
 a qualitate ſic. 9. numero colligunt: quo-
 rum primum eſt color totius corporis, &
 proprie faciei: qm̃ oportet, vt ſit rubeus,
 obſcurus, tuberoſus cū refulgētia quadā:
 velut corij torrefacti præter debitiū & ſo-
 litū. Secundum ſignū, eſt diſpoſitio ocu-
 lorum et palpebrarū atq̃ ſuperciliorum:

Tractatus quartus secundi libri

quoniam oportet, vt sint rotundi cū grossitie & duritie palpebrarum, & nuditate superciliorum vehementi, & perturbatione in albuginibus ipsorum ex liuiditate, vel fuscedine cōmixta, cum venis tuiheis plurimis in angulis ipsorum, velut in cane rabido seu leone. Tertium vero signum, est dispositio labiorum oris emines cum plumbeitate, prater q̄ sit ex natura. Quartum aut, est dispositio linguæ & palati: quoniam si linguam depresso, & intus aspexeris, reperies super radicē linguę, vbi pēdet vuula, similiter & in palato fissuras minimas, et grana velut milij colorū diuersorū, & proprie alba, v̄ citrina, vel rubea, foetentia, velut in porcis infectis. Quintum signum, est dispositio capillorum: quoniam cadunt, & sunt rari, atq; curti cū furfuribus in capite pluribus: q̄ si regenerantur, sunt parui subtilis, qui vix videntur, nisi cum perspexeris ad solem. Sextum signum, est dispositio corporis totius pruritua, scabiosa cū asperitate, & tortuositate, & nodositate, quæ sub cute reperitur, quando inter digitos tractatur, & proprie in facie & circa iuncturas. Et hæc qdē sex signa, sunt alijs certiora, ita vt cū simpl̄ fuerint nō faciēt errare. Septimū signū, est dispositio musculorum: quoniam ipsos reperies duros, graciles, & consumptos, & proprie inter pollicem & indicem manuum & in pulpis tibiarum. Octauum, est cutis tensio in toto corpore, & proprie super spondiles dorsi, propter fortem siccitatem: quapropter si trahatur vel comprimatur, tarde redit ad figuram suam: & si aqua aut oleum superaspergatur, nō imbibitur, sed cito labitur sup corpus, quasi nō fuerit humectatum. Nonum signū, est dispositio corporis ad aërem cōtinentem: quoniam & si facile frigescant aut calefiscant ex debilitate virtutis naturalis, vt plurimū tamen frigescunt: quare plurimis indigent vestibus, & cameris ca-

lesactis: sed hoc est signum fallax: quoniam & omne ratum corpus, aut macrum per naturam retinet huiusmodi dispositionem. Si vero signa trahantur ab operatione mutata, sex quidem numero colliguntur. Primum, est vocis rauedo, & stricture anhelitus non accidens ex catarrho, vel alia causa manifesta, sed propter siccitatem & viarum anhelitus opilationem ex materia grossa cinerosa. Secundum, est insensibilitas membrorum extremorum, cum punguntur, aut vruntur, prater q̄ sit ex paralyti, v̄ cachexia. Tertium, est membrorum fornicatio tittilosa perdurans assidue sine manifesta causa, & proprie in fronte, et supercilijs, & naso, et maxillis atq; in dorso. Et hæc tria signa, sunt alijs certiora, quæ sequuntur. Quartum signum, est hebetudo pulsus: quoniam oportet, vt sit paruus, debilis, rarus, subtilis propter virtutis oppressionem, & organi siccitatem, nisi fortassis a principio, priusquam lepra confirmetur: quoniam potest esse fortis, magnus, velox propter necessitatem adauctam ex adustione vehementi. Quintum, est morum prauitas fraudulenta: quare facile irascuntur, neq; statim mitigantur, nec confidunt in aliquo, sed sunt auari, tenaces, & ad concupiscentiam vehementer inclinati. Sextū, est somni dispositio: qm̄ breuem & paucum habent somnum, ita vt ex qualibet leui causa excitent̄, & appareat in somno fantasmata nigra, timorosa. Quod si signa lepræ traxerimus ab exeunte mutato, sic quinq; numero colliguntur. Quorum primum, est foetor anhelitus, atq; corporis totius: velut foetor hircorum, & proprie in loco calido astuso. Secundum signum, est vrina parua, subtilis, radiosa, subcitrina in colore, oleaginea in superficie cum arenulis rubeis minutis in fundo: nisi fortassis a principio, cum nec adustio, nec opilatio fuerint consummata: quoniam potest illo

tempore grossa, rubea: vel citrina, vel karopos apparere. Tertium, est apparitio ulcerum sordidorum in volis manuum atque plantis pedum, ex quibus sanies aut virus foetidum, cœnosum assidue manat, neque consolidari se permittunt, cum sunt cancrofa, sed magis per diem & diē dilatantur cū pruritu vehementi. Et hæc quidem tria signa ex signis huius generis sunt magis certa. Quartū vero signū est, quod sumitur ab egestione: quoniam sunt (vt plurimum) vĕtres eorum sypitici, propter siccitatem, & egestiones liuidæ cinerose. Quintum signum ex sanguinis dispositione, & hoc quidem multipliciter: vno modo: quoniam hora illa, qua febrotomia basilicæ seu medianæ dexterae vel sinistrae egreditur sanguis niger, grossus, terreus, foetidus, & forte nihil egreditur: quā vulnus oppilat sanguinis crassitie. Alio modo: quoniam post eius receptionem in paropside, citissime condensatur, & post tempus modicum scinditur aut in partem grossam residētē, aut aquosam supernatantem separatur: sed certior est significatio, si scindatur. Alio iterum modo: quoniam si recens, cū per febrotomiā extrahitur: fundatur in aquā clarā frigidā, nullatenus cū ea permisceat, sed vel supernatat, vel ad fundum descendens inibi condensatur: velut sanguisugæ nigræ, minutæ. Et iterum alio modo: quā si recens coletur per pannum lineum densum, & digitis exprimaturs diligenter, reperies reliquias, velut grana milij minuta. Et iterum aliter: quoniam si recens cum aqua frigida pura dissoluatur in pelui tersa & mundata, reperies in fundo ipsius, post effusionem ipsius & aquæ grana milij iam dicta. Et aliter iterum quoniam si super ipsum aliquid salis asperseris, postquam constiterit in paropside, & liquor si quis supernatat, fuerit abiectus, nequaquam liquefiet, vel morose valde: quod quidem accidit pro-

pter sanguinis grossitiem atque siccitatem, siue sit adustus, siue congelatus. Et iterum alio modo: quoniam si super ipsum postquam constiterit omniquaque, fundatur acetum, aut lixiuium acutum, fortassis natabit, & bulliet super ipsum. Sed in egestione atque sanguine non cadit fides certa: quoniam consimiles eorum dispositiones reperiuntur in corporibus melancholicis ex morbo vel natura. Dicit præterea Rasis in diuisionibus, in capitulo præsentī, quod lepra habet tres gradus. Quorum primus est incipiens, & propter ipsam patiens non separatur ab hominibus: quoniam ipsa scilicet alopecia curam perfectam recipit, si medicus fuerit sapiens & studiōsus. Et signa eius, sunt raucedo vocis, et strictura anhelitus, & turbatio albedinis oculorum, & rubedo faciei, & tuberositas eius & paucitas pilorum, & casus eorum, & vniuersaliter omnia signa sumpta a qualitate mutata, atque ab actione læsa, cum fuerint remissa moderate, neque deteriora accidentia accesserunt ad ipsa. Secundus vero gradus est inualecens, & propter ipsam patiens ab hominibus separatur. Et signa eius sunt: quoniam raucedo fit fortior, & facies tuberosa, & digiti curuantur, & deturpatur forma, ita vt pueri ipsum fugiant, & spasmantur iuncturæ, & fiunt tuberosæ: & vniuersaliter, cum omnia si gna sumpta a qualitate mutata, atque ab actione læsa fuerint fortiora: sed quæ ab exeuntibus mutatis trahunt fuerint oīno nulla vel remissa: tūc nāque nequaquam perfecte curatur hæc passio: Sed cura, quæ est primi gradus sanatiua, fiet repressiua eius, ne cito peioretur. Tertius vero gradus est interficiens: quoniam non est eius cura, nisi mortis suspensiuā, & membrorum custoditiua, ne valde cito corrodatur, & decidat, sed morose. Et signa eius sunt, quā vlcerat corpus, et foetet, et currit virus ex

Tractatus quartus secundi libri.

membris vlceratis. Sed vt signa omnia perfecte compleamus, ad species lepræ proprias descēdamus. Signa igitur alopecie, sunt cū prædictis signis cōmunibus, rubor faciei plurimus, cū inflatione oculorum, & eorū lachrymositas cum rubore & tumore albuginis oculorum: & quæ fuit sanguis e naribus et gingiuis ex omni leui causa et apparatus venarum quindies in collo cū dispositione præfocatiua assidue, & multiplicatio pustularum rubearum humidarū super corpus totū, & vrina rubea grossa vinctuosa, & habitudo liuida carnosa, & ætas iuuentutis, & cōplexio sanguinea, & antecessio regiminis multiplicatis sanguinē ex vino dulci rubeo & carnibus salitis syluestribus, & ocio, & quiete: verum quā in hac specie capilli cadunt plurimum, alopeciam vocauerunt. Signa leoninæ, sunt cū prædictis signis cōmunibus color faciei citrinus vehementer, & vlcera fœda, pruritus in labijs oris & manibus, & partibus alijs corporis cum ardore vehementi, & multiplicatio serpentinis super corpus vniuersum, & vrina subtilis pauca citrina, & sitis vehemens, & prostratio appetitus, & habitudo corporis cholerica, & ætas iuuentutis, & regimen calidum siccū antecedens ex pipere, alijs & sinapi, & vngilijs, & fame, & siti, & labore assiduo, & potu vini veteris puri amari: & quā in hac specie fit maxime morum furiositas, idcirco leonina nuncupatur, vel quā plurimi leonum patiuntur hanc speciem: vt ait Auicē. Signa vero tyriæ, sunt cum prædictis signis cōmunibus color faciei subalbidus, parum deficiens a facie sano rum cum furfuribus in capite, & pruritu, & scabie sicca super membra faciēte cutim separari, velut squamas pisciū, aut spoliū serpentis: propter quod & tyria nuncupatur, & multiplicatio albaras super corpus totum: similiter & habitudo flegmatica, & ætas senectutis, & sexus

(vt plurimum) muliebris & regimē flegmaticum antecedens, & proprie ex piscibus salitis, atq; caleo veteri, & lacte acetoso. Signa elephantia, sunt cū signis prædictis communibus color faciei liuidus, & iuncturarum nodositas cum tortura & spasmo, & ineptia ad motus voluntarios, & multiplicatio morpheæ nigra super corpus totum: similiter & habitudo macra gracilis, & ætas senectutis, & complexio sicca per naturā, & antecessio tristitiæ & solitudinis assidue perdurantis. Et dicitur hoc nomine: quā in hac specie iuncturæ crurium & manuum fiūt plus rigida quā in alijs: velut accidit in cruribus elephantum.

Methodus. Cura huius passionis non diuersificat secundū suas species, sed tantū penes gradus, quod est: quoniam melancholia non naturalis, siue facta sit per aduersionem, siue per condensationem humoris cuiuscumq; fit grossa sicca frigida per naturā, ex eo quod ab ipsa resoluūt subtilē vinctuosum: veruntamen peccatum suę siccitatis est multo fortius, quā frigiditatis, nisi fortassis per aduersionē maximā caliditas accidentalis sit infixā, & proprie in lepra vlcerata: quapropter vniuersaliter cum rebus humectantibus corrigitur atq; impinguatibus pro posse temperatis inter calidū & frigidū omni quaq;. Cum igitur lepra fuerit in primo gradu, extrahatur gradatim pro posse grossus humor cū flebotomia & farmacia, & regeneretur humor subtilis temperatus cum successione ciborum humidorum. Modus autem extrahendi cum flebotomia fiet talis: vt ait Ras. in diuisione, capitulo præfenti. Quoniam oportet, vt in omni mēse fiat flebotomia basilicæ, vel medianæ cum incisione larga nō stricta retinente grossum. Ad quod plurimū confert sessio in tina aquæ dulcis tepida, vel aquæ decoctionis maluarum, violæ & altheæ ante flebotomiā immedie.

supra diximus: & est illud quod plurimū accidit. Sunt autem & alij, in quibus medicinæ frigida, videntur conferre solum: sed nos illud infra distinguemus, cum de moribus, & puncturis specialiter differemus proprio cap. Ponimus namq; calida in moribus timorosis, velut viperarū & canis rabidi: frigida vero in moribus paruis, velut apum et vesparum: quoniā non fit attractio ex ipsiis: sapiens tamen medicus id poterit cognoscere ex post ap parentibus, & iuuatibus & nocentibus: vt ait Gale. 12. de ingenio sanitaris: quoniam cū exemplastris calidis prædictis dolor & corruptio augmentatur: perueniendum erit ad frigida, quæ sunt ex solatio & tēperuua, similiter & ecōuerso.

Prognosticatio. Venenum operans a proprietate periculosus est omnibus, venenum vero operans a frigiditate debilis est omnibus: quare & multi euadunt ab eo: sed quod a caliditate, medium est ipsorum. Item omnia venena citius imprimuntur in corpus chole ricum largas habens venas, & membra mollia spongiosa, & quod est in ætate iu uenituti, q̄ in corpus diuersum ab hoc, præter q̄ venena operantia a frigiditate: quare & facilius curantur in eisdem, præter q̄ ea, quæ ex caliditate: vnde Hip. 2. partic. apho. In morbis minus periclitantur &c. Item syncopis aut dissolutio frequens et fortis superueniens, mortale. Item sudor frigidus, & pulsus paruus, debilis, inordinatus, similiter & anhelitus huiusmodi, mortalis. Item si vomitus & venter restringantur, neq; res exhibita expellatur, sed ad epar & venas rapiatur: mortale. Item alienatio aut spasmus, aut tetanus superueniens, mortale. Item si in punctura, aut morsu venenoso fuerit nervus læsus, aut arteria: mortale est vt plurimū, & proprie si læsio sit fortis: quare accidit vt musculus & iunctura cum pungūtur, sint plurimum timorosa.

De cura propria venenorum assumptorum per interius, vtpote in cibo vel potu vel medicina Cap. II.

Res venenosæ interficientes corpus nostrum, cū per interius assumuntur: sunt generum diuersorum. Sūt ex eis nāq; mineræ & plantæ & animalia cum partibus eorū, de quibus per ordinem dicamus breuiter, & proprie famosis vsitatis. **Lithargyrum** cū bibitur, apostemat totū corpus, & proprie lingua, & fit dolor fortis in visceribus, ita vt superueniat vomitus, & vētris fluxus & egressio vrinae simul hora vna, velut in ileo, & corrodātur intestina, & egreditur anus, & fit color corporis liuidus, vt color plumbi. Cura eius est, vt statim a principio fiat cura generalis venenorum operantium a frigiditate, ita vt nihil eorū prætermittat, quæ dicta sunt illic. Post illa vero omnia, si virtus fortis fuerit: sumat ex medicinis prouocantibus vrinam & secessum: quoniā cū egreditur sterlus & vrina vehemēter per se vel per artem sine violētia, plurima surgit spes salutis: quare in potu dentur grana 7. vel 9. scamoneæ vel diagridij 3. i. cum aqua mellis: quoniā facit fluxum festinare: Et de vice alia vinum albū aquosum, in quo cocta sint semen apij, petrosili: & aliquid absynthij: quoniam confortando stomachum & intestina, prouocāt vrinam. Et fortiora prouocantia, diximus capitulo de calculo in renibus & vesica. Et dixerunt experientiores, q̄ si post curam generalem & euacuationem dētur in potu 3. iij. myrrhæ cum vino, aut spica celtica cū stercore columbæ bibentis vinum, liberat a proprietate. **Cerussa** cum bibitur, accidit mollificatio membrorum, & infrigidatur cerebrum, & albifatur lingua, & rario permiscetur, & accidit tussis & singultus, & surgit dolor fortis in visceribus, ita vt quādoq; superueniat

Tractatus tertius secundi libri.

syncopē, & permutatur color corporis ad albedinem, & quandoq; mingit patiens sanguinem nigrū, & proprie quando frigidas vltimatur. Cura eius est sicut cura lithargy. Et si somnus grauis superuenierit, nequaquā dormire permittatur: qm̄ caderet in subeth & apoplexiā. Dixerūt præterea experimentatores, qd si post curam gñalē & euacuationē patiēs comedit sisamum aut semen lini, & bibat vinū verus clāg: super ipsum, curat a proprietate: similiter & muscillago scēnigrē ci, & seminis mal̄, & althea & psyllij, li poref. ¶ Vlsur, i. cinabari cū bibis: accedit dolor fortis et corrosio in stomacho & gutture atq; intestinis propter caliditatē vehementē, quā per aduersionē acquisiuit: quare sit fluxus ventris difficilis: ita vt quādoq; sanguis egrediatur. Cura eius est, vt statim a principio fiat cura generalis venenorum operantiū a caliditate: Post hoc vero sorbeat iura pinguis gallinarum, & comedat cibos vinctuosos temperatos in caliditate, velut est butyrum: quoniam lenificabit vias & faciet materias egredi per vomitum aut secessum. ¶ Zimar, id est, viride æris, cū bibitur: accedit dolor & corrosio in gutture & stomacho atq; intestinis: quare retinetur vrina, & fit fluxus dysentericus, & quādoq; vomitus: Deinde cū dolor fortificatur, infrigidantur extrema, & fit syncopis, et pfocatio. Cura eius est, vt statim a principio fiat cura generalis venenorum operantiū a caliditate: & si venter restrictus fuerit, lubricetur cū medicina lenitiua, vlt cum clysteri, quod fit ex viol. maluis, ordeo depilato, scēnigrā. psyllio, althea, & fistibus, coctis in aq̄ pfecte: de cuius colatura, & oleo violēt melle fiat clystere, quod actū frigidū sapius iniiciat. Quod si fluxus ventris superuenierit, pro posse restringatur. In fine vero rei, & post vomitum atq; euacuationem, sorbeat assidue iura vinctuosa gallinarū pinguiū &

porcellorū: similiter & brodia butyrofa. Bibat etiā sapius muscillaginē scēnigrē. psyllij, seminis althea, & seminis mal̄, et lini. Quod si fastidiosum & abominabile fuerit: bibat syrupū viol. aut iulep cū aqua frigida: & comedat butyrū crudū cū buccella panis: qm̄ dolorē lenit in visceribus: deinde bibat lac acetosum, & aquam frigidam, & vinū granatorū, & succū malorum acetosorū, & herberis & trifolij: qm̄ sua stypticitate prohibēt intestinorū corrosionē, et sic lenitiua cū stypticis alternetur. Et dixerūt experimētatores, qd vrina asini, aut fel capreoli, si ex ipsis 3. i. potetur cū aqua calida post curā gñalē & euacuationē, curat a proprietate. ¶ Calx viva cū potat: facit accidentia zimar. Et cura eius ē cura illius. ¶ Arsenicū vlt auripigmentū cū bibitur: facit accidentia zimar: & cura eius est cura illius. ¶ Gypsum cū bibis: facit accidentia cerussa vel lithargyri, sed fit in eo difficultas anhelitus maior: et cura eius, est cura cerussa. ¶ Alumen cū bibitur: facit tussim vehementem, q̄ cū perdurauerit, perducit ad phthisim paulatim. Et cura eius est cura phthisis in cibis et medicinis lenitiuis humectantib; & mūdificantiib; pspūtū, q̄re sorbeat om̄i die i ieiunio lac recēs alinæ vel capræ. Et comedat butyrū crudū cum buccella panis, & lābat per diem penidias, & zucarum albißimū: & cum tussis fuerit sicca, difficilis, bibat de syrupo liquiritiæ vel de hysope, quos dixim⁹ ca. de tussi. ¶ Squama ferri cū bibitur: accedit dolor & mordicatio vehemens difficilis in stomacho & intestinis, & quandoq; fluxus ventris superfluus, ita vt fortassis ad dysenteriam pducatur. Cura eius est, vt si fluxus ventris nō fuerit superfluus, detur in potu medicina solutiua recens cum lacte acetoso: sicut est drachma vna vel drachma semis diagridij vel vncia semis electuarij de succo ros. ita, vt materia expellatur per secessum.

Post hoc vero dentur in potu sorbitiones vnctuosæ dictæ in cura zimar vna vice post aliam assidue, donec dolor mitigetur. Quod si fluxus valde superfluat, restringatur; vt docuimus capitulo de fluxu ventris capitulo de medicina effreniter laxante. Et dicunt experimentatores, q̃ si venter restrictus fuerit, & dolor fortis, detur in potu drachma vna pulueris magnetis cum aqua calida: quoniam cōgregabit squamas separatas. Et post hoc per duas horas, dentur solutiuā, primo quidem lenia velut iura pinguis & brodia butyrofa: quoniam facient ipsas egredi per vomitum, ṽl secessum. Quod si lenia non suffecerint, ad fortia gradatim procedatur. ¶ Realgar cum bibitur: facit accidentia zimar, sed est malitiæ deterioris, & citius interficit. Cura eius est cura zimar: sed o quā parua est eius cura, cum iam impressa sit eius operatio, & superuenerit dissolutio virtutis, & syncopis profunda. ¶ Argentum viuū cum bibitur, silico egreditur cum dissolutione sua per inferiora: & si quidem fuerit non extinctum, lædit stomachum & intestina cum dolore & torsione atq; inflatione ex frigidityte sua actuali, priusquam egrediatur per inferiorem regionem: quare inflatur ex eo corpus totum, & retinetur vrina, & magnificatur lingua, & mollificantur membra omnia: velut in paralyfi & apoplexia. Si vero fuerit sublimatum, est nocituum valde, atque corrosiuū propter caliditatem maximā, quam per adustionem acquisiuit: quare inducit dolorem, & mordicationem vehementem in visceribus, priusquam egrediatur: & sequitur fortassis fluxus ventris sanguineus, & dysenteria perniciofa. Et cum funditur in aurem, siue fuerit sublimatum, siue viuū, est penetratiuum, incisiuū ex subtilitate suā substantiæ, & fluxibilitate: quare accidit in capite dolor vehemens, & permi-

xtio rationis: & quandoq; ducit ad spasmodum, & epilepsiam, aut ad mollificationem & apoplexiam propter lationem fortem cerebri & panniculorum eius. Et dicunt quidam autores, quod argenti viuū est frigidum, & humidum in quarto gradu: & quidam quod sit calidum & humidum in eodem. Et videtur nobis, q̃ vtriq; verum sapiant. Est namq; frigidum vehementer secundum suā actualitatem & operationem priam: quare est mollificans & paralyticum faciens, cum quis gestauerit ipsum tēpore longo, aut eius fumum (cum aduritur) attraxerit per nares. Est autem calidum vehemēter secundum suā complexionem & virtutem & operationem secundam: quare est incidens, & corrosdens, & adhuc magis cum fuerit sublimatum. Verum qualitercūq; res se habuerit est penetratiuum, & dissolutiuū ex modo suæ substantiæ. Cura eius est, vt statim a principio, cū bibitum fuerit: fiat cura generalis venenorum operantium a proprietate, quæ fere vna est & eadem omnino. Post hoc vero oportet considerare accidentia, quæ sequuntur: quoniam si sequitur fluxus ventris plurimus, & dolor fortis intestinorum, quæ significant: quoniam virtus calida dominatur in ipso super frigidam: dentur confectioes frigida dictæ ibidem gradatim procedendo, donec ad narcotica perueniatur, & restringatur fluxus pro posse: sicut diximus in capitulo de fluxu ventris, parag. de fluxu ex medicina effreniter laxante. Si vero sequitur paralyfis, & mollificatio membrorum, quæ significant quoniam virtus frigida dominatur in ipso super calidam: dentur confectioes calida, sicut diamargaritō, theriaca vetustissima, mithridatum. Et fiant quæ diximus in cura generali venenorum operantium a frigidityte. Et dixerunt experimentatores, q̃ in causa calida confert bibere lac capri-

Tractatus tertius secundi libri

num in plurima quantitate, & lac aceto sum, & exercitari super ipsum motu fortis assiduo: quoniam refrangeret eius caliditatem, & dolorem mitigabit, & expellet materias deorsum p secessum. In causa vero frigida, cōfert vna vice post aliā in potu sumere drachmas tres myrrhæ cū vino veteri amaro, aut hydromelle: similiter & vinū decoctionis absynthij hyssopi & ruta. Cum autem infusum fuerit in aurem, nequaquam agiteretur cum tēa vel radio: quoniam fieret magis furiosum, sed leniter inclinet patiens caput suum super aurem laſam, & saliat super pedem lateris eiusdem, donec egrediaſ. Et si non sufficit: prouocetur sternutatio cum pipere vel condisi, ita vt os & nares obturentur. Quod si adhuc non suffecerit, fiant omnia quæ diximus ea, de surditate, parag. de surditate, quæ fit ex recadente in aurem. Et sollicitetur medicus in eius euacuatione: quoniam cum non educitur, corrodit cerebrum, & piam matrē & demum interficit cū dolore vehementi. ¶ Napellus cū potat: apostemastru labia oris, & lingua, & egrediuntur oculi, & fiunt super ipsum vertigo & syncopis & tenasmon, & raro euadunt aliqui ex eo: quoniam est venenum a proprietate. Quod si subito non moriantur: cadunt in febrem hecticam aut phthisim: & sagitta illinitæ ex succo eius interficiunt subito, quæ tågunt. Cura eius si fuerit possibilis, est vt statim a principio fiat cura generalis venenorum operantium a proprietate. Post hoc vero detur in potu theriaca optima cum vino & musto: aut detur mithridatum, aut diamargariton, aut diamuschi cū vino decoctio. capparis, macis, & croci vna vice post aliam assidue: quoniam resistunt huiusmodi veneno a proprietate, si tamē resisti sibi poterit per artem quoquo modo. Et si vomitus tardareſ, possunt dari ante ipsum: licet tunc minus operentur. ¶ Euforbium cum bi-

bitur: facit accidentia zimar: & cura eius est cura illius. ¶ Tithymallus cū bibitur aut aliquid ex generibus lactis: fructu accidentia zimar: & cum facies aut manus ex eo linitur, surgit in tumorem, & discoloratur: velut facies leproforum. Et dicitur q. 3. ij. ex lacte huiusmodi inficiunt potatē. Sunt autem tithymalli iij. species famosæ, scilicet anabula, cuius succo vrimur: esula, cuius radice vrimur: & caraputia, cuius semine vrimur. Cura eorum omnium, cum in potu assumunt, est cura zimar in stypticando ventrem, atq; leniēdo dolorem: sed oportet, vt sit maior interior ad fluxum restringendum cū cibis & potibus & balneis, & clysteribus frigidis stypticis vehementer. Quod si dolor & corrosio fortis sit in visceribus, lenitiua cum stypticis alternentur: vt do cuimus ibidem. Et ex balneis vehementer stypticantibus, est aqua pluuialis, aut cisternæ, postq; in ea fractæ fuerint rosæ, balaustis, corti, granarorū, papaueris, folia & fructus rubi, pira pōtica, mala acetosa, mespila, sorba, gallæ cypressi, cupula gladium, folia vitis, agreſtis, berberis, & similia, in qua cum tepida fuerit, balnearer vsq; ad vmbilicū parum post parum: ne virtus ex eo debilitetur, & spargatur aqua ros. super faciem & pectus, & naribus instilletur. Ex cibis autem stypticis, sunt risum, panicum, citonia, sorba, mespila, pira, lentes ex corticata antebis coctæ reiecta prima aqua & expresse diligenter: similiter & pulres ex farina similæ conditi cum lacte vstulato. Similiter & caro pullorum assa, atq; condita cum cera recenti, & adipe renum caprarum, vel hircorum simul ad ignem in sartagine dissolutis & rotaris super assaturā. Ex potibus stypticis, sunt vinū rubetū pōticum mixtum cum duplo aquæ pluuialis, aut aquæ in qua ferrum ignitum fuerit extinctum, similiter & aqua decocti sumach, & mirrillorum cū zuccato ros.

dulcorata. Clysteria styptica pretiosa diximus cap. de dysenteria. Electuaria styptica bona diximus cap. de sputo sang. Et trochis. de karabe sublimes, ca. de mictu sanguinis. Cum autem lactithymalli linitum fuerit super faciem, aut membrum aliud, inungatur ex vnguēto albo famoso, aut citrino: quod si nō suffecerit: fortificetur eius virtus cum cerussa aut lithargyro. ¶ Mesereon & cocognidium cum sumuntur in potu, immoderato vsu & sine proprijs theriacis, faciunt accidentia tithymalli. Est autem mesereon herba, cuius folijs vtitur: sed cocognidium est semē eius, quod est malitiæ peioris. Et dicitur q̄ 3. 2. in potu exhibita sunt perniciosā: plus tamen vel minus secundū virtutem assumentis. Cura eorum est cura tithymalli. ¶ Scamonea & diagridiū cū bibuntur sine suis correctorijs, & vsu nō moderato faciunt accidentia tithymalli. Est autem scamonea dicta, priusq̄ assetur in citonio, vel torrefiat super lamina ferrea acuta: post hoc vero diagridium appellatur, & sic scamonea est malitiæ peioris: quare dicitur q̄ 3. 2. ex ea interficiunt potātem, plus tamen vel minus secundum virtutē assumentis: diagridiū vero vncia semis, vel circa id. Et cura eorū est cura tithymalli. ¶ Aloe cū bibit dosi superfluente, & cum additione piperis, aut sinapis, aut aliorū acutorū, & postpositione stypticorū, facit accidentia tithymalli, & aperit officia venarum, primo quidem meseraicarū, deinde earum, quæ sunt in substantia epatis, & post hoc in mēbris remotis: quare educit sanguinē bonum per secessum, & sequitur synco. & casus virtutis. Et cura eius est, vt ligentur extrema vehemēter, primo quidem superiora, deinde inferiora: & ponantur ventosæ siccæ magnæ super epar, stomachum & splenem, vt attrahant suctione fortī. Et post hoc ministrētur potus styptici, similiter & balnea, quæ diximus in ti-

thymalli cura. ¶ Elleborus cū sumitur in potu vsu immoderato, facit angustia circa cor & stomachū: & si fuerit albus, accedit vomitus fortis assidue, donec cadere faciat virtutē: si vero niger acciderit fluxus vētris corrosiuus, donec ad dysenteria perducatur. Et dicitur, q̄ albus interficit canes a proprietate: niger vero homines, si ex ipso 3. 2. vel tres sumantur. Cura eius est, cura tithymalli. ¶ Ciclamen cū bibitur vsu immoderato, facit fluxū vētris superfluere vehemēter. Et cura eius est cura tithymalli. ¶ Cucumer asininus cum succus eius bibitur dosi superfluente, facit ventrem currere vsq̄ ad syncope & mortem. Cura eius est cura tithymalli. ¶ Opium cū bibitur: accedit stupor & frigiditas extremorum, & singultus, & vertigo, & oculorum tenebrositas cū grauitate magna, & color faciei & labiorū oris & vnguū sit plumbeus: Deinde cū virtus eius magis impresserit: accedit difficultas anhelitus, & amissio loquelæ, & suberth, & spasmus. deinde præfocatio cum frigido sudore. Et dicitur q̄ 3. 2. vel iij. ipsius interficiunt potantem, & proprie si fuerit frigidus per naturam, vel ætatem, & ipsum potauerit cū modico vini albi & vaporosi, quod eius virtutē cito deleget per venas ad cor & cerebrum, præter q̄ resoluat. Si vero fuerit cholericus, aut sanguineus per naturā & in ætate adoleſcētiæ vel iuuetutis, do si indiger ampliori. Cura eius est, vt statim a principio fiat cura generalis venarum a frigiditate: Post illud autem, de rur in potu vna vice post aliam vinū decoctionis castorei & piperis: Et sumat ex theriaca optima, in qua aliquid balsami ponatur, si fuerit possibile, & comedat allia et nuces sup ipsum assidue: qm calefaciendo conferunt vehemēter: Similiter & vinum album vetus amarū bibitum in multa quantitate, donec sudet, et calefiat, & moueatur. Et dicunt experi-

mentatores, q̄ ista confectio est eius propria theriaca. **℞.** assā fortidā casto. pyrethri. piperis. myrrhæ. sauinæ. añ. quantū volueris de vino quocūq; terantur, & conficiantur cum melle, & detur ex ea assidue cum vino calido puro veteri amaro: similiter & quodlibet simplicium est conferens sua qualitate potēti. **¶** Nux mecha cum bibitur, facit accidentia opij: & dicitur q̄ 3. f. ex ea somnum profundum inducit. Quod si ad 3. 2. procedat, interficit cū somno. Cura eius est, cura opij. Hyoscyamus, cum bibitur ex semine eius, mollificatur corpus, & magnificatur lingua, & egreditur spuma ex ore, & rubet oculi, velut strangulari, & sensus obscurantur, & fit asthma, & permisceet ratio, & superuenit spasms, et epilepsia, & qñq; rugiūt voce horribili atq; rauca: & niger est in hoc deterior albus: verumtū vterque ipsorū est debilior, q̄ sit opij, vel nux mecha: ita vt fortassis 3. iij. vel quatuor ad minus efficiant accidentia predicta. Cura eius est cura opij omnino. **¶** Vna vulpina cum bibitur: surgit velut lactis sapor in ore bibētis, & induratur lingua, & color faciei offuscat, & superuenit vomitus, & singultus, & fluxus ventris dysentericus cum mucositatibus, & squamis intestinorū. Cura eius est, vt statim a principio fiat cura generalis venenorū oim, quæ est vt festinetur ad euacuationem subitam per vomitū & secessum. Post hoc vero sumat in potu lac caprinum vel asininū in multa quātitate, & moveat fortiter super ipsum: quoniam malitiā eius refrāgit, corrosionem prohibet, & ipsius reliquias euacuat per vomitum vel secessum: & si fuerit lac acetosū, aut lac vstularum, fortius operabitur hoc idē. In fine vero rei cum dolor et corrosio cessauerint omnino, detur theriaca, & elec. calida cum vino, vt alterent malam complexionem frigidam derelictā. Est namq; venenum huiusmodi mortificatiuum &

corrosiuium, sed maior cadit timor in corrodendo, q̄ mortificando. **¶** Fungus. Cum ex aliquo genere fungorum plurima quātitas sumitur in cibo, & proprie sine pipere aut alijs rebus acutis, & in corpore frigido per naturam, vel atate: accidit singultus, & pūctura circa stomachū, & difficultas anhelitus, & inflatur venter, & in frigidatur corpus totum, & minoratur pulsus. Deinde cū superfluit eius virtus, accidit sudor frigidus, et syncopia & moritur fortassis. Cura eorum est, vt statim a principio fiat cura generalis venenorū operantium a frigiditate, quæ cōsistit in euacuatione plurima per vomitū & secessū: post illud fiat cura opij supradicti. **¶** Psyllium cū recēs assumitur in potu sub multa quātitate, facit accidentia fungorū. **¶** Coriandrum cum recens comeditur in quātitate li. x. aut succus eius bibitur in quātitate quartæ partis li. x. facit accidentia opij. Et cura ei⁹ est cura opij omnino. **¶** Mandragora cum potatur sub dosi excedēte, facit accidentia opij, sed est malitiæ minoris: & cura eius est cura illius oīno. **¶** Cantharides cū bibuntur: accidit dolor, & corrosio in stomacho & meri & intestinis: ita vt qñq; sequatur solutio ventris, fluxus vehemēs & syncopa, & permixtio rationis, & dolor protēdit vsq; ad extrema corporis transiens per hypochondria, & inguina vsq; ad coxas et crura. Et hæc oīa proueniūt ex earū qualitate sola: verū qd ex proprietate accidit, est, vt siue per interius siue p̄ exterius misistretur in potibus vel emplastris, lædāt vesicam læsione vehementi, ita vt alteretur, & assidue appetat mingere: prater quod mingat, & qñq; mingit sanguinē purum modicū subtilē, cū venit ex vesica: & qñq; sanguinē purū plurimū nigū condensatū, cū ex renibus procedit: quare sit dolor maximus circa pectine & sumē, et inflat virga vehemēter. Cura earū est, vt statim a principio fiat cura gñalis

venenorum operantium a qualitate, donec tota materia evacuetur per vomitum & secessum: post hoc vero mitigetur dolor & corrosio intestinorum et stomachi fortificationibus lenitiuis vinctuosis, & clysteribus frigidis humectatiuis, quæ diximus in cura zimar. Quod si fluxus ventris superfluat restringat, sicut docuimus in cura tichymalli: deinde vero mitigetur dolor & corrosio, quæ fit in vesica & regionibus urinæ cum syrupo frigidis, & cum trochiscis de alkekengi, & cum collyrijs iniectis per syringam, & cum balneis & vnguentis conferentibus, quæ oia pro posse iam scripsimus cap. de vlcere & scabie in vesica: & cap. de ardore urinæ lib. i.

¶ **S**trasilagria cum bibitur dosi superfluen te, facit accidentia catharid. Et cura eius est, cura ipsarum. ¶ **S**tellio cum assumitur eius caro, aut bibitur liquor in quem ceciderit: fiunt accidentia cantarid, secundum isophagum, stomachum atque intestina, sed non secundum vesicam. Et cura eius est, cura cantharid. Hydrus cum bibitur eius caro, aut aqua in qua habitat, aut moritur: aut facit accidentia cantharid. Et cura eius est cura catharid. ¶ **R**ana seu bufo cum bibitur aqua in quam proiecerit saliuam, aut in qua moratur: inflatur corpus ex ea vehementer, velut in hydropisi, & fit eius color liuidus cum citrinitate permixta, & accidit dolor & angustia in stomacho & meri atque intestinis, & difficultas anhelitus, velut præfocati, & sensuum obtenebratio, & vertigo, & permixtio rationis: & cum eius malitiam impresserit magis, fit spasmus aut tetanus, & ventris solutio fortis, & vomitus, et emissio spermatis vna hora: post hoc superuenit syncopis, mortalis, & pauci saluantur ex ea: quod si quis euaserit, non retinebit dentes: & hæc est proprietas sua specialis ex mollificatione gingivarum, quam induxerit. Cura eius est, ut statim a principio fiat cura generalis ve-

nenorum operantium a proprietate, donec tota materia vel maior eius pars euacuetur per vomitum & secessum. Deinde procedatur ad curam proprietatis venenorum cum potu theriacæ veteris electæ, & mithridati, dando ex eis vice post vicem cum vino claro, donec malitia veneni refrangatur, & virtus naturalis confortetur. In fine vero rei considerentur accidentia, quæ remanserunt: & si remanserit ventris inflatio, detur diacurcuma maior & minor, & fiant omnia, quæ diximus capitulo de hydropisi, parag. de ascite sine fe. Si vero remanserit sensus obscuritas, & mollificatio membrorum: fiant omnia, quæ diximus ca. de paraly si per totum. ¶ **V**itulus aquaticus est vermis parvus longus, velut duorum cubitorum, coloris subalbidi, habitans in paludibus & ags corruptis, & creditur ab aspicientibus, quod sit pilus caudæ equinæ propter similitudinem ad ipsum: & cum assumitur in potu, facit accidentia ranarum.

¶ **L**epus marinus cum bibitur, facit accidentia catharid, & cura eius est, cura earum.

¶ **C**eruus: cum assumitur in cibo extremas caudæ ceruinæ, facit angustiam vehementem in stomacho & intestinis, & quandoque syncopim & mortem. Cura eius est, ut statim a principio fiat cura generalis venenorum operantium a proprietate, donec materia educatur totaliter, vel pro maiori parte. Post illud vero detur in potu vicibus frequentatis theriaca optima cum vino claro aromatico. Et dicunt experimentatores, quod ista confectio est eius pura theriaca. Ite euellana, fisticores, fellis equini, aut terantur, & incorporentur cum melle vel zuccaro, & dentur in potu vna vice post aliam cum vino prædicto.

¶ **F**el. Omne genus fellis cum assumitur in cibo vel potu est ex genere venenorum, & facit accidere vomitum cholicum & syncopim. Et dicunt, quod fel leonis aut leopardi inficit ilico potatæ: & fel canis aquatici, aut

Tractatus tertius secundi libri

canis tabidi cum sumitur ad quantitatē lentis, interficit infra 7. dies, quos si pertrāseat fiet spes salutis.

De cura speciali venenorum: proximorum per exterius, utpote mortuorum, vel punctura, aut vulneratio: ne cum gladio aut sagitta toxicata. Cap. III.

Res venenosa, quæ per exterius exhibitæ interficiunt nostrum corpus: sunt generum diversorum. Sunt namque ex eis mineræ, & plantæ, atque animalia, de quibus per ordinem famosiora atque utilia percurramus. Si videtur necessarium, ut unumquodque ipsorum operetur a proprietate: quoniam rarum est, ut virtute alia valeat corpus hominis trucidare. **N**apellus cum ex succo eius recenti gladius aut tela perungitur, interficit, quem reperit hora una: & non videtur ei cura possibilis. Quod si conferre poterit: est theriaca magna Andromachi, & post ipsam theriaca Gal. cum dissolvitur in vino vel aqua ro. & intra vulnus, & extra perungitur omninoque, & datur ex ea in potu una vice post aliam incessanter. Quod si per huiusmodi patiens senserit alleviationem: procedatur ilico ad curam generalem mortuorum & puncturarum venenosarum, quam diximus in fine cap. generalis, ubi etiam signa generalia certa atque infallibilia evidenter descripsimus. **R**e algar cum linitur super gladium vel sagittam vulnerantem, facit dolorem & corrosionem plurimam, ita ut si non succurratur, totaliter corrumpit membrum & eius operationem. Cura eius est, ut statim a principio fiat cura generalis supradicta, sed oportet ut emplastra frigida cum attrahentibus sibi positis alternentur, ne forte malitia veneni reddatur furiosa. Fiant ergo emplastra attractiva ex rebus calidis, utpote sicibus & sinapi & fermento

& stercore columbarum atque similibus, vice una, & emplastra mitigativa repressiva ex rebus frigidis, utpote solatro, lemperviuo, lactuca, cicorea, folijs papaveris, et similibus, vice alia, donec corrosio securetur: neque festinet medicus ad consolationem labicrum, donec tota malitia veneni radicitus exhalarit. **A**rsenicum sublimatum cum acciderit ex eo vulnus, facit accidentia realga: & cura eius est cura illius. **V**ipera cum morsum in quem fecerit dentibus, aut puncturam cauda sua, egreditur primo sanguis, purus: deinde per horam unam san. spumofus propter ebullitionem veneni, et post hoc virus citrinum, aut viride coenofum: quare surgit dolor vehemens, & apostematur membrum totum, & surgunt bothor & pustula minuta velut ab igne vel aqua bulliente. Verum cum ambulaverit eius malitia per corpus, inflatur, & fit rigor & frigiditas extremorum, non quia venenum sit frigidum, sed propter oppressi onem similiter & resolutionem caloris naturalis ex caliditate veneni: & quandoque superuenit vomitus citrinus, & singultus, et vertigo, et fluxus sanguinis narium. In fine vero sudor frigidus diminuitur, & syncope, donec mors infra diem seprimum (ut plurimum) subsequatur. Et masculi quidem sunt deteriores femellæ. & discernuntur ex hoc: quoniam masculus habet unum dentem solum, quare & facit foramen unicum ex utraque parte mentis: femella vero plures. Et iterum magni sunt deteriores parvæ, & senes iunioribus propter siccitatem suæ complexionis & famelici repletis, & irati mansueris, et motani paludinosi, & in æstate atque autumno peiores sunt, quam hyeme & vere. Et sputum eius cum sumitur in cibo, vel sanguis qui fluit ex cauda sua cum occidit, aut se ipsius, interficit ilico sumente, & inflatur ex eo corpus vehementer, & fit dolor & angustia fortis valde, donec

superueniat syncope & mors. Et dixerunt experimentatores, q̄ lingua viperæ cum siccat, & custoditur, ne putrescat: alteratur in colore, & citrinatur, & velut sudorem roridum modicum acquirit, cū venenum accesserit ad ipsam, et proprie cum ponitur inter res frigidas siccas moderate, velut est sal, & arena: quoniam tūc vapor venenosus magis sup ipsam aggregatur. Et idcirco super mēlas principum ponitur & magnatum. Cura eius est, cura generalis siue per exterius, siue p̄ interius obuiauerit: neq̄ reperitur scriptū aliquod certū & perfectum præter curas generales. Veruntamen empirici dixerunt, q̄ multiplicatio somni, & potatio vini boni plurimi, & vsus assiduus theriacæ optimæ intus & exterius, aut mithridati optimi confert specialiter in isto veneno propter resolutionem spirituum plurimam & maximam, quā efficit suo calore forti. Neq̄ dentur in potu confecti ones frigidae: quia calorem veneni aggrent, & naturalem debilitant vehementer, sed calide acutæ: quoniam venenum subtiliant, & resoluunt: sicut est theriaca optima exhibita cum vino plurimo veteri amaro, & modico aceto: similiter & allia & sinapis, & semen cicutæ, & assa foetida, & pyrethrum, & myrrha, & genziana, piper, castoreum, aristologia rotunda, & omnia coagula: proprie tamen coagulū leporis, & squilla, acorus, & alarum, ruta & oppoponacum, siue potentur, siue supra vulnus emplastrētur quoquo modo possibili conueniēti. Et ex emplastris bonis est illud quod fit ex pullis viuīs per medium scissis, & actu calidis frequentatis super locum: & quod fit ex ranis ficcis: & quod fit ex carne viperæ, si potest haberi: & quod fit ex fauina, & baccis lauri, & squilla assata, & farina orobi, & sinap. & florib⁹ chamomill. simul mixtis, & perfecte cōtritis & incorporatis cum oleo laurino vel oleo de iuni

pero vel laterino vel benedictino: vltimius adhuc om̄ibus oleis foret balsamus, si posset haberi. Dixerunt etiam q̄ si homo læsus a vipera, bibat vinum hominis non læsi, curatur. Conferunt præterea & res vinctuosæ in cibo assumptæ: velut sunt butyrum nouum vel vetus plurimū sumptum cū buccella panis, & iura galinarum pinguiū, & nuges, & oleum: qm̄ sua viscositate, aut humiditate forti opprimunt caliditatem veneni, & in se trahunt, ne per corpus dilatetur: & fortassis educunt per vomitum aut secessum. Dixerunt etiam, q̄ virga cetui assata & coacta hora sumptionis veneni multum confert: in fine vero rei, & cum tumor, et inflatio corporis, & angustia fuerint minorata, inducatur sudor atq̄ exercitiū, et labor fortis in ieiunio, & prohibeatur a somno pro posse: & balneari in aqua tepida, in qua sint cocti flores chamomillæ, meliloti, & anethum, donec veneni reliquiæ resoluantur. ¶ Scorpio cum fecerit puncturam in mēbro aliquo per aculeum suæ caudæ, tumor, & inflatio cū tumore forti & dolore: & si non succurrat, perambulat, inflādo totū corpus, donec pueniat ad membra nobilia, & eoq̄ operationem destruat, & sic vitam tollat. Cura eius est cura generalis cum ventosis & emplastris attractiuis positis statim a principio super locum: & fortassis opus erit cauterio, si non sufficiant prædicta. Et dixerunt experimentatores, q̄ si locus iniungatur sæpius cum oleo de scorpionibus, quod diximus ca. de calculo renibus & vesica. parag. de empericis: cōfert a proprietate. Sed oleum antiquū, in quo puluis euforbij fuerit dissolutus, aut allium coctum cum vino cōfert sua resolutione vehementi. Similiter & vetusta theriaca & mithridatum, & omnis confectio vehemēter calida, siue per interius, siue per exterius applicet. ¶ Aranea cū mēbrum stimulauerit: facit acci-

Tractatus tertius secundi libri

dentia scorpionis, et quandoq; deteriora illis, ita vt extrema infrigidentur, et venter ingrossetur: et virga erigatur ex multiplicatione ventositarum in corpore plurimarum. Cum autem in potu sumitur: inflatur collum, & venter, et egreditur oculi. Et fit angustia in stomacho et intestinis, donec syncopis, & mors sequatur. Cura eius est cum fecerit puncturam loci ventosatio fortis cum scarificatione & post hoc eius emplastrum cum ruta & absynth, & calce & cinere simul incorporatis cū aqua calida, & sudor in balneo siccō, & sepeliri in arena calida: vel stercore bouino vel cinere calefacto in fornace, & fumere in potu theriacam cū vino puro vna vice post aliam assidue, & confectiones calidas sæpe dictas, & semē nigellæ proprie, et se. apij, et assam foetidam, donec dolor, & tumor cessauerint omnino. Cum autem in potu sumatur: fiat illico cura generalis venenorum operantium a proprietate. ¶ Rutela est animal simile araneæ, sed habet crura longiora, & eius punctura facit accidentia araneæ: et eius cura est cura illius. ¶ Basiliscus, quod cognominatus est regulus: quoniam caput habet velut coronatum, vel quoniam cunctis animalibus sua potenti malicia dominatur. Ipse namq; non tantum sputo, vel morfu, interficit, verum & visu solo. Quoniam est eius venenositas aduersiva, vt vapores sui corporis aërem reddant venenosum: quare nullum animal viuere potest circa suam speluncam, & herbe & plantæ virides aescunt, cū serpit super eas: & si quis ipsum gladio vel lancea tetigerit: moritur, velut ex punctura: & dicitur, quod generat ex ovo galli decrepiti, quando super ipsum bufo cohat, et fouet velut gallina pullos suos. Sed nos magis credimus, quod sit animal generatum ex sibi simili, quemadmodum & bufo: quoniam in India maxime multiplicatur, & in nubia, quæ sunt regiones calidæ

vehementer: & non est eius cura omnino: quare cum videris hominem interimi subito sine causa manifesta, & in loco deserto suspecto, scias hoc fieri propter basiliscum. Et dixerunt emerici, quod sola mustela habet a proprietate interficiendi ipsum, & in hoc confisit fortior leone aut milite armato. ¶ Armena est animal simile basilisco in figura & operatione, præter quod non interficit hora vna sicut basiliscus, sed infra 4. dies: sed idcirco apud medicos sagittæ toxicatæ, sagittæ Armenæ nuncupantur, aut fortassis ideo, quod apud Armenos fuit repertus primus eius vsus. ¶ Aspis & irudo sunt serpentes venenosi, quorum est proprietas, vt quæ tetigerint morfu vel punctura, interficiant intra duas aut tres horas: neq; est eius cura. Canis cum est rabidus, interficit suo morfu, nisi subito succurratur. Fit autem rabidus per aduersionem humorum sui corporis, & conuersionem complexionis naturalis in melancholiam aduersionem: quemadmodum in hominibus fit mania canina. Et signa canis rabidi, & morfus eius, sunt rubor oculorum, & proiecchio linguae extra os, & intromissio caudæ inter crura, & spuma currens ex ore, & raucedo vocis, & abhorreere socios & natos: quare currit solitarius, et vult inuadere cui obuiat, & fugiunt ab eo canes. Et dicitur quod si liniatur panis ex sanguine currente ex morfu canis rabidi, non comedunt eum canes alij. Et si emplastre vulnus cū mica panis, & proiciatur galinæ, non comedit ex ea. Cum igitur canis huiusmodi momordit hominem, & sibi post aliquot dies, & ad minus intra dies 40. & quatuor menses superuenerit timor aquæ vehemens, & raucedo vocis, & dolor vulneris maior debito, & dispositio ad operationes melancholicas: scias quod fuit morsura canis rabidi: quare si non succurrat, fit rabidus & ipse, ita vt mordeat homines, quibus similiter accidet,

sicut sibi: quoniam est eius morsus venenofus, et superuenit difficultas anhelitus, velut in asthma, & venter siccat, & vrina quandoq; retinetur, & quandoq; mingit vrina nigra, & qñq; lactea grossa valde, quasi sint in ea canes parui, & qñ p̄ subtilis aquosa propter opilationē, & demum accidit p̄fatio cū morte festina. Et dicit Auic, q̄ nō euadet aliq, quem canis rabidus momorderit, postq̄ timor aquæ superuenit, quoniam significat veneni malitiam totum corpus pertransisse. Et dicit Ras, in diuisionibus capitulo de mordicatione animalium venenosorum, q̄ morsus canis rabidi est sup̄ alia venena maximi nocuenti: qm̄ est magis interficiēs, q̄ alia ex eo, q̄ est eius conuersatio inter homines per naturam. Cura eius & proprie i principio intra tres dies ad plus, cum adhuc est possibilis, est vt statim fiat cura generalis morsum venenosorum cum ligationibus, & ventosis & emplastris attractiuis: similiter & cauterio cum ferro ignito. Quod si nō videtur sufficere & membrum incipiat denigrari, nō securabitur æger nisi membrum totaliter mutiletur, si fuerit possibile membrum remoueri, prout dictum est in cura generali. Et regatur cum cibis & potibus impinguantibus corpus: similiter & digestionibus, & euacuationibus: quemadmodum in passionibus melancholicis, quas diximus cap. de perturbatione virtutum sensitiuæ. parag. de mania canina: verum quoniam in huiusmodi regimine cadit potus aquæ frigidæ, necesse est, vt exhibeatur in vasis obstratis, ita vt ipsam non videat, neq; audiat cum potarit. Sunt præterea remedia quedam consentanea a proprietate, quemadmodum emplastrum ex ruta elixata & confecta cum buryro vaccino super locum post curam generalem. Et frequens vsus medicinæ de cancro, quæ sic fit.

74. cinerum cancorum adustorum cum

suis corticibus, sicut sunt in testa vel fornace. 3. 10. gentianæ. 3. 4. thur. 3. 1. teratur omnia, & cribellentur, & misceantur simul, detur ex eo omni die statim a principio. 3. 1. vel 2. cum aqua frigida: quoniam rabiem fieri prohibet anteq̄ fiat: & cum facta est, mitigat & decedit. Similiter & cerotū. 18. acetii lib. 1. & 8. opoponaci li. 1. dissoluatur adinuicē in calola, & bulliantur, donec fuerint inspissata in formā vnguētī, continue agitando cū sparula, donec fuerint p̄fecte cōmixta. Et cū infrigidatū fuerit, reseruetur & omni die aliqd ex eo sup̄ corū extendatū molle albū, & vulnere supponat p̄missa cura ḡnali: qm̄ attrahendo mundificat & post hoc sanat. Ad idem etiam confert vnguentū fuscū famosum virtute potenti. ¶ Lupus cum fuerit rabidus, facit accidentia canis rabidi: & signa & cura sunt, sicut in cane rabido. Vulpes cū sit rabida, facit accidentia canis rabidi: & signa & cura sunt etiā illius. Simile est de mustela rabida. ¶ Homo cum sit rabidus, & de moniū habēs lupinum, seu maniam caninam, fit eius morsus venenosus, & facit accidentia canis rabidi, p̄ter q̄ nō accidit timor aquæ nisi fortassis rabies fuerit a principio ex cane rabido: vt diximus superius. Et cura eius est cura canis rabidi. Est præterea cū morsus hominis, aut alterius animalis est malus dolorosus, præter q̄ fit venenosus propter aliquam malam qualitatem calidam vel frigidam vehementer, qua distendunt individua inter se sub eadē specie, vel propter rem acutā, vt pote spinā vel vnguē, aut dentē parū derelictū in vulnere post morsuram: quare tardat consolidatio in eis, quemadmodum accidit in puncturis apum & vesparum, & calcarium, & fuscis filantium mulierum & gladijs rubiginosis, quorum omnium vna & eadem est cura, scilicet vt a principio fiat emplastrū super locū ex cepis crudis & sale & melle simul commixtis

Tractatus quartus secundi libri

et incorporatis, quod dimittatur supra vulnus per diem vnam et noctem: quoniam malam complexionem alterat, & vulnus seu morsuram dilatat: & mundi ficat perfecte. Similiter & emplastrum ex farina fabarum & rad. fēi, coctis in aqua & aceto, deinde expressis, & pistatis in mortario, & incorporatis cum melis despumato: postea vero consolidetur cum vnguento fusco vskato, & proprie cum tumor est de spina, vel vngue, vel aculeo, vel dente derelicto in vulnere post morsuram: quoniam attrahit, & mundi ficat vulnus efficaciter, et post hoc labia eius cōsolidat perfecte. Sunt autē ad huc genera plurima serpentū venenosorum, velut dracones, et nominari surdi: sed nos ipsa pretermittimus: quoniam perparū nobis obuiat in frigida regione: & cū obuiauerint: sufficiet in eis cura generalis.

TRACTATVS QVARTVS, cuius sunt xij. capitula. Prīmū est de decoratione capillorū.



Decoratio est rectificatio dispositionum malarum, qui fiunt in corpore manifeste, velut in capillis & cute. Verum quoniam partes huiusmodi non sunt principales, neq; nobiles per naturam, quæ sint necessariae ad subsistentiam indiuidui: ideoque doctrina de ipsis non est, nisi ad complementum artis medicinae. Dicamus autem primo de capillis, quorum quidem decoratio consistit in octo dispositionibus, quæ sunt eorum generatio, & eorum euulsio in locis in quibus id volumus, & eorum fixio, & eorum coloratio, & eorum a canicie præseruatio, & eorum crispatio vel rectificatio, & eorum consolidatio cum scinduntur, & eorum elongatio perfecta: de quibus omnibus breuiter per ordinem dicamus. Generatio capillorum, cum nō

sunt similiter & eorum multiplicatio, cū sunt in membro, in quo id volumus: perficiti ex reductione corporis ad caliditatem, & siccitatem q̄ sunt causæ productiue capillorū cum cibis & potibus & medicinis calidis & siccis per naturam, & fame & siti et exercitio forti in ieiunio: localia vero remedia virtutis consimilis sunt post illud adhibēda. Fricetur ergo locus omni die sapius cum cepis & allijs aut sinapi, aut spōgia marina, aut pāno laneo alpe ro, donec vlceretur: & ilico post frictionem liniatur ex vrina propria actu calida, aut lixiuio acutissimo factio ex cinere quercus, aut oleo laurino, aut oleo laterino, aut oleo veteri, in quo cinis capillorum veneris adustorum fuerit dissolutus: quoniā post eius vsum & frequentiam diuturnā pullulabūt stipites capillorum, quos tūc abradere cōuenit omni septimana semel cum rasorio sicco super loco sapius refrigerato, donec videatur sufficienter inspissari. Ex quibus scire potes, q̄ in corpore frigido & humido per naturam, sexum, regionem, & ætatem difficile, aut impossibile est pilos gñare multos. Medicamen autem nobile curas caluicium non factū per naturā quod alopeciam medici vocauerunt, sic fit secundum Mes. in suo de appropriatis. ℞. euforb. spumæ maris, simi columbini. añ. 3. i. elsi albi, seminis rutæ montanæ, radicum cannæ combustarum, corticum auellandarum adustarū, corticū castanearum, nasturtij, sinapis, artemisij, stercoris muris, sulphuris viui, spicæ, capsicæ. añ. 3. f. amygdalarū amararum adustarū cum corticibus suis. 3. 9. capillorum veneris adustorum, corticis pinī adusti, thuris myrrhæ. añ. 3. 4. terantur omnia subtiliter, & cribellentur, & fiat ex eis vnguetum cum oleo de raphano, vel laurino, vel oleo ro, vel vino cocto, vel si aliud præstio non sit, cum vino puro veteri amaro, vel cum succo cepæ acutæ vel squillæ, & ex illo caput vnge

ſero, cum vadis dormitum, præmiſſa fri-
catione ſupradicta: & ſi ſeretur ſcarifica-
tio ante fricationē, melius penetraret: &
dimitte ſic ꝑ noctē torā, capite vndiqꝫ
cū pānis calidis coopto, & in craſſino la-
ua cum aqua decoctionis ſiclæ & ſaba-
rum, aut cum lixiuio, aut cum vino vere-
ri ſine intermiſſione, donec fuerit cura-
tus: & ſi voleris ipſum aromatizare,
adde parum muſchi. Medicamen aliud
ad idem ſecundum eundem conferens a
proprietas, ſic fit. ℞. carnium limacū
& languifugarum, & apum & veſpa-
rum, & ſalis coſti. añ. par. ꝑ. pone in vaſe
vitreato habente foramina multa in fun-
do ſuo, ſicut cribratorium: et pone ſub eo
vas vitreum, & manabit poſt diem &
diem humiditas, quæ conſeruetur in va-
ſe, & quando oportet, fricetur ſuper locū
caluum, poſtqꝫ ipſum prius fricueris vehe-
menter cum panno aſpero, aut ſpongia
marina. Euulſio capillorū in locis, in q̃ba
id volumꝰ, vt pore ſupercilij, aut manibꝰ,
aut collo ſit duobus modis, vno quidē rē
porali remouente capillos tantum, non
ſtipites eorum: quare regenerari poſſunt
poſt dies paucos cum pſilothro, quod ſic
fit. ℞. calcis viuæ. 3. i. arſenici, citrini. 3.
i. terantur ſubtiliſſime, atqꝫ cribellentur,
& cum aqua calida incorporentur, velut
in formam vnguenti liquidi: vel ſi ma-
gis fortificare vlueris, pone ad ſolem ca-
lidum ꝑ dies plurimos ſumendo tanto
magis de aqua a principio, ne poſſit con-
denſari, & omni die cum puluere recenti
calcis viuæ & arſenici renouando, donec
ad tantam acuitatem peruenerit, vt pen-
na illinita denudetur. Ex hoc igitur vn-
guento vngatur locus leniter ſine fricati-
one in æſtuatio vel aliquo loco calido,
vel mēbro inclinato ſuper vaporē aquæ
calidæ: & cum ad horam ſteterit, & pilli
ſint omnes corroſi, abſtergatur leniter cū
manu, & abluatur locus cum aqua tepi-
da primo, donec pſilothrū totaliter ablu-

atur: & poſt hoc cum aqua frigida, donec
locus conſortetur: verum quoniam pſilo-
thrum eſt corroſiuum, cauendum ne de-
ſluat ꝑ membra circunquaqꝫ: quare li-
niantur cum oleo roſ. mixto cum albu-
minibus ouorum, & aqua roſ. vel popu-
leon: & fiat corroſio cutis in loco depila-
to, conſolidetur cum vnguēto albo vſita-
to. Alio modo euellūtur capilli radicibus,
ita vt nunqꝫ renaſcātur, ſed illud eſt rarū,
& difficile valde. Extrahātur igitꝫ a prin-
cipio radices ſingulæ capilloꝝ cū ſorpicl-
bus, & poſt hoc liniatur pſilothrum præ-
dictum diſſolurum cū aceto. in quo pul-
opij aut hyoſcyami fuerint diſſoluti vn-
diqꝫ ſuper locum, donec pori cutis indu-
rentur, & radices capillorum penitus au-
ferantur. Tunc ergo liniatur omni die ſu-
per locum vnguento inſpiſſans cutim,
& calloſam faciens, quod ſic fit. ℞. alu-
minis. 3. f. ceruſſæ. 3. i. dragaganti, gum-
mi arabici, ſang. draco. maſticis, thuris.
añ. 3. i. opij. 3. i. terātur omnia ſubtiliter,
& cribellentur, & incorporētur cū aqua
roſ. vel oleo ro. vel oleo myrrino, vel ſuc-
co meſpilorum, & prunorum ponticorū,
vel ſucco hyoſcyami recentis, vel aqua
decoct. ſe. hyoſcyami, addendo in quoli-
bet eoꝝ modicum aceti. Et ſi capilli poſt
tempus regenerari videantur: redeatur a
principio ad curam totius, donec cutis in-
ſpiſſetur, & mala complexio calida alte-
retur. ¶ Fixio capillorum perficitur cū
reductione corporis ad craſſitudinē &
pinguedinē, ſi fuerit macrum, teneꝝ: aut
ad extenuationem & macilentiam, ſi fu-
erit ſqualidum, groſſum. Duobus namqꝫ
modis contrarijs accidit caſus capilloꝝ.
Vno quidē mō ꝑpter ſiccitatē, ſtyptici-
tatem, & ſtriſtitudinem pororum, velut
accidit in ſenio & poſt ægritudines per-
durantes. Alio modo ꝑpter cutis molli-
ciem, & pororum laxitatem, velut in hy-
dropſi & cachexia: quare regatꝫ corpus
in contrarium in cibis & medicinis con-

Tractatus quartus secundū libri.

trarijs secundum humiditatem & siccitatem, cōperatis vero secundū calliditatē & frigiditatē. Et purgetur humor dñians, & proprie flegma falsum, prout dicem⁹ ea. de scabie & pruritu. Localia vero remedia post hoc ex rebus stypticis ministrantur. Quorum primum atq; debilius est, vt omī die membrum abluatur cum vino rubeo pontico, aut cum lixiuio debili facto ex aqua pluuiali & cinere quercus & vitis albæ, aut cum decoct. ros. balaustriarum, plantaginis, rubi, cupulæ, glandium myrtillorum, corticum granatorum: aut cum aqua calida, in qua pul. thuris, & gummi ara. & mastice fuerit dissolutus. Sed fortius prædictis est hoc vnguentum Hebemef. in suo de appropriatis capitulo de casu capillorum. ℞. corticum cancri vltularū. auellandarum adustarū, & granatorum myrti. añ. 3. quatuor, ab synh. gallarum. añ. 3. duas, terantur omnia in vltimo, atq; cribellētur, & cum oleo ros. & myrtino conficiantur, addita cera rubea sufficienti: & inungatur ex eo caput rasum omni sero, & in crastino mane abluatur cum aliquo liquorum prædictorum. Item vnguentum expertum ad idem. ℞. capill. veneris adustum, corticum pini torrefacti, donec possit conteri, et puluerisari, granorum myrti, granorum granatorum, & cortic. eorum, cortic. nucum, gallarum, cypressi, auellandarum adustarum, cortic. papaueris, cortic. rubi, omnium añ. 3. 4. terantur & cribellentur, & conficiantur cum oleo ros. & modico laudani, vel terebentinæ, & inungatur ex eo actu calido vt prius. Et si ipsum aromatizare volueris, adde calami aromatici, gariofi. cynamomi electi, & similia. Verum quoniam vnguentum hoc & quod præcessit, denigrat capillos, auferantur gallæ & cortic. nucum & granatorum, & reliqua dimittantur: sed fiet minoris operationis. ¶ Coloratio capillorum nō est fieri possibilis, ni

si in capillis canis, vel albis, vel subalbidis: qm̄ alijs colores non recipiunt tincturam aliquam vel diminutam et falsam: velut in picturis demonstratur. Modos igitur flauos faciendi capillos atq; auratos sic fit. Decoquantur paleæ ordei vel aue næ in lixiuio non acuto: post hoc coletur per hunc puluerē. ℞. rasurā buxi, liquiritiæ, cortic. medianæ sambuci, berberis. añ. & fiat illud terties, donec lixiuū citrinetur, cū quo sapius caput abluatur, ita vt nō fricetur, donec excicetur. Quod si colorem huiusmodi volueris facere fixū, adde aliquid mastice, gūmi arabici, thuris, dragaganti in lixiuio dissoluēdo. Modus vero brunos siue fuscōs faciendi capillos, est vt frequenter abluatur caput cum lixiuio debili non acuto, postq̄ in eo per diem & noctem infusa fuerint, & cum hoc ad ignem bullita folia rosarum & modicum vitreoli & gummi arabici. Et si fortificare volueris, adde modicum pulueris alcānæ, vel pulpæ granatorum. Et si iterum magis fortificare volueris, ita vt color fiat brunus cum obscuritate: adde aliquid succi cortic. nucum recentium, et dimitte capillos ad vmbra exicari. Potest autem succus huiusmodi per rotarum annū referuari, si colligatur dum adhuc nuces non sunt mature, & coletur & parumper ad ignem bulliatur. Modus vero rubeos faciendi capillos fit cum ablutione capitis ex lixiuio debili, in quo sang. draconis, vel rubea tinctorum fuerint dissoluta. Et si volueris vt color huiusmodi permaneat, quādiu capilli steterint: adde aliquid gummi arabici, & vitreoli sicut prius. Modus autem nigrōs faciendi capillos fit cum reiteratione plurius colorum prædictorum: quoniam illud, quod a principio facit capillos canos fieri flauos, facit post hoc fieri brunos, deinde nigrōs: quoniam minora tur diaphanum lucidum, & multiplicat opacum terrestre. Quod si subito, & vice

Vna capillos nigros facere volueris: ablu-
e eos cum lixiuo debili, in quo pul, gal-
lae, cypressi, lithargyri, & salis gemme
fuerit dissolutus, aut acacia et cortices nu-
cū, & cortices granatorū. Modos vero al-
bos facendi capillos, id est vt remittatur
eorum nigredo, sit vt abluatur primo ca-
put cū lixiuo debili, in q̄ sapo fuerit dis-
solutus: Deinde post q̄ siccē p̄fecte, sumi-
getur cū sulphure posito super carbones:
& post hoc inungat cū hmoi vnguento,
℥ss. corticū medianæ sâbuci exiccatae,
p̄isae ex corticatae, sulphuris, enulæ sic-
cae, stercoreis hirundinū, .sc. rephani, gūmi
arab. oīm. añ. quantū volueris, terantur
& incorporent cū vaccino felle, & modi-
co aceti, donec redeat ad formā vnguen-
ti. Vel vngatur cū oleo sambucino oīm
die, donec incipiat color albus apparere.
Ista tamen tinctura est omnium difficilli-
ma, & q̄ raro fit per artem: sed plurimū ad
eā confert ablutio pilosae assidua cū lixi-
uo feruenti, & infusio eorū in ipso: quoni-
am manibus tangi non potest, & eorum
expositio ad solē calidū capite nudato:
quoniam sicut calor corporis cutim deni-
grat, cū sit humida per naturā: ita capil-
los dealbat, cū sint sicci terrei per naturā.
¶ Capillorū præservatio a canitie festina
completur cū reductione corporis ad ca-
liditatem & siccitatem cum cibus & po-
tibus assis, vel fixis cōditis cum pipere
& sinapi vel melle: similiter & cū medi-
cinis purgantibus flegma, & custodia a
nauseatiua satietate atq; ebrietate. Qd̄
si repletio quādoq; acciderit, festinet ad
vomitum pro posse: deuter cibos humi-
dos, vt sunt brodia & olera atq; carnes
elixatae: quoniam humiditas disponit ad
putredinem, quam canities comitatur,
velut apparet in stercoribus antiquatis.
Abstineat a vino pro posse: quoniam & si
sit calidum & siccū, post q̄ fuerit digestū:
ipsum tamen a proprietate cito rapit ad
neruos, & cerebrū, prius q̄ perfecte dige-

ratur: similiter & acetū. Sed bibat melli-
cratū, aut claretū, aut medonē. Caveat
præterea ab infrigidatiōe cerebri ex ablu-
tiōibus capitis cū aqua frigida, vel aqua
rosae, vel aëre frigido ventoso. Similiter et
a suffumigationibus ex camphora, et ar-
gento viuo, vel spodio, vel cerussa, vel li-
thargyro. Somnum nō multiplicet illico
super cibum. Conetur omni die, cum sur-
git de lecto, ad euacuationem superflui-
tarum capitis per nares et palatum cum
rascationibus & sternutationibus atque
tussi. Medicina præterea tardans caniciē
a proprietate est trisera minor: quoniam
calefacit & stypticat cerebrum virtute
sublimi, quę sic fit. ℥ss. myrobalanorum
bellericorum, emblicorum, indorum, ke-
bulorum. añ. partes æquales: terantur, et
inungantur ex oleo communi, & post
conficiantur cū melle cocto & bene despu-
mato: de qua sumatur omni die in ieiunio
ad modum castaneæ cum modico
vini puri veteris, vel mellicrati. ¶ Cris-
patis vel lenificatio capillorum fit pro-
prie, post humectationem ipsorum cum
lixiuo v' alioquo liquore: quoniam si vo-
lumus, q̄ crispentur, oportet vt voluan-
tur circa seiplos, vel circa ferrum calidū
intricationibus diuersis: & tunc firmen-
tur cum fascia sub huiusmodi figura, do-
nec p̄fecte fuerint exiccati. Quod si sicci
fuerint a principio, nullatenus per huius-
modi operationem crispantur: quoniam
siccitas hoc habet proprium, vt difficile
terminef termino alieno, humiditas ve-
ro facilius ex quacunque causa. Et hæc
quidem crispatio temporalis, neq; per-
durat tempore longo. Quod si magis
perdurantem facere volueris: abradatur
caput quanto profundius erit possibile,
& abluatur omni die sapius cum vino
veteri calido amaro, v' cum lixiuo acu-
to: & cū capilli otiri cœperint: inuoluan-
tur assidue, & nequa q̄ cum pectine dis-
soluantur, donec ipsorum tortuositas

Tractatus quartus secundus libri.

fuerit roborata. Dicunt tamen medici, quod crispitudo perpetuari non potest, nisi cum fuerit ex tortuositate pororum cutis, quam nec infirmitas, nec senium relaxat. Si vero volumus, ut rectificentur: oportet ut post ablutionem capitis, cum pectine fortius distrahantur, & sub figura huiusmodi firmantur cum fascijs. Et si fieret ablutio capitis assidua cum aqua maluarum maluausci, scenigræci, psyllij, seminis lini, quam sequeretur fricatio cum pectine infuso sapius in eodem, melior fieret operatio: quoniam vniuersaliter omne quod prohibet fissuras capillorum, atque ipsos elongat: similiter & lenificat, & applanat. Et huiusmodi quidem virtutis sunt res humidæ muscillaginosæ. Consolidatio capillorum cum scinduntur & ipsorum elongatio perficitur cum humectatione capitis ex cibis & potibus impinguantibus, atque medicinis vniuersis: quoniam ipsorum scissio, similiter & accuratio non accidit, nisi propter siccitatem: quemadmodum in lignis apparet, dum arescunt. Abluantur ergo sæpius capilli quaque die cum aqua decoctionis maluarum, vel scenigræci, vel altheæ, vel psyllij, vel seminis lini, vel seminis citoniorum aut cum aqua & oleo similiter coquassatis. Et si ipsam aromatizare volueris: adde cinamum, electum, & calami aromatici quantitatem parvam, & fac bullire modicum: fricentur quandoque leniter, præter quod rumpantur cum pectine linito ex muscillagine psyllij, vel scenigræci, vel seminis lini, vel ex adipem gallinæ, vel lardo, & proprie apud somnum. Crastino vero abluantur cum lixiuio debili, vel aqua tepida supradicta: neque desiccentur in sole calido, sed in umbra.

De furfuribus capitis. Cap. II.

Furfures sunt squamæ albæ parvæ subtiles, quæ separantur a cute capitis, aut aliorum membrorum cum eorum mordicatione vehemēti. Fiunt autem a

mala complexionem calida sicca adusta dominante super corpus aut membrum. Et hæc quidem complexio aut est sine materia: & proprie cum est parua recens: quare solis alteratibus curatur: aut est cum materia post malam complexionem generata, qualis est cholera rubea, & flegma salsum, & proprie cum est perdurans difficilis antiquata: & hæc indiget apud curam, primo quidem mundificatibus causam, secundo rectificatibus dispositionem.

Methodus. Cura eius est, cum fuerit recens modica, ut caput radatur a principio vicibus frequentatis, & abluatur omni die semel vel bis ablutionibus duabus super se fricatione studiosa: quarum prima sit riptica absteriua, quæ sit ex lixiuio forti acutissimo, vel ex aqua calida decoctionis sinapis, seminis raphani, & anethi: vel ex aqua decoctionis caulium recetium, vel ex aqua & melle, vel ex aqua calida, in qua farina fabarum & fursuris & eicerum & pisorum & lupinorum fuerit dissoluta, vel ex lacte amygdalarum amararum: vel ex aqua, in qua polysulphuris & aluminis & baurach fuerit dissolutus. Secunda vero ablutio sit levis mollificatiua, quæ sit ex aqua tepida sola, vel ex lacte dulci recenti solo vel ex aqua & lacte simul mixtis, vel ex aqua & oleo communi, vel ex oleo rosæ, vel violaceo simul conquassatis, vel ex aqua decoctionis maluarum, maluausci, altheæ, & seminis eorum, vel ex adipibus anatis, anseris & gallinæ, vel ex aqua decoctionis scenigræci, psyllij, se. lini, vel aqua, in qua dragagantum fuerit dissolutum. Et si fieret ablationes huiusmodi in balneo, melior fieret operatio: similiter & si ablutio riptica fieret omni sero, cum iterum ad lectum, & ablutio mollitiua in crastino, succederet sanitas festina. Si vero fuerit hæc passio fortis antiquata, digeratur primo materia, et euacuetur, prout dicemus cap. proximo de scabie & pruritu: post

Et non extrahatur simul san. plurimus, sed parum quaq; vice: & permuteſ eius locus nunc ad brachiū, nunc ad pedes, & modo ad partem dextrā, modo ad sinistram: qm̄ erit iuuatiuū in educatione materię, & custodia virtutis: & considereſ san. cū egreditur: qm̄ cū est niger & grossus, dimittatē: cum vero subtilis lucidus, ilico restringatur, & ad medicinas procedatur. Et corpora quę magis audemus flebotomare, sunt corpora calida, humida, carnosa: frigida vero & sicca perhorreamus. Post flebotomias aut plurimas, & venarū inanitiones ex sanguine grosso melancholico, fiant scarificationes profundatę cum incisione larga post exitū a balneo humectante, nunc quidē in pulpis crurium, nunc vero in natibus, & nūc in spatulis, vel in dorso. Modus vero humores grossos extrahēdi cum farmacia, fiet talis, vt in omni hebdomada venter semel soluatur cum medicinis educentibus melancholiam, primo quidē cū lenibus: post hoc vero cū fortioribus gradatim, ita tñ vt nulla vice fortis fiat solutio sed moderata: qm̄ cū dicimus medicinas fortes, nō qdē intelligimus scđm pōdus, sed scđm virtutē. Et has qdē medicinas complete diximus ca. de permixtione rationis. parag. de melancholia. Neq; permittendum quando das medicinas attractiuas fortes, prout humor melācholicus requirit, quin addas x lenitius quantitatem paruā: cuiusmodi sunt cassia, manna, tamarindi, violę atq; pruna: qm̄ ventrē præparant, & velocitatē medicinam: vt ait Mes. in suo de appropriatis. ca. de melācho. Diebus vero intermedijs, quibus nō purgatur corpus, digeratur materia cum syrupo, quem dicemus in empericis: & humectet corpus cū sessione assidua in tina supradicta. Et semper cū balneū exierit, inungat totū corp⁹, et proprie mēbra debiliora ex oleo cōmuni catido, vel oleo violę, vel oleo nenuphar. vñ si ali

ud præsto non fuerit, cum lacte dulci recentis butyroso, vel cū adipe anatis, anseris & gallinę incorporata cū populeon & dialtheę, partes æquales oīm lumen-do. Et reguletur corpus ex cibis humidis lenibus dulcibus velocis penetrationis, q̄ tenerę faciāt corpus & impinguet ipsum & humores generent subtiles: ex quibus est lac dulce recens ex animalibus sanis iuuenibus sumptum in ieiunio per se, vel cum mica panis oīm die, & proprie si in ipso delectetur. Similiter & pulues ex farina similis vel auenę conditi cū eodē, & pulues ex amylo & farre conditi cum lacte amygd. & zuc. albiſſimo: & iura carniū hædoꝝ & agnoꝝ & pulli, pinguiū cōdita cum vitellis ouoꝝ, & croco & cynamomū, et carnes elixę cum lactucis, cucurbitis, spinargijs, boragiū, & sicla: Similiter & oua recentia sorbilia elixa nō assa: similiter & brodia butyroſa, & butyrum recens comestum cum bucella panis. Bibat vinū album clarum lymphatum dulce vsq; ad medietatē, vel melliteratum aquosum subtile, vel iulep, vel aquam decoctionis ficuum, vel aquā frigidam clarā. Caveat a cibis & potibus & saporibus generantibus melancholiā naturalē vel nō naturalem, qualēcunq;: quos plene iā descripsimus ca. de hæmorroidibus. Caveat a rebus vrinā prouocantibus vehemētē: ne fortassis educatē subtile, & grossum induretur: nisi fuerit patiens ex ijs, qui p̄ vrinā purgari consueuerunt. Qued qdē scies ex vrina grossa, liuida exeunte cū sedimine plurimo cineroso. Istud tñ est perrarę: qm̄ humor grossus postulat vias largas. Et ex rebus vehementer humectantibus, est somnus plurimus post cibum, & ocium, & quies, & postpositio solitudinis, et habitatio assidua i aēre humido valde, sed frigido moderate p se vel per artē. Sic ergo regulet, donec secundo redierit hora flebotomandi, vel purgandę: & fiat ordinis reciproca-

Tractatus quartus secundi libri.

tio assidua perdurans: quoniam sanatur hac cura. Et si remanserit color malus in facie, rectificetur cū vngueto citrino, vel cū vngueto albo vsitato : Ad qđ cōfert plurimū scarificatio facta, primo quidē in spatulis, deinde sub mento & pulpis aurium : vltimo vero p̄ superficiē faciei totam, ita vt sanguis ex cicatricibus diligerenter cū digitis exprimatur, & vnguenta p̄dicta ilico imprimantur, & proprie in balneo vel loco alio calido vaporoso. Et si rubor in oculis apparuerit: instillent collyria di-cc, de ophthalmia, & proprie de cerussa. Et si capilli capitis deciderint: fiant, q̄ diximus proprio ca. ad ipsorū generationē atq; fixationē. Si vero lepra processerit ad gradū secundū, aq̄ si vocatus ad curā, nihil ex ordine supradictō diminue: qm̄ fiet conferēs, ne cito peiores. Et si nodi duri vel maculæ morphæ fuerint circa iuncturas, frequenter ipsas molifica cum balneis & oleis vnguentis supradictis, et oportet vt olea sint calida vehementer, donec vrant, & penetrēt loca dura. Quod si non suffecerit, opus est vt cū lamina ferrea ignita perurāt ipsorū superficies, atq; resoluatur. Et si nec ista suffecerint: conuenerunt antiqui, & existimauerunt, q̄ carnes vipæ comestæ, et vinū eius bibitū, et theriaca de vipis, & trochisci de tyro famosi exhibiti bis vel ter in hebdomada, cū vino albo subtili mixto cū aqua frigida sanāt ipsam: qm̄ ex vsu eorū assiduo inflatur corpus totū, & molificatur caro, & cadit cutis superior dura defœdata, et regenerat̄ alia inferior mollis atq; clara: sed hæc est cura rara difficilis. Præparatio aut̄ vipæ in iure talis est, 18. serpentē habitātem in locis syluestribus montanis, non paludosis, cuius color sit flauus habens ventrē albū, & in medio vētris lineā rubeam, & in medio dorsi lineam nigrā, & caput habens planū subtile, & corpus in medio grossum, & caudam curā subtile, velut lacerta, q̄

dum mouetur, facit strepitum. Et si dentes habuerit in mandibulis, est melior: & abscindatur caput & cauda, & absciantur oīa eius interiora, & abluatur eius caro pluries in aq̄ clara, & frustarim incidatur, & ponatur in lebebre mundo cū sufficiens aqua pura, & addatur aliquid aceti, & salis, & olei, & pip. & gallan. & seminis anethi, et bulliatur, donec caro ab ossibus vndiquaq; separetur. Tunc igitur paties comedat de carnibus, & sorbeat ex iure parum post paſs assidue p̄ dies multos. Et si carnes abhorruerit, misceat ip̄as cū carnibus pullos, vel columbas, vel faciat ex eis tortellum, v̄ pullos cū viperis decoquat, & fiat ius magis saporosū. Cum aut̄ illud per dies multos continuauerit, et superuenerit scotomia, et corpus inflatū fuerit, & cutis seperetur, sufficiens est iam eius vsus. Præparatio aut̄ vipere in vino talis est, vt vipa vna præparata sicut prius, bulliā in lib. 20. vini albi puri clari, donec caro ab ossibus separetur: & tūc vinū cū vipera simul actu calidū in dolium fundatur, qđ 40. lib. vini albi clari contineat, cui misceatur. Et ex ipso bibat modicum omni die in ieiunio. Præparatur aut̄ vipera in syrupo sic. 18. viperā p̄paratā, vt prius: & pone in 8. lib. aquæ, & adde aliquid fumiteræ, vel succi eius, & thymum, & epithymū, & aristologiam rotundā, & gentianā & mentā, & buccas lauri & zz. ac cinamomū, & fac bullire, donec medietas consumatur, vel caro ab ossibus separetur: tūc coletur, & syrupifetur colatura cū li. x. zuccari, & detur ex eo omni die in aurora, quantū testa oui cape pōt cū aqua calida. Præparatur vipera in electuario sic. 18. carnes vipæ præparatæ, sicut prius: & coctæ vt prius, pistentur perfecte, & misceantur cū duplo zuccari rosa. In causa calida, v̄ cum duplo diafena in causa frigida, & detur ex eo omni die in ieiunio cum vino clario bene adaquato. Si vero

lepra peruenit ad gradum tertium, & vlceretur corpus, & virus effluat, & fecerit eius corpus: tunc inungantur vlcera eius assidue cū vnguentis de cerussa opia to: qđ diximus ca. de apostemate in matrice. parag. de malitia cācri reprimēda: qm̄ refrangit materiā corrodentē, ne cito mēbra cadant, vt vita prolonget: & cauterisetur cū ferro ignito, & permute eius habitatio ad aērē humidū vehementer, sed nō superflui frigoris, nec caloris, sicut aēr hās secus decursus aquarū mundaꝝ. Et assidue viatur lacte ouin & vaccarū in potu: qm̄ prolōgat eius vitā, & sapius assidue fletotomiā basilicā, & venarū guindegi in collo, ne suffocet, & balneationem in tina supradicta.

Emperica. Constructio syrupi nobilis digerens humores grossos adustos vel condensatos, atq; ipsos p̄pans purgationi sic fit. ℞. boraginis, buglossę, scolopend. capilli veneris, polytrichi, adianti, & fumiterrę, si recēs haberi possit. añ. m. i. se. lactucę, endiuicę, cucurbitę, melon. añ. 3. i. prunorū siccorū, passulorū pinguium enucleatarū. añ. 3. i. & f. polypodij. 3. iij. bulliantur oīa prāter epithymum, in lib. 8. aquę clarę: vel in 6. li. aquę, & lib. duabus vini albi dulcis aromatizati clari subtilis, donec tertia pars fuerit consumpta: tunc apponatur epithymum, & illico deponatur ab igne, ne virtus epithymi resoluatur: & cum infrigidari cōperit, oīa manibus confricent & coentur: & additis 2. lib. zuccari albissimi fiat syrup. clarus, subtilis, aquosus, de quo poterunt omni die in aurora 3. 4. vel 6. Syrupus de epithymo purgans humores grossos adustos vel non adustos cum virtute, sic fit secūdu Hebeḿ. ℞. epithymi boni hortensis. 3. 20. myrobalanorū citrinorū & indorū. añ. 3. i. 4. cuscute, fumiterrę. añ. 3. i. 0. thymi, buglossę, calamentī, emblicorū, bellericorū, liquir. polyped. agarici, sticad. añ. 3. 6. ros. se. feniculi, ani

si 3. 2. & pruna numero 20. vuarum pas-sularum enucleatarum 3. 4. tamarind. 3. 2. & f. zuccari lib. iij. rob. lib. 2. vel loco eius dulcis vini albi subtilis, fiat syrupus bene coctus. & cantur cum aqua de cecithionis prunorum: vel addat aqua plurima, quando coquitur & fiat syrupus subtilis aquosus. & per se poterit. Confert enim leprę inchoatę, & morpheę, & scabiei, & safati & cancro, & oibus morbis de cholera nigra gñatis. Pillulę indi, quas scripsit Hali, & sunt vltimi iuuamenti, atq; fortitudinis ad idem, sic fiunt secundum eundem. ℞. myrobalanorum indorum, ellebo. nigri, polypod. añ. 3. v. thymi, epithymi, sticad. añ. 3. sex, agarici, lapid. lazuli loti, colloquintid. salis indi. añ. 3. 4. succi eupatorij, spicę. añ. 3. 2. gariofil. 3. i. hierēpicę. 3. 12. fiant pillulę cū succo apij vel fumoterrę, vel vino veteri amaro: de quibus detur a 3. 2. vsq; ad aureos. 2. cum aqua casei sero cum itur ad lectum sine cœna, & sunt sanę & expertę. Pillulę de elleboro nigro ad idem sic fiunt. ℞. aloes. 3. vnam, salis indi. 3. f. ellebori nigri. 3. i. agarici boni. 3. 2. fiat pillulę cum melle, vel vino dulci, & sint omnia 1. dosis. Ex solutiuis debilibus cōuenientibus corporibus delicatis, est serū vel aqua casei cum ex eo actū calido bibitur lib. vna in aurora cū melle vel zucaro dulcoratū. Quod si fortificare volueris, infunde in ipso per noctē myrobalanorū citrinorū, & indorū. añ. 3. 2. pistando grosso modo, & in crastino manibus fricando, atq; colando diligenter. Electuariū delicatum ad idē. ℞. fenę, epithymi. añ. 3. iij. elleb. nigri, ros. ru. añ. 3. f. fiat electuariū cum melle cocto & mundato, de quo detur semel in hebdomada. 3. i. vsq; 3. 12. cū vino calido lymphato. Electuariū, quo vtitur cūni die in seiuio alterans & confortans, sic fit. ℞. trochisciōi de thyro 6. numero, theriacę veteris electę. 3. i. zuccari ro. dianhodō abba

Tractatus quartus secundi libri.

tis. añ. 3. 2. & si calor fortis fuerit: addat tria sand. 3. 1. detur ex eo ante cibū. 3. vna cū vino lymphato. Oleum de serpētibz cutim leprosoꝝ pulchrificās, & proprie post purgationē, sic fit s̄m Mes. in antidorario. 18. serpentū nigroꝝ vel flauoꝝ quos superius descripsimus, circiter li. 2. pone eos integros in olla terrea vitrea stricti orificij, & funde super eos olei sisami. vel de semine lini, vel olei chamomil. vñ cōis li. 1. & f. & sigilla orificiū vasis, & decoque lento igne, vel super prunas, donec caro ab ossibus separet: & caueat si: bi operator à vapore eius (qm̄ est venenosus) & cū cocti fuerint, dimittātur infrigidari, & recondat in vase vitreo diligenter obturato, & administret liniēdo sup̄ faciē & mēbra leprosoꝝ cū penna: qm̄ post dies aliquot faciet cutim cadere, & aliā tenerā regenerari. Oleum de ouis ad idē s̄m eundē. 18. vitella ouoꝝ elixatorū, donec indurata fuerint, circa 30. & cōminue manibus, & pone in sartagine lapidea, & frige sup̄ ignē mouēdo cū ligno donec rubescant, & resoluat ab eis oleū: & tunc ea cōprime cū torculari, & tunc abundācius manabit: qm̄ ex pluribus vitellis fit oleū paucū. Et si poneris in alēbico, & distillares, sicut faceres aquā ro. melior fieret operatio. Est eū expertū ad oēm cutis scorditatem: & confert impetigini, serpiginī, safati, alguesetz, & fistulę & vlceribus malis corrosiuis. Oleū de iunipero s̄m eundē in eodē sic fit. 18. ligni iuniperi recētis (quantū volueris) diuide frustatim, & reple ex eo ollā terrea vitrea stricti orificij, & pone sup̄ ipsum laminā ferreā spissimā pforatā: sicut fit cribratoriū, & inclina ollā super orificiū, & pone sub eo in fouea sub terra constrictā ollā aliā vitreatā lati orificij, & ignē super ollā superiorē circūquaq; & stillabit oleū in ollā inferiorē, qd̄ vsui reseruetur. Oleū de fra xino fit eodem modo, & cōfert ad idē. Dicunt p̄terea experti, qd̄ si patiens le

prā inchoatā castret, ilico sanat absq; oī alia medicina: qm̄ alterabit eis cōplexio ad frigiditatē & humiditatē vehemētē.

Canones. Dubitarūt aliq; quare lepra incipiens curetur, cancer vero nequa q; licet sint ex eisdem causis. Ad qd̄ dicendū, qd̄ in cāero est materia intra venas, q̄ sunt velut radices eius: quare curari nō potest, nisi radices auferantur: sed illud fieri est impossibile sine mēbri mutilatione: sed cū lepra, & albaras, & morphea, similiter safati, & alguesetz, & fe. quar. & multa diuersoꝝ ex eisdē fiāt causas: vt est generum dictum a principio: cōsequēter videtur, vt eorum capitula libi mutuo suffragentur.

Prognosticatio. Lepra primi gradus perfecte curatur: Lepra vero secūdi gradus occultatur, sed q̄ in tertio gradu, mitigatur. Itē si sola ql̄tas corpis mutetur, significat primū gradū: Si vero cū hoc opatio naturalis mutetur, significat gradū secūdu: Quod si ex euntia superuenerint mutata gradū, certificant tertiu confirmatū. Itē cū oīe genus morboꝝ possit q̄ncq; sanari bñficio naturæ, sola lepra nō curatur: nisi succulserit consiliū medicinæ. Itē lepra, q̄ fit a causa calida, cito confirmatur, & fit corrosiua maligna: q̄ vero ex causa frigida, tarda est atq; morosa, neq; mēbra corrodit, & diutius occultatur: quapropter accidit, vt pueri & mulieres & seniores diutius in lepra perseuerent, q̄ iuniores & viri fortes calidi p̄ naturā. Itē lepra magis multiplicatur in regionibus frigidis, q̄ calidis: qm̄ i eis sunt propter antiprismaticos ventres calidiores: & similiter in illicis magis, q̄ humidis: quia sunt in eis humores grossiores. Itē corpora per naturā crassa valde, raro incurrunt leprā, & cū accidit (vt plurimū) occultatur: qm̄ oīa corpora impinguantia, sunt leprę curatiua: vt di. Auer. 2. sui collig. qd̄ lepra (vt plurimū) est ex gñatiōe: raro vero ex accidēte, quā

propter & difficile curatur: quēadmodū
& epilepsia, atq; arthetica, q̄ per gñatio-
nē transfunduntur. Itē leprosi raro febrici-
rant: & cum accidunt eis feb. fit brevis, nec
perdurat: qm̄ siccitas prohibet putrefa-
ctionē. Quod si fe. chronica supuenerit: et
proprie quartana, curat leprā inchoatā.

De albaras & morphea. Ca. V.

Istæ sunt passionēs descendentes cutim
et corporis superficiē exteriorē: quēad-
modū lepra carnē inficit, & membra
profunda. Verē differūt inter se parūper:
in valde conueniunt. qd̄ est: q̄a morphea
stat magis circa cutis superficiem: sed al-
baras inter carnem & cutem. Et tam al-
baras quā morphea generantur ex hu-
more grosso frigido maligno: quem cū
natura membrīs assimilāt secundū sub-
stantiam in toto vel in parte, non potest
ipsum p̄fecte assimilare in colore: quare
remanet eius color proprius, & cutim co-
lorat. Et quēadmodū tres sunt colores ex-
tranet a colore corporis principales, qui
sunt albus, rubeus & niger: ita & sunt
tres species vtriusq; principales, quæ sunt
morphea alba, morph. rubra & morph.
nigra. Similiter & albaras al. rub. atque
nigra. Et alba quidem fit ex humore san-
guineo terreo compacto: sed nigra ex me-
lancholia condensata. Neq; poterunt ex
cho. generari, cū sit humor subtilis et reso-
lubilis: vt in ictericia demonstratur.

Methodus. Cura vtriusq; ipsarum cū
gma grossum cum syrups calidis acutis
incisuiis: & post hoc purgetur cum medi-
cinis foribus vicibus alternatis, quas di-
ximus ca. de arthetica passione. Et si pre-
stio non sit aliud, cōferens erit oxymel cō-
positum vel squilliticum in digerēdo, &
pillulæ cochix in purgādo: semel in heb-
domada prouocet vomitus duobus di-
ebus continuis super se: quomā diuertit
materias a circumferentia corporis ad cē-
trum omniqualq; si fuerit facilis copio-

sus. Post hoc vero localia remedia mini-
strentur. Fricetur ergo macula alba cum
rebus acutis rubificantibus, donec vesi-
cetur: ex quibus sunt allia, cepa cruda &
sapo, & suc. anacardi, & se. raphani. vel
vrticæ, & se. sinap̄. contritū & mixtū cū
aceto: sūt radix taphiæ, vel lilij, vʒ rubæ
tinctor: sūt & stasisagria, & ellebor. al.
& radix lapparij acuti. Hæc em̄ oīa ma-
terias grossas subtiliant, & insensibilē re-
soluunt: & post sang. laudabilē attrahūt
& addunt in rubore. Quod si suffecerit,
emplastre loci cū stercore colūb. & si-
cubus siccis, in qbus puluis sinap̄. & can-
tharides sint incorporata, & proprie post
fricationē p̄dictā: nec desistatur ab vlcē-
tatione hmoi, donec profunde radix ma-
culæ totalit̄ auferatur. Et ad id cōfert pluri-
mū ancessio balnei q̄q; vice, i q̄ fiat sca-
rificationo particulæ, cui succedat frictio
atq; emplastratio iā dicta. Post illud aut̄
incarnetur locus, & color eius rub. viuid⁹
infigat cū vnguento, qd̄ sic fit. It̄ rubæ
tinctor, brassilij, sandalor: rub. terræ ru-
bæ, san. gra. oim, vel quorūcūq; volue-
ris. ʒ. 2. thuris, farinæ fabar: excorticatar:
adustar: añ. ʒ. ʒ. lithargyri albificati. ʒ. iij.
terant oīa subtilit̄, et cū lithargyro, & aq̄
de coc. brassilij, vel terræ rub. miscent̄, do-
nec redierit ad formā vnguenti: & ex eo
om̄idie locus corrosus inungatur vsq; ad
consolidationē p̄fectā. Albificatur aut̄ li-
thargyrū si puluerisetur, & misceatur cū
oleo ro. & ad solē calidū exponat̄, donec
exiccet: & it̄ teratur, & cū oleo ro. mi-
sceať, & soli exponat̄: & hoc fiat toties,
donec fuerit albificatū p̄fecte. Abstineat
a cibis et medicinis frigidis, et regatur ex
rebus calid. subtilib. vehemēter: Vtatur
sæpius in ieiunio trisera minore, quā dixi-
mus ca. de decoratione capillor: qm̄ fle-
gma grossum educit, & subtiliat excellē-
ter. Cura vtriusq; cū est rubea, est vt sta-
tim a principio extrahatur san. grossus a
corpe toto cū fleboro, larga basilica de-

Tractatus quartus secundi libri.

xtre vel sinist. vel saluatellæ in pede dex. vel sinist. modo illo modo alio, donec totus extrahat cū successione assidua san. subtilis ex cibis humectantibus subtilib: vt dixim⁹ de lepra. Post illud vero scarificet locus vsq; ad profundū maculæ rub. pfecte, & emplastre, & frice cū rebus acutis vesicantibus iam dictis, donec totus fuerit corrosus: deinde permittatur se carnari paulatim non subito cū succo cepæ vel sinap. asperso, vel solijs recetibus caulis, & bletis & sambuco positis super vlcus, & infigatur ei color albus temperatus cum proiectione farinæ amyli & cadmiæ argenti intra vulnus cū lithargyro albificato supradicto. Cura vtriusque ipsarum cū est nigra, est vt a principio digeratur, & porgetur melancholia (sicut dixim⁹ ca. de lepra) cū successiōe assidua humorū subtilium lucidorū ex c. bis & potibus subtilibus penetratiuis dictis ibidē: & assiduatione balnei in aqua dulci tepida, & multiplicatione otij, somni & quietis, & abstinentia omnimoda a rebus acutis sanguinē educentibus: vt sunt piper et sinap, similiter & a rebus ponticis sanguinē congelantibus: vt sunt mespila & pira non matura. Post ista vero omnia, perueniendū est ad remedia localia: quare scarificetur atq; vesicetur macula nigra: sicut dixim⁹ de alba, donec locus totus corrodat: deinde nō permittat incarnari subito, sed paulatim, donec ei (sicut & in prædictis) infigatur color.

Prognosticatio. Albaras atque morphea cū fuerint fortes difficiles, antiquatæ, corpus habilitat ad leprā. Itē albaras est deterior morphea: qm̄ eius materia magis extat profunda: similiter & est cū ipsa pruritus corporis, & asperitas scabiosa: quæ plurimū aptificant ad leprā. Item hmōi passiones cū non rabuerint faciliter post loci frictionē, difficile curantur: qm̄ materiam significant antiquatam. Item si sanguis non

exierit, quando locus purgitur cum acuo nullatenus curat: qm̄ materiā significat lapidificatā. Item in corporibus crassis p naturā vldiat, facilius curant q̄ in siccis extenuatis: qm̄ regimen humectatiuum est hmōi passionū sanatiuū. Itē si fuerint ex gñatione, aut diuturnis tēporibus antiquatæ, nullatenus auferuntur.

De saphati & alguesetz, & gutta rosacea. Cap. VI.

ISta sunt tres passiones cutim deformatas, quæ admodum & albaras & morphea. Vtū differunt ab ipsis hoc modo: qm̄ in istis passionibus alterat color naturalis & proprius nēbri, cū pustulis & furunculis diuersis: sed i albaras & morpheæ nō sunt pustulæ neq; furunculi, imo solus color alteratur. Differētia autē eorū inter se talis est: qm̄ & si q̄libet ipso accidat circa cutim, et proprie faciei: sūt & ruborē efficiat pustulosum: vt untū si pustulæ hmōi latæ fuerint atque sparsæ, ex quibus virus egredit saniofum, fit fauus q̄ saphati nuncupatur: si vero minute fuerint atq; ipsæ coniunctæ plurimæ, sic alguesetz, vel gossium noiat: si vero rubor sup pustulas dominatur, sic gutta rosacea dicitur. Et fiunt oēs ex eadē causa, .s. humore calido adusto corrosiuo: vt sūt flegma salum, & cholera atq; melancholia adusta. Cura oim istarū passionū vna atq; eadē ē oino: digerāt igit statim a principio humor acutus, atq; purgetur (vt diximus ca. de scabie & pruritu) & fortiores itidē medicinas digerentes atq; purgantes humores adustos diximus ca. de lepra: qm̄ hæc duo capitula nō differūt nisi penes magis et minus. Quod si corp⁹ carnosum, & viuudum apparet: oportet, vt hmōi purgatio fiat quādoq; cū flebotomia larga grossum sanguinē extrahēte: & quādoq; cū sarmacia, modo qdē cum ista, modo cum illa, vt diximus de lepra: donec totus humor adustus educa

tur, & subtilis atq; temperatus successe-
rit paulatim ex subtilibus iuribus tempe-
ratis. Post istam autē curam videtur per-
ueniendum ad remedia localia particu-
laria propinqua. Vlceretur ergo primo
locus totus a profundo cū frictionibus
& emplastris, & oleis rubificatibus acu-
tis, q̄ diximus ca. de albaras & morphea
& ca. de fursutibus in capite vel in aqua
adurente, quā diximus ca. de hæmorrhoi-
dib. parag. Emperica. Et hoc fiat toties
donec tota materia, q̄ fuit radix atq; cau-
sa coniuncta p̄ntis ægritudinis, extirpet̄.
Et ad illud vehemētē conferunt sangui-
sugæ positæ super locū, aut v̄tosa cū sca-
rificatione profundata. Et si passio fuerit
in facie, ponantur ventosæ primo super
sp̄arulas & collū, & post hoc sub mento:
qm̄ si ipsius eradicatione, sicut & diuersio
ad propinquū & remotū. Caueat tñ pa-
tiens ab ipsoꝝ vsu immoderato: qm̄ ven-
tosæ super collū positæ memoriā debili-
tāt, et mollificationē inducūt: q̄ vero sub
mento, visum diminuūt & auditū. Post
hoc vero gradatim consolidentur nō su-
bito cū vnguētis & fomentationibus le-
nitius, dictis capitulis eisdē. Et ex vnguē-
tis nobilibus ad albandū atq; lenificandū
faciē, est vnguentū albū, & vnguentū ci-
trinū sicut v̄tāt: q̄ si magis stypticæ volue-
ris gr̄a consolidationis, adde aliqd pul. thu-
ris atq; lithargyri. Et si post curationē vl-
ceris, redierit aliqua istarū passionū p̄di-
ctarū: reitereꝝ curatio a principio, donec
locus ab ea securetur.

Emperica. Epithyma expertum ad pu-
stulas h̄mōi, sic fit. ℞. aque
ros. lib. i. pul. sulphuris triti subtilissime,
atq; eribellati. ʒ. i. & ʒ. conuascentur si-
mul in vase vitreo, & per dies plurimos
ad solē calidū vel locū temperatū depo-
nantur, donec eorum virtus vnias, r̄pti-
ca quidem ex sulphure, styptica vero ex
aqua ros. & ex ipso facies om̄i sero linia-
tur, & in crastino cū aqua tepida abluat̄:

qm̄ post dies & dies faciē pulchrificat ex-
cellenter. Ad idem cōfert plurimū lithar-
gyrū albificatū (vt diximus ca. de alba-
ras) si super faciē diutius inungat̄. Refert
p̄terea Mes. in suo de appropriatis. ca. de
saphati: q̄ Gal. dicit se multos curasse cū
isto linimēto, ℞. chartas cōbustas, & cō-
tere eas, atq; contēpera cū aceto acutissi-
mo, & line sup locū post frictionē suffi-
cientē cū panno aspero, vel spongia ma-
rina. Refert et aliud autoritate Democri-
ti. ℞. chartarū cōbustarū, calcis lotæ, ar-
genti viui. añ. ʒ. i. cōfice cū aceto & oleo
de nucibus, & lina super locū, post frica-
tionē sufficientē. Quod si alterutrū forti-
ficare volueris: adde tartari combusti &
colchorar adusti, & salis adusti, & stercō-
ris muris, & amygdalarū amararū adu-
starū, & succi squillæ, & succi cepæ acu-
tæ, & aristologiæ rotundæ, & sulphuris vi-
ui, & pumicis gr̄a corrosionis & abster-
sionis, olibanū autē & gallas cōbustas, &
lithargyr̄. & cadmiā auri & argenti gr̄a
stypticarū & consolidationis, sed amy-
lum & spodiū & cerussam gratia deal-
bationis. Sic nanq; fiet medicina comple-
ta aggregans omnes intentiones.

Prognosticatio. Istius capituli est pro-
gnosticatio, de alba-
ras & morphea.

**De dealbatione totius corporis,
& proprie faciei. Cap. VII.**

Istius capituli certificat complemen-
tum artis medicinz cum scriptis vti-
libus & necessarijs: neq; turpia neque
superflua negligantur, neq; fortassis pu-
sillum corpus humanū respiciens eius suf-
ficientiam, effugiat redundantē. Corpus
igitur humanum, & proprie facies pars
oibus nobilior, atq; manifestior, potest di-
uersis coloribus colorari, duobus quidē
ad decorem pertinentibus, qui sunt albus
& ruber, & duobus alijs ad contemptū,
qui sunt niger & citrinus.

Methodus. Albificatur autē corpus ex multiplicatione adipis & pinguedinis in ipso, cū cibis & potibus dulcib⁹ aromaticis, & balneis humectātib⁹ cū absterfione aliquali, prout dicemus ca. de arte impinguādi. Sift & cū guamera, & epithymate, qđ sic fit. ℞. amyli puriss. dragagan. albiss. amygdal. dulc. excorticatarum, & fabaz, farina ordei. añ. 3. 2. 6. raphani. 3. f. terātur oīa subtilif. & cribellētur per pannū defum linētū, v℞ syndonē velut i collyrijs et cū lacte ouis, vel caprarū, vel vaccarū calido recenti distēperet, v℞ cū lacte amygd. dulc. donec fiat sicut mel currens: & ex illo collū & facies epithymetur sero, cū itur ad lectū, & in crastinū cū aq̄ tepida dulci, vel cū aqua decoc. sulphuris, vel cū aqua deco. mal. & viol. sicca, ablatur: & si, hoc p̄ dies plurimos vicibus frequentatis. Et si fortificare volueris: adde aliquid cerussæ ablutę: cuius tñ vsus assiduus caput infrigidat, & dentes denigrat. Solū p̄retea lac recēs butyrosolum quodcūq; fuerit ex p̄dictis, cutim albificat, atq; mollē reddit, si cū eo sape facies abluat, & per se dimittatur exiccari: vel in ipso pāni linei albi molles infundātur, & super faciē tota nocte dimittātur: Sift & albumen ouorū recentū p̄fecte cōquassatū, donec spumā fecerit, & cū eodē lacte tēperatū, Rubificatur autē corpus & facies ex multiplicatione sang. & spūs in eis cū potu vini pluri, & proprie rubei dulcis odoriferi, & iuribus carnū inspissatis cū vitel. ouorū, & conditis cū croco, gariofil. & cinamo. Similr & gumera seu epithymate calido acuto rubificatiuo taliter refracto, vt ei⁹ virtus sufficiat ad attrahēdū sang. verū, deficiat autē ad cutim corrodendā. Et ip̄a plene distinxim⁹, & diximus ca. de albas & morphea. Est autē conferēse epithyma, qđ sic fit. ℞. brassillij. vel rubeæ tinctorū, vel rad. pedū colōbař. q̄tū volueris: pistetur grosso mō, et bulliatur leniter

in aqua dulci clara, donec aqua p̄fecte coeperit rubere: tunc dissoluat in ipsa modicū masticeis, aut thur. albiss. et post hoc imbibantur in ea particulæ minutæ coti carminati, donec ruborē assumpserit p̄fectū: tunc igitur extrahantur, & ad solem exiccētur, atq; reseruentur: & cū ipso vti volueris: humectetur primo mēbrum cū propria salua, & post hoc fricetur totū, sicut est super locū diligenter: qm̄ ruborē efficiet plurimū excellētē, qđ durat p̄ dies sex vel amplius si nō abluatur: & si misceantur rubificantiā cū de albanibus, fiet color viuīdus, velut i corporibus speciosis. Citrinatur autē facies ex multiplicatione cholera sup corpus: velut accidit post vsum assiduū cymini, vel linap. vel carui, vel pipis, vel vini veteris amari: Sift etiā post extenuationē corporis ex labore plurimo, atq; vigilijs, & sollicitudinibus, & fame, & siti, & cibis acetos. Cōfert etiā epithyma factum ex puluere sulphur. aut cymini bullito p̄fecte in aqua, sup quā inclinēt suā faciē, & cū petijs imbibitis in ea, faciē perungat, aut fumū ex eis faciat, ponendo super carbones. Denigratur vero corpus, & facies ex multiplicatione melancholia super ipsa, qđ accidit post vsum assiduū lentū, & caulū, et carnū fumigatarū, atq; solitarum vehemēt: sift & post negligentia vsus balneandi. Confert p̄retea epithyma factū ex succo cortic. nucū, vel granatorū recentū vel aqua decoc. earundē: sift & cortic. paueris atq; berberis. Et si fortificare volueris, adde fuliginis mixtā cū xungia: qm̄ adharebit vehementer.

De arte impinguandi vel extenuandi corpus. Cap. VIII.

Corpus impinguatur ex dñio humiditatis sup ipsum totū, & proprie super epas, cum sit fons & minera virtutis nutritiua, siue fuerit hmōi humiditas per naturā (q̄ radicalis dicitur) siue

per acquisitionem, quæ influēs appellat. Quod si moderata caliditas accesserit ad ipsam, carnem augmentabit: si vero frigiditas, adipē et lardū procreabit: quæ propter dictum est a medicis, quod corporis grossities est duplex, vna quidē carnosa, velut in corporibus sanguineis, quæ vitam elōgat: Alia vero sanguinosa, velut in corporibus flegmaticis, quæ suffocat, & extinguit. Ex rebus itaque corpus humectantibus, sunt cibi & medicinæ, atque regimē operātium. Et cibi, quæ conueniunt in hoc, oportet vt multū & subitū præbeant nutrimentum: quare oportet, vt sint dulces subtilēs vinctuosi: velut sunt iura carniū agnorū, & pullos pinguiū, & porcellorū iuuenū, & perdicum, & fasianorū, & capitiū atque extremitatum vitulorū. Quod si fuerint iura hīdōi inspissata cū vitellis ouorū, necnon condita cū speciebus aromaticis nō acutis: velut sunt cinamomū, & cardamomū, nux muscata, zinzib. crocus, macis, liquiritia, & gallāga: melior fiet opatio: Similiter et vinū rub. dulce, vel albū rubeū odoriferū, vbi medio tēperatus in ætate, vel ceruisia debito artificio pparata. Grossa namque viscosa, & si nutrimentum tribuant mansuū, vehementer tñ virtutem nutritiā debilitant, priusquē elaborerūt: velut est criticum, & tortellæ: propter quod ait Hip. 2. par. apho. Facilius est repleri potu, quā cibo. Et ex rebus melioribus est lac recens, dulce, butyrosū, & proprie ouū vel vaccarū: Sistr & pulres de simila, vel farina auenæ, vbi farris, vel ordeī cōditi cum eodem: Similiter & caseus mollis & recēs, & butyrū cum buccella panis de simila comestum & pinæ, & fistici, & nuces recentes, atque auellana, & ficus pingues, & dactyli, et vna valde maturæ. Medicinæ vero impingvares, sic sūt. Iste. farinæ fabarū ex corticarū, farinæ cice, vbi pīso. ex cortic. rīsi, amyli, auellana, mundatarū, seim cōium frigidorū mundatorum, fisticorū,

quinearum. añ. quannū volueris de vno cuorū: iterant oia subtiliter, & inungant pum butyro recenti, & fiat electuariū cū zuc. de quo omī die comedať in ieiunio, et super ipsum bibať aliqđ ex potibus supradictis: Et si ipsum aromatizare volueris, adde ex speciebus supradictis. Et sunt quæ trochis. conficiunt ex rebus eisdē, cū lacte recenti butyroso. Et plurima restauratiua diximus. ca. de se. hecť. quæ sunt ex car nibus, aut sine carne. Et di. Mes. in suo de appropriatis ca. de spāmo: quæ iura capitiū hœdorum, & agnorū, & arietum pin guium iniecta cū clysteri, atque longo tpe retenta in ventre, corpus vehementer humectant. Similiter & lac dulce, postquē in eo cocta fuerit farina similæ, vbi ordeī, vel rīsi. Similiter et suppositoria ex eisdē confecta cum oleo, vel butyro, & per noctē in ventre retenta, donec fuerint dissoluta. Similiter & balneatio in aqua dulci tepida, vel in aqua decoc. extremitatum arietū et porcellorū, præter quæ fiat in ipsis longa mora, & proprie cū cibis in stomacho fuerit digestus: quā faciet eius sang. ad mēbra penetrare. Ad quod confert plurimum fricatio levis modica per superficiē corporis totius. Vnguēta autē, & emplāstra impinguantia corpus totū, similiter & mēbrum aridū, plene iam diximus cap. de diminutiōe coit. parag. de methodo. Et di. Auic. quæ flagellatio corporis cū cor rigijs mollibus, lenibus moderate facta, semel omī die post cibi digestionē impinguat corpus vehemēter, cutim rubificando, & nutrimentū ad mēbra attrahēdo. Regimen vero corpus impingvans consistit in multiplicatiōe somni i lecto molli sub arēe tēperato, & postpositione solitudinis, & laboris, & sudoris: nisi fortassis quicquid modicū sudare placeat i æstuario propter abstersionem sordiciorū, & sudorū, quæ sunt superfluantes digestionis quartæ & proprie mēbrorū: quā post hoc fortior sit attractio recentis nutrimenti.

Tractatus quartus secundi libri

Corpus vero maceratur ex dominio siccitatis super ipsum, & proprie super epar & cor: cū virtutē nutritiua influat super totū, siue illud affuerit per naturā, siue per diatā. Quod si calor vehemens, aut frigus assequatur: fiet exiccatio magis vltimata: propter quod dictum est a medicis, quod duplex est genus corporis: macro: vñ quidem propter resolutionē humiditatis plurimā: vt accidit iuuenibus, & cholericis febricitantibus, & laborantibus in sole aestuoso. Aliud vero propter digestionē debile, atque conuersionē nutritiui diuinitatē: quē admodū in melancholicis et senibus, & patiētibus heclicā senectutis. Ex rebus itaque corpus exiccantibus, sunt cibi & medicinae, atque regimen operatio nū: quē admodū in humectantibus diximus hucusque. Et cibi, qui conueniunt, oportet vt sint pauci nutritiui: quorum quintuplex est maneries: quoniam aut pauci ex ipsis conuertit: velut sunt cibi secessiui, quorum maior portio transit in superfluitates: verbi gratia: saliti plurimū, & allia, & sinapi. & iura piperata vehemēter: quoniam sui acuitate stimulant intestina. Aut multum ex ipsis resolutur, velut sunt cibi vrinatiui: verbi gratia: iura carniū non pinguiū, et brodia cicerū, vel pisorum: similiter et vinum album aquosum, & holera quaecunque: horum namque maior portio transit per vrinam, vel exhalat per sudorē: Vel plurimū ex ipsis virtus nutritiua fatigatur: sicut sunt cibi aquosi, vel acetosi, vel pontici, qui sui frigidityte stomachū epar, & membra congelant. Aut appetitus ex eis prosternitur, velut sunt cibi non sapidi, & quibus natura communis, vel propria nocetur inimica. Cum enim cibus praeter desiderium assumitur, ex ipso corpus non nutritur, sed potius fatigatur. Aut ex ipsis membrorum humiditas imbibitur, atque desiccatur: velut sunt cibi sicciper naturam: verbi gratia: Risum, mytilū, panicū, & caseus antiquus, & vinū

vetus amarus, et panis valde fermentatus, & panis azymus, et panis cū se. carui vñ fenic. cōditus, & panis affusus super prunas, & panis bis coctus, et panis antiquatus, donec fiat durus. Ex his namque grossus sanguis efficitur, qui sua siccitate omnes humores imbibit manifeste, & omnes humiditates diminuit. Medicinae vero corpus exiccantes, sunt omnes calidae siccāe vehementer: velut diamargariton, diatrion pipercon, diacyminum: Similiter et omnes ventris solutivae: velut hierapicra benedicta: similiter & omnes vrināe prouocativae: sicut dianisum & nefrocaticum. Similiter & omnes menstruorum educitivae: velut antidotum emagogum. Ex his enim omnibus cōsumitur omne, quod humectat. Et ex medicinis appropriatis est ista, scilicet. anisi, feniculi, agnocalti, rutae, cymini, carui, piperis, zedoarie, ameos, amomi, granorum iuniperi, seminis apii, salis adusti. añ. quantum volueris de vinoquoque: fiat ex eis pul. aut electuarium, & detur ex eo omni die in ieiunio 3. i. vel 2. cum potu aquae frigidae mixto, vel cum aceto, vel cū potu vini acetosi, vel albi aquosi, vel veteris amari: quoniam post diem & diem operabitur manifeste. Regimen vero operationum hoc idem faciens consistit in multitudine laboris, & sudoris sub aere aestuoso post famem, & sitim perdurantem: similiter & in vigiliis plurimis per noctem super lectum durum, necnon tristitia & solitudine vel coitu superfluyente. Vnguenta & emplastra sublimia corpus totū exiccantia, aut membrum quodcunque turgidum inflatum pro posse iam scripsi simus cap. de restrictione lactis in mamillis: & cap. de extenuatione mamillarum & capitulo de apostematibus virgae & testiculorum. parag. de empericis: & capitulo de varicibus & elephantia: & ex omnibus praecipua sunt illa, quae diximus cap. de arthetica. parag. de canone.

Prognosticatio. Potest quidem omne corpus macerari, im pinguari vero est impossibile, cum vehemens caliditas aut siccitas adest per naturam. Potest enim natura quæ facile subtrahere, apponere vero difficile, cum virtus non cooperatur. Itē dī. Gal. 8. de ingē. san. q̄ tēpus humectandi multo longius est tpe exiccādi: qm̄ siccitas facilius obtinet super humiditatē, q̄ contra: quapropter est dictū a medicis, q̄ humiditas est radix ois passiōis. Item corpora magnū epar habentia, difficile impinguant. Cognoscitur autē epar magnū ex venis magnis apparentibus in mēbris corporis totius: qm̄ gñā ē in hmōi san. calidus, subtilis, vaporosus. Itē dicit Hip. 2. par. apho. Quæcūq; multo tēpore extenuant corpora, tarde reuerti cōsueuerunt: q̄ vero in modico, modice. Cum nāq; virtus nutritiua deficitur, & humiditas substantifica minoratur, maius tēpus requirit resumptionis, q̄ si virtus remansisset. Corpora præterea grossa vehementer, sunt cenis anni tēporibus periodicè euacuanda, & proprie in principio veris, vel in fine aut tūncū flebotomia, si fuerint carnosa: sed cū farmacia, si fuerint saginosa, ne fortassis subito suffocent. De carnosis nāq; dicit Hip. 1. part. apho. In exercitantibus ad summū, habitudines sunt fallaces. De saginosis locutus est 2. apho. Crassi valde secundū naturā, cito moriuntur magis gracilibus. Corpora præterea cacochymica non crassescunt, aūq; purgēt: vñ Hip. 2. apho. Non pura corpora quāto magis nutries, tanto magis lædes. Itē corpa humida facile purgamus, et fortiter: macra vero, atq; fusca minus, et debilius. Vnde Hip. ibid. vbi indigētia, nō oportet laborare. Dicit præterea Auer. 2. coll. q̄ si corpus fuerit crassum moderate, virtutis nutritiue fortitudinē, & vitæ signat elongationē: qm̄ adeps est velut superfluitas proprii nutrimenti: quare natura sagax ipm̄

nō gñat, nisi prius mēbra singula restauerit. Corpora præterea macra facilius lædunt a causa primitiua, q̄ cōiuncta: verbi grā: Ab actu solis, vel frigore hyemis cōstringētis: qm̄ ipsorū mēbra sunt principalia debiliter cōfecta. Crassa vero corpora lædunt magis a causis intrinsicis, q̄ primitiuis: verbi grā. Oppilationibus, aut febribus, aut apostematibus pnciosis: qm̄ ipsorū vasa sunt oppilata, & coartata. Cū autē corporis partes sint duplices. s. spermaticæ et carniformes: solē qdē carniformes fluūt & refluūt, q̄ sunt caro & sagimen: spermaticæ vero nec senio, nec fame, nec agritudinē minorantur.

De nodis & verrucis Cap. IX.

Nodi vel verrucæ nuncupantur eminetiæ cutis tuberosæ, q̄ fiūt in manibus & pedibus ex materia grossa melancholica radicē habētes in mēbro profundatā, & caput grossum exterius, velut clauus infixus, neq; lædunt, cū coartatē: neq; prohibēt mēbrū a suis opationibus, nisi fortassis acciderint in volis manu vel plātis pedū, & proprie si fuerint magnæ, difficiles, antiquatæ. Et sunt modorū diuersorū: qm̄ aut sūt molles, tractabiles: aut duræ, aspæ vehemēter: Et iterū aut habēt paruū stipitē, caput vero latū, aut ecduersū: Et iterū, aut sunt albæ, aut nigrae, aut coloris eiusdē cū mēbro, cuius sunt: Et iterū, aut sunt integræ, aut scissæ p fissuras: Verū qualitercūq; se habuerint, non differunt in materia, neq; cura.

Methodus. Cura ipsarū ē, vt causticē & cōburatē earū radices citēquaq; vsq; ad profundū oīno, cū aq̄, & cū vnguētis ardetibus dictis ca. de hæmorrhoidibus, donec fuerint denigratæ, & mortificatæ pfectæ. Post hoc vero liniatē cū emplastris, & vnguētis putrefaciētibus, dictis ibid. donec p se ceciderint, vñ facile cū digitis extrahāt: neq; permittatur aliquid radices in loco: quoniā & si paruū fuerit, ilico germinabit. Post hoc

Tractatus quartus secundi libri

vero consolidetur vlcus cum puluere thuris minuti proiecto super ipsum, vel dragaganti, vel litargyri, donec totaliter appianetur. Quod si fuerint verrucae parue molles, neque profundae, sufficiet ipsarum fricatio vehemens & proprie post scarificationem profundatam cum medicinis, dictis ca. de morphea: & tam in paruis quam in difficilibus. Nutriatur paries ex cibis humidis sorbilibus sanguinem generantibus subtilem. Et purgetur humor grossus cum flebotomia larga, & farmacia: quemadmodum diximus ca. de lepra.

Emperica. Modus euellendi verrucas radicitus hic est, ut comburantur ipsarum capita vicibus frequentatis cum virga tenera coryli, vel myrti, vel cum tenta ignita, donec adustio penetret in radicem, ita ut separetur a membro circumquaque, velut surgens in tumore: tunc igitur leuiter manibus extrahatur, proutque rumpatur aliquid ex radice, & post vlcus consolidetur cum vnguento albo vlsitato. Et sunt, qui ligant radices verrucarum cum pilis caudae equinae, & leniter quaque die laqueum constringuunt, donec eius totam substantiam resercent: sed illud non sufficit, nisi fuerit veruca tenera, facilis non profunda.

De impetigine, serpigine, & igne persico & igne volatili & formica miliari Cap. X.

Omnes istae passionnes sunt similes in dispositione & causa, similiter & cura: quapropter de ipsis vno dicemus ca. Sunt pustulae valde minutae spissimae inuolutae simul plurimae currentes per membri superficiem, cum velocitate multa atque ardore & pruritu vehementi. Fiunt autem ex materia subtili adusta: verbi gratia, cholera vel flegmate salso, vel sanguine, cuius humiditate adustio non finiuit, neque reliquias ipsius ingrossa. Et si sit a cholera, sit color eius citri-

nus cum ardore vehementi: Si vero fuerit a flegmate salso, sit color subalbidus cum fursuribus & pruritu: Si vero a sanguine, fiet color ipsorum rubeus vehementer cum humiditate manante. Sunt praeterea huiusmodi pustulae quandoque in cutis superficie, quandoque velut sub cute, & quandoque cum bothor minutissimis, quandoque vero dilatatis: sunt etiam quae cum ardore pruritum vincent: quapropter diuersificantur eorum nomina, verumtamen nec causa nec cura.

Methodus. Cura ipsorum omnium cum fuerint tenerae, subtiles, est: ut a principio statim locus circumquaque ventosetur, atque scarificetur profundatim, & sanguis ex vulneribus cum digitis exprimat, ita ut nihil ipsius remaneat sub cute: & ad illud confert non modicum antecessio balnei: quam cutim mollificat, & materiam humectat. Post illud vero si quid visum fuerit remansisse, cum fricationibus ripticis vesicantibus extergatur, dictis ca. de fursuribus: quibus succedat ilico fricatio lenitiua dicta ibidem, donec ex alterationibus huiusmodi perfecte securetur. Quod si fuerint fortes, antiquatae, primo materia digeratur: similiter & purgetur, velut iam scripsimus ca. de scabie corporis & pruritu, quibus succedant localia remedia.

Emperica. Omnes istae passionnes de facili curantur, si praemissa scarificatione, et balneo iam dicto, locus frequenter ex vnguento albo vlsitato linatur. Vel si praesto non sit aliud, ex adipe gallinae, vel anseris, vel anatis, vel ex muscillagine scilicet lipi vel se. maluae, & loco scarificationis ponimus quoadque sanguis fugat, & proprie si materia fuerit profundata. Similiter & inungimus locum circumquaque ex oleo ro. vel ex albuminibus ouorum conquassatis cum aqua rosae. & aceto, vel cum succo trifolij, vel acetosae: ne fortassis perambulatio dilate. Et con-

fert ad id non modicum corporis humef-
tario ex cibis liquidis vergēbus ad fri-
giditatem: velut sunt iura carniū hœ-
dorum & agnorum elixatorum cum la-
ctucis & cucurbitis & feminibus ipsorū:
similiter & ex potibus aquæ frigidæ, vel
vini debilis aquosi & abstinētia a rebus
acutis oīno: vt sunt allia, cepæ, sinap̃, pi-
per, & cibi vehemēter saliti, & vinū ve-
tus amarum: similiter & ex balneis assi-
duis aquæ dulcis clara. Et ex remedijs
sublimibus, est oleum de vitellis ouorum
& oleum de iunipero, & oleum de fraxi-
no, quæ scripsimus cap. de lepra, & pro-
prie post curam generalem.

**¶ De lentiginibus & panno
faciei. Cap. XI.**

Differunt istæ passiones in dispositi-
one seu forma, verum qm̃ eadem
est ipsarum cura & causa, sub eo-
dem ca. reponuntur. Dicuntur autē lenti-
gines, maculæ rubæ aut nigræ in facie,
seu membri alijs generatæ, velut super
ipsum lenies sint profectæ. Fiunt autem
ex materia grossa melancholica cuti &
carni vehemēter infiltrata. Pannum ve-
ro dicimus colorem faciei nubilū obscu-
rum, quasi panno liuido vel tinctura so-
phistica variatum: vt accidit in pregnan-
tibus, & ambulanti-
bus in sole. Fit autē
ex humore grosso disper-
so per mēbri su-
perficiē omni-
qua: quare sit cutis opa-
ca p̃pter alienationem lucidi diaphani
ab extremitatibus ipsius.

Methodus. Cura amborū est, vt a prin-
cipio digerat materia, atq;
pargetur, modo cū farmacia, modo cū
flebotomia larga grossum sanguinē ex-
trahēte, cui succedat regeneratio assidua
humorū subtiliū lucidorū ex cibis & po-
tibus subtilibus, & balneis humectanti-
bus pro posse, quæ plene omnia iam tra-
ctauimus ca. de lepra. Post ista vero pro-
cedendum est ad localia tali modo: qm̃

oportet, vt primo totus locus vlceret, do-
nec macularum vestigia radicatus extur-
pentur: quod quidem perficitur cum vn-
guentis & fricationibus: similiter & em-
plastris acutis rubificanti-
bus vehemēter, atq; cutim corrodentibus & carnē: post
illud vero succedat inunctiones stypticæ
consolidatiuæ vlcerum, quibus admisce-
atur quod albedinem nigrat et decorem:
& hæc oīa plene iam tractauimus ca. de
albaras & morphea.

Emperica. Si pannus aut lentigo fuerit
recēs atq; facilis, tollit hoc
modo. Fricetur primo locus & facies cū
oleo de tarraro, & de iunipero vel cum
aqua decoct. sinap̃. vel cū lixiuio acuto,
in quo sapo fuerit dissolutus, donec cutis
cecidit omnino: & ad illud confert plu-
rimum antecessio balnei, vel membri so-
mentario cū aqua tepida: qm̃ cutim mol-
lificat, et ad casum facilem ipsam aptat.
Post illud vero perungatur sapius cū vn-
guento albo vsitato, vel cū vnguento ci-
trino: qm̃ cutim regenerat candidā & de-
corā. Ad idem præterea conferunt omnia,
quæ diximus ca. de albificatione, & leni-
ficatione corporis totius.

Prognosticatio. Vtraq; istarum passi-
onum difficile curat̃,
& proprie cū fuerit fortis, antiquata: qm̃
tunc eius materia vehemēter est infixa:
Veruntamen lentigines sunt panno diffi-
ciliores. Sunt autē lentigines duarū speci-
erum: qm̃ quædam sunt rubæ, quædam
vero nigræ, sed nigræ sunt peiores, et q̃to
nigriores sunt, tanto deteriores. Lenti-
gines cū fuerint ex generationis principio,
nullatenus curantur: præterea pannus in
facie cum breuiter superuenerit cū signis
alijs, mulierē certificat imprægnatam.

¶ De scrophulis. Cap. XII.

Scrophulus est caro glandulosa geni-
ta in loco molli spongiosa, velut in
gutturē, vel post aures: vel circa iun-
cturam vel sub alis, ṽl in inguinibus, ex

Tractatus quartus secundi libri

decurſu humoris groſſi viſcoſi, velut eſt flegma gypſeum, quod actione caloris naturalis inſpiffatum conuertitur in carnem duram, rotundam, albi coloris: quæ cum manibus tractatur, mouetur de loco ad locum, velut nux in cifti. Et quandoq; ſunt tres vel quatuor in eodem loco, & quandoq; magnificantur, donec fiant ſicut melones vel cucurbitæ, & occupant collum totum & caput. Cura eius cum eſt parua recēs & mollis, ſolis medicinis acutis reſoluentibus integratur, qđ eſt vt ægrum euacues a flegmate, cū vomitu forti aſſiduo, ſi fuerit poſſibile. Similiter & cum catharticis attrahentibus flegma cum virtute, quæ diximus cap. de epilepſia, & cap. de paralyſi: & fac ipſum pari famem & ſitim poſt exercitium & laborem fortem in ieuniō, & cauere a cibis & poribus viſcoſis: vt ſunt paſta, tortellæ, & cibi frixi, & caſeus, & piſces. Et rege ipſum cum cibis ſubtilibus acutis calidis: vt ſunt allia, ſinap. & piper, atq; vinū vetus, purum, amatum. Poſt iſta vero omnia adminiſtrentur emplaſtra reſolūctia, atq; ſuffumigia ſimiliter, & gargarifmata, necnō vnguentā, & maſticationes, prout nūc dicemus. Emplaſtrum reſolutiuum ſit ex diaquilon vel apoſtholicon actu calido poſito ſuper locum: ſimiliter & ex fermento, cui myrrha, aut cantharides contrita fuerint commixta: ſimiliter & ex ſtercore colūbaræ, cui ſicus ſiccæ & allia, & cepe crudum, et ireos, & ſtaſifagria fuerint incorporata pfecte piſtādo in mortario, atq; commiſcēdo, & actu calidum imponendo poſt balnearionē, vel membri fomentationē ex aqua dulci calefacta. Suffumigium reſolutiuum ſit ex pipere, myrrha, ſpōgia marina, oſſe ſepiæ, ſaxifraga, pyrethro, galbano, armoniaco, bdellio, opoponaco, ſulphure: quodetiꝫ iſtorum poſitū fuerit ſuper carbonēs ignitos: ita vt patiēs ſumum recipiat ore aperto, donec

humor effluat ſaliuatiū, & proprie omni die in ieuniō: vel aliqua ipſorū ſimul conuertantur in puluerem, ex quo figurētur pillulæ cum pice, aut terebēntina, & vſui referuentur. Gargarifmata vero ſiunt ex oxymelle ſquillitico & aqua calida, vel ex ſinapitrica, & conſecta cū melle, vel ex aqua decoctionis pyrethri, ſinap. gentianæ, vel ex aceto acutiſſimo, & vino veteri amaro, vel ex aqua calida ſalfa vehementer. Vnguenta vero reſolutiua ſiunt ex vnguento ſulco acuatō cū myrrha, & galbano, poſtq̃ diſſoluta fuerint in vino veteri, & incorporata cum ipſo: Similiter & ex bdellio, galbano, armoniaco, ſerapino, opoponaco ſimul diſſolutis in aceto acutiſſimo, vel vino veteri amaro, & poſt hoc incorporatis cum cera liquefacta ad ignem in caſola. Maſticationes vero ſiūt ex pipere trium ſpecierum, & pyrethro, & euſorbio, & ſinapitritis & pulueriſatis groſſo modo, ita vt ex hoc puluere ſapius in ieuniō maſtictur aliqd, donec eius calor flegma colliquarit, quare totum expuatur ſimul: vel ſiāt ex eis trochiſci cum vino veteri, vel cum aqua decoctionis caricarum, vel cū oxymelle ſquillitico, quorū duo vel tres omni die maſticeantur in ieuniō. Ex reſolutiuis igitur huiusmodi yciſſim alteratis, tota materia extrahatur, ita vt nihil ipſius penitus remaneat: quoniām ſi fuerit quid modicum remanens, deuo germenabit. Cum aut ſcrophulus fuerit magnus, durus, diſtictilis, anriquat, hac cura reſoluetur: ſed oportet, vt raſorio circumcirca excorietur, ita tamen, vt vena vel arteria nequaꝫ diſſoluatur: quoniām magnum foret periculū propter hæmorragiam ſanguinis vehementem, atque extrahatur, & vulnus ilico coartetur cū pulueribus ſtypticis, & faſcijs plurimis: ne fortaliſſ ſanguis effluat exceſſiuus, velut ſunt bolus arme, terraſigillata, ſang. draconis, roſæ et myrtilli. In ſine vero cū

Solidetur cum vnguentis & pulueribus cicatrizatiuis: vt sunt, vnguentum de lithargyro dictum capitulo de fissura labiorum oris, & vnguentum de mastice & thure dictum capitulo de hæmorrhoidibus: similiter & vnguentum album vtitur, postquam fuerit cum puluere thuris mummiæ, masticis & dragaganti, et

lithargyri confortatum. Et in hoc laborem nostrum compleuimus auxilio dei misericordis: cuius nomen sit benedictum in sæcula sæculorum: Amen.


Collectoriꝝ medicinæ Bertruchij
Bononiensis finis.

The first of these is the fact that the
 second of these is the fact that the
 third of these is the fact that the
 fourth of these is the fact that the
 fifth of these is the fact that the
 sixth of these is the fact that the
 seventh of these is the fact that the
 eighth of these is the fact that the
 ninth of these is the fact that the
 tenth of these is the fact that the

1.2
 1.700 ar units

Complete / Normal
 with blank by

Drelling 560



1910
126

12
128
835
1537

